



实用中草药彩色图鉴大全集

全草类 中草药彩色图鉴

巢建国 周德生 主编



- **100** 种最常见全草类中草药
- **300** 多幅原植物、药材、饮片高清原色彩图
- **500** 多首精选验方，配以实用病症验方索引，方便查找



湖南科学技术出版社

1238
205



实用中草药彩色图鉴大全集

全草类

中草药彩色图鉴

主 编：巢建国 周德生

副主编：周达宇 谷 巍 陈湘鹏 周 海

编 委：（按拼音字母为序）

巢建国	陈湘鹏	陈 瑶	戴 莉	邓 龙	高 杰
耿 超	谷 巍	郭 彪	郭雅玲	侯皓然	胡 华
江元璋	黎秋凤	李彩云	李 琳	李孟洋	李 中
刘菊燕	刘利娟	刘圣金	马思雨	束晓云	孙亚昕
谭 灊	吴兵兵	肖志红	张 莹	周达宇	周德生
周 海	周娟娟	周 平	邹立思		

图书在版编目 (C I P) 数据

全草类中草药彩色图鉴 / 巢建国, 周德生主编. —长沙 : 湖南科学技术出版社, 2016.6

(实用中草药彩色图鉴大全集)

ISBN 978-7-5357-7768-3

I. ①全… II. ①巢… ②周… III. ①中草药—图谱
IV. ①R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 110731 号

实用中草药彩色图鉴大全集

QUANCAOLEI ZHONGCAOYAO CAISE TUJIAN

全草类中草药彩色图鉴

主 编：巢建国 周德生

责任编辑：李 忠 王跃军

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址：

<http://hnkjcbstmall.com>

邮购联系：本社直销科 0731-84375808

印 刷：长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮 编：410600

出版日期：2016 年 6 月第 1 版第 1 次

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：15.75

书 号：ISBN 978-7-5357-7768-3

定 价：58.00 元

(版权所有 · 翻印必究)

前 言

我国中草药种类繁多，资源丰富。一种中草药资源，当它作为一种植物存在时，它表现的是以枝、叶、花、果实的自然形态；当它作为药材应用时，它是天然的或经产地粗加工的原料药；当以配方入药应用时，它必须是按照有关规范进行加工炮制后的饮片。它的不同用途与形态带给我们不同的图像，给我们在识别与鉴别中草药时带来一定的困难。

为了保证中草药的稳定、安全与有效，准确识别与鉴别常用中草药的植物自然形态以及药材、饮片，我们组织长期从事中草药鉴别的有关专家，根据他们在植物资源调查以及科研工作中所积累的大量图片，编写了这本《全草类中草药彩色图鉴》，以满足广大中医爱好者、采集中草药人员以及中医药院校学生的需要。

本书收载了常用中草药100种，重点突出了常用同种中草药的原植物形态、药材、饮片的特征，并配有彩色图片，图文并茂，使读者能够快速、准确地识别与鉴别常用中草药。

现将本书的内容与特色介绍如下：

- ① 本书精简明确地记载了全草类常用中草药的别名、来源、产地、采收加工、原植物、药材性状、饮片特征、质量标志、性味功能、用法用量、常用验方。每味中草药均附有原植物形态、药材形态、饮片形态3张图片。
- ② 常用验方主要是从古代和现代医药文献中精心挑选的经验方，具体应用时可随症加减，有毒药物及大剂量药方的应用应遵医嘱。
- ③ 每味中草药彩色图片均经专家鉴定，精心挑选，以保证照片的清晰度和科学性。
- ④ 本书的参考文献主要以最新版《中华人民共和国药典》与高等院校教材《中药鉴定学》等公开出版的权威著作或杂志文献为主，限于篇幅，未注明出处。

由于编者的水平有限，编写时间较为紧迫，不足或错漏之处在所难免，敬请广大读者多提宝贵意见。

巢建国 周德生

于南京中医药大学
湖南中医药大学



试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

一 画

- 一支箭 002
- 一枝黄花 004
- 一点红 006

三 画

- 三叶人字草 010
- 三白草 012
- 千层塔 014
- 千里光 016
- 千屈菜 018
- 大蓟 020
- 小蓟 022
- 广金钱草 024
- 广藿香 026

四 画

- 及己 032
- 双蝴蝶 034
- 天胡荽 036
- 瓦松 038
- 车前草 040
- 长春花 042

五 画

- 仙桃草 046
- 仙鹤草 048
- 冬凌草 050
- 半边莲 052
- 半枝莲 054

- 叶下珠 056
- 瓜子金 058
- 田基黄 060
- 白花蛇舌草 062
- 白英 064
- 石仙桃 066
- 石蝉草 068
- 龙葵 070

六 画

- 刘寄奴 074
- 地椒 076
- 地锦草 078
- 地柏枝 080
- 百蕊草 082
- 红旱莲 084

目 录

七 画

- 伸筋草 088
- 含羞草 090
- 杠板归 092
- 芫荽 094
- 连钱草 096
- 陆英 098
- 驳骨丹 100
- 鸡屎藤 102
- 鸡骨草 104

八 画

- 佩兰 108
- 兔耳风 110

- 垂盆草 112
- 委陵菜 114
- 岩白菜 116
- 泽兰 118
- 泽漆 120
- 肿节风 122
- 茅莓 124
- 虎耳草 126
- 虎刺 128
- 败酱草 130
- 金线莲 132
- 金盏银盘 134
- 金钱草 136
- 鱼腥草 138

九 画

- 穿心莲 142
- 绞股蓝 144
- 茵陈 146
- 荆芥 148
- 荔枝草 150
- 鬼羽箭 152
- 贯叶连翘 154

十 画

- 瓶耳小草 158
- 留兰香 160
- 益母草 162

积雪草	164
笔简草	166
透骨草	168
铁苋菜	170
鸭跖草	172

十一画

淡竹叶	176
淫羊藿	178
猫爪草	180
绵毛马兜铃	182
菥蓂	184
蛇莓	186
野马追	188
雪莲花	190
鹿衔草	192
麻黄	194

十二画

筋骨草	198
紫参	200
紫花地丁	202
葛蕕	204

十三画

矮地茶	208
蒲公英	210
鼠曲草	212
豨莶草	216

十四画

十五画

墨旱莲	220
-----	-----

十六画

薄荷	224
----	-----

十八画

瞿麦	228
----	-----

十九画

藿香	232
----	-----

目 录

药名汉语拼音索引	234
病症验方索引	237

一 画

来 源 瓶尔小草科植物尖头瓶尔小草 *Ophioglossum peclunculosum* 或心脏叶瓶尔小草 *O. reticulatum* L. 等的带根全草。

产 地 分布于福建、台湾、广东、安徽、江西、四川、贵州、云南等地。

采收加工 春、夏季采挖带根全草，洗净泥沙，阴干或鲜用。

原 植 物 为多年生小草本，高15~20厘米。根状茎短，呈圆柱形。营养叶单一，卵圆形。长3~6厘米，宽2~3厘米，先端钝或有小突尖，全缘，基部阔楔形，侧脉网状，不与中脉平行；孢子叶自营养叶基部抽出，线形穗状，先端尖；孢子囊30~60对，排成2列；孢子苍白色，近于平滑。

药材性状 全体卷缩状，根茎短，根细小，圆柱形，弯曲，黄棕色。叶2~3枚，总叶柄长10~20厘米。营养叶展开后呈卵圆形，长3~6厘米，宽2~2.5厘米。先端钝或稍急尖，基部圆楔形或阔楔形，柄长5~10毫米，两侧有狭翅，草质，表面绿黄色，叶脉网状。孢子囊穗条形，长2.5~3.1厘米，先端尖，从总柄顶端生出，有8~15厘米长的柄。质柔软，难折断。气微，味淡。

饮片特征 根茎短，细小，呈圆柱形，弯曲，黄棕色。叶展开后呈卵圆形，两侧有狭翅，草质，表面绿黄色，叶脉网状。孢子囊穗条形，先端尖，从总柄顶端生出。质柔软，难



一支箭 | yizhijian

别名：青藤、蛇咬子、小青藤

折断。气微，味淡。

质量标志 以根细、叶黄绿色者为佳。

性味功能 性微寒，味苦、甘。归肝经。功能清热解毒，活血散瘀。用于痈肿疮毒，疥疮身痒，跌打损伤，瘀血肿痛，毒蛇咬伤，烧烫伤，瘀滞腹痛。

用法用量 内服：煎汤，15~30克。外用：适量，鲜品捣敷；或煎水洗；或研末调敷。

常用验方

- ①治疥疮：一支箭、蒲公英、鱼鳅串、侧耳根各15克。炖鳝鱼服。
- ②治痈肿：一支箭、鱼腥草、铧头草、野烟叶各15克。捣烂敷。
- ③治乳痛：一支箭、蒲公英各适量。捣烂外敷。
- ④治疗疮痈肿：一支箭、熟大黄各4.5克，对经草12克，柴胡6克。水煎服。
- ⑤治毒蛇咬伤、无名肿毒：一支箭鲜品适量。捣烂外敷。
- ⑥治小儿疳积：一支箭、使君子、鸡内金各10克。煎服。
- ⑦治跌打损伤：一支箭适量，大黄6克，三七粉10克，乳香、没药各8克。共捣烂，黄酒调敷患处。
- ⑧治腹痛：一支箭15克，蒲黄、川芎、当归各10克，赤芍、延胡索各9克，五灵脂、没药各6克。水煎服。



原植物

图1 一枝箭



药材



饮片

来 源	菊科植物一枝黄花 <i>Solidago decurrens</i> Lour. 的全草或带根全草。
产 地	分布于浙江、江苏、安徽、江西、贵州、湖南、湖北、广东、广西等地。
采收加工	夏、秋季之间采收，洗净，晒干，切碎用。
原 植 物	多年生草本，高 15~80 厘米。茎直立，下部光滑无毛，上部微有茸毛。叶互生；卵形至矩圆形，长 1~5 厘米，宽 0.2~2.5 厘米，下部叶具柄，上部叶较小而狭，近于全缘。圆锥花序，由腋生的总状花序再聚集而成；头状花序小，直径 5~8 毫米，单生或 2~4 聚生于腋生的短花序柄上；总苞片狭而尖，具干膜质边缘，长 2~5 毫米，大小不等，数列呈覆瓦状排列；花托秃裸；外围的舌状花黄色，雌性，约 8 枚；中央筒状花，两性，花冠 5 裂，花药聚合，基部钝。蒴果近圆柱形，秃净或有柔毛。花期 10 月，果期 11 月。

药材性状 茎圆柱形，表面暗紫红色或灰绿色，具纵纹，光滑无毛，茎端有稀毛；质坚而脆，易折断，断面纤维性，中央有疏松的白色髓。叶片多破碎而皱缩，上面黄绿色，下面淡绿色，展平后呈卵圆形、长圆形或披针形。头状花序集生茎顶，排成总状或圆锥状，苞片 3 层，膜质宿存，花冠多脱落。气清香，味苦。

饮片特征 茎圆柱形，表面暗紫红色或灰绿色，具纵纹，质坚而脆，易折断，断面纤维性，中央有疏松的白色髓。叶片多破碎而皱缩，展平后呈卵圆形、长圆形或披针形。头状花



一枝黄花 | yizhihuanghua

别名：野黄菊、山边半枝香、酒金花、满山黄、百根草、百条根

序集生茎顶，膜质宿存，花冠多脱落，气清香，味苦。

质量标志 以叶多、色绿者为佳。

性味功能 性平，味辛、苦。归肝、胆经。功能清热解毒，消肿除痛。用于上呼吸道感染，肺炎，肺结核，肾炎，小儿疳积；外用治跌打损伤，毒蛇咬伤，疮疡肿毒，乳腺炎。

用法用量 内服：煎汤，9~18 克（鲜者 21~30 克）。外用：捣敷或煎水洗。

常用验方 ①治感冒、咽喉肿痛、扁桃体炎：一枝黄花 9~30 克。煎服。②治头风：一枝黄花根 9 克。水煎服。③治黄疸：一枝黄花 45 克，水丁香 15 克。水煎服。④治小儿急惊风：鲜一枝黄花 30 克，生姜 1 片。同捣烂取汁，开水冲服。⑤治跌打损伤：一枝黄花根 9~15 克。水煎服。⑥治发背、乳痈：一枝黄花 21~30 克。酒煎服，渣捣烂敷患处。⑦治痈肿：一枝黄花 60 克，野菊根 30 克。醋煎熏疮口。⑧治肿毒初起：一枝黄花 60 克。煎水淋洗，或用毛巾浸药汁温敷患处。⑨治咽喉肿毒：一枝黄花 21 克。水煎，加蜂蜜 30 克调服。⑩治毒蛇咬伤：一枝黄花 30 克。水煎，加蜂蜜 30 克调服。外用全草同酒糟杵烂敷。⑪治鹅掌风、灰指甲、脚癣：一枝黄花，每日 30~60 克，煎取浓汁，浸洗患部，每日 1~2 次。



原植物

图2 一枝黄花



药材



饮片

来 源 菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC. 的全草。

产 地 主产于广东、广西、福建、贵州、江西。

采收加工 夏、秋季采收，洗净晒干，或趁鲜切段晒干。

原 植 物 一年生草本，高 10~50 厘米。茎分枝，枝柔弱，粉绿色。叶互生，茎下部叶卵形，攀状分裂，长 4~9 厘米，上部叶较小，抱茎。头状花序直径 1~1.3 厘米，有长梗，花枝常 2 纲分枝；总苞圆柱形，苞片 1 层，约与花冠等长；花管状，红色，两性。蒴果圆柱形，长 5~6 毫米，有棱，冠毛白色，柔软。花期春至秋季。

药材质性状 全草长约 30 厘米。根茎细长，圆柱形，浅棕黄色；茎少分枝，细圆柱形，有纵纹，灰青色，基部叶卵形、琴形，上部叶较小，基部稍抱茎；纸质。头状花序干枯，花多已脱，花托及总苞残存，苞片茶褐色，膜质。蒴果浅黄褐色，冠毛极多，白色。有干草气，味淡，略咸。

饮片特征 根茎细长，圆柱形，浅棕黄色；茎少分枝，细圆柱形，有纵纹，灰青色，纸质。头状花序干枯，花多已脱，花托及总苞残存，苞片茶褐色，膜质。蒴果浅黄褐色，冠毛极多，白色。有干草气，味淡，略咸。

质量标志 以叶多、棕黄色者为佳。



一点红 | yidianhong

别名：红背叶、叶下红、羊蹄草

性味功能 性凉，味苦。归脾、肾经。功能清热，利水，凉血，解毒。治痢疾，腹泻，便血，水肿，肠痈，耵耳，目翳，喉蛾，疔疮，肿毒。


用法用量 内服：煎汤，25~50 克。外用：适量，鲜品捣烂敷患处。

常用验方 ①治痢疾、便血：一点红和猪瘦肉煎汤服之。②治肠炎：一点红 200 克，番桃叶 20 克。水煎服，每日 2 次，每次 50 毫升。③治水肿：鲜一点红全草、灯心草各 100 克。水煎，饭前服，每日 2 次。④治肾盂肾炎：一点红 30 克，狗肝菜 30 克，车前草 30 克。水煎服。⑤治乳痈：鲜一点红茎叶 100 克，加红糖共捣烂，加热敷贴。⑥治无名肿毒、对口疮：鲜一点红叶 100 克，加红糖捣烂敷贴，日换 2 次。⑦治指疗：鲜一点红同砂糖少许捣烂敷。⑧治耵耳：鲜一点红适量。洗净，用开水浸润后捣取自然汁。先洗净患耳，再将药汁滴入，每日 2~3 次。⑨治翳膜：一点红 200 克，梅片 0.5 克。共捣烂，敷眼眶四周。⑩治喉蛾：鲜一点红 150 克。水煎，频频含咽。⑪治小儿上呼吸道感染：一点红、古羊藤各等份。水煎服。⑫治溃疡：鲜一点红茎叶适量。捣烂，敷于患处，日夜各换一次。⑬治跌打肿痛：一点红 400 克，土牛膝 200 克。共捣烂，敷患处。



图3 一点红





三画

来 源	豆科植物鸡眼草 <i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl 的全草。
产 地	生长于向阳山坡。分布于东北、西南、中南、江苏、福建等地。
采收加工	7~8月采取，晒干或鲜用。
原 植 物	一年生或多年生草本，高10~30厘米，多分枝。小枝上有白色细毛。三出羽状复叶，互生；有短柄；小叶细长，椭圆形，长2~8厘米，宽3~7毫米，先端圆形，其中脉延伸呈小刺尖，基部楔形；沿中脉及边缘有白色鬃毛。托叶较大，长卵形，急尖，初时淡绿色，末时为淡褐色。花蝶形，1~2朵，腋生；小苞片4，卵状披针形；花萼深紫色，钟状，长2.5~3毫米，5裂，裂片阔卵形；花冠浅玫瑰色，较萼长2~3倍；旗瓣近圆形，顶端微凹，具爪，基部有小耳；翼瓣长圆形，基部有耳；龙骨瓣半卵形，有短爪和耳；雄蕊2。荚果卵状圆形，顶部稍急尖，有小喙，萼宿存。种子1粒，黑色，具不规则的褐色斑点。花期7~9月，果期9~10月。

药 材 性 状	茎枝圆柱形，多分枝，被白色细毛。三出复叶互生，叶多皱缩，完整小叶椭圆形；叶端钝圆，有小突刺，叶基楔形；沿中脉及叶缘疏生白色长毛；托叶2片。花腋生，花萼钟状，深紫褐色；蝶形花冠浅玫瑰色。荚果卵状，顶端稍急尖，有小喙。种子1粒，黑色，具不规则褐色斑点。气微，味淡。
----------------	--



三叶人字草

sanyerenzicao

别名：鸡眼草、人字草、三叶草、鹿含草、土文花

饮片特征	茎枝圆柱形，多分枝，叶多皱缩，花萼钟状，深紫褐色；蝶形花冠浅玫瑰色，荚果卵状，种子1粒，黑色，具不规则褐色斑点。气微，味淡。
-------------	--

质量标志	以叶多、茎直者为佳。
-------------	------------

性味功能	性微凉，味甘、淡，无毒。归肺、肾经。功能清热利湿，健脾，清肺利尿。用于咳嗽，口渴，疳积，久痢，疟疾，中暑发痧，小便不利，尿血，急性胃肠炎，夜盲症。
-------------	---

用法用量	内服：煎汤，9~15克。外用：捣敷或捣汁涂。
-------------	------------------------

常用验方	<p>①治吐泻腹痛：三叶人字草嫩尖叶适量。口中嚼之，其汁咽下。</p> <p>②治中暑发痧：鲜三叶人字草90~120克。捣烂冲开水服。</p> <p>③治黄疸、暑泻、肠风便血：公母草21~30克。水煎服。</p> <p>④治久痢：鲜三叶人字草60克，凤尾蕨15克。水煎，饭前服。</p> <p>⑤治红白痢疾：公母草15克，六月霜6克。水煎，去渣服。</p> <p>⑥治疟疾：三叶人字草30~90克。水煎，分2~3次服。</p> <p>⑦治小儿疳积：三叶人字草15克。水煎服。</p> <p>⑧治胃痛：三叶人字草30克。水煎温服。</p> <p>⑨治小便不利：鲜三叶人字草30~60克。水煎服。</p> <p>⑩治热淋：公母草21~30克。米酒煎服。</p> <p>⑪治白带：公母草21~30克。用精猪肉60~90克炖汤，以汤煎药服。</p> <p>⑫治跌打损伤：三叶人字草适量。捣烂外敷。</p>
-------------	--