

2017年

护士执业资格考试 模拟试卷

• 崔景晶 冯玉英 刘学梅 主编



- ◆ 仿真试卷 5 套
- ◆ 涵盖历年高频考点



化学工业出版社

2017年

护士执业资格考试 模拟试卷

• 崔景晶 冯玉英 刘学梅 主编



化学工业出版社

· 北京 ·

本书共包含 5 套模拟试卷，每套模拟试卷分为专业实务和实践能力两个分卷。各试卷考题紧扣最新考试大纲，各科目占分比例、题型与真题相同，难度以近 5 年真题的平均难度为准，高频率出现的考点覆盖率达到 75%。本书可帮助考生在较短的时间内，全面掌握重要考点、迅速提高应试能力。本书适合参加护士执业资格考试的考生参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

2017 年护士执业资格考试模拟试卷/崔景晶, 冯玉英,
刘学梅主编. —北京: 化学工业出版社, 2016.12
ISBN 978-7-122-28493-8

I. ①2… II. ①崔…②冯…③刘… III. ①护士-资格
考试-习题集 IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 265366 号

责任编辑: 赵兰江
责任校对: 宋 夏

装帧设计: 张 辉

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 三河市航远印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 10 $\frac{1}{4}$ 字数 251 千字 2017 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 32.00 元

版权所有 违者必究

编写人员名单

主 编：崔景晶 冯玉英 刘学梅

副主编：于秀荣 刘 珍 张 芳 王 琳 刘秀芳

编 者：（按姓氏笔画排序）

于秀荣 王 丽 王 琳 冯玉英 邢娜娜

刘 珍 刘 珊 刘秀芳 刘学梅 李 敏

李伟华 李景霞 张 芳 张 娜 陈 菲

崔清芳 崔景晶 薛焕云

前 言

执业护士资格考试的主要内容为护理基本理论、基本知识、基本技能，涉及循环、呼吸、消化及泌尿系统等 21 个章节的内容。自 2011 年起，考试科目由原来的四个科目改变为专业实务和实践能力两个科目，一次通过两个科目为考试成绩合格。为帮助考生更好地了解新的考试要求，由各专业富有经验的护理学教师，针对 2017 年考试编写了本书，使考生体验考试的题型和难度，同时复习、掌握重要的考点。

“紧扣新编大纲、覆盖考点率高、题型难度均衡、注重简洁时效”是本书的特点。本书紧扣卫生部护理资格考试委员会和国家医学考试中心修订的考试大纲，根据考试范围准确把握历年考点，高频率出现的考点覆盖率达到 75%，各科目占分比例和题型严格按照真题标准，难易度以近 5 年真题的平均难度为准，用最为简洁的语言，尽可能少的篇幅，使考生在最短的时间内，全面掌握重要考点、迅速提高应试能力、轻松应对资格考试。

为了考生应试水平的迅速提高和顺利通过本次考试，我们从各个方面做了不懈的努力，由于时间比较紧，编写内容多，疏漏之处在所难免，恳请同行专家和广大考生批评指正。

最后，衷心祝愿考生朋友们顺利通过本次考试，成为一名优秀的白衣天使！

编者

2016 年 10 月

目 录

模拟试卷（一）	1
专业实务	1
实践能力	16
参考答案	33
模拟试卷（二）	35
专业实务	35
实践能力	49
参考答案	66
模拟试卷（三）	67
专业实务	67
实践能力	80
参考答案	95
模拟试卷（四）	97
专业实务	97
实践能力	111
参考答案	126
模拟试卷（五）	128
专业实务	128
实践能力	141
参考答案	156

模拟试卷 (一)

专业实务

一、以下每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 世界卫生组织 (WHO) 对健康的定义不包括
A. 有完整的生理状态
B. 躯体没有疾病
C. 有完整的心理状态
D. 有社会适应能力
E. 有一定劳动能力
2. 下列描述不属于护理诊断的是
A. 体温过低
B. 肝性脑病
C. 营养失调
D. 体液不足
E. 完全性尿失禁
3. 腰椎穿刺后 6 小时内让患者采取去枕仰卧位的目的是
A. 防止颅内压增高
B. 防止脑缺血
C. 预防颅内感染
D. 防止颅内压降低
E. 有利于脑部血液循环
4. 对芽胞无杀灭作用的消毒剂是
A. 2% 戊二醛
B. 2% 过氧乙酸
C. 环氧乙烷

- D. 漂白粉
E. 洗必泰 (氯己定)
5. 下列操作中，违反无菌原则的做法是
A. 取放无菌持物钳时，钳端向下
B. 倒取无菌溶液时，手不可触及瓶盖的内面
C. 打开无菌容器盖时，盖内面向上放置
D. 手持无菌容器时，应托住边缘部分
E. 铺好无菌盘，手不可触及治疗巾的内面
6. 应执行保护性隔离的疾病是
A. 白血病
B. 痢疾
C. 霍乱
D. 伤寒
E. 肺结核
7. 对受压处局部进行按摩方法，以下错误的是
A. 蘸 50% 乙醇做局部按摩
B. 做压力均匀的环形按摩
C. 全手掌紧贴皮肤按摩
D. 按摩力度由轻到重，再由重到轻
E. 每次 3~5 分钟
8. 测量血压时出现假性高读数的原因可能是
A. 血压计袖带宽度太宽
B. 血压计袖带缠绕太紧
C. 被测者手臂位置高于心脏
D. 被测者在进餐后立即测量血压

- E. 测量时放气速度太快
9. 对医嘱的描述不正确的是
- A. 临时医嘱一般只执行一次
- B. 长期医嘱有效期限在 24 小时以上
- C. 长期医嘱在医生注明停止时间后失效
- D. 临时备用医嘱 12 小时内未执行须注明未用
- E. 长期备用医嘱 24 小时以上未执行须注明未用
10. 我国卫生部规定, 500 张以上床位的医院的护理管理体制的设置为
- A. 设专职副院长兼护理部主任, 另设护理部副主任 2 人
- B. 不需设专职副院长, 设护理部主任 1 人, 副主任 2 人
- C. 设专职副院长兼护理部主任, 另设护理部副主任 1 人
- D. 护理部主任 1 人, 副主任 3 人
- E. 护理部主任 1 人, 副主任 1~2 人
11. 在对肿瘤患者的护理道德要求中, 应尊重恶性肿瘤晚期患者的一项基本权利是
- A. 应得到心理护理
- B. 减轻或解除痛苦
- C. 选择诊疗方案
- D. 保障基础护理
- E. 允许随时探视
12. 护士在与患者交谈过程中, 希望能给自己提供思考和观察的时间, 此时可采用的交谈技巧是
- A. 倾听
- B. 核实
- C. 鼓励
- D. 沉默
- E. 重述
13. 糖尿病最容易并发的感染是
- A. 真菌性阴道炎
- B. 肾盂肾炎
- C. 皮肤化脓性感染
- D. 肺结核
- E. 败血症
14. 对于甲状腺功能亢进症重度浸润性突眼患者, 护理措施不妥当的是
- A. 睡觉或休息时抬高头部
- B. 鼓励多饮水
- C. 眼睑不能闭合者用眼罩覆盖双眼
- D. 常用眼药水湿润眼睛
- E. 睡前涂抗生素眼膏
15. 易引起阿-斯综合征的心律失常是
- A. 房性期前收缩
- B. 室性期前收缩
- C. 心房扑动
- D. 心房颤动
- E. 三度房室传导阻
16. 可以同时扩张小动脉和静脉的血管扩张剂是
- A. 硝普钠
- B. 酚妥拉明
- C. 硝酸甘油
- D. 多巴胺
- E. 多巴酚丁胺
17. 心肌严重而持久的急性缺血达多长时间以上, 即可发生心肌梗死
- A. 30 分钟
- B. 1 小时
- C. 15 分钟
- D. 50 分钟
- E. 2 小时
18. 发生急性心肌梗死后几小时, 禁止用洋地黄治疗心力衰竭
- A. 24 小时
- B. 12 小时
- C. 6 小时
- D. 3 小时
- E. 1 小时
19. 属于出血性脑血管疾病的是
- A. 短暂性脑缺血发作
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 脑梗死
- D. 脑血栓形成
- E. 脑栓塞

20. 脑出血以内囊出血最常见，其特征性的临床表现为
- 同侧偏瘫
 - 对侧偏瘫
 - 同侧偏盲
 - 三偏症
 - 交叉性偏瘫
21. Crohn 病最常见的并发症是
- 急性肠穿孔
 - 中毒性结肠扩张
 - 直肠结肠癌变
 - 肠梗阻
 - 腹腔内脓肿
22. 肝硬化肝功能失代偿期最显著的临床表现是
- 脾大
 - 侧支循环的建立和开放
 - 腹水
 - 脾小
 - 食管-胃底静脉曲张
23. 肝硬化伴大量腹水取半卧位的原因是
- 有利于腹水消退
 - 增加回心血量
 - 减轻心脏负荷
 - 减轻呼吸困难
 - 降低腹内压力
24. 幽门梗阻患者行胃镜检查前 2~3 天应给予
- 流食
 - 半流质
 - 低脂半流质
 - 少渣普食
 - 普食
25. 肝性脑病合并碱中毒时应选用
- 谷氨酸
 - 精氨酸
 - 鸟氨酸
 - 半胱氨酸
 - 色氨酸
26. 风湿性疾病是指
- 累及软组织及血液的一大类疾病
 - 累及肌肉、肌腱的一大类疾病
 - 累及关节的一大类疾病
 - 累及骨、关节及周围软组织的一大类疾病
 - 累及关节、肾脏、皮肤的一大类疾病
27. 下列那个不是类风湿关节炎关节表现特点
- 关节晨僵
 - 不对称关节肿胀
 - 关节痛
 - 关节压痛
 - 关节畸形
28. 哮喘患者禁止使用的药物是
- 地高辛
 - 苯海拉明
 - 普萘洛尔
 - 氢氯噻嗪
 - 呋塞米
29. 下列哪种疾病应严格限制植物蛋白的摄入
- 肝性脑病
 - 糖尿病
 - 肺性脑病
 - 尿毒症
 - 甲亢
30. 肺炎球菌肺炎的患者热型常为
- 稽留热
 - 弛张热
 - 间歇热
 - 循环热
 - 不规则热
31. 慢性肾小球肾炎的治疗原则是
- 以消除蛋白尿和血尿为目标
 - 使用激素治疗为主
 - 早期透析治疗
 - 防止和延缓肾功能减退，改善症状以及防止严重并发症
 - 休息，饮食治疗为主

32. 肾病综合征的三高一低特征不包括
- 高血压
 - 高度水肿
 - 高脂血症
 - 大量蛋白尿
 - 低蛋白血症
33. 前列腺增生术后 1 周内护理措施不妥的是
- 安置 2 根导尿管
 - 膀胱冲洗液自气囊导尿管注入
 - 冲洗液从耻骨上造口管流出
 - 患者腹胀, 应用人工肛管排气
 - 冲洗液中必要时加入止血剂
34. 在我国引起肝硬化的主要原因是
- 日本血吸虫病
 - 慢性酒精中毒
 - 胆汁淤积
 - 循环障碍
 - 病毒性肝炎
35. 痢的临床表现特点是
- 发热不重
 - 好发于毛囊丰富的部位
 - 致病菌是溶血性链球菌
 - 病区有多个脓栓
 - 全身疼痛
36. 妊娠合并肝炎, 下列不正确的是
- 妊娠早期合并肝炎, 可使妊娠反应加重
 - 妊娠中、晚期合并肝炎者易发展为重症肝炎
 - 妊娠早期患肝炎时胎儿畸形率高
 - 退奶时应用雌激素
 - 肝炎患者原则上不宜妊娠
37. 前置胎盘终止妊娠时, 主要的处理手段是
- 剖宫产术
 - 阴道分娩
 - 阴道分娩, 产钳助产
 - 阴道分娩, 胎头吸引器助产
 - 阴道分娩试产, 失败后剖宫产
38. 异位妊娠最常见的着床部位是
- 卵巢
 - 宫角
 - 子宫颈
 - 腹腔
 - 输卵管
39. 妊娠期高血压综合征的基本病理生理变化是
- 全身小动脉痉挛
 - 子宫血管痉挛
 - 胎盘血管痉挛
 - 子宫胎盘缺血
 - 宫腔内压力过大
40. 新生儿出生后初次哺乳的时间是
- 1 小时以内
 - 2 小时以内
 - 30 分钟以内
 - 12 小时以内
 - 24 小时以内
41. 正常胎动次数应为每小时
- 3~5 次
 - 6~8 次
 - 9~11 次
 - 12~14 次
 - 16~18 次
42. 关于经阴分娩产妇, 产后落实避孕措施的时间是在产后
- 2 周
 - 4 周
 - 6 周
 - 8 周
 - 12 周
43. 有机磷中毒首选的抗胆碱药是
- 肾上腺素
 - 氯解磷定
 - 氯化钙
 - 阿托品
 - 碳酸氢钠
44. 不属于阿托品化表现的是
- 瞳孔较前扩大面部潮红

- B. 口干, 皮肤干燥
C. 肺部啰音减少
D. 心率加快
E. 烦躁不安, 意识模糊
45. 关于有机磷的代谢和排泄正确的是
A. 在体内蓄积, 毒性持久
B. 经肾排泄
C. 肝内氧化产物不如原来毒性强
D. 肝内水样产物比原来毒性强
E. 经皮肤、呼吸道吸收, 不经胃肠道排泄
46. 若肩背部疼痛且范围较大, 应选用下列哪种拔罐法进行治疗
A. 留罐
B. 闪罐
C. 走罐
D. 刺血拔罐
E. 留针拔罐
47. 在肿瘤患者放疗或化疗期间, 最主要的观察项目是
A. 白细胞及血小板
B. 食欲不振
C. 恶心呕吐
D. 皮肤损害
E. 脱发程度
48. 预防和消除肿瘤远处转移, 效果最好的治疗方法是
A. 根治手术
B. 放疗
C. 化疗
D. 预防性手术
E. 中医中药治疗
49. 甲胎蛋白对哪种肿瘤的诊断特异性较高
A. 肺癌
B. 原发性肝癌
C. 骨癌
D. 白血病
E. 甲状腺癌
50. 急性白血病患者缓解期出现中枢神经系统白血病的的原因是
A. 免疫功能低下
B. 多数化疗药物不能通过血脑屏障
C. 疗程不够
D. 化疗药剂量不足
E. 对化疗药产生耐药
51. 胰腺癌好发于
A. 胰体、尾部
B. 胰颈
C. 全胰腺
D. 胰头、颈部
E. 胰尾
52. 精神分裂症的特征性症状是
A. 抑郁
B. 遗忘
C. 易兴奋
D. 被洞悉感
E. 意识范围缩小
53. 错觉是指
A. 对客观事物歪曲的知觉
B. 对已知的事物有未知的陌生
C. 对从未经历的事物有熟悉感
D. 对客观事物部分属性产生了错误的知觉感
E. 没有客观事物作用于感官时出现的知觉体验
54. 患者女性, 56岁, 顽固性便秘, 护士对其采取的护理措施, 下列哪项不妥
A. 每天晚上灌肠1次
B. 指导患者建立正常排便习惯
C. 进食纤维素丰富的蔬菜、水果
D. 给予足够水分
E. 排便时注意采取适当体位
55. 患者男性, 66岁, 因脑外伤昏迷入院, 现住ICU。护士为其进行晨间护理时应特别注意
A. 局部皮肤受压情况
B. 头发是否整齐
C. 面部、手部是否清洁
D. 床单是否清洁、干燥
E. 体位是否合适

56. 患者男性, 46 岁, 因车祸头部受重伤, 无自主呼吸, 使用人工呼吸机后, 若通气量合适, 患者不应出现的症状是
- 吸气时看到胸廓起伏
 - 肺部呼吸音清晰
 - 生命体征平稳
 - 皮肤潮红、出汗
 - 情绪稳定
57. 患者男性, 43 岁, 破伤风, 神志清楚, 全身肌肉阵发性痉挛、抽搐, 以下对于病室环境的要求哪项不正确
- 室温 18~22℃
 - 相对湿度 50%~60%
 - 门、椅脚钉橡皮垫
 - 保持病室光线充足
 - 护士做到“四轻”
58. 患者男性, 50 岁, 发热、咳嗽、左侧胸痛, 患者喜左侧卧位, 自述此卧位时胸部疼痛减轻, 此卧位性质属于
- 被迫卧位
 - 被动卧位
 - 主动卧位
 - 习惯卧位
 - 特异卧位
59. 患者女性, 需做胆囊造影, 检查前准备不妥的是
- 检查时第一次摄片后如胆囊显影良好则进高脂肪餐
 - 30 分钟后第二次摄片观察
 - 检查当日早晨禁食
 - 检查前 1 日午餐进无脂肪低蛋白的清淡饮食, 晚餐进高脂肪餐
 - 检查前 1 日午餐进高脂肪餐, 晚餐进无脂肪低蛋白的清淡饮食
60. 患者女性, 62 岁, 农民, 文化程度较低, 食管癌术后。针对此患者的特点, 最佳的护理关系模式为
- 指导型
 - 被动型
 - 主动—被动型
 - 指导—合作型
 - 共同参与型
61. 根据医院人事安排, 护理部王副主任升任主任一职, 作为高层护理管理者, 应侧重培养哪种能力
- 技术能力
 - 交往协调能力
 - 科学决策能力
 - 组织能力
 - 用人能力
62. 患者男性被诊断为 1 型糖尿病, 护士在问病史时获得的资料中与本病无明显关系的表现是
- 睡觉时多梦易醒
 - 做事没力气, 易疲劳
 - 饮食多但体重减轻
 - 口渴, 饮水多
 - 皮肤易生疖感染
63. 患者男性, 2 岁, 发现胸骨左缘第二肋间收缩期吹风样杂音, 第二心音亢进分裂。该患者最可能为
- 室间隔缺损
 - 动脉导管未闭
 - 房间隔缺损
 - 二尖瓣狭窄
 - 二尖瓣关闭不全
64. 患者男性, 48 岁, 入院 8 小时后突然出现急性左心衰, 表现为呼吸困难, 咳嗽, 吐粉红色泡沫样痰, 两肺满布干湿性啰音, 心率 108 次/分, 护士即刻通知医生, 责任护士给予患者的护理措施不妥的是
- 静点硝酸甘油
 - 肌肉注射吗啡
 - 经酒精湿化后给氧, 氧流量 6~8L/min
 - 静脉注射速尿
 - 开放 2 条静脉通路, 同时快速输液给药
65. 患者男性, 58 岁, 有高血压病史, 突然

- 出现剧烈头痛、烦躁，并伴有恶心、呕吐及意识模糊等症状。应考虑
- 高血压性心脏病
 - 高血压脑病
 - 高血压病第三期
 - 高血压危象
 - 高血压病第二期
66. 患者男性，50岁，高血压18年。上班途中突然出现头晕、头痛，血压180/100mmHg，同事将其送往医院治疗，不久症状好转，诊断短暂性脑缺血发作，这种发作最常见的病因是
- 情绪激动
 - 高血压
 - 吸烟
 - 饮酒
 - 动脉粥样硬化
67. 患者女性，28岁，腹痛、腹泻2个月就诊。该患者选择下列哪项检查最有诊断价值
- 血沉
 - 血常规
 - 正位胸片
 - 钡剂灌肠
 - 腹腔镜检查
68. 一患者大量呕血，经输血后血压正常，胸部X线及心电图检查均为正常，为查明出血原因，拟采用下列各项检查，安排的顺序，哪项最合适
- 上消化道钡餐检查—内镜检查—腹腔血管造影
 - 内镜检查—腹腔血管造影—上消化道钡餐检查
 - 上消化道钡餐检查—腹腔血管造影—内镜检查
 - 内镜检查—上消化道钡餐检查—腹腔血管造影
 - 腹腔血管造影—上消化道钡餐检查—内镜检查
69. 患者男性，36岁，临床诊断为十二指肠球部溃疡出血，此时应给予哪种治疗最为合适
- 饮食控制
 - 应用止血药
 - 应用抗酸剂
 - 减轻工作
 - 补充营养
70. 患者女性，15岁，因双腕关节及近端指间关节肿痛3年，加重2个月，以类风湿关节炎收住院。经休息、药物治疗，现病情缓解，下一步最主要的护理措施为
- 嘱患者卧床休息，避免劳累
 - 指导患者进行功能锻炼，要循序渐进
 - 向患者进行营养指导，增加营养
 - 向患者介绍如何观察药物疗效
 - 介绍预防药物不良反应的方法
71. 患者男性，30岁，右侧胸痛5天，气促2天入院。胸腔积液检查：外观红色，浑浊，相对密度（比重）1.020，黏蛋白定性试验阳性，细胞计数 $0.8 \times 10^9/L$ ，应考虑
- 化脓性胸膜炎
 - 肺癌
 - 结核性胸膜炎
 - 肝硬化
 - 右心功能不全
72. 患者男性，30岁，水肿尿少，尿蛋白（+），红细胞5~10个/HP，白细胞2~3个/HP，诊断为慢性肾炎，其护理诊断不包括
- 尿蛋白
 - 体液过多
 - 有营养失调的危险
 - 有感染的危险
 - 潜在并发症：慢性肾功能衰竭
73. 患者女性，30岁，低热盗汗，乏力2

- 周。2天前出现寒战、高热、咳嗽，X线检查显示：双肺在浓密的网状阴影上满布境界清晰的粟粒状阴影，直径约2mm大小，密度、大小和分布均匀，该患者可能为
- 原发性肺结核
 - 急性血行播散型肺结核
 - 浸润型肺结核
 - 慢性纤维空洞型肺结核
 - 亚急性或慢性血行播散型肺结核
74. 患儿女性，10岁，因患急性肾炎住院。患儿躁、头痛，并有一过性失明，血压170/120mmHg，每日尿量400ml。导致该症状的最可能原因是
- 严重循环充血
 - 化脓性脑膜炎
 - 高血压脑病
 - 肾功能衰竭
 - 代谢性酸中毒
75. 患者女性，30岁，因会阴水肿行会阴湿热敷，有关会阴湿热敷的注意事项错误的是
- 湿敷面积是病灶面积的2倍
 - 热敷温度为41~48℃
 - 应每3~5分钟更换纱布垫1次
 - 会阴水肿者24小时内禁止热敷
 - 每次热敷时间应30~45分钟
76. 患者女性，12岁，背部有一脓肿，切开后，脓液特点稠厚、黄色、无臭味，感染的细菌可能是
- 大肠杆菌
 - 金黄色葡萄球菌
 - 溶血性链球菌
 - 铜绿假单胞菌
 - 变形杆菌
77. 患者男性，50岁，因近1周食欲减退，呕吐，疲乏无力，尿黄入院。自昨日起烦躁不安，呼吸中有腥臭味、巩膜及皮肤黄染，皮肤见瘀斑，腹水征阳性。目前最主要的护理问题是
- 体液过多
 - 活动无耐力
 - 皮肤完整性受损
 - 营养失调，低于机体需要量
 - 潜在并发症，肝性脑病
78. 初产妇，急产一男婴，体重3900g，胎盘娩出后半小时内有间歇性阴道流血，量较多，色红，宫底、宫颈及肌肉已注射催产素10单位，再次查看胎盘完整，胎膜有一处见血管中断于胎膜边缘，其出血原因最可能是
- 胎盘剥离不全
 - 软产道裂伤
 - 胎膜残留
 - 产后宫缩乏力
 - 凝血功能障碍
79. 某产妇，于今日早晨经阴道顺产一女婴，进展顺利。为了预防尿潴留的发生，应该指导她第一次排尿的时间在产后
- 4小时之内
 - 5小时之内
 - 6小时之内
 - 7小时之内
 - 8小时之内
80. 一孕妇，35岁，G₃P₀，34周妊娠，曾2次人工流产，阴道少量流血，伴下腹胀痛5小时入院。检查：面色苍白，BP80/40mmHg，宫高34cm，宫缩持续30秒，间歇2分钟，呈强直性收缩，胎心和胎方位不清。尿蛋白(+)。该孕妇最可能的诊断是
- 胎盘早剥
 - 前置胎盘
 - 子宫破裂
 - 凝血功能障碍
 - 先兆流产
81. 新生儿出生后第3天，以下对其生命体

- 征的描述正确的是
- 胸式呼吸为主
 - 呼吸 20~40 次/分
 - 心率 100 次/分
 - 体温 38.7℃
 - 脉搏 90 次/分
82. 患者女性, 30 岁, 流产后出现月经不调, 表现为月经周期正常, 经期延长, 伴下腹坠胀、乏力, 疑诊黄体萎缩不全。为确诊需做诊刮, 时间应预约在
- 经前 3 天
 - 经后 10 天
 - 月经的第 1 天
 - 月经周期的第 5 天
 - 月经周期的任意时间
83. 患者男性, 第 9、10 肋闭合性骨折, 肝破裂, P 106 次/分, BP 90/60mmHg, Hb 90g/L, 最恰当的紧急治疗措施是
- 吸氧, 输血, 观察
 - 抗休克, 病情好转后手术
 - 抗休克同时开腹手术
 - 先抗休克 2~3 小时, 不好转一面抗休克一面手术
 - 肋骨骨折处封闭及橡皮膏固定后手术
84. 患者男性, 58 岁, 诊断为 Colles 骨折, 请问该患者可出现的典型畸形是
- 正面看呈枪刺刀样
 - 正面看呈银叉样
 - 侧面看呈鹰爪样
 - 局部肿胀
 - 缩短畸形
85. 患者女性, 24 岁, 确诊为慢性粒细胞性白血病 3 年余。目前贫血、出血明显加重, 脾脏迅速增大。对该患者的护理措施不正确的是
- 适当限制活动
 - 预防各种创伤
 - 尽量减少肌肉注射
 - 保持鼻黏膜湿润清除鼻腔内血痂
 - 摄取高蛋白、高维生素、低渣、易消化饮食
86. 患者男性, 57 岁, 直肠癌 Miles 术术后 10 天。患者出现腹胀、恶心, 造瘘口检查肠壁浅红色, 弹性差, 可伸入一小指。该患者可能出现的并发症是
- 造口肠端血运障碍
 - 吻合口瘘
 - 肠粘连
 - 造口狭窄
 - 便秘
87. 患者女性, 36 岁, 因绒毛膜癌住院。入院后突然出现剧烈头痛、喷射性呕吐、偏瘫。该患者发生上述症状的可能原因是
- 肺转移
 - 脑转移
 - 阴道转移
 - 肝转移
 - 肾转移
88. 患者男性, 57 岁, 胃溃疡病史 8 年。患者经常胃出血, 单位体检时查血常规提示: 血红蛋白 90g/L, 红细胞 $3.8 \times 10^{12}/L$, 拟诊为缺铁性贫血。该患者发病的主要原因是
- 慢性失血
 - 蛋白丢失
 - 缺维生素 B₁₂
 - 缺胃蛋白酶
 - 缺叶酸
89. 患者男性, 67 岁, 口中常喃喃自语“我该死、我该死”, 每晚席地而卧, 上盖一破被。该患者属于
- 被害妄想
 - 妒忌妄想
 - 罪恶妄想
 - 夸大妄想
 - 物理影响妄想

二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(90~92 题共用题干)

患者男性，68 岁，因进行性排尿困难 1 年就诊。入院后完善检查，初步诊断为：前列腺增生。第 3 天在硬膜外麻醉下行前列腺增生摘除术，手术顺利，术后遵医嘱给予膀胱冲洗。

90. 该患者膀胱冲洗的目的是

- A. 防止出血
- B. 防止中毒
- C. 防止少尿
- D. 清除膀胱内血凝块，防止堵塞尿道
- E. 防手术部位粘连

91. 应选择的冲洗液为

- A. 3% 硼酸溶液
- B. 0.1% 新霉素
- C. 生理盐水
- D. 0.02% 呋喃西林
- E. 0.05% 氯己定

92. 密闭式膀胱冲洗操作，不妥的一项是

- A. 在无菌操作下备好冲洗液及装置
- B. 分离并消毒导尿管及集尿袋引流管的接头
- C. 每次滴入溶液 400~500ml
- D. 瓶内液体距床面约 60cm
- E. 滴速一般为 60~80 滴/分

(93~95 题共用题干)

某老年女性，晕倒在路边，路人拨打 120，救护车急诊接入院。立即组织人员对患者实施紧急救护。查体：P 107 次/分，BP 78/46mmHg，ECG 示室性早搏、前壁心肌梗死。

93. 关于紧急救护，以下说法不正确的是

- A. 遇有患者病情危急时，护士应立即

通知医师

B. 医师不能马上赶到时，护士应当先行实施必要的紧急救护

C. 护士实施必要的抢救措施，要避免对患者造成伤害

D. 护士有权独立抢救危重患者

E. 必须依照诊疗技术规范救治患者

94. 医嘱溶栓药物尿激酶 150 万单位，ivdrip，st。护士未认真查对医嘱，将尿激酶注入患者静脉内，造成患者死亡，属于哪级医疗事故

- A. 特级
- B. 一级
- C. 二级
- D. 三级
- E. 四级

95. 在上述医疗过失行为中，护士应承担的责任程度为

- A. 完全责任
- B. 主要责任
- C. 次要责任
- D. 轻微责任
- E. 同等责任

(96~97 题共用题干)

患者男性，69 岁，因头痛、头晕、右半身麻木无力 2 个月，呕吐 2 日入院。体检：神志清楚，血压正常，眼底视盘模糊不清，视盘水肿。右面部感觉减退，右侧肢体不全瘫，右侧病理反射（+）。头部 CT 检查发现有颅内占位性病变。

96. 应首先考虑的诊断是

- A. 慢性硬脑膜下血肿
- B. 脑出血
- C. 颅内肿瘤
- D. 脑脓肿
- E. 急性硬脑膜下血肿

97. 此时最有效的处理措施是

- A. 持续腰穿引流
- B. 使用脱水药
- C. 开颅病灶切除

- D. 过度换气
- E. 去骨片减压术

(98~99 题共用题干)

患儿女, 6 岁。1 天前开始发热, 体温 38.5°C , 皮肤出现皮疹伴瘙痒。查体: 头面部和躯干可见红色血斑疹、疱疹及结痂。

98. 该患儿可能的疾病诊断为

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 水痘
- D. 猩红热
- E. 幼儿急疹

99. 对该患儿采取的不正确处理措施为

- A. 抗病毒治疗
- B. 应用静脉丙种球蛋白
- C. 激素治疗
- D. 给予干扰素
- E. 降温处理

(100~102 题共用题干)

患者女性, 30 岁, 腹痛、腹泻 5 个月, 粪便呈糊状, 不含黏液与脓血, 不伴有里急后重感。查体: 一般情况欠佳, 消瘦, $T 37.8^{\circ}\text{C}$, 心肺无异常发现。

100. 若患者既往有结核病史, 可考虑为

- A. 肠结核
- B. 阿米巴痢疾
- C. 克罗恩病
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 炎症性肠病

101. 最有价值的实验室检查

- A. 白细胞测定
- B. 血红蛋白测定
- C. 血沉
- D. 痰、粪便浓缩找结核杆菌
- E. 大便隐血试验

102. 为进一步明确诊断, 首先应做的辅助检查是

- A. 肝功能检查
- B. 肾功能检查

C. X 线胸片

D. 钡剂灌肠

E. 痰找结核杆菌

(103~106 题共用题干)

患者女性, 55 岁, 双手不能紧握, 腕关节痛, 见“鹅颈征”, 低热, 咽痛, 血常规示: $\text{WBC } 12 \times 10^9/\text{L}$, $\text{PLT } 430 \times 10^9/\text{L}$, $\text{Hb } 89\text{g/L}$ 。未查 RF, 临床诊断类风湿关节炎。

103. 临床上所指的“鹅颈征”是指

- A. 腕关节
- B. 手近指关节
- C. 手远指关节
- D. 第一跖趾关节
- E. 颈椎

104. 除查血沉外, 还应查

- A. RF 定量
- B. CRP
- C. 抗 CCR 抗体
- D. 双手 X 线检查
- E. 以上均可选择

105. 该患者的血常规数值变化, 主要是因为

- A. 低热感染
- B. 缺铁
- C. 关节痛
- D. 关节炎活动
- E. 检查误差

106. 对患者的健康指导错误的是

- A. 严格卧床休息, 禁止活动关节
- B. 避免感染、寒冷、潮湿
- C. 遵医嘱用药, 勿自行停药、换药、增减药量
- D. 严密观察药物疗效与不良反应
- E. 建立社会支持系统

(107~109 题共用题干)

患者男性, 36 岁, 2 天前受凉后出现高热、寒战、咳嗽、咳痰, 左胸疼痛, 且随呼吸加重。查体: 左下肺叩诊浊音, 左下肺触