

2017年

护士执业资格考试 习题集

• 崔景晶 刘凤琴 王永利 主编

- ◆ 紧扣考试大纲
- ◆ 涵盖历年高频考点与要点
- ◆ 精选习题2800余道及解析



化学工业出版社

2017年

护士执业资格考试 习题集

• 崔景晶 刘凤琴 王永利 主编



化学工业出版社

· 北京 ·

本书根据最新护士执业资格考试大纲编写,将考试大纲要求掌握的知识点用习题的形式列出,习题类型与考试题型相同,包含 A₁、A₂、A₃、A₄ 四种题型,共计 2800 余道习题。对重点难点习题进行解析及给出相关考点。本书适合参加护士执业资格考试的考生和护理专业在校生参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

2017 年护士执业资格考试习题集/崔景晶,刘凤琴,王永利
主编. —北京:化学工业出版社,2016.10
ISBN 978-7-122-28055-8

I. ①2… II. ①崔… ②刘… ③王… III. ①护士-资格
考试-习题集 IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 217035 号

责任编辑:赵兰江
责任校对:王素芹

装帧设计:张 辉

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装:三河市延风印装有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 18 $\frac{1}{4}$ 字数 542 千字 2016 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询:010-64518888 (传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:48.00 元

版权所有 违者必究

编写人员名单

主 编 崔景晶 刘凤琴 王永利

副 主 编 高俊芳 安新荣 曹晓宁 王 芸 丛 薇

编 者 (按姓氏笔画排序)

王 芸 王永利 丛 薇 朱 云 刘凤琴

刘德华 安新荣 李 霞 李春兰 吴艳丽

张 兰 袁赛赛 都新俊 高俊芳 郭岩红

曹晓宁 崔景晶

前 言

为了使我国护理队伍的管理更加规范,根据《中华人民共和国执业医师法》,卫生部制定并实施了护士资格考试制度,自1995年起每年举行一次执业医师资格考试。国家组织执业医师资格考试的目的是全面提高护理人员的护理水平,限制不合格护理人员从事护理行业,其最终目标是确保临床护士为患者提供高水平的优质护理服务。

执业医师资格考试的主要内容为护理基本理论、基本知识、基本技能;涉及循环系统、消化系统和呼吸系统疾病患者的护理等21个章节的内容。为帮助考生更好地了解新的考试要求;方便考生在短短数个月的时间内,在繁忙的临床护理工作之余,全面掌握考点,做好考前复习工作;由各专业富有经验的护理学教师,根据考试大纲编写了针对考试的辅导用书。

本书紧扣最新考试大纲,根据考试范围和题型分章节编写,力求习题典型,使考生在短时间内提高护理理论水平,在轻松应对考试的同时,临床护理水平也会得到质的飞跃。

为了帮助考生顺利通过考试,我们从各个方面做了不懈的努力,由于时间比较紧,编写内容多,疏漏之处在所难免,恳请同行专家和广大考生批评指正。

最后,衷心祝愿考生朋友们顺利通过本次考试,成为一名优秀的白衣天使!

编者

2016年9月

目 录

第一章 基础护理知识和技能

一、A ₁ 型题	1	四、A ₄ 型题	40
二、A ₂ 型题	17	五、参考答案	44
三、A ₃ 型题	37	六、重点难点习题解析	46

第二章 循环系统疾病病人的护理

一、A ₁ 型题	59	四、A ₄ 型题	72
二、A ₂ 型题	63	五、参考答案	73
三、A ₃ 型题	70	六、重点难点习题解析	73

第三章 消化系统疾病病人的护理

一、A ₁ 型题	80	四、A ₄ 型题	101
二、A ₂ 型题	86	五、参考答案	106
三、A ₃ 型题	94	六、重点难点习题解析	107

第四章 呼吸系统疾病病人的护理

一、A ₁ 型题	117	四、A ₄ 型题	126
二、A ₂ 型题	121	五、参考答案	128
三、A ₃ 型题	125	六、重点难点习题解析	129

第五章 传染病病人的护理

一、A ₁ 型题	133	四、A ₄ 型题	138
二、A ₂ 型题	135	五、参考答案	139
三、A ₃ 型题	137	六、重点难点习题解析	139

第六章 皮肤及皮下组织疾病病人的护理

一、A ₁ 型题	142	四、A ₄ 型题	143
二、A ₂ 型题	142	五、参考答案	143
三、A ₃ 型题	142	六、重点难点习题解析	143

第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理

一、A ₁ 型题	144	四、A ₄ 型题	155
二、A ₂ 型题	147	五、参考答案	156
三、A ₃ 型题	152	六、重点难点习题解析	156

第八章 新生儿和新生儿疾病病人的护理

一、A ₁ 型题	161	四、A ₄ 型题	163
二、A ₂ 型题	162	五、参考答案	164
三、A ₃ 型题	163	六、重点难点习题解析	164

第九章 泌尿生殖系统疾病病人的护理

一、A ₁ 型题	166	四、A ₄ 型题	173
二、A ₂ 型题	169	五、参考答案	175
三、A ₃ 型题	172	六、重点难点习题解析	175

第十章 精神障碍病人的护理

一、A ₁ 型题	178	四、A ₄ 型题	182
二、A ₂ 型题	179	五、参考答案	183
三、A ₃ 型题	181	六、重点难点习题解析	183

第十一章 损伤、中毒病人的护理

一、A ₁ 型题	187	四、A ₄ 型题	193
二、A ₂ 型题	189	五、参考答案	195
三、A ₃ 型题	192	六、重点难点习题解析	196

第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病病人的护理

一、A ₁ 型题	199	四、A ₄ 型题	202
二、A ₂ 型题	200	五、参考答案	203
三、A ₃ 型题	202	六、重点难点习题解析	203

第十三章 肿瘤病人的护理

一、A ₁ 型题	205	四、A ₄ 型题	213
二、A ₂ 型题	209	五、参考答案	216
三、A ₃ 型题	211	六、重点难点习题解析	216

第十四章 血液、造血器官及免疫系统疾病病人的护理

一、A ₁ 型题	220	四、A ₄ 型题	228
二、A ₂ 型题	224	五、参考答案	228
三、A ₃ 型题	226	六、重点难点习题解析	229

第十五章 内分泌与代谢疾病病人的护理

一、A ₁ 型题	231	四、A ₄ 型题	238
二、A ₂ 型题	234	五、参考答案	239
三、A ₃ 型题	236	六、重点难点习题解析	239

第十六章 神经系统疾病病人的护理

一、A ₁ 型题	241	四、A ₄ 型题	249
二、A ₂ 型题	246	五、参考答案	250
三、A ₃ 型题	248	六、重点难点习题解析	250

第十七章 生命发展保健

一、A ₁ 型题	252	四、A ₄ 型题	256
二、A ₂ 型题	254	五、参考答案	256
三、A ₃ 型题	255	六、重点难点习题解析	256

第十八章 中医基础知识

一、A ₁ 型题	259	四、A ₄ 型题	261
二、A ₂ 型题	260	五、参考答案	261
三、A ₃ 型题	260	六、重点难点习题解析	261

第十九章 法规与护理管理

一、A ₁ 型题	264	四、参考答案	269
二、A ₂ 型题	265	五、重点难点习题解析	269
三、A ₃ 型题	269		

第二十章 护理伦理

一、A ₁ 型题	272	四、A ₄ 型题	275
二、A ₂ 型题	274	五、参考答案	275
三、A ₃ 型题	275	六、重点难点习题解析	276

第二十一章 人际沟通

一、A ₁ 型题	278	四、A ₄ 型题	280
二、A ₂ 型题	279	五、参考答案	281
三、A ₃ 型题	280	六、重点难点习题解析	281

一、A₁型题

1. 对护理诊断的陈述正确的是
A. 入厕自理缺陷：与关节疼痛有关
B. 社交障碍：与人缘不好有关
C. 有肺炎的危险
D. 清理呼吸道无效：与肺气肿有关
E. 皮肤完整性受损：与护士未定时为患者翻身有关
2. 首先提出护理程序的学者是
A. 渥斯 (Walsh)
B. 奥兰多 (Orlando · IL)
C. 罗伊 (Roy)
D. 赫尔 (Hall · L)
E. 尤拉 (Yura · H)
3. “母乳喂养有效”属于
A. 现存的护理诊断
B. 危险的护理诊断
C. 健康的护理诊断
D. 合作性的护理问题
E. 可能的护理问题
4. 以下护理目标陈述正确的是
A. 住院期间患者不发生感染
B. 每天雾化吸入两次
C. 3天后教会患者自我护理
D. 3天后患者能学会自我注射胰岛素
E. 使患者呼吸困难减轻
5. 护理诊断陈述方式中的“E”指的是
A. 症状和体征 B. 相关因素
C. 护理问题 D. 诊断名称
E. 临床表现
6. 护理程序的第一步“评估”在何时进行
A. 患者入院时
B. 患者入院及出院时
C. 患者入院开始到患者出院为止
D. 遵照医嘱
E. 患者住院期间
7. 关于预期目标的陈述，下列说法错误的是
A. 目标要切实可行
B. 一个目标中可以出现多个行为动词
C. 一个护理诊断可有多个目标
D. 目标陈述的逻辑主语一定是护理对象
E. 潜在并发症的目标叙述为：护士能及时
发现并发症的发生并积极配合处理
8. 以下不属于护理程序特点的是
A. 有特定的目标 B. 适用范围广泛
C. 具有互动性 D. 具有创造性
E. 是一个完善的闭合系统
9. 护理评价中最重要的的是
A. 护理目标的评价 B. 护理措施的评价
C. 护理效果的评价 D. 护理过程的评价
E. 护理内容的评价
10. 关于收集资料，下列说法错误的是
A. 收集资料是护理评估的第一步
B. 收集资料为做出护理诊断提供依据
C. 收集资料贯穿护理工作全过程
D. 收集资料是在患者刚入院时进行
E. 收集资料要准确、全面
11. 关于护理措施，下列说法错误的是
A. 护理措施应切实可行，符合患者的年龄、体力和病情
B. 护理措施应有理论依据
C. 护理措施不应与其他医务人员的措施相矛盾
D. 一个护理目标须采取一项护理措施
E. 护理措施要被患者接受
12. 关于护理程序，下列错误的是
A. 护理程序是指导护士工作及解决问题的方法
B. 把患者作为一个整体，考虑其生理、心理、社会方面的需求
C. 护理程序的运用拓展了护理工作范畴和护士角色
D. 是由评估、诊断、计划、实施四部分组成
E. 执行护理程序时，需用多学科的知识
13. 护理程序的结构最基本的理论框架是
A. 系统论 B. 方法论

- C. 信息交流论 D. 解决问题论
E. 基本需要论
14. 关于护理诊断的相关因素, 下列说法错误的是
A. 现存的护理诊断有相关因素
B. “有……危险”的护理诊断其相关因素是高危因素
C. 一个护理诊断仅有一个相关因素
D. 相关因素的陈述要准确具体, 以指明护理行动的方向
E. 相关因素的陈述应使用“与……有关”的方式
15. 关于护理诊断与医疗诊断, 下列说法错误的是
A. 护理诊断随患者反应的变化而变化
B. 护理诊断是对个体病理生理变化的一种临床判断
C. 护理诊断的决策者是护理人员
D. 医疗诊断的名称在病程中保持稳定
E. 医疗诊断描述疾病及病理改变
16. 关于护理诊断的排序, 下列说法错误的是
A. 执行护理计划过程中, 往往同时解决几个问题, 但着重解决优先问题
B. 护理诊断的排列顺序不是固定不变的
C. 潜在的问题一定不是优先问题
D. 排序应考虑患者的需求
E. 优先解决直接危及患者生命, 需立即解决的问题
17. “让患者能够复述解除疼痛的意义”的护理目标, 错误出现在
A. 结果不便于测量
B. 护士不能实现此目标
C. 描述不具体
D. 描述的是护理活动本身而不是患者的行为结果
E. 与治疗的目的不一致
18. 护理程序中, 指导护理活动的思想核心是
A. 以完成护理工作内容为核心
B. 以医院管理的重点任务为核心
C. 以执行医嘱为核心
D. 以维护医护人员的利益为核心
E. 以护理的服务对象为核心
19. 健康的护理诊断常用的陈述方式为
A. PES 公式 B. PE 公式
C. ES 公式 D. PS 公式
E. P 公式
20. 属于护理程序计划阶段内容的是
A. 分析资料 B. 提出护理诊断
C. 确定护理目标 D. 实施护理措施
E. 评价患者反应
21. 在普通门诊和急诊护理工作中, 下列处理不妥的是
A. 急诊室的留观室留观时间一般为 3~7 天
B. 急诊物品完好率应达到 100%
C. 遇到高热、呼吸困难者应安排提前就诊
D. 急诊患者只要病情稳定可以不必留下家属和陪护者
E. 遇到病情较重或年老体弱者, 可适当调整就诊顺序
22. 门诊就诊时, 首先进行
A. 健康教育 B. 挂号
C. 预检分诊 D. 测量生命体征
E. 提供检验单
23. 下列不属于预检分诊内容的是
A. 询问病史 B. 指导挂号诊疗
C. 科普宣教 D. 初步判断
E. 观察病情
24. 医院的任务不包括
A. 医疗 B. 教学
C. 制订卫生政策 D. 预防保健
E. 指导基层和计划生育的技术工作
25. 门诊发现传染病患者时应立即
A. 安排患者提前就诊
B. 将患者隔离诊治
C. 转急诊室处理
D. 开展候诊教育与卫生宣教
E. 消毒候诊环境
26. 下列哪项不属于急诊留观室的护理工作
A. 填写各种记录单
B. 住院登记, 建立病历
C. 及时处理医嘱
D. 做好心理护理
E. 主动巡视患者, 密切观察病情
27. 危重患者入院时, 下列工作不属于护士应做的是
A. 酌情安置危重病室
B. 发病危通知单
C. 迅速通知医生
D. 立即给予应急处理
E. 安慰患者家属

28. 关于医院良好物理环境叙述错误的是
- 病室内合适的温度是 18~22℃
 - 白天病区较理想的噪声强度是 35~40dB
 - 病室内合适的湿度为 45%~50%
 - 病室的布置应简单、美观、整洁
 - 通风是降低室内空气污染的有效措施
29. 最适宜老年人和婴儿的病室温度和相对湿度是
- 18~20℃、60%~70%
 - 18~20℃、50%~60%
 - 22~24℃、60%~70%
 - 22~24℃、50%~60%
 - 18~22℃、50%~60%
30. 一般开窗多长时间可达到置换室内空气的目的
- 4h
 - 3h
 - 2h
 - 30min
 - 10min
31. 噪声强度达到多少分贝 (dB), 即能产生相当的干扰
- 20~30dB
 - 30~40dB
 - 40~50dB
 - 50~60dB
 - 90~120dB
32. 噪声对人体心理方面危害的主要表现是
- 肌肉紧张
 - 听力减退
 - 焦躁易怒
 - 心率增加
 - 血压升高
33. 病室墙面的色调不宜选用
- 深棕色
 - 淡黄色
 - 淡绿色
 - 浅蓝色
 - 粉色
34. 病床之间的距离不得少于
- 0.5m
 - 1m
 - 1.5m
 - 2m
 - 2.5m
35. 铺暂空床的目的是
- 保持患者的舒适
 - 方便患者的治疗
 - 供暂时离床活动的患者卧床休息用
 - 预防卧床并发症
 - 等待手术患者
36. 下列哪种患者需要较高的病室空气湿度
- 贫血
 - 原发性高血压
 - 心力衰竭
 - 急性喉炎
 - 尿毒症
37. 不属于医院社会环境范畴的是
- 建立良好的护患关系和病友关系
 - 尊重患者和探视人员
 - 患者有隐私权
 - 病室整齐、舒适、安全
 - 引导患者相互关心、相互帮助
38. 不符合铺床时省力原则的是
- 将用物准备齐全
 - 用物按使用顺序放置
 - 两腿前后或左右分开, 稍屈膝
 - 膝、髋部伸直, 以保持身体的稳定性
 - 身体靠近床边
39. 麻醉护理盘内, 需要准备的物品不包括
- 压舌板
 - 吸痰管
 - 护理记录单
 - 血压计、听诊器
 - 导尿管
40. 住院处办理入院手续的根据是
- 门诊病历
 - 住院证
 - 转院证明
 - 诊断书
 - 单位介绍信
41. 下列哪一项不属于入院程序
- 健康评估
 - 办理入院手续
 - 交纳住院保证金
 - 卫生处置
 - 护送患者入病区
42. 一般患者入病区后的初步护理, 应首先
- 介绍住院规章制度
 - 扶助上床休息, 护士自我介绍
 - 测量生命体征
 - 通知医生, 协助体检
 - 填写住院病历有关栏目
43. 一般患者入院, 值班护士接住院处通知后, 应先
- 准备病床单位
 - 迎接新患者
 - 填写入院病历
 - 通知医生
 - 通知营养室
44. 护送患者入病区时下列不妥的是
- 能步行的患者嘱其自己去病区
 - 不能步行的患者用轮椅护送去病区
 - 危重患者用平车护送去病区
 - 护送时注意保暖
 - 轮椅、平车护送要注意安全
45. 对患者进行入院介绍和指导的内容不包括
- 病区及病室环境
 - 医院的规章制度

- C. 常规标本的送检方法
D. 床单位及设备的使用方法
E. 医院的作息时间
46. 有关一级护理, 表述不正确的是
A. 每 1~2h 巡视患者一次
B. 严密观察患者病情及生命体征
C. 及时、准确、逐项填写特别护理记录单
D. 按需准备急救药物
E. 认真做好基础护理, 满足患者身心需要
47. 一级护理适用于
A. 肾功能衰竭 B. 脏器移植手术后
C. 年老体弱 D. 发热
E. 大面积灼伤
48. 出院患者床单位处理错误的是
A. 污床单被套等撤下送洗
B. 被褥曝晒 6h
C. 床、床旁桌、椅用消毒溶液擦拭
D. 脸盆、痰杯用清水刷净
E. 铺成备用床
49. 护士协助患者向平车挪动时顺序应为
A. 上身、臀部、下肢
B. 下肢、臀部、上身
C. 臀部、下肢、上身
D. 臀部、上身、下肢
E. 上身、下肢、臀部
50. 用平车搬运患者, 下述正确的是
A. 搬运腰椎骨折患者, 平车上放置木板
B. 上坡时, 患者头部在平车后端
C. 下坡时, 患者头部在平车前端
D. 进门时, 用平车前端轻轻将门撞开
E. 暂停输液, 以免针头脱出
51. 医院分级护理级别划分的依据是
A. 病情 B. 病种
C. 年龄 D. 性别
E. 自理能力
52. 单人搬运患者时, 平车与床边适宜的位置是
A. 平车与床平行
B. 平车头端与床头呈钝角
C. 平车头端与床头呈锐角
D. 平车头端与床尾呈钝角
E. 平车头端与床尾呈锐角
53. 医院获得性感染的发生对象不包括
A. 患者 B. 医生
C. 护士 D. 探视者
E. 传染病院周边的居民
54. 消毒的含义是
A. 消除物品上的一切污秽
B. 消灭除细菌芽胞外的各种病原微生物
C. 杀灭物品上的所有微生物
D. 杀灭物品上的芽胞
E. 消灭包括细菌芽胞在内的各种病原微生物
55. 清除或杀灭物品上的一切微生物, 包括细菌芽胞的处理称为
A. 消毒 B. 灭菌
C. 无菌 D. 清洁
E. 抑菌
56. 燃烧法灭菌不能用于
A. 弯盘
B. 组织剪刀
C. 带致病菌又无保留价值的纸张
D. 铜绿假单胞菌污染的敷料
E. 镊子
57. 用煮沸法消毒物品, 正确的是
A. 水沸后放橡胶管
B. 杀灭细菌繁殖体时间为 20~30min
C. 水沸后放入玻璃物品
D. 大小相同的治疗碗可重叠
E. 煮沸中途加入物品应从加入开始计时
58. 热力消毒灭菌法的原理是
A. 干扰细菌酶的活性
B. 破坏细菌膜的结构
C. 使菌体蛋白发生光解变性
D. 抑制细菌代谢和生长
E. 使菌体蛋白及酶变性凝固
59. 煮沸消毒时为提高沸点, 可加入
A. 氯化铵 B. 亚硝酸钠
C. 碳酸钠 D. 碳酸氢钠
E. 碳酸铵
60. 肛管煮沸消毒时, 操作错误的是
A. 先将肛管洗刷干净
B. 肛管腔内注水, 用纱布包好
C. 冷水时放入
D. 水沸后开始计时
E. 在沸水中持续 5~10min
61. 紫外线灯管消毒, 应从灯亮后几分钟开始计时
A. 1~3min B. 3~5min
C. 5~7min D. 7~9min

- E. 9~11min
62. 用紫外线灯管消毒物品, 下列哪项是错误的
- 照射前房间内应保持清洁干燥
 - 物品消毒时, 物品距灯管的有效距离为 25~60cm
 - 保持灯管清洁, 每周用 95% 乙醇纱布擦拭 2 次
 - 灯亮开始计时
 - 照射后应开窗通风
63. 用紫外线灯消毒空气, 下述哪项错误
- 灯管用无水乙醇纱布擦净
 - 消毒过程用纱布遮盖患者双眼
 - 灯亮 5~7min 开始计时
 - 关灯后须冷却 3~4min 再开
 - 使用超过 2000h 的灯管应更换
64. 对特殊感染而无保留价值的物品, 最彻底的灭菌方法是
- 煮沸消毒灭菌法
 - 高压蒸汽灭菌法
 - 燃烧灭菌法
 - 日光曝晒法
 - 过氧乙酸浸泡法
65. 紫外线灯作空气消毒时, 照射时间不少于
- 15min
 - 20min
 - 25min
 - 30min
 - 35min
66. 不属于物理消毒灭菌法的是
- 熏蒸法
 - 生物净化法
 - 微波消毒灭菌法
 - 压力蒸汽灭菌法
 - 臭氧灭菌灯消毒法
67. 对高压蒸汽灭菌效果的监测, 最可靠的方法是
- 温度计法
 - 化学指示管法
 - 生物测试法
 - 化学指示胶带法
 - 化学指示卡法
68. 使用手提式高压蒸汽灭菌器, 叙述错误的是
- 隔层器内加水 2000ml
 - 布类物品放在搪瓷物品下面
 - 物品之间要有间隙
 - 要驱除灭菌器内的冷空气
 - 灭菌毕要待压力降至“0”再开盖
69. 浸泡纤维胃镜的消毒液宜用
- 0.1% 新洁尔灭
 - 0.2% 过氧乙酸
 - 70% 乙醇
 - 2% 戊二醛
 - 碘伏
70. 内镜用 2% 戊二醛浸泡消毒, 下述哪项正确
- 浸泡前用清水冲洗
 - 打开轴节全部浸于液面下
 - 加入 5% 亚硝酸钠防锈
 - 浸泡时间需 15min
 - 浸泡取出后即可使用
71. 可以用作空气消毒的化学消毒剂是
- 过氧化氢
 - 乙醇
 - 碘伏
 - 过氧乙酸
 - 环氧乙烷
72. 关于无菌技术, 以下操作错误的是
- 治疗室要湿式清扫, 每日紫外线照射一次
 - 衣帽要整齐, 口罩遮住口鼻, 修剪指甲, 洗手
 - 操作时手臂保持在腰部水平以上
 - 一份无菌物品, 仅供一位患者使用
 - 消毒液应浸没钳的 2/3 左右
73. 有关无菌物品保管方法不妥的是
- 无菌物与非无菌物应分别放置
 - 无菌包必须注明灭菌日期
 - 打开过的无菌包, 48h 后必须重新灭菌
 - 取出的无菌敷料不得再放回无菌容器内
 - 无菌物品应放在清洁干燥固定的地方
74. 取无菌溶液注意事项不包括
- 用前核对瓶签
 - 检查药液有无沉淀
 - 保持瓶盖内面无菌
 - 倒溶液时瓶签向下
 - 用后立即盖好
75. 已开启的无菌溶液可保存
- 48h
 - 24h
 - 12h
 - 8h
 - 4h
76. 无菌盘铺好后有效时间不超过
- 4h
 - 5h
 - 6h
 - 7h
 - 8h
77. 传染病区中划分为清洁区的是
- 走廊
 - 浴室
 - 洗漱室
 - 化验室
 - 配餐室
78. 以下除哪种情况外均需立即更换口罩
- 口罩潮湿时
 - 接触霍乱患者后

- C. 污染的手接触了口罩
D. 为流行性感冒患者作保健指导后
E. 隔离衣袖口触及口罩
79. 在隔离技术中以下哪项不妥
A. 隔离衣里面及衣领部应避免污染
B. 隔离衣潮湿应立即更换
C. 隔离衣被呕吐物污染应立即更换
D. 脱下的隔离衣送去消毒时清洁面应
向里
E. 病房所用隔离衣应每天更换一次
80. 执行隔离技术, 下列哪项步骤是错误的
A. 取下口罩, 将污染面向内折叠
B. 从指甲至前臂顺序刷手
C. 隔离衣挂在走廊里, 清洁面在外
D. 从页面抓取避污纸
E. 隔离衣应每天更换消毒
81. 为传染患者实施护理操作时, 以下正确的是
A. 穿好隔离衣后, 可到治疗室取物
B. 穿好隔离衣后, 活动范围不受限制
C. 穿好隔离衣后, 如仅用避污纸接触患者, 脱衣后可不洗手
D. 护理操作前用物计划周全, 以避免反复穿脱隔离衣和手的消毒
E. 穿好隔离衣, 尚未接触患者, 允许手抚摸口罩、脸部
82. 脱隔离衣的步骤是
A. 先解领子、袖口, 再刷手
B. 先解袖口、领子, 再刷手
C. 先刷手, 后解领子、袖口
D. 先解腰带、解袖口, 再刷手
E. 先解领子、解腰带, 再刷手
83. 腹腔感染术后患者取半坐卧位, 是为了
A. 防止发生呼吸困难
B. 促进腹腔引流, 使炎症局限
C. 防止呕吐物流入呼吸道
D. 使切口张力增加
E. 减少术后出血
84. 腰椎穿刺术后 6h 内去枕平卧的目的是
A. 预防脑压增高 B. 防止脑充血
C. 防止脑缺血 D. 预防脑压减低
E. 减轻脑膜刺激症状
85. 急性肺水肿时患者的卧位应采用
A. 端坐位 B. 俯卧位
C. 仰卧位 D. 侧卧位
E. 头低足高位
86. 胎膜早破的产妇, 应采用的卧位是
A. 头高足低位 B. 头低足高位
C. 膝胸位 D. 截石位
E. 屈膝仰卧位
87. 颈椎骨折进行颅骨牵引时, 采取何种卧位
A. 端坐位 B. 半坐卧位
C. 头低足高位 D. 头高足低位
E. 俯卧位
88. 为防止窒息的发生, 对全麻术后呕吐者应采取的体位是
A. 头向后倾 B. 头偏向一侧
C. 保持头部水平位 D. 抬高头部 15°
E. 头向前倾
89. 颅脑术后患者头部只能卧于健侧, 主要是为了
A. 减轻疼痛 B. 减少伤口的压力
C. 防止脑疝形成 D. 防止呕吐
E. 便于观察伤口情况
90. 盆腔炎患者取半坐卧位的目的是
A. 减少炎性渗出 B. 促使感染局限
C. 减轻疼痛 D. 减轻盆腔充血
E. 防止脏器粘连
91. 昏迷患者去枕仰卧的目的是
A. 防止脑压过低 B. 防止脑细胞缺氧
C. 预防头痛 D. 预防呼吸不畅
E. 防止呕吐物流入气管引起窒息
92. 帮助胆囊切除术后患者翻身侧卧的描述正确的是
A. 翻身前将枕横立于床头
B. 翻身前必须夹闭引流管
C. 两人协助翻身时手的着力点分别在肩、腰、臀和膝部
D. 翻身后助患者上腿伸直, 下腿弯曲
E. 翻身后更换敷料
93. 口腔护理时发现口腔黏膜有溃疡, 除哪项外均可酌情选用
A. 锡类散 B. 冰硼散
C. 碘酊 D. 西瓜霜
E. 金霉素甘油
94. 患者的活动义齿取下后, 应放在
A. 70%乙醇中 B. 冷开水中
C. 热开水中 D. “84”消毒液中
E. 苯扎溴铵溶液中
95. 口腔铜绿假单胞菌感染, 宜使用的漱口液是
A. 1%~3%过氧化氢溶液

- B. 2%~3%硼酸溶液
C. 1%~4%碳酸氢钠溶液
D. 0.02%呋喃西林溶液
E. 0.1%醋酸溶液
96. 给昏迷患者进行口腔护理时须特别注意
A. 用压舌板轻轻撑开颊部
B. 从外向里擦净口腔及牙齿的各面
C. 用血管钳夹紧棉球, 蘸水不可过多
D. 操作时动作要轻
E. 观察口腔黏膜
97. 灭头虱的方法中, 错误的是
A. 用纱布蘸百部酊, 按顺序擦遍头发
B. 反复揉搓头发 10min
C. 24h 后用篦子篦去死虱, 洗发
D. 患者换下污衣裤高压蒸汽灭菌
E. 梳子和篦子先清洗后消毒
98. 为右上肢骨折患者脱、穿衣的方法是
A. 先脱右肢, 先穿右肢
B. 先脱右肢, 先穿左肢
C. 先脱左肢, 先穿左肢
D. 先脱左肢, 先穿右肢
E. 没有要求, 患者愿意即可
99. 适宜盆浴的患者是
A. 严重心脏病
B. 阑尾术后第 7 天
C. 严重创伤
D. 极度衰竭患者
E. 妊娠 7 个月以上
100. 下列患者应进行床上擦浴的是
A. 心梗急性期患者
B. 左腿骨折石膏固定患者
C. 大出血患者
D. 截瘫患者
E. 腹部手术术后当天患者
101. 用 50%乙醇按摩局部皮肤的目的是
A. 消毒皮肤
B. 去除污垢
C. 降低体温
D. 润滑皮肤
E. 促进血液循环
102. 容易发生压疮的患者不包括
A. 年老体弱患者
B. 石膏固定患者
C. 全身营养不良患者
D. 行动不便的孕妇
E. 恶病质患者
103. 下列不属于压疮诱发因素的是
A. 石膏夹板内衬垫放置不当
B. 皮肤受汗液、尿液等的刺激
C. 局部组织长期受压
D. 肌肉萎缩
E. 全身营养缺乏
104. 发生压疮的最主要原因是
A. 局部组织受压过久
B. 病原体侵入皮肤
C. 机体营养不良
D. 用夹板时衬垫不平
E. 皮肤受潮、摩擦刺激
105. 最容易发生压疮的人群是
A. 肥胖患者
B. 高热患者
C. 全身瘫痪患者
D. 糖尿病患者
E. 老年痴呆患者
106. 下列体位与褥疮好发部位的关系不正确的是
A. 仰卧—骶尾部
B. 侧卧—髋部
C. 俯卧—内踝
D. 坐位—坐骨结节
E. 侧卧—肩峰部
107. 长期卧床患者为预防压疮, 下列做法不妥的是
A. 鼓励患者增加营养
B. 每 4~6h 翻身一次
C. 翻身时避免拖、拉、推动作
D. 适当调节夹板或矫形器械的松紧度
E. 骨突部位处垫软枕、海绵垫
108. 有关体温生理性变化的描述, 错误的是
A. 一般清晨 2~6 时体温最低, 下午 2~8 时最高
B. 儿童体温略高于成人
C. 老年人体温为正常范围低值
D. 女性排卵后体温略降低
E. 进食、运动后体温一过性增高
109. 体温上升期患者表现为
A. 畏寒、皮肤潮红、无汗
B. 畏寒、皮肤苍白、无汗
C. 畏寒、皮肤苍白、出汗
D. 畏寒、皮肤潮湿、出汗
E. 畏寒、皮肤潮红、出汗
110. 肿瘤性发热常见的热型为
A. 稽留热
B. 弛张热
C. 间歇热
D. 超高热
E. 不规则热
111. 疟疾患者发热常见的热型是
A. 波浪热
B. 稽留热
C. 弛张热
D. 间歇热
E. 不规则热
112. 不宜测腋下温度的患者是

- A. 昏迷患者 B. 热坐浴的患者
C. 极度消瘦的患者 D. 呼吸困难的患者
E. 口鼻手术的患者
113. 检查体温计不合格的误差是
A. 0.1°C 以上 B. 0.2°C 以上
C. 0.3°C 以上 D. 0.4°C 以上
E. 0.5°C 以上
114. 不符合脉搏生理变化的是
A. 成人比小儿快 B. 老人比儿童慢
C. 女性比男性快 D. 活动时增快
E. 睡眠时减慢
115. 测量脉搏的首选部位是
A. 颞动脉 B. 桡动脉
C. 肱动脉 D. 足背动脉
E. 颈动脉
116. 奇脉的特征性表现为
A. 单位时间内脉率小于心率
B. 脉搏一强一弱交替出现
C. 吸气时脉搏明显减弱, 甚至消失
D. 脉搏骤起骤落, 急促有力
E. 脉搏强而有力
117. 失血性休克患者的脉搏特征是
A. 间歇脉 B. 绌脉
C. 奇脉 D. 洪脉
E. 丝脉
118. 呼吸过速常见于
A. 高热 B. 颅内疾病
C. 催眠药中毒 D. 呼吸中枢衰竭
E. 老年人
119. 喉头有异物, 呼吸可呈
A. 库斯莫尔呼吸 B. 呼气性呼吸困难
C. 鼾声呼吸 D. 蝉鸣样呼吸
E. 毕奥呼吸
120. 昏迷患者呼吸道有较多分泌物蓄积时, 可出现
A. 库斯莫氏呼吸 B. 叹息样呼吸
C. 蝉鸣样呼吸 D. 鼾声呼吸
E. 潮式呼吸
121. 混合性呼吸困难多见于
A. 喉头水肿 B. 哮喘
C. 喉头异物 D. 肺部感染
E. 呼吸中枢衰竭
122. 气促是安静状态下, 成人的呼吸频率超过
A. 20 次/分 B. 24 次/分
C. 22 次/分 D. 18 次/分
E. 28 次/分
123. 关于血压的生理性变化, 错误的叙述是
A. 小儿血压低于成年人
B. 中年以前女性血压低于男性
C. 清晨血压低于傍晚
D. 上肢血压低于下肢
E. 寒冷环境血压低于高温环境
124. 1999 年世界卫生组织规定的高血压标准是
A. 收缩压 $\geq 16.00\text{kPa}$ (120mmHg) 和/舒张压 $\geq 9.33\text{kPa}$ (70mmHg)
B. 收缩压 $\geq 17.33\text{kPa}$ (130mmHg) 和/或舒张压 $\geq 10.00\text{kPa}$ (75mmHg)
C. 收缩压 $\geq 18.67\text{kPa}$ (140mmHg) 和/或舒张压 $\geq 12.00\text{kPa}$ (90mmHg)
D. 收缩压 $\geq 20.00\text{kPa}$ (150mmHg) 和/或舒张压 $\geq 12.67\text{kPa}$ (95mmHg)
E. 收缩压 $\geq 21.33\text{kPa}$ (160mmHg) 和/或舒张压 $\geq 13.33\text{kPa}$ (100mmHg)
125. 取坐位测量血压应使肱动脉位置平
A. 锁骨 B. 胸骨柄
C. 第 2 肋间隙 D. 第 4 肋软骨
E. 剑突下
126. 测血压时袖带缠得过紧可使
A. 血压偏低 B. 脉压加大
C. 收缩压偏高 D. 舒张压偏高
E. 舒张压偏低
127. 使血压值偏高的因素包括
A. 水银不足
B. 衣袖束缚上肢
C. 测量成人的袖带用于测儿童的血压
D. 袖带缠得太紧
E. 袖带缠得太松
128. 患者不宜长期使用流质饮食的原因是
A. 影响消化吸收 B. 影响营养供给
C. 影响食欲 D. 影响休息
E. 进食次数过多
129. 一般不选用低盐饮食的疾病是
A. 心力衰竭 B. 贫血
C. 高血压病 D. 急性肾炎
E. 肝硬化腹水
130. 高蛋白饮食适用于下列哪类疾病的患者
A. 肝炎 B. 糖尿病
C. 高血压病 D. 贫血
E. 腹泻
131. 低盐饮食要求每天摄入的食盐量低于

- A. 1.0g B. 2.0g
C. 3.0g D. 4.0g
E. 5.0g
132. 下列属于试验饮食的是
A. 流质饮食 B. 低蛋白饮食
C. 无盐饮食 D. 忌碘饮食
E. 要素饮食
133. 实际体重占标准体重的百分数多少为正常范围
A. $\pm 10\%$ B. $\pm 20\%$
C. $\pm 20\%$ 以下 D. $\pm 30\%$
E. $\pm 35\%$
134. 有关饮食护理错误的是
A. 督促和协助配餐员分发饭菜
B. 观察患者进餐
C. 检查治疗、试验饮食实施情况
D. 昏迷患者谨慎喂食, 以免食物呛入气管
E. 随时征求患者对饮食的意见
135. 急性胰腺炎患者禁食脂肪的目的是
A. 防止呕吐 B. 减轻腹痛
C. 减少腹胀 D. 减少胃液分泌
E. 减少胰液分泌
136. 下列哪类患者无须用管饲饮食
A. 手术后不能张口者
B. 拒绝进食者
C. 昏迷患者
D. 婴幼儿病情危重时
E. 高热患者补充高热量流质饮食时
137. 无须记入排出量内容的是
A. 呕吐液 B. 胸水和腹水
C. 胃肠减压液 D. 胆汁
E. 汗液
138. 下列哪项是冷疗的适应证
A. 牙痛 B. 痔疮
C. 胃痛 D. 腰肌劳损
E. 腕关节扭伤 3 天后
139. 冷疗的目的不包括
A. 促进炎症扩散 B. 减轻出血
C. 减轻疼痛 D. 降低体温
E. 减轻局部充血
140. 为降温做温水擦浴, 水温宜选用
A. $56\sim 60^{\circ}\text{C}$ B. $45\sim 50^{\circ}\text{C}$
C. $40\sim 45^{\circ}\text{C}$ D. $37\sim 40^{\circ}\text{C}$
E. $32\sim 34^{\circ}\text{C}$
141. 护士在使用热疗时, 水温可以在 $60\sim 70^{\circ}\text{C}$ 之间的是
A. 老年患者
B. 慢性关节肿痛的中青年人
C. 昏迷患者
D. 婴幼儿
E. 瘫痪患者
142. 下列部位可放置冰袋降温的是
A. 前额、足底 B. 头顶、腹股沟
C. 枕部、腠窝 D. 颈部、腹部
E. 腋窝、胸部
143. 热湿敷的作用不包括
A. 降低痛觉神经的兴奋性
B. 增加深部组织充血
C. 可使痉挛的肌肉松弛
D. 可改善血液循环
E. 促进炎症的消散或局限
144. 属热疗适应证的是
A. 急性阑尾炎 B. 鼻翼旁疖肿
C. 牙痛 D. 早产儿
E. 软组织挫伤 10h 内
145. 面部危险三角区感染病灶不宜做热敷的理由是
A. 皮肤细嫩易烫伤 B. 易引起鼻出血
C. 易造成颅内感染 D. 加速病灶化脓
E. 使局部疼痛加重
146. 影响热疗效的因素叙述不正确的是
A. 湿热比干热穿透力强
B. 个体对热的耐受性不同
C. 热效应与热敷面积成正比
D. 热效应与热敷时间成正比
E. 室温过低, 热效应减低
147. 不宜热水坐浴的患者是
A. 肛裂感染 B. 子宫脱垂
C. 肛周脓肿 D. 急性盆腔炎
E. 痔疮手术后
148. 排尿观察属异常的是
A. 24h 尿量 2000ml
B. 尿呈淡黄色
C. 尿比重 1.015
D. 夜间排尿 0~1 次
E. 新鲜尿有氨臭味
149. 多尿指昼夜尿量超过
A. 2000ml B. 2300ml
C. 2500ml D. 2800ml
E. 3000ml
150. 阻塞性黄疸患者的尿液呈