



实用中草药彩色图鉴大全集

# 果实和种子类 中草药彩色图鉴

周德生 巢建国 主编



- **120** 种最常见果实和种子类中草药
- **300** 多幅原植物、药材、饮片高清原色彩图
- **500** 多首精选验方，配以实用病症验方索引，方便查找



实用中草药彩色图鉴大全集

# 果实和种子类

## 中草药彩色图鉴

主 编：周德生 巢建国

副主编：陈湘鹏 谷 巍 周 海 周达宇

编 委：（按拼音字母为序）

巢建国	陈湘鹏	陈 瑶	戴 莉	邓 龙	高 杰
耿 超	谷 巍	郭 彪	郭雅玲	侯皓然	胡 华
江元璋	黎秋凤	李彩云	李 琳	李孟洋	李 中
刘菊燕	刘利娟	刘圣金	马思雨	束晓云	孙亚昕
谭 灿	吴兵兵	肖志红	张 莹	周达宇	周德生
周 海	周娟娟	周 平	邹立思		

CTS | 湖南科学技术出版社

## 图书在版编目 (C I P) 数据

果实和种子类中草药彩色图鉴 / 周德生, 巢建国主编. — 长沙: 湖南科学技术出版社, 2016. 6

(实用中草药彩色图鉴大全集)

ISBN 978-7-5357-7765-2

I. ①果… II. ①周… ②巢… III. ①中草药—图谱  
IV. ①R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 116701 号

实用中草药彩色图鉴大全集

GUOSHI HE ZHONGZILEI ZHONGCAOYAO CAISE TUJIAN

### 果实和种子类中草药彩色图鉴

主 编: 周德生 巢建国

责任编辑: 李 忠 王跃军

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcs.tmall.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮 编: 410600

版 次: 2016 年 6 月第 1 版第 1 次

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 18.25

书 号: ISBN 978-7-5357-7765-2

定 价: 58.00 元

(版权所有·翻印必究)

# 前 言

我国中草药种类繁多，资源丰富。一种中草药资源，当它作为一种植物存在时，它表现的是以枝、叶、花、果实的自然形态；当它作为药材应用时，它是天然的或经产地粗加工的原料药；当以配方入药应用时，它必须是按照有关规范进行加工炮制后的饮片。它的不同用途与形态带给我们不同的图像，给我们在识别与鉴别中草药时带来一定的困难。

为了保证中草药的稳定、安全与有效，准确鉴别常用中草药的植物自然形态以及药材、饮片，我们组织长期从事中草药鉴别的有关专家，根据他们在植物资源调查以及科研工作中所积累的大量图片，编写了这本《果实和种子类中草药彩色图鉴》，以满足广大中医爱好者、采集中草药人员以及中医药院校学生的需要。

本书收载了常用中草药120种，重点突出了常用同种中草药的原植物形态、药材、饮片的特征，并配有彩色图片，图文并茂，使读者能够快速、准确地识别与鉴别常用中草药。

现将本书的内容与特色介绍如下：

① 本书精简明确地记载了果实和种子类常用中草药的别名、来源、产地、采收加工、原植物、药材性状、饮片特征、质量标志、性味功能、用法用量、常用验方。每味中草药均附有原植物形态、药材形态、饮片形态3张图片。

② 常用验方主要是从古代和现代医药文献中精心挑选的经验方，具体应用时可随症加减，有毒药物及大剂量药方的应用应遵医嘱。

③ 每味中草药彩色照片均经专家鉴定，精心挑选，以保证照片的清晰度和科学性。

④ 本书的参考文献主要以最新版《中华人民共和国药典》一部与高等院校教材《中药鉴定学》等公开出版的权威著作或杂志文献为主，限于篇幅，未注明出处。

由于编者的水平有限，编写时间较为紧迫，不足或错漏之处在所难免，敬希广大读者多提宝贵意见。

周德生 巢建国

于湖南中医药大学  
南京中医药大学



## 二 画

- 八角茴香····· 002  
刀豆····· 004

## 三 画

- 千金子····· 008  
大风子····· 010  
大枣····· 012  
川楝子····· 014  
女贞子····· 016  
小茴香····· 018  
山茱萸····· 020  
山楂····· 022  
马钱子····· 024  
马兜铃····· 026

## 四 画

- 乌梅····· 030  
五味子····· 032  
化橘红····· 034  
天仙子····· 036  
巴豆····· 038  
无花果····· 040  
木瓜····· 042  
木蝴蝶····· 044  
木鳖子····· 046  
水飞蓟····· 048  
水红花子····· 050  
火麻仁····· 052  
牛蒡子····· 054  
王不留行····· 056  
车前子····· 058

## 五 画

- 丝瓜络····· 062  
冬瓜皮····· 064  
瓜蒌····· 066  
白果····· 068  
白扁豆····· 070  
石榴皮····· 072  
龙眼肉····· 074

## 六 画

- 决明子····· 078  
地肤子····· 080  
竹叶椒····· 082  
红豆蔻····· 084  
芝麻····· 086

## 目 录

- 西瓜皮····· 088

## 七 画

- 佛手····· 092  
吴茱萸····· 094  
孜然····· 096  
沙苑子····· 098  
沙棘····· 100  
芡实····· 102  
芥子····· 104  
花椒····· 106  
花生衣····· 108  
苍耳子····· 110  
补骨脂····· 112  
诃子····· 114  
豆蔻····· 116

- 赤小豆····· 118  
连翘····· 120  
陈皮····· 122

## 八 画

- 使君子····· 126  
枇杷····· 128  
罗汉果····· 130  
苘麻子····· 132  
苦瓜····· 134  
苦杏仁····· 136  
郁李仁····· 138  
金樱子····· 140  
青皮····· 142  
青果····· 144  
青箱子····· 146

## 九 画

- 砂仁····· 150  
南瓜子····· 152  
急性子····· 154  
枳壳····· 156  
枳椇子····· 158  
枳实····· 160  
枸杞子····· 162  
柏子仁····· 164  
柿蒂····· 166  
牵牛子····· 168  
胖大海····· 170  
葫芦巴····· 172  
胡椒····· 174  
草豆蔻····· 176

草果	178
荔枝核	180
韭菜子	182
香橼	184
鸦胆子	186

### 十画

娑罗子	190
核桃仁	192
桃仁	194
桑椹	196
莱菔子	198
莲子	200
预知子	202

### 十一画

望江南子	206
淡豆豉	208
猕猴桃	210
甜瓜子	212
绿豆	214
菟丝子	216
蛇床子	218
雪莲果	220
黄荆子	222

### 十二画

楮实子	226
葱实	228
紫苏子	230

葶苈子	232
黑芝麻	234
黑胡椒	236

### 十三画

槐角	240
蒺藜	242
蓖麻子	244
路路通	246
锦灯笼	248

### 十四画

榧子	252
槟榔	254
蔓荆子	256
酸枣仁	258



# 目 录



### 十五画

鹤虱	262
----	-----

### 十六画

薏苡仁	266
-----	-----

### 十八画

覆盆子	270
-----	-----

药名汉语拼音索引	272
----------	-----

病症验方索引	275
--------	-----



二画



**来源** 木兰科植物八角茴香 *Illicium verum* Hook. f. 的干燥成熟果实。

**产地** 主产于福建、广西、广东、贵州、云南等地。

**采收加工** 春果在4月间果实成熟落地时拾取，晒干。秋果在10~11月采收，采后置沸水锅中煮沸，搅拌5~10分钟后，捞出，晒干或烘干。

**原植物** 常绿乔木，高达20米；树皮灰色至红褐色，有不规则裂纹；单叶互生；叶柄粗壮，长约1厘米；叶片革质，椭圆状倒卵形至椭圆状倒披针形，长5~11厘米，宽1.5~4厘米，先端急尖或短渐尖，基部窄楔形，全缘，上面有光泽和透明的油点，下面生疏柔毛。春季花单生于叶腋；花被片7~12，数轮，覆瓦状排列，内轮粉红色至深红色；雄蕊11~20个，排成1~2轮；心皮8~9个，离生，轮状排列。果梗粗壮，长3~4厘米，钩形弯曲。聚合果放射星芒状，直径约3.5厘米，红褐色，萼萼顶端钝呈鸟喙状。每一萼萼含种子1粒，种子呈扁卵形，红棕色或灰棕色，有光泽。气芳香，味香甜。

**药材性状** 本品为聚合果，多由8个萼萼果组成，放射状排列于中轴上。萼萼果长1~2厘米，宽0.3~0.5厘米，高0.6~1厘米；外表面红棕色，有不规则皱纹，顶端呈鸟喙状，上侧多开裂；内表面淡棕色，平滑，有光泽；质硬而脆。果梗长3~4厘米，连于果实基部中央，弯曲，常脱落。每个萼萼果含种子1粒，扁卵圆形，长约6毫米，



## 八角茴香

*bajiaohuixiang*

别名：茴香、八角、大茴、大茴香

红棕色或黄棕色，光亮，尖端有种脐；胚乳白色，富油性。气芳香，味辛、甜。

**饮片特征** 本品粉末红棕色。常由八枚萼萼果集成聚合果。呈浅棕色或红棕色。果皮肥厚，单瓣果实前端钝或钝尖。香气浓郁，味辛、甜。

**质量标志** 以果实肥壮饱满，色红亮，气味浓厚，萼端钝平，质坚实者为佳。

**性味功能** 味辛，性温。归肝、肾、脾、胃经。功能温阳散寒，理气止痛。用于寒疝腹痛，肾虚腰痛，胃寒呕吐，脘腹冷痛。

**用法用量** 内服：煎汤，3~6克。

**常用验方** ①**治疝气**：八角茴香、小茴香各9克，乳香少许。水(煎)服取汗。②**治腰扭伤**：八角茴香(炒研)每服6克，食前盐汤下。外以糯米2~4千克，炒热，袋盛，拴于痛处。③**治臌胀**：大麻子(炒，去壳)15克，八角茴香7个。上作末，生葱白3~7个，同研煎汤，调五苓散服。④**治湿疮**：八角茴香、地龙、川乌头(炮、去皮尖)、乌药、牵牛各30克。研杵匀细，酒煮糊为丸。每服3克，每日2次。





原植物



图1 八角茴香



药材



饮片

**来源** 豆科植物刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. 的干燥成熟种子、果壳及根。

**产地** 主产于江苏、湖北、安徽。此外，四川、广西等地亦产。

**采收加工** 在播种当年 8~11 月分批采摘成熟果荚，剥出种子，晒干或烘干。

**原植物** 缠绕草质藤本，长达数米。三出复叶互生，叶柄长 8~15 厘米，小叶柄长约 1 厘米；小叶宽卵形，长 8~20 厘米，宽 5~16 厘米，先端渐尖，基部近圆形，两面无毛，侧生小叶偏斜。夏季开淡红色或淡紫色蝶形花，总状花序腋生，花疏，生于花序轴隆起的节上；萼二唇形，上唇大，2 裂，下唇 3 齿，卵形；旗瓣近圆形，大于其他瓣；雄蕊 10，二体；子房有疏长硬毛。荚果极长，窄长方形，略弯曲，长 15~30 厘米，先端有钩状短喙，边缘有明显凸出的隆脊；种子肾形，红色或褐色，长约 3.5 厘米，种脐和种子几等长。

**药材性状** 本品呈扁卵形或扁肾形，长 2~3.5 厘米，宽 1~2 厘米，厚 0.5~1.2 厘米。表面淡红色至红紫色，微皱缩，略有光泽。边缘具眉状黑色种脐，长约 2 厘米，上有白色细纹 3 条。质硬，难破碎。种皮革质，内表面棕绿色而光亮；子叶 2，黄白色，油润。无臭，味淡，嚼之有豆腥味。

## 刀豆 | daodou

别名：挟剑豆、刀豆子、大戈豆、大刀豆、刀鞘豆、刀凤豆、刀板仁豆、刀巴豆、马刀豆、刀培豆、卡肖

**饮片特征** 饮片为扁卵形或扁肾形横切薄片，表面淡红色至红紫色，皮部有眉状黑色种脐，横断面棕绿色。质硬，无臭，味淡，嚼之有豆腥味。

**质量标志** 以果实饱满，表皮淡红色至红紫色，有光泽，质坚实者为佳。

**性味功能** 味甘，性温。归胃、肾经。功能温中下气，益肾培元。治虚寒呃逆，呕吐，腹胀，肾虚腰痛，痰喘。

**用法用量** 内服：种子 6~9 克，果壳及根 30~60 克。外服：适量。


**常用验方** ①治呃逆：刀豆取老而绽者，每服 6~9 克，开水下。②治腰痛：刀豆子 2 粒，包于猪腰子内，外裹叶，烧熟食。③治百日咳：刀豆子（打碎）10 粒，甘草 3 克。加冰糖适量，水 200 毫升，煎至 150 毫升，去渣，频服。④治鼻渊：老刀豆，文火焙干为末，酒服 9 克。⑤治小儿疝气：刀豆子研粉，每次 4.5 克，开水冲服。⑥治闭经：刀豆 9 克，卷柏、柴胡各 10 克，续断、当归、赤芍各 15 克，桃仁、红花各 8 克，香附、甘草各 6 克。水煎服，每日 1 剂，分 2 次温服。⑦治跌打损伤：刀豆、熟大黄、三七粉各适量。研成粉，酒调匀外敷患处。




原植物



图2 刀 豆




药材



饮片









三画

**来源** 大戟科植物续随子 *Euphorbia lathyris* L. 的干燥成熟种子。

**产地** 主产于河南、浙江、陕西等地（多栽培）。

**采收加工** 夏、秋季种子成熟后，割取植株，打下种子，除去杂质，筛去泥沙，洗净，捞出，晒干，置阴凉干燥处，防蛀。

**原植物** 二年生草本，高达1米，全株微被白霜，内含乳汁。单叶交互对生；具短柄或近无柄；茎下部的叶较密，由下而上叶渐增大，长6~12厘米，宽0.8~1.3厘米，基部近截形，先端渐尖，全缘。杯状聚伞花序，通常4枝排成伞状，基部轮生叶状苞4片，每枝再叉状分枝，分枝处对生卵形或卵状披针形的苞叶2片；雄花多数和雌花1枚同生于萼状总苞内，总苞杯状，先端4~5裂；雄花仅具雄蕊1；雌花生于花序中央，雌蕊1，子房3室，花柱3，先端2歧。蒴果近球形，表面有褐黑两色相杂斑纹。生于向阳山坡；多为栽培。幼苗淡绿色；第一叶长2~2.5毫米，椭圆形，有明显的叶脉，第二叶长5~6毫米；7~8叶出现分蘖和匍匐茎及不定根。花期4~7月，果期7~8月。

**药材性状** 干燥种子呈椭圆形或卵圆形，长5~6毫米，直径约4毫米。表面灰棕色，有网状皱纹，皱纹的凸起部深棕色，凹下部灰黑色，顶端有小圆形微突起的合点，基部偏向种脊处有类白色的种阜，通常都已脱落，而呈斜切面状。种皮薄而硬脆，内表



# 千金子

qianjinzi

别名：续随子、打鼓子、一把伞、小巴豆、看园老

面灰白色，有光泽。胚乳黄白色，富油质，包围着细小而直的胚，子叶2片。气无，味辛。

**饮片特征** 生千金子：呈椭圆形或倒卵形，长约5毫米，直径约4毫米。表面灰棕色或灰褐色，具不规则网状皱纹，网孔凹陷处灰黑色，形成细斑点。顶端为突起的合点，下端为线形种脊，基部有类白色突起的种阜或具脱落后的疤痕。种皮薄脆，种仁富油质。气微，味辛。千金子霜：为均匀、疏松的淡黄色粉末，微显油性。味辛辣。

**质量标志** 本品以身干、粒充实饱满、种仁白色、无杂质、不破碎、油性足者为佳。

**性味功能** 味辛，性温，有毒。归肝、肾、大肠经。功能逐水消肿，破血消癥。用于水肿，痰饮，积滞胀满，二便不通，血瘀经闭。外治顽癣，赘疣。

**用法用量** 内服：1~2克，去壳，去油用，多入丸、散服。外用：适量，捣烂敷患处。

**常用验方** ①治水肿：千金子（炒，去油）60克，大黄30克。为末，酒、水为丸。每服以白汤送下10克，②治闭经：千金子3克，丹参、制香附各9克。煎服。③治赘疣：千金子熟时坏破之，以涂其上，便落。④治二便不通：千金子、黑丑、商陆各适量。共研细末，每服以白汤送下3克。



原植物



图3 千金子



药材



饮片



**来源** 大风子科大风子属植物大风子 *Hydnocarpus anthelminticus* Pierre ex Laness. 和海南大风子 *H. hainanensis* (Merr.) Sleum. 的种子。

**产地** 主产于越南、泰国、马来西亚等国。也产于我国云南、台湾、广西等地。

**采收加工** 4~6月采摘成熟果实，除去果皮，取出种子，晒干。

**原植物** 常绿乔木。单叶互生；革质；叶柄长1.2~1.5厘米；叶片线状披针形，长10~30厘米，宽3~7厘米，下面黄绿色，侧脉8~10对。花杂性或单性，1至数朵簇生；花梗被短柔毛；雄花萼片5，卵形，基部稍联合，两面被长柔毛；花瓣5，卵形，红色或粉红色；退化雄蕊鳞片状，线形，着生于瓣上，内部边缘被缘毛，近先端部被柔毛；雄蕊5，花药外向，长圆形，花丝基部粗厚；退化子房圆柱状，被长硬毛；雌花的花萼、花瓣均与雄花相同；退化雄蕊成一纺锤状体；子房卵形或倒卵形，被长硬毛，1室，具5侧膜胎座，胚珠多数，花柱粗短，被柔毛，柱头5裂，反卷。浆果球形，直径6~8厘米，果皮坚硬。种子30~40粒，略呈多角体，外种皮角质；胚乳丰富。花期1~3月。

**药材性状** 干燥的成熟种子，呈不规则的卵圆形，或多面形，稍有钝棱，长1~2.5厘米，直径1~2厘米。外皮灰棕色或灰褐色，有细纹，较小的一端有明显的沟纹。种皮厚而坚硬，厚1.5~2毫米，内表面光滑，浅黄色或黄棕色，种仁与皮分离，种仁两瓣，灰白色，



# 大风子

*dafengzi*

别名：麻风子、大枫子、驱虫大风子

有油性，外被一层红棕色或暗紫色薄膜。气微，味淡。

**饮片特征** 饮片为不规则的卵圆形，或多面形横切薄片，表面浅黄色或黄棕色，种皮厚而坚硬，横断面灰白色。质硬，气微，味淡。

**质量标志** 以个大、种仁饱满、色白、油性足者为佳。

**性味功能** 味辛，性热，有毒。归肝、脾、肾经。功能祛风燥湿，攻毒杀虫。用于麻风，疥癣，杨梅疮。

**用法用量** 内服：1.5~3克，大风子霜多入丸、散剂用。外用：适量，研烂搽，或烧存性和麻油调搽，亦可榨取大风子油搽患处。

**常用验方** ①治杨梅疮：大风子烧存性，和麻油、轻粉研涂，仍以壳煎汤洗之。②治疮疡肿痛、赘疣、麻风：大风子、白矾（枯）各60克，真轻粉30克，为末。将柏油180克和匀涂之。③治鼻疔：大风子、木鳖子、轻粉、硫黄各适量。为末，夜夜水调涂之。④治手足皲裂：大风子捣泥涂之。






图4 大风子

