



21世纪普通高等学校数学系列规划教材

医药高等数学


安国斌 卢小青 主编

$$f(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{2}{1+2x}$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$$

$$x \in (-1, 1)$$

$$\frac{2}{2x} = 2[1 - 2x + (2x)^2 - (2x)^3 + (2x)^4 - \dots] \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$



$$[A: E] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3+3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 \times \frac{1}{2} \\ r_1 - r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 + 6r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + 6r_3} [E: A^{-1}]$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \quad x \in (-1, 1)$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!} x^n \quad x \in (-1, 1)$$

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

21 世纪普通高等学校数学系列规划教材

内容简介

本书是“21 世纪普通高等学校数学系列规划教材”中的一本，由安国斌、卢小青、张文艺、田如玉、关树明等编写。本书以医学专业学生的数学知识需求为出发点，力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进，既注重数学知识的传授，又注重能力的培养。全书共分 10 章，内容包括：多元微分学、多元积分学、多元微分方程、多元统计初步、多元回归分析、多元判别分析、多元方差分析、多元协方差分析、多元时间序列分析、多元因子分析等。

医药高等数学

主 编 安国斌 卢小青

副主编 张文艺 田如玉 关树明

21 世纪医学人才的培养过程中，需要进一步拓宽医学类院校各专业大学生的知识面，增强创新能力。随着数学方法在医学领域的应用日益广泛和深入，医学科学逐步由传统的定性描述向定量描述转变，数学文化对医学研究的重要性日益凸显。成为现代医学研究的重要基础工具。本书在编写过程中，力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进，既注重数学知识的传授，又注重能力的培养。全书共分 10 章，内容包括：多元微分学、多元积分学、多元微分方程、多元统计初步、多元回归分析、多元判别分析、多元方差分析、多元协方差分析、多元时间序列分析、多元因子分析等。

为了培养学生良好的科学思维方式，提高学生的综合素质的培养，本书在编写过程中，力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进，既注重数学知识的传授，又注重能力的培养。全书共分 10 章，内容包括：多元微分学、多元积分学、多元微分方程、多元统计初步、多元回归分析、多元判别分析、多元方差分析、多元协方差分析、多元时间序列分析、多元因子分析等。

本书共十章，内容包括：多元微分学、多元积分学、多元微分方程、多元统计初步、多元回归分析、多元判别分析、多元方差分析、多元协方差分析、多元时间序列分析、多元因子分析等。

主编：安国斌、卢小青
副主编：张文艺、田如玉、关树明
编写：安国斌、卢小青、张文艺、田如玉、关树明

中国铁道出版社
北京 100044
ISBN 7-113-05800-3
定价：39.00 元

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

本书责任编辑：卢小青

北京铁路出版社 (010) 23232323

21世纪普通高等数学系列规划教材

内 容 简 介

本书介绍了医药类院校各专业常用的高等数学知识,内容包括函数、极限与连续,导数与微分,不定积分,定积分,多元函数微分学,多元函数积分学,常微分方程,无穷级数,线性代数,概率论。本书内容精炼,结构合理,逻辑严谨,例题丰富,内容由浅入深,前后呼应,力求体现医药类专业的特点。书末附有习题解析及标准正态分布表,便于学生学习和使用。

本书适合作为医药类高等院校各专业本科教材,也可作为医药工作者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

医药高等数学/安国斌,卢小青主编. —北京:
中国铁道出版社,2014.8
21世纪普通高等学校数学系列规划教材
ISBN 978-7-113-18575-6

I. ①医… II. ①安… ②卢… III. ①医用数学—高等数学—高等学校—教材 IV. ①R311 ②013

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 096148 号

书 名: 医药高等数学
作 者: 安国斌 卢小青 主编

策划编辑: 魏 娜
责任编辑: 周 欣
编辑助理: 刘丽丽
封面设计: 付 巍
封面制作: 白雪
责任编辑: 汤淑梅
责任印制: 李 佳

读者热线: 400-668-0820

出版发行: 中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街8号)

印 刷: 三河市兴达印务有限公司

版 次: 2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷

开 本: 787×960 1/16 印张: 20.25 字数: 428千

书 号: ISBN 978-7-113-18575-6

定 价: 38.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材研究开发中心批销部联系调换。电话:(010)63550836

打击盗版举报电话:(010)63549504

前 言

21 世纪医学人才的培养过程中,需要进一步拓宽医药类院校各专业大学生的知识面,增强创新能力。随着数学方法在医药学中的应用日益广泛和深入,医药学科逐步由传统的定性描述向定性、定量分析相结合的方向发展。数学方法为医药科学研究的深入发展提供了强有力的工具,数学文化对医药学科的渗透与结合成为现代医药学领域的显著特征。由此而形成的生物医学工程学、药物代谢动力学、计量诊断学等边缘学科显示了强大的生命力,生物数学方法已成为现代医药学研究的重要基础工具。

为了培养学生良好的科学思维方式,提高学生的综合素质与能力,使学生掌握解决实际问题的方法与技能,为学习后续课程打下必要的数学基础,我们结合多年的教学经验编写了本教材。

针对医药类院校各专业的特点,注重内容的实用性,适当兼顾理论体系。在选择题材和叙述上,我们把实用性放在首位,使教学内容尽量覆盖医药学领域中常常涉及的数学知识,让读者能在较短的时间内获得尽可能多的信息,更好地学习和掌握必备的高等数学知识。力求将教学实践经验与教学内容相结合,体现联系医药实际、深化概念、注重应用、重视创新的教改思想。

全书共十章,包括函数、极限与连续,导数与微分,不定积分,定积分,多元函数微分学,多元函数积分学,常微分方程,无穷级数,线性代数,概率论。在编写过程中,我们将多年的医药学数学教学经验浓缩提炼,力求结合医药类院校实际,内容设置少而精,且重点突出,注重讲述基本概念、基本原理和基本方法。书末附有习题解析,方便学生自学、供教师备课参考。

本书适合作为医药类高等院校各专业本科教材,也可作为医药工作者的自学参考书。

本书由安国斌、卢小青担任主编，张文艺、田如玉、关树明担任副主编。其中，田如玉编写第1、5章，张文艺编写第2、6章，关树明编写第3、9章，卢小青编写第4、8章，安国斌编写第7、10章。

在编写过程中，我们得到河北联合大学各级领导的大力支持，在此一并表示感谢。

由于时间仓促，书中难免有疏漏或不妥之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2014年6月

目 录

第 1 章 函数、极限与连续	1
1.1 函数	1
1.1.1 函数基础知识	1
1.1.2 函数的几种简单特性	6
1.2 函数的极限	7
1.2.1 函数极限的概念	7
1.2.2 极限的运算法则	10
1.2.3 两个重要极限	11
1.2.4 无穷小量	12
1.2.5 极限在医学上的应用实例	14
1.3 函数的连续性	15
1.3.1 函数连续的概念	15
1.3.2 函数的间断点	16
1.3.3 初等函数的连续性	17
1.3.4 闭区间上连续函数的性质	18
习题一	19
第 2 章 导数与微分	21
2.1 导数的概念	21
2.1.1 变化率问题	21
2.1.2 导数的定义	22
2.1.3 导数的几何意义	24
2.1.4 函数的可导性与连续性的关系	25
2.2 导数的计算	25
2.2.1 一些基本初等函数的导数	25
2.2.2 导数的四则运算法则	27
2.2.3 复合函数的求导法则	29
2.2.4 反函数的求导法则	30

2.2.5	隐函数的求导法则	31
2.2.6	对数求导法	32
2.2.7	高阶导数	33
2.3	微分	34
2.3.1	微分的概念	34
2.3.2	微分的运算法则	35
2.3.3	微分在近似计算和误差估计中的应用	37
2.4	导数的应用	39
2.4.1	微分中值定理	39
2.4.2	洛必达法则	41
2.4.3	函数的单调性和极值	46
2.4.4	函数曲线的凹凸性和拐点、渐近线	54
2.4.5	函数图形的描绘	57
2.5	导数在医学上的应用	59
	习题二	62
第3章	不定积分	66
3.1	不定积分的概念	66
3.2	不定积分的性质及基本公式	68
3.2.1	不定积分的性质	68
3.2.2	不定积分的基本公式	69
3.3	不定积分的计算	70
3.3.1	直接积分法	70
3.3.2	换元积分法	71
3.3.3	分部积分法	75
3.3.4	典型例题	77
	习题三	78
第4章	定积分	80
4.1	定积分的概念	80
4.1.1	问题的引入	80
4.1.2	定积分的概念	82
4.2	定积分的性质和计算	83
4.2.1	定积分的性质	83
4.2.2	定积分的计算	85
4.3	定积分的应用	90

4.3.1	微元法 (differentiation)	90
4.3.2	平面图形的面积 (area of plane figure)	91
4.3.3	旋转体体积 (volume of the solid of revolution)	92
4.3.4	平面曲线 (plane curve) 的弧长	94
4.3.5	变力做功	95
4.3.6	连续函数的平均值	96
4.4	广义积分	97
4.4.1	无穷区间上的广义积分	97
4.4.2	被积函数有无穷间断点的广义积分	98
	习题四	99
第5章	多元函数微分学	102
5.1	多元函数的基本概念	102
5.1.1	空间直角坐标系	102
5.1.2	空间曲面和曲线	103
5.1.3	多元函数的概念	107
5.1.4	二元函数的极限和连续	108
5.2	偏导数与全微分	109
5.2.1	偏导数的概念	109
5.2.2	偏导数的几何意义	112
5.2.3	高阶偏导数	112
5.2.4	全微分	113
5.3	复合函数微分法	115
5.3.1	复合函数求导法则	115
5.3.2	隐函数微分法	116
5.3.3	二元函数的极值	117
	习题五	120
第6章	多元函数积分学	122
6.1	二重积分的概念和性质	122
6.1.1	二重积分的概念	122
6.1.2	二重积分的性质	124
6.2	二重积分的计算	124
6.2.1	在直角坐标系中化二重积分为累次积分	124
6.2.2	在极坐标系中化二重积分为累次积分	127
6.3	二重积分的应用	129

6.3.1	曲面的面积	129
6.3.2	在静力学中的应用	131
6.4	三重积分	132
6.4.1	三重积分的概念	132
6.4.2	三重积分的计算	133
	习题六	135
第7章	常微分方程	137
7.1	微分方程的基本概念	137
7.1.1	两个实例	137
7.1.2	微分方程的基本概念	138
7.1.3	微分方程的几何意义	139
7.2	可分离变量的微分方程	139
7.3	一阶线性微分方程	142
7.4	几种可降阶的微分方程	145
7.4.1	$y^{(n)}=f(x)$ 型的微分方程	145
7.4.2	$y''=f(x, y')$ 型的微分方程	145
7.4.3	$y''=f(y, y')$ 型的微分方程	146
7.5	二阶常系数线性微分方程	147
7.5.1	线性微分方程解的结构	147
7.5.2	二阶常系数线性齐次微分方程	149
7.5.3	二阶常系数线性非齐次微分方程	151
7.6	二维线性常系数微分方程组	155
7.7	微分方程的应用	156
7.7.1	微分方程在医药学中的应用	156
7.7.2	肿瘤生长的数学模型	159
	习题七	160
第8章	无穷级数	162
8.1	常数项级数的基本概念和性质	162
8.1.1	无穷级数的概念	162
8.1.2	无穷级数的基本性质	164
8.2	常数项级数敛散性判别法	165
8.2.1	正项级数敛散性判别法	166
8.2.2	任意项级数敛散性判别法	170

8.3 幂级数	171
8.3.1 函数项级数的概念	171
8.3.2 幂级数的收敛区间与收敛域	172
8.3.3 幂级数的运算性质	175
8.3.4 函数展开为幂级数	176
8.4 傅里叶级数	180
8.4.1 三角级数与三角函数系的正交性	180
8.4.2 傅里叶级数及收敛定理	181
8.4.3 将函数展成正弦级数或余弦级数	185
习题八	186
第9章 线性代数	188
9.1 行列式	188
9.1.1 行列式的概念	188
9.1.2 行列式的性质	191
9.1.3 行列式的计算	192
9.1.4 克莱姆法则	195
9.2 矩阵及其运算	197
9.2.1 线性变换与矩阵	197
9.2.2 矩阵的运算	199
9.2.3 逆阵	203
9.3 向量组的线性相关性与矩阵的秩	205
9.3.1 n 维向量	205
9.3.2 向量的线性相关性	206
9.3.3 向量组的秩	208
9.3.4 矩阵的秩	208
9.3.5 矩阵的初等变换	209
9.4 线性方程组	211
9.4.1 线性方程组解的判定	211
9.4.2 线性方程组的解法	213
9.4.3 用矩阵的初等行变换解线性方程组	215
9.5 矩阵的特征值与特征向量	217
9.6 线性代数在医学中的应用	219
习题九	220

第 10 章 概率论	225
10.1 随机事件及其概率	225
10.1.1 随机事件	225
10.1.2 事件的概率	228
10.2 概率的常用公式	233
10.2.1 条件概率与概率的乘法公式	233
10.2.2 事件的独立性	234
10.2.3 全概率公式与逆概率公式	236
10.2.4 二项概率公式	239
10.3 随机变量及其概率分布	240
10.3.1 随机变量的概念	240
10.3.2 离散型随机变量及其分布	241
10.3.3 随机变量的分布函数	244
10.3.4 连续型随机变量及其分布	245
10.4 随机变量的数字特征	249
10.4.1 数学期望及其性质	250
10.4.2 方差及其性质	253
10.4.3 常用的统计量	256
10.5 大数定律与中心极限定理	257
10.5.1 大数定律	257
10.5.2 中心极限定理	258
习题十	260
习题解析	263
习题一	263
习题二	264
习题三	272
习题四	275
习题五	278
习题六	282
习题七	284
习题八	291
习题九	297
习题十	305
附录 标准正态分布表	311
参考文献	313

第1章

函数、极限与连续

函数(function)是高等数学(Higher Mathematics)的主要研究对象。极限概念是微积分学(Calculus)的理论基础,极限是高等数学的基本研究方法。通过极限,人们才可能以高于初等数学的观点和方法来研究函数,引起从常量数学到变量数学质的飞跃。本章将介绍函数极限的基本内容,并由此引入连续函数的概念和性质。

1.1 函 数

1.1.1 函数基础知识

1. 函数的概念

在观察各种自然现象或实验过程中,常常会遇到各种不同的量,在过程中不断运动和变化的量称为变量(variable)。而这种运动和变化往往都是相互联系,彼此制约的。反映在数量上,就是变量与变量之间的依赖关系,即函数关系。

例1 外界环境温度对人体代谢率的影响可表达如下:

环境温度/ $^{\circ}\text{C}$...	4	10	20	30	38	...
代谢率/%	...	60	44	40	40.5	54	...

其中每一对数值可以在直角坐标系中找到相应的点,于是便得到A、B、C、D、E五点,见图1-1。医学中常用折线把它们连接起来,这时环境温度和代谢率两个变量之间的相互影响关系从图中便一目了然。环境温度太低或太高对代谢率的影响较大,只有温度在 20°C 左右,代谢率最低且比较稳定。故临床做“基础代谢率”时,就要保持室温在 20°C 左右的条件下进行。




图1-1

例2 对某糖尿病患者作葡萄糖耐糖试验,每

千克体重口服葡萄糖 1.75g 后,测定血糖结果如下:

口服葡萄糖后时刻 t/h	0	0.5	1	2	3
患者血糖水平 y/mg	200	230	250	255	240

例 3 医生给婴儿看病,给药应视体重而异,在 1~6 个月范围内婴儿体重有如下经验公式:

$$y=3+0.6x,$$

其中 x 的单位为月份, y 的单位为千克(kg)。

上述三例说明,参与同一过程的两个变量之间都存在着某种确定的对应关系。在这种关系下,第一个变量取定了某一个数值,第二个变量也相应地取定某一个数值,抛开变量的具体意义,就可以抽象出函数的概念。

定义 1 设 x 与 y 是某个变化过程中的两个变量,若变量 x 在它可能取值范围内所取的每一个值,变量 y 依照一定的对应规律 f ,都有唯一确定的值与其对应,则称变量 y 为变量 x 的(一元)函数,记为

$$y=f(x), \quad (1.1)$$

其中 x 称为自变量(independent variable), y 称为因变量(dependent variable),对应规律 f 称为函数关系(functional relation),也可用 g, φ 等表示。

函数常用的表示方法有:解析法(或公式法),如 $S=\pi R^2$ 及 $y=x^2+1$ 等;列表法,如对数表,三角函数表及由某些实验得到的观测数据表等;图像法,如心电图、脑电图及自动记录仪记录的气温曲线等。

如果当自变量 x 取某一值 x_0 时,函数具有唯一确定的对应值,则称函数在 x_0 处有定义。使函数有定义的自变量的取值范围称为函数的定义域(domain of definition)。把以 x_0 为中心,长度为 2δ 的开区间 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 称为点 x_0 的 δ 邻域(neighborhood),记为 $x_0-\delta < x < x_0+\delta$ 或 $|x-x_0| < \delta$ 。在点 x_0 的 δ 邻域内,去掉 x_0 点所得到的开区间 $(x_0-\delta, x_0)$ 和 $(x_0, x_0+\delta)$ 称为点 x_0 的 δ 去心邻域(deleted neighborhood),记为

$$x_0-\delta < x < x_0, x_0 < x < x_0+\delta \text{ 或 } 0 < |x-x_0| < \delta.$$

函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义,即指存在某个正数 δ ,使 $f(x)$ 在区间 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内每一点都有定义。

一般地,函数的定义域应由问题的实际意义来确定。例如,物体自由落体的运动方程 $S=\frac{1}{2}gt^2$ 的定义域为 $\left[0, \sqrt{\frac{2h}{g}}\right]$ (其中 h 为落体距地面的高度);1~6 个月的婴儿体重方程 $y=3+0.6x$ 的定义域为 $[1, 6]$ 。当函数用纯粹的解析式给出时,其定义域就是使该解析式有意义的自变量的取值范围。

例 4 求 $y=\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ 的定义域。

解 要使函数有意义,必须 $4-x^2>0$,由此得函数的定义域为 $-2<x<2$,也可用区间表示为 $(-2,2)$ 。

例5 求 $y=\lg(|x-3|-2)$ 的定义域。

解 要使函数有意义,必须满足 $|x-3|-2>0$,由此得函数的定义域为 $x>5$ 或 $x<1$,用区间可表示为 $(-\infty,1)\cup(5,+\infty)$ 。

对于函数 $y=f(x)$,当自变量 x 在定义域中取定一值 x_0 时, $f(x)$ 的对应值称为函数当 $x=x_0$ 时的函数值(value of function),记为 $f(x_0)$ 或 $y|_{x=x_0}$ 。

例如,设 $f(x)=x^2-x+1$,则 $f(2)=2^2-2+1=3$; $f(a+1)=(a+1)^2-(a+1)+1=a^2+a+1$; $f\left(\frac{1}{a}\right)=\left(\frac{1}{a}\right)^2-\frac{1}{a}+1=\frac{a^2-a+1}{a^2}$ ($a\neq 0$)。

函数值的全体称为函数的值域(range)。

以上所述函数是单值函数(monotropic function),即自变量 x 在定义域内每取一值时, y 只有一个确定的值与之对应。如果 y 有两个或两个以上的值与之对应,则称 y 为 x 的多值函数(multivalued function)。例如 $y=\arcsin x$, $y=\pm\sqrt{x}$ 都是多值函数。遇到多值函数时可以分成单值分支和取主支处理,例如 $y=\pm\sqrt{x}$ 分成 $y=\sqrt{x}$ 和 $y=-\sqrt{x}$; $y=\arcsin x$ 取单值支(即将其值限制在闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上),记为 $y=\arcsin x$ 。如不特殊指出时,本书主要讨论单值函数。

2. 分段函数

在实际问题的研究中,一个函数关系有时需要用几个式子来表示。

定义2 在定义域内的不同范围上,对应规律用不同的解析式来表示的函数,称为分段函数(piecewise function)。

例如, $y=|x|=\begin{cases} x & \text{当 } x\geq 0 \\ -x & \text{当 } x< 0 \end{cases}$ 及 $y=\begin{cases} 2 & \text{当 } x> 0 \\ 0 & \text{当 } x= 0 \\ x-2 & \text{当 } x< 0 \end{cases}$ 均为分段函数。

在求分段函数的函数值时,应将不同范围的自变量的值代入相应的函数表达式。例如,

符号函数 $y=\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases} 1 & \text{当 } x> 0 \\ 0 & \text{当 } x= 0, \\ -1 & \text{当 } x< 0 \end{cases}$ 当 $x=-2,2,0$ 点时,函数值分别为 $\operatorname{sgn}(-2)=-1$,

$\operatorname{sgn}(2)=1, \operatorname{sgn}(0)=0$ 。

又如,在生理学研究中,有人根据测量血液中胰岛素浓度 $C(t)$ 随时间 $t(\text{min})$ 的变化数据,建立了如下经验公式:





$$C(t)=\begin{cases} t(10-t) & \text{当 } 0\leq t\leq 5 \\ 25e^{-k(t-5)} & \text{当 } 5<t \end{cases},$$

其中 $k = \frac{\ln 2}{20}$, 显然浓度 $C(t)$ 是时间 t 的分段函数, 其定义域为 $[0, +\infty)$, 且 $t = 2 \text{ min}, 10 \text{ min}$ 时, 函数值分别为 $C(2) = 2(10 - 2) = 16, C(10) = 25e^{-k(10-5)} = 25e^{-5k}$ 。

3. 基本初等函数

中学里学过的幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数统称基本初等函数 (fundamental elementary function)。归纳为表 1-1。

表 1-1

类别及解析式	定义域	值域	图 形
幂函数 $y = x^\mu$ $\mu > 0$, μ 次抛物线 $\mu < 0$, 令 $\mu = -m (m > 0)$, $y = x^{-m} = \frac{1}{x^m}$, m 次双曲线	因 μ 而异, 但 $[0, +\infty)$ 是公 共定义域 公共定义域为 $(0, +\infty)$	因 μ 而异, 但 $[0, +\infty)$ 是公 共值域 公共值域为 $(0, +\infty)$	 <p>$y = x^\mu$ (x 在第一象限)</p>
指数函数 $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$	$(-\infty, +\infty)$	$(0, +\infty)$	 <p>$y = a^x (a > 0, a \neq 1)$</p>
对数函数 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$	$(0, +\infty)$	$(-\infty, +\infty)$	 <p>$y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$</p>
三角函数 正弦函数 $y = \sin x$ 余弦函数 $y = \cos x$ 正切函数 $y = \tan x$ 余切函数 $y = \cot x$	$(-\infty, +\infty)$ $(-\infty, +\infty)$ $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ $x \neq n\pi$ $(n = 0, \pm 1, \dots)$	$[-1, 1]$ $[-1, 1]$ $(-\infty, +\infty)$ $(-\infty, +\infty)$	 <p>$y = \sin x$ $y = \cos x$ $y = \tan x$ $y = \cot x$</p>

续表

类别及解析式	定义域	值域	图 形
正割函数 $y = \sec x = \frac{1}{\cos x}$	$x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ $n=0, \pm 1, \dots$	$(-\infty, -1]$, $[1, +\infty)$	
余割函数 $y = \csc x = \frac{1}{\sin x}$	$(n\pi - \pi, n\pi)$ $n=0, \pm 1, \dots$	$(-\infty, -1]$, $[1, +\infty)$	
反三角函数			$y = \arcsin x$ $y = \arccos x$
反正弦函数 $y = \arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	
反余弦函数 $y = \arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	
反正切函数 $y = \arctan x$	$(-\infty, +\infty)$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	
反余切函数 $y = \operatorname{arccot} x$	$(-\infty, +\infty)$	$[0, \pi)$	

4. 复合函数

定义 3 若 y 是 u 的函数 $y=f(u)$, 而 u 又是 x 的函数 $u=\varphi(x)$, 且 $\varphi(x)$ 的值域全部或部分在 $f(u)$ 的定义域内, 则称 y 是 x 的复合函数(compound function), 记为

$$y=f(\varphi(x)), \quad (1.2)$$

其中 u 称为中间变量。

例如, $y = \sin u, u = \sqrt{x}$ 经复合可以得到 y 关于 x 的复合函数 $y = \sin \sqrt{x}$ 。

以上是两个函数的“嵌套”关系构成的复合函数, 不难将其推广到有限个函数的层层“嵌套”关系构成的复合函数。例如, 由 $y = u^2, u = \arctan v, v = e^x$ 可以复合成 y 关于 x 的复合函数 $y = (\arctan e^x)^2$ 。

但需注意, 不是任何两个函数都可以复合成一个复合函数。例如, $y = \arcsin u$ 及 $u = x^2 + 2$ 就不能复合成一个复合函数。因为函数 $u = x^2 + 2$ 的值域为 $[2, +\infty)$, 在此区间上 $y = \arcsin u$ 没有意义。

我们不仅要学会把若干个函数“复合”成一个复合函数, 而且要善于把一个复合函数“分解”成若干个简单的函数。例如, $y = \sqrt{\lg(x^2 - 1)}$ 可以看成是由 $y = \sqrt{u}, u = \lg v, v = x^2 - 1$ 复合而成的; 而 $y = 2^{2\sin(x+1)}$ 可以看成是由 $y = 2^u, u = 2v^2, v = \sin w, w = x + 1$ 复合而成的。

注意: 要从外到里层层分解, 分解到简单函数为止, 所谓简单函数 (simple function), 是指基本初等函数或者是常数与基本初等函数经过四则运算后得出的函数。这种分解在微分运算中经常用到。

5. 反函数

定义 4 设给定 y 是 x 的函数 $y = f(x)$, 且 y 与 x 之间一一对应, 如果把 y 当作自变量, x 当作函数, 则由关系式 $y = f(x)$ 所确定的函数 $x = \varphi(y) = f^{-1}(y)$, 称为函数 $f(x)$ 的反函数 (inverse function)。

由反函数的定义可见, 如果 $x = \varphi(y)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数, 则 $y = f(x)$ 也是 $x = \varphi(y)$ 的反函数, 所以 $y = f(x)$ 和 $x = \varphi(y)$ 互为反函数。

例如, 对于函数 $y = f(x) = 3x + 4$, 可得 $x = \varphi(y) = \frac{y-4}{3}$, 因而函数 $y = 3x + 4$ 的反函数为 $\varphi(y) = f^{-1}(y) = \frac{y-4}{3}$ 。

函数 $y = f(x)$ 与其对应的反函数 $x = \varphi(y)$ 的图形关于直线 $y = x$ 对称。

6. 初等函数

定义 5 由常数和基本初等函数经过有限次四则运算及有限次复合所构成的由一个解析式表达的函数, 称为初等函数 (elementary function)。

例如, 多项式函数 $y = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$, 有理分式函数 $y = \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n}$, 无理函数 $y = \sqrt{\cot 3x + e^{x+1}}$ 等都是初等函数。但需注意, 有的分段函数虽然不是初等函数, 可它在每一段上均为初等函数。

本书所讨论的函数绝大多数都是初等函数。

1.1.2 函数的几种简单特性

1. 有界性

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内有定义, 如果存在一个正数 M , 使对所有的 $x \in (a, b)$, 恒有