

「黔版中草药彩色图谱」系列

特色

TESE ZHONGCAOYAO JI PEIFANG 3

中草药

及配方 **3**

杨卫平

夏同珩 / 主编

 贵州出版集团
贵州科技出版社

本书获2016年贵州省出版传媒事业发展专项资金资助

特色中草药及配方

3

主 编 杨卫平 夏同珩

副主编 李朝斗 陈谦海

编辑委员（按姓氏笔画顺序排列）

尹武燕	云雪林	刘 冬	刘 明
李 琼	李文科	李朝斗	沈 明
冷 丽	吴筱枫	陈 芳	陈谦海
何前松	张庆乾	张华海	杨卫平
杨成华	杨传东	周 静	周惟粲
苟光前	姜东辉	夏同珩	梅 颖
黄 敏	董发发	潘晓瑛	

贵州出版集团
贵州科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

特色中草药及配方. 3 / 杨卫平, 夏同珩主编. --

贵阳: 贵州科技出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5532-0489-5

I. ①特… II. ①杨… ②夏… III. ①中草药—图集

②中草药—验方 IV. ①R282.7-64②R289.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第157290号

出版发行 贵州出版集团 贵州科技出版社
地 址 贵阳市中天会展城会展东路A座 (邮政编码: 550081)
网 址 <http://www.gzstph.com> <http://www.gzkj.com.cn>
经 销 全国各地新华书店
印 刷 贵阳德堡印务有限公司
版 次 2016年8月第1版
印 次 2016年8月第1次
字 数 310千字
印 张 10.75
开 本 890 mm × 1240 mm 1/32
书 号 ISBN 978-7-5532-0489-5
定 价 44.00元

天猫旗舰店: <http://gzkjcs.tmall.com>

前 言

当前，环境问题已成为影响人类生存、经济发展和社会进步的一大问题，世界各国民众普遍关注，各国政府也高度重视，积极投入人力、物力，努力开展科学研究和对被破坏的生态及环境进行治理。与人类生老病死关系最为密切的医药卫生事业，也是环境问题的一个重要方面，一样颇受世人关注。生产各种用于防病、治病的化学药品，需要耗费大量的人力、物力、财力，也能对环境造成一定的影响。全世界工业化、现代化的高度发展，使人们生活在钢筋混凝土的高楼大厦缝隙之中，遭受汽车尾气、工业废气及各种噪声的刺激，再加上工作紧张，难免身心疲惫，渴求返璞归真，回到农耕田园生活之中；与此同时，也对防病治病提出了新的要求，希望能更多地使用天然药物，以避免或减少化学药物在防病、治病中的毒副作用对身体的伤害。这个要求，并不过分，同时也是最现实、能实现的要求。中医中药延续了几千年，在从事诊病治病的医疗实践中，历代医药人员努力工作，积累了丰富的诊病用药经验，使中国医药成了世界医药宝库的一个重要组成部分。中医中药防病治病的宝贵经验，可供世界各国借鉴和参考，这就为人们使用天然药物来防病治病打下了基础。为了充分发挥中草药这一天然药物毒副作用小、易取易得和在防病治病中的优势，本书作者在野外拍摄了近10万张有关中草药的照片，并从中挑选出近1800种常用中草药的照片，为其撰写相关文字，编著成了《特色中草药及配方》一书，分六册出版。

全书编排顺序是：植物药按植物分科科名的汉语拼音字母顺序排列，对每一科中的种类，基本上按拉丁学名的字母顺序排列；动物药、矿物药则排列在植物药之后。每个药按来源及药用部位（含拉丁名）、本草论

述、形态特征（含生境及分布）、性味功效、常用配方（一般3~5首）、主要化学成分、现代研究等条目列项叙述；每个药配有1~2张具有鉴别特征的在生长实地拍摄的彩色照片。本书具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

本书在编写过程中，参阅了国内较多的相关书籍及刊物，不能一一作谢，在此，特向相关参考书或文章的作者表示诚挚的谢意。

本书主编杨卫平和编辑委员云雪林、陈芳、刘明、周静、刘冬、梅颖、冷丽、何前松、吴筱枫系贵阳中医学院教师。

由于编著者的学识水平及见识有限，书中难免有疏漏和谬误之处，敬请广大读者批评指正，以备再版时订正，对此特表衷心感谢。

编 者

目 录

- | | | | |
|---------------------|------|-------------------|------|
| 薯草(一枝蒿)····· | (1) | 三叶鬼针草····· | (30) |
| 洋薯草(千叶薯、蜈蚣蒿)····· | (2) | 狼把草····· | (31) |
| 土一枝蒿(飞天蜈蚣)····· | (3) | 艾纳香····· | (32) |
| 水葫芦根····· | (4) | 走马风(六耳铃)····· | (33) |
| 风气草····· | (5) | 东风草(毛千里光)····· | (34) |
| 胜红蓟····· | (6) | 金光菊(山柳菊)····· | (35) |
| 金边兔耳····· | (7) | 金盏草····· | (36) |
| 倒赤伞····· | (8) | 金盏菊····· | (37) |
| 叶下花····· | (9) | 飞廉····· | (38) |
| 大叶白头翁····· | (10) | 天名精····· | (39) |
| 午香草(香附草)····· | (11) | 鹤虱(野烟)····· | (40) |
| 通肠香(九里香)····· | (12) | 杓儿菜(金挖耳)····· | (41) |
| 牛蒡子(恶实、大力子)····· | (13) | 金挖耳(挖耳草)····· | (42) |
| 牛蒡根(恶实根、牛菜)····· | (14) | 红花····· | (43) |
| 黄花蒿(苦蒿)····· | (15) | 鹅不食草····· | (44) |
| 青蒿····· | (16) | 野菊花(苦蕒)····· | (45) |
| 艾····· | (17) | 茼蒿(茼蒿菜)····· | (46) |
| 牡蒿(齐头蒿)····· | (18) | 大蓟····· | (47) |
| 红姨妈菜(鸭脚艾)····· | (19) | 线叶蓟(尖叶小蓟)····· | (48) |
| 茵陈(茵陈蒿)····· | (20) | 小蓟(小刺菜)····· | (49) |
| 白蒿····· | (21) | 虾须草(绿绿草、草麻黄)····· | (50) |
| 山白菊····· | (22) | 白酒草····· | (51) |
| 紫菀····· | (23) | 线叶金鸡菊(除虫菊)····· | (52) |
| 苍术····· | (24) | 野木耳菜(假茼蒿)····· | (53) |
| 白术····· | (25) | 大丽菊(大理菊、苕儿花)····· | (54) |
| 云木香(木香)····· | (26) | 菊花····· | (55) |
| 鬼针草····· | (27) | 蚯疽草(鱼眼菊)····· | (56) |
| 金盏银盘(鬼针草)····· | (28) | 鱼眼草····· | (57) |
| 小花鬼针草(鹿角草、小鬼钗)····· | (29) | 东风菜····· | (58) |

川木香·····	(59)	翼齿六棱菊(六棱麻、鹿耳林)···	(94)
旱莲草(墨旱莲)·····	(60)	山紫菀(葫芦七)·····	(95)
地苦胆·····	(61)	橐吾(接骨丹)·····	(96)
一点红(羊蹄草)·····	(62)	蜂斗菜·····	(97)
一年蓬·····	(63)	秋分草(大鱼鳅串)·····	(98)
灯笼细辛·····	(64)	雪莲·····	(99)
佩兰(兰草)·····	(65)	丝茅七(仙茅参)·····	(101)
山佩兰(单叶佩兰)·····	(66)	大红青菜(山青菜)·····	(102)
尖佩兰(野马追)·····	(67)	狗舌草·····	(103)
飞机草(香泽兰)·····	(68)	蒲儿根(肥猪苗)·····	(104)
萍蓬草(橐吾)·····	(69)	千里光(九里光)·····	(105)
毛大丁草(兔耳风)·····	(70)	豨莶草·····	(106)
绵花草(清明菜、小火草)·····	(71)	水飞蓟·····	(107)
地膏药(宽叶鼠曲草)·····	(72)	一枝黄花(金柴胡)·····	(108)
细叶鼠曲草(天青地白)·····	(73)	苦菜(苦苣、苦蕒)·····	(109)
白背三七(玉枇杷、金枇杷)···	(74)	漏芦·····	(110)
土三七(血当归)·····	(75)	兔儿伞(一把伞)·····	(111)
葵花(向日葵)·····	(76)	万寿菊·····	(112)
葵花根·····	(77)	孔雀草·····	(113)
菊芋(洋姜)·····	(78)	蒲公英(黄花地丁)·····	(114)
泥糊菜(豹子草)·····	(79)	款冬花·····	(115)
白牛胆(大毛香)·····	(80)	蟛蜞菊·····	(116)
土木香·····	(81)	苍耳(萁耳)·····	(117)
水朝阳草(金沸草)·····	(82)	苍耳子(萁耳子)·····	(118)
旋覆花·····	(83)	黄鹌菜(黄狗头)·····	(119)
金沸草·····	(84)	金线兰·····	(120)
山苦蕒(野苣)·····	(85)	白及·····	(121)
剪刀股·····	(86)	麦斛(果上叶)·····	(122)
苦蕒菜(苦蕒)·····	(87)	果上叶·····	(123)
马兰(鱼鳅串、田边菊)·····	(88)	马牙七·····	(124)
野葛苣(丁萝卜)·····	(89)	虾脊兰(九子连环草)·····	(125)
山苦菜(野洋烟)·····	(90)	四里麻·····	(126)
葛苣·····	(91)	银兰·····	(127)
苦苣·····	(92)	金兰·····	(128)
鹿耳翎(臭灵丹、六棱菊)·····	(93)	贝母兰·····	(129)

- 山慈姑····· (130)
- 独蒜兰····· (131)
- 云南独蒜兰····· (132)
- 建兰····· (133)
- 蕙兰····· (134)
- 寒兰····· (135)
- 岩兰(硬叶兰)····· (136)
- 兔耳草····· (137)
- 扇脉杓兰(扇子七)····· (138)
- 石斛····· (139)
- 玉凤兰(玉峰兰)····· (140)
- 天麻····· (141)
- 斑叶兰····· (143)
- 见血清····· (144)
- 钗子股····· (145)
- 鹤顶兰····· (146)
- 盘龙参(米洋参)····· (147)
- 喜树····· (148)
- 甜菜(恭菜、牛皮菜)····· (149)
- 土荆芥····· (150)
- 藜(藿、灰苋菜)····· (151)
- 灰藿(灰灰菜)····· (152)
- 地肤子····· (153)
- 菠菜(菠棱菜、角菜)····· (154)
- 芒(芒萁、郎鸡叶)····· (155)
- 刺齿贯众(尖耳贯众)····· (156)
- 小贯众(公鸡头)····· (157)
- 大贯众(绵马贯众)····· (158)
- 乌韭(乌蕨)····· (159)
- 米仔兰(米兰花)····· (160)
- 苦楝皮(川楝皮)····· (161)
- 苦楝子····· (162)
- 川楝子(金铃子)····· (163)
- 地黄连(矮陀陀)····· (164)
- 椿(香椿、椿白皮)····· (165)
- 菱角····· (166)
- 甜荞(荞麦)····· (167)
- 苦荞头(万年荞、野南荞)····· (168)
- 竹节蓼····· (169)
- 篇蓄(扁蓄)····· (170)
- 拳参(紫参、鸢头鸡、地马蜂)····· (171)
- 头花蓼(四季红、太阳草)····· (172)
- 血苕(红药子)····· (173)
- 虎杖(花斑竹、酸汤杆)····· (174)
- 胖血藤(毛血藤)····· (175)
- 丛枝蓼····· (176)
- 水蓼····· (177)
- 何首乌····· (178)
- 扛板归(蛇倒退、扛板归)····· (179)
- 荭草(红草、水红花子)····· (180)
- 花蝴蝶(赤胫散)····· (181)
- 雀翘(倒刺林)····· (182)
- 廊茵(大扛板归)····· (183)
- 羊蹄(土大黄)····· (184)
- 大黄(将军)····· (185)
- 金不换(土大黄、血三七)····· (186)
- 圆叶蓼(云支花)····· (187)
- 野菰(牛心草)····· (188)
- 肉苁蓉(大芸)····· (189)
- 列当····· (190)
- 牛泔草(夜抹光)····· (191)
- 毛脉柳叶菜(柳叶菜)····· (192)
- 柳叶菜(水接骨丹)····· (193)
- 心胆草(水朝阳花)····· (194)
- 丁香蓼(水蓬砂)····· (195)
- 月见草(夜来香)····· (196)
- 红花月见草(红花夜来香)····· (197)
- 穿心草····· (198)
- 秦艽····· (199)
- 青鱼胆草(小龙胆草)····· (200)

小儿血参（笔龙胆）·····	（201）	奶浆藤（通光散）·····	（236）
龙胆（龙胆草）·····	（202）	蓝叶藤·····	（237）
石龙胆（蓝花地丁）·····	（203）	奶浆草（奶浆藤、萝藦）·····	（238）
扁蕾·····	（204）	黑骨藤（滇杠柳）·····	（239）
花锚·····	（205）	香加皮（杠柳皮）·····	（240）
黑及草·····	（206）	麻黄·····	（241）
苔菜·····	（207）	珍珠风（珠子树）·····	（242）
獐牙菜·····	（208）	紫珠·····	（243）
贵州獐牙菜·····	（209）	老鸦糊·····	（244）
青叶胆（紫花龙胆）·····	（210）	大叶紫珠·····	（245）
当药·····	（211）	红紫珠（对节树）·····	（246）
蔓龙胆（青鱼胆草）·····	（212）	臭牡丹·····	（247）
冰片·····	（213）	臭牡丹根·····	（248）
金边莲（金边龙舌兰）·····	（214）	大青（大青叶）·····	（249）
龙舌兰·····	（215）	大青根·····	（250）
朱蕉·····	（216）	荷包花·····	（251）
露兜子（檳榔子、野菠萝）·····	（217）	臭茉莉·····	（252）
水晶兰（梦兰花）·····	（218）	三百棒（山枇杷、三台花）·····	（253）
鹿衔草（鹿蹄草、鹿含草）·····	（219）	臭梧桐·····	（254）
罗汉松实·····	（220）	臭梧桐根·····	（255）
罗汉松根皮·····	（221）	五色梅（马缨丹）·····	（256）
落葵·····	（222）	五色梅叶·····	（257）
藤三七·····	（223）	臭黄荆·····	（258）
马利筋（草木棉）·····	（224）	腐婢（斑鸠窝）·····	（259）
吊灯花·····	（225）	斑鸠占（臭树）·····	（260）
白薇·····	（226）	马鞭草·····	（261）
牛皮消（白首乌）·····	（227）	黄荆子·····	（262）
白前·····	（228）	黄荆叶·····	（263）
竹林消（川白薇、老君须）·····	（229）	牡荆子·····	（264）
青羊参（牛尾七）·····	（230）	牡荆叶·····	（265）
徐长卿（对月莲）·····	（231）	牡荆根·····	（266）
柳叶白前·····	（232）	蔓荆子·····	（267）
隔山消·····	（233）	午时花（太阳花）·····	（268）
球兰·····	（234）	马齿苋·····	（269）
白杜仲（三百银）·····	（235）	土人參（栝兰）·····	（270）

- 马兜铃····· (271)
 青木香····· (272)
 天仙藤(青木香藤)····· (273)
 木防己····· (274)
 汉中防己····· (275)
 大白解薯····· (276)
 关木通····· (277)
 绵毛马兜铃(寻骨风)····· (278)
 大青木香····· (279)
 荇叶细辛(接气草)····· (280)
 尾花细辛····· (281)
 杜衡(土细辛)····· (282)
 细辛····· (283)
 大乌金草····· (284)
 花脸细辛(翻天印)····· (285)
 密蒙花····· (286)
 钩吻(断肠草)····· (287)
 马钱子····· (288)
 马桑叶····· (289)
 马桑根····· (290)
 满江红····· (291)
 老鹳草····· (292)
 生扯拢(破铜钱)····· (293)
 香叶····· (294)
 石蜡红····· (295)
 茅膏菜····· (296)
- 美人蕉····· (297)
 猕猴桃····· (298)
 毛花猕猴桃(毛花杨桃、毛冬瓜)
 ····· (299)
 木天蓼····· (300)
 蘑菇····· (301)
 木耳····· (302)
 南五味子(五味子)····· (303)
 五香血藤····· (304)
 北五味子(五味子)····· (305)
 厚朴····· (306)
 凹叶厚朴····· (307)
 峨嵋含笑····· (308)
 黑老虎(饭团藤、饭团根)····· (309)
 莽草····· (310)
 玉兰(辛夷)····· (311)
 辛夷····· (312)
 八角(八角茴香、大茴香)····· (313)
 血藤(紫金藤)····· (314)
 缅桂····· (315)
 黄角兰(黄兰、黄缅桂)····· (316)
 鹅掌楸(双飘树、马褂木)····· (317)
 木棉花····· (318)
 木棉根····· (319)
 中文名笔画索引····· (320)
 拉丁学名索引····· (327)

蓍草（一枝蒿）

【来源及药用部位】菊科植物蓍 *Achillea alpina* L.的全草。

【本草论述】《本草纲目》：“蓍叶主治痞疾。”

【形态特征】多年生草本，高50~100cm。具短根茎。茎直立，有棱条，上部分枝。叶互生，叶片长线状披针形，栉齿状羽状深裂或浅裂，裂片线形，排列稀疏，半抱茎，两面生长柔毛。头状花序多数，集成伞房状；总苞钟状，3层，覆瓦状排列，绿色；边缘舌状花雌性，5~11朵，白色，中心管状花两性，白色；花药黄色，伸出花冠。瘦果扁平。花期7~9月。

生于向阳山坡、草地、林缘，有栽培。分布于东北、华北、西南及宁夏、甘肃、河南等地。

【性味功效】辛、苦，微温；有小毒。祛风止痛，活血，解毒。

【常用配方】**1.治跌打伤痛** 一枝蒿30g，泡酒涂搽伤处。**2.治闭经腹痛** 一枝蒿茎叶10~15g，水煎服。**3.治风湿痹筋骨疼痛** 一枝蒿3g，五香血藤、黑骨藤各15g，见血飞6g，排风藤12g，红牛膝9g，泡酒1000ml，每次服15~30ml。

4.治牙痛 一枝蒿鲜茎叶适量，捣绒，揉搽太阳穴。

【主要化学成分】含蓍素，兰香油萜，乌头酸，菊糖和桉叶素等。

【现代研究】药理研究显示有抗炎，抗菌，解热，镇静和镇痛等作用。现代临床用于治疗感冒发热，跌打损伤，风湿病筋骨疼痛，牙痛，外伤疼痛和月经不调等。



洋蓍草（千叶蓍、蜈蚣蒿）

【来源及药用部位】菊科植物千叶蓍 *Achillea millefolium* L.的全草。

【本草论述】《陕西中草药》：“清热解毒，凉血消肿，止血，调经。”

【形态特征】多年生草本，高40~100cm。具匍匐根茎。茎直立，有细条纹，生白色长柔毛。叶互生，叶片长圆状披针形或近条形，2~3回羽状全裂，裂片多数、细小，先端尖。头状花序多数，集成伞房状；总苞倒卵形，总苞片3层，覆瓦状排列；各头状花序有边花5朵，舌片近圆形，白色、粉红色或淡紫色；盘花两性，管状，黄色，5齿裂。瘦果宽卵圆形，淡绿色。花、果期7~9月。

生于草地、荒地及道路沿线。分布于东北及内蒙古、新疆等地。

【性味功效】辛、苦，凉；有毒。祛风，活血，止痛，解毒。

【常用配方】**1.治跌打损伤、疔疮肿毒** 千叶蓍15g，土当归9g，水煎服；并取千叶蓍适量，水煎熏洗患处。**2.治风湿痹痛** 千叶蓍、骆驼蓬各等份，水煎熏洗患处。**3.治痔疮出血、痛经** 千叶蓍9g，紫参6g，水煎服。

【主要化学成分】含愈创木内酯类，蒿属种萜，墨西哥蒿素，千叶蓍内酯和胆甾醇等。

【现代研究】药理研究显示有抗炎，止血和降血压等作用。现代临床用于治疗跌打损伤，风湿病筋骨疼痛，痈肿疮毒，痔疮出血和痛经等。



土一枝蒿（飞天蜈蚣）

【来源及药用部位】菊科植物云南蓍 *Achillea wilsoniana* Heimerl ex Hand.-Mazz.的全草。

【本草论述】《文山中草药》：“祛风除湿，消肿止血。”

【形态特征】多年生草本，高30~100cm。茎有纵皱纹。叶互生，线形，2~3回羽状深裂，裂片线形，基部半抱茎。头状花序排列成伞房状，簇生于枝端；边缘舌状花雌性，白色或淡粉红色，中央管状花两性，浅黄色。瘦果。花期6~7月。

生于高山草丛及山坡阴凉处，有栽培。分布于西南各地。

【性味功效】辛、苦，平；有小毒。活血止痛，消肿解毒。

【常用配方】1.治跌打伤痛 土一枝蒿、铁筷子、见血飞、大血藤各20g，泡酒服。

2.治胃寒痛 土一枝蒿0.6~0.9g，嚼服。3.治肢体末端疼痛 土一枝蒿、白花刺根各10g，酒水各半煎服，取药液外搽痛处。4.治狗咬伤 土一枝蒿、野烟叶鲜品各适量，捣烂外敷。5.治蛇咬伤 土一枝蒿、独脚莲、八角莲各10g，水煎服；药渣捣烂外敷。

【主要化学成分】含挥发油，鞣质和有机酸等。

【现代研究】现代临床用于治疗急性乳腺炎，急性扁桃体炎，跌打损伤，风湿病筋骨疼痛，脉管炎，牙痛，狗咬伤和痛经等。



水葫芦根

【来源及药用部位】菊科植物和高菜 *Adenocaulon himalaicum* Edgew. 的全草。

【本草论述】《贵州民间药物》：“调气，逐瘀。”


【形态特征】多年生草本，高30~100cm。根茎匍匐。茎直立，多分枝，粗壮。叶互生，有宽窄不等的翅；下部茎生叶肾形或圆肾形，先端急尖或钝，基部心形，边缘有不等的波壮大牙齿，齿端有突尖；中部叶三角状卵形，向上叶渐小。头状花序排列成圆锥状；花梗短，生白色柔毛；总苞半球形，总苞片5~7个，宽卵形；雌性白色，两性花淡白色。瘦果棍棒状，生多数带柄腺毛。花期7~8月。

生于林下、林缘、路旁及河谷阴湿处。分布于全国各地。

【性味功效】辛、苦，温。宣肺平喘，利水消肿，散瘀止痛。

【常用配方】**1.治气喘水肿** 水葫芦根500g，煮绿壳鸭蛋20个，半熟时敲碎蛋壳，再煮熟，每天早晚各吃鸭蛋2个。**2.治产后腹痛** 水葫芦根15g，水煎服。**3.治骨折伤处疼痛** 水葫芦根鲜品适量，捣烂外敷。

【现代研究】现代临床用于治疗咳嗽气喘，水肿小便不利，跌打损伤和产后腹痛等。



风气草

【来源及药用部位】菊科植物下田菊*Adenostemma lawenia* (L.) O. Kuntze的全草。

【本草论述】《贵州民间药物》：“除风湿，解表。”

【形态特征】多年生草本，高30~100cm。茎直立，多单生，上部叉状分枝，具白色短柔毛，下部光滑无毛。叶对生，有狭翼；基生叶小，花期凋落，中部叶卵圆形或卵状椭圆形，先端锐尖或圆钝，基部圆楔形或楔形，边缘有圆锯齿，两面疏被柔毛。头状花序小，总苞半球形，总苞片2层，近等长，狭长椭圆形；管状花5齿裂；花柱分枝伸出。瘦果倒椭圆形，有腺点或细瘤。花、果期9~10月。

生于水边、路旁沼泽地及林下阴湿处。分布于全国大部分地区。

【性味功效】辛、微苦，凉。清热解毒，祛风除湿。

【常用配方】**1.治感冒发热** 风气草、姨妈菜、生姜各9g，水煎服。**2.治湿热黄疸、胁痛** 风气草鲜品90~120g，或干品30~60g，水煎服。**3.治风湿筋骨疼痛** 风气草120g，泡酒500ml，早晚饮服30ml。

【主要化学成分】全草含多种贝壳杉烷型二萜类等。

【现代研究】现代临床用于治疗感冒发热，肺热咳嗽，咽喉肿痛，风湿病发热、筋骨疼痛和痈肿疮疖等。



胜红蓟

【来源及药用部位】菊科植物藿香蓟 *Ageratum conyzoides* L.的全草。

【本草论述】《泉州本草》：“清热解毒，利咽喉，为喉科专药。治一切咽喉症状，痈疽肿毒。”

【形态特征】一年生草本，高50~100cm。茎直立，多分枝，淡红色或稍带紫色，具白色尘状短柔毛。叶对生，上部互生；叶片卵形，先端急尖，基部钝或宽楔形，边缘有钝齿；叶柄生白色短柔毛和黄色腺点。头状花序小，聚集为稠密、顶生的伞房花序；花冠淡紫色，全部管状，先端5裂。瘦果黑褐色，具芒状鳞片形冠毛。花、果期全年。

生于山坡、荒地。分布于福建、广东、广西、云南和贵州等地。

【性味功效】辛、微苦，凉。清热解毒，利咽消肿，止血，止痛。

【常用配方】**1. 治咽喉肿痛** 胜红蓟鲜叶30~60g，洗净绞汁，加适量冰糖调服。**2. 治痈疽肿毒** 胜红蓟全草洗净，和饭粒、盐适量，共捣烂外敷患处。**3. 治筋伤骨扭疼痛** 胜红蓟干品适量，置炉火中烧烟熏之。**4. 治外伤出血** 胜红蓟适量，捣烂外敷患处。

【主要化学成分】含黄酮苷，氨基酸，有机酸，甾醇，氯化钾和挥发油等。

【现代研究】药理研究显示有抗菌活性。现代临床用于治疗疟疾，感冒，风湿病关节疼痛，跌打损伤，皮肤痈疖和急性咽喉炎肿痛等。



金边兔耳

【来源及药用部位】菊科植物杏香兔耳风 *Ainsliaea frograns* Champ.的全草。

【本草论述】《本草纲目拾遗》：“治虚劳吐血。”

【形态特征】多年生草本，根茎较短，茎直立，高30~50cm，具棕色长毛，不分枝。叶片5~6枚，着生茎下部，近乎轮生；卵状长椭圆形，基部心形，上面绿色无毛，下面具棕色长柔毛，有时下面呈紫红色。头状花序，花白色。瘦果。花期9~10月。

生于山坡背阴处。分布于长江流域以南地区。

【性味功效】甘，寒。润肺止咳，除湿利尿。

【常用配方】**1.治咳嗽吐血** 金边兔耳15g，水煎服。**2.治水肿** 金边兔耳、水白菜各10g，水煎服。**3.治跌打劳伤** 金边兔耳、地胡椒各15g，水煎服。**4.治九子疮** 金边兔耳适量，捣烂外敷。

【主要化学成分】

全草含无羁萜，表无羁萜醇，精烯醇，正三十二酸，正二十六醇和 β -谷甾醇等；地上部分含倍半萜内酯等。

【现代研究】药理研究显示有明显抑制金黄色葡萄球菌的作用。现代临床用于治疗感冒头痛，咳嗽咯血，黄疸型肝炎，淋巴结核，外伤出血和小儿消化不良等。

