

中國傳世醫學醫藥史料匯編

(第二輯)



中國傳世醫學醫藥史料匯編

(第二輯)

一





9 789881 330956

二〇一六年三月

中國傳世醫學醫藥史料匯編（第二輯）

選題組織策劃：蝠池書院出版有限公司

發行者：蝠池書院出版有限公司

出版者：蝠池書院出版有限公司

香港九龍旺角花園街二十六號好景商業中心二十三樓二三〇九室

電話：〇〇八五二一六五九二三七〇

傳真：〇〇八五二一三三八七九〇〇

定價：人民幣 七二六八〇元（全八十冊）

凡例

一、全書所收集的中國醫學醫藥史料，上自先秦下迄清代。

二、全書共七輯，每輯八十冊，均爲影印。本書爲第一輯，爲綜合類。

三、全書共分十九類，各類均按其作者所在年代先後順序編輯，同一朝代，則按作者時代先後排列。如綜合類，最早的爲漢代人華佗，排在第一位，最後爲清人論著，而清人有十幾位，則再按其年代先後編排。

四、在總共的十九類中，其中十二、十四類爲中藥學著述，十八類爲獸醫、十七類爲養生保健和醫學醫藥學者傳記類，其餘各類均爲中醫學論著。

五、一種書有幾個版本的，按優用劣汰原則處理，選用較好的版本。

本書按各書作者之時代先後編輯。

唐代王冰月詔得舊藏之本，補足此書。總之，本輯所收之醫書，內容豐富，所述為中醫學界必讀之重要者頗多。

明，皆為此書。以正脈訣之失。其法分浮沉遲數滑等二十七種，精核無遺。《黃帝素問》原為八卷，後第七卷缺失，

傳，每傳後附有作者論斷。其攻理有下占所未發者。在診法類中的《瀕湖脈學》，是李時珍，撮舉其父言間四診發

張擴以下，迄于張養正，凡十人，其中張機（張仲景）、王叔和、王履、戴元禮、景應岳六人，為李瀛所補

作，該書來錄古名醫，自《左傳》醫和以下，迄元李杲，見于史傳者達五十人。又采諸家文集所載，自宋

次為刪補名醫方論，次為四脈要訣，其吾簡括而精密，有圖，有說，有歌訣。本輯所收《醫史》為明人李瀛的杰

中《御定醫宗金鑑》九十七卷，為乾隆十四年奉敕撰，該書首對《傷寒論》、《難經》作了訂正，對之進行糾偽補

本輯共八十八冊，收有綜合類醫書十部、脈六部、內經類醫書十四部。綜合類為明清重要醫學論著，其

出版說明

祕傳證治要訣卷之一

明 大醫院使戴元禮述

諸中門

中風附破傷風漏風

天地間惟風無所不入。一罅不塞。來不可禦。人之一身。縝密者少。疎漏者多。風乘之也。輕則爲感。重則爲傷。又重則爲中。古人謂避風如避寇。蓋欲窒源以防患。中風之證。卒然暈倒。昏不知人。或痰涎壅盛。咽喉作聲。或口眼喎斜。手足癱緩。或半身不遂。或舌強不語。風邪既盛。氣必上逆。痰隨氣上。停留壅塞。昏亂暈倒。皆痰爲之也。五臟雖皆有風。而犯肝經爲多。蓋肝主筋屬木。風易入之。各從其類。肝受風則筋緩不榮。或緩或急。所以有喎斜癱緩不遂。舌強語澀等証。治之之法。調氣爲先。經云。善治風者以氣理風。氣順則痰消。徐理其風。庶可收效。先用麻油調蘇合香圓。或用姜汁。或用白湯調。如口噤。挾開灌之。稍甦。則進八味順氣散。

諸中。或未甦。或已甦。或初病。或久病。忽吐出紫紅色者。死。昏沉不省人事。口噤不可進藥。急以生半夏爲末。吹入鼻中。或用細辛。阜角爲末。吹入喉。噴嚏則甦。此可以驗其受病深淺。則知其可治不可治。若稍得

神傳治要訣 卷之一

一一

麝省者。八味順氣散。使服治風藥。然未遽絕治氣藥。小續命湯煎熟去滓。調蘇合香圓一粒。或五積散加麝香少許。或星香散。或醒風湯加木香一錢。如服前藥不效。其人頑涎愈盛。或前證不解。或增困重。宜星附湯。或三生飲加全蝎三箇。間磨沉香湯下。養正丹。肥人多有中病。以其氣盛於外而歉於內也。肺爲氣出入之道。人肥者氣必急。氣急必肺邪盛。肺金剋木。膽爲肝之腑。故痰涎壅盛。所以治之必先理氣爲急。中後氣未盡順。痰未盡除。調理之劑。惟當以藿香正氣散。星香散煎服。此藥非特可治中風之證。治中氣中惡霍亂尤宜。尋常上嘔下痢多痰者。亦可用之。

若中後體虛有痰。不可峻補。熱燥者宜四君子湯和星香飲。或六君子湯和之。中而口眼喎斜者。先燒阜角烟薰之。以逐去外邪。次燒乳香薰之。以順其血脉。若前證多怒。宜小續命湯加羚羊角。熱而渴者。小續命湯去附子加秦艽半錢。恍惚錯語者。加茯神遠志各半錢。不得睡者。加炒酸棗仁半錢。不能言者。加竹瀝一蜺殼許。人虛無力者。去麻黃加茯苓如其數。

若人自甦者。能言能食。惟身體不遂。急則犖蹠。緩則耽曳。經年累月。難以起止。加減地仙丹常服。若中飲食。坐臥如常。但失音不語。俗呼爲啞風。小續命湯去附子加石菖蒲一錢。

筋骨疼者。俗呼爲痛風。或痛而遊走無定。俗呼爲走注風。並宜烏藥順氣散。和煎復元通氣散。嚙地仙丹。或青龍圓。未效。用大防風湯。或五積散調乳香末。脛細而膝腫者。俗呼爲鶴膝風。宜地仙丹。

二

感冒後、四逆、手足不遂、牙關緊急、與霍亂後、四逆、手足搐捻、欲成風者、草果飲和星香散、各半貼煎服、有無故口眼喎斜、投以中風藥劑不效、蓋緣骨虛中受風所致、當於此求之、不可例作尋常中風治之、川烏一味、決不可少、宜炮熟用、

遍身骨節疼痛、晝靜夜劇、如虎之噬、名曰白虎歷節風、並宜加減地仙丹、或青龍圓乳香圓等、有於窗牖間梳洗、卒然如中、呼爲驚風、五積散加防風一錢、有痛風而痛有常處、其痛處赤腫灼熱、或渾身壯熱、此欲成風毒、宜敗毒散、

兩頰赤腫、其狀如癰、名頭面風、酒調消風散、食後服、仍以生杏仁去殼頻搗之、諸般頭風、見在諸痛門、頭痛證、病有終身不愈者、其在腰或屈而不能伸、或伸不能屈者、在手足亦然、以風傷肝、肝主筋、筋爲之也、治法活血爲先、多服四物湯吞活絡丹、

治風之法、初得之、卽當順氣、及其久也、卽當活血、此萬古不易之理、久患風疾、四物湯吞活絡丹愈者、正是此義、若先不順氣、遽用烏附、又不活血、徒用防風天麻羌活輩、吾未見能治也、

風有偏枯、風痹、風懿、風癱、此皆言其至重也、外有證狀不同、其名亦衆、非旦暮可愈、非口耳可受、不復繁引、若中人髮直、吐清沫、搖頭、上攛、面赤如粧、汗綴如珠、或頭而赤黑、眼閉口開、手撒遺尿、聲如鼾睡、皆不可治、所謂風中脉則口眼喎斜、中腑則支體廢、中臟則性命危、不特中風、他中亦然、其有害大風者、古謂之癩風、俗呼爲麻風、病之至惡、無出於此、得此病而眉髮髭髯先落、猶風撼木而葉

祕傳證治要訣 卷之一

四

先落也。間有食蛇服大風油而愈者亦幸耳。

破傷風者。因皮肉曾有破傷處。風從瘡口入。其證項強牙關緊。狀如發瘧。不似中風。又似產後角弓反張。用蘇合香圓進防風散。玉真圓。

漏風不論冬夏。額上常有汗出。得之醉後當風所致。頭乃諸陽之會。酒能發陽。所以飲必見面。醉後陽氣上升。頭面之毛竅必開。當風坐臥。風邪入之。以致頭面汗名曰漏風。黃耆六一湯加防風麻黃根桂枝各半錢。風已除。只口開喎斜未正者。以草麻去殼爛搗。右喎塗在左。左喎塗在右。或以膳魚血入麝香少許塗之也。

有虛熱生風。元氣虛。虛則風乘之。治虛當兼風治。有虛證似風。此權當治其虛。不可以風論。中風而疼痛甚者。或在遍身。或在手足。惟鐵彈圓佳。如碧霞丹。青州白圓子。防風圓。犀角圓。八風散。骨碎補圓。烏荊圓。大三五七散。四生散。省風湯。五痹湯。四生圓。輕腳圓。伏虎丹。祕方換腿圓。左經圓。木瓜圓。胡麻散。皆治諸中風。斟酌病源。當用治效方藥。

中氣

中氣。因七情內傷。氣逆爲病。痰潮昏塞。牙關緊急。但七情皆能使人中。因怒而中尤多。中氣之狀。大略與中風同。風與氣亦自難辨。以氣藥治風則可以。風藥治氣則不可。纔覺中氣急。以蘇合香圓灌之。候醒。繼以八味順氣散。或調氣散。中氣與中風相似。所以別者。風中身溫。氣中身冷。既甦之後。尚有餘痰。未盡平。

復宜多進四七湯及星香散若其人本虛痰氣上逆關膈不通上下不升降或大便虛閉宜用三和丹諸氣皆可用不獨中氣

中寒

中寒之證人身體強直口噤不語或四肢戰掉或洒洒惡寒或翕翕發熱或卒然眩暈身無汗者此爲寒毒所中宜先用酒調蘇合香圓輕則進五積散加香附一錢麝香少許重則用薑附湯若人漸甦身體回暖稍能言語須臾問其別有何證挾氣攻刺薑附湯加木香半錢挾氣不仁加防風一錢挾濕而腫痛者加白朮一錢筋脉牽急者加木瓜一錢肢節疼痛者加桂二錢

中暑

中暑爲證面垢悶倒昏不知人冷汗自出手足微冷或吐或瀉或喘或滿切不可冷水及用十分冷劑卻暑散水調灌下亦得或以來復丹末同蘇合香圓用湯調灌或以來復丹研末湯調灌之候其人稍甦則用香薷飲香薷湯煎熟去滓入麝香少許服或剝蒜肉入鼻中或研蒜水解灌之蓋中傷暑毒陽外陰內諸暑藥多有煖劑如大順散之用薑桂枇杷葉散之用丁香香薷飲之用香薷香薷味辛性暖蒜亦辛暖又蒜氣臭烈能通諸竅大概極臭極香之物皆能通竅故也

初覺中暑卽以日晒瓦或布蘸熱湯更易熨其心腹臍下急以二氣丹末湯調灌下曾有客人中暑迷悶四肢厥逆冷汗如雨鰥形欲投水中口吻涎沫流溢此中暑已深陰陽離絕難除

秘傳證治要訣 卷之一

六

又有暑途一證。似中而輕。欲睡懶語。實人香薷飲加黃連一錢。虛人星香飲加香薷一錢。甦後冷汗不止。手足尙逆。煩悶多渴者。宜香薷飲。甦後爲醫者。過投冷劑。致吐利不止。外熱內寒。煩躁多渴。甚欲裸形。狀如傷寒。陰盛隔陽。當用溫藥。香薷飲加附子浸冷服。渴者縮脾飲加附子亦浸冷服。

中濕

風寒暑濕。皆能中人。惟濕氣積久。留滯關節。故能中。非如風寒暑之有暴中也。中濕之證。關節痛重。浮腫喘滿。腹脹煩悶。昏不知人。宜白朮酒。有破傷處。因澡浴濕氣從瘡口中入。其人昏迷沉重。狀類中濕。名曰破傷。宜白朮酒。

中惡

中惡之證。因冒犯不正之氣。忽然手足逆冷。肌膚栗起。頭面青黑。精神不守。或錯言妄語。牙緊口噤。或頭旋暈倒。昏不知人。卽此是卒厥。客忤。飛尸。鬼擊。吊死。問喪。入廟。登塚。多有此病。蘇合香圓灌之。候稍甦。以調氣散和平胃散服。名調脉平胃散。

霍亂之病。揮霍變亂。起於倉卒。與中惡相似。俗呼爲觸惡。但有吐利爲異耳。其證胸痞腹疴。氣不升降。甚則手足厥逆。冷汗自出。或吐而不瀉。或瀉而不吐。或兼作吐瀉。或吐瀉不透。且蘇合香圓以通其痞塞。繼進藿香正氣散。加木香半錢。仍以蘇合香圓調吞。來復丹。若果瀉已甚。則不可用來復丹。瀉而不吐。胸膈痞滿。先以陰陽湯。或濃鹽湯。頓服以導其吐。已吐未吐。並藿香正氣散。問進蘇合香圓。吐而不瀉。心腹疴

痛頻欲登圜。苦於不通。藿香正氣散加枳殼一錢。多下來復丹。欲捷則用生枳殼。若不能見效。逼迫已甚。其勢不容不用神保圓。但神保雖能通利。亦入大腸而復有功。若膈於上而不能下。轉服轉祕。須用來復丹研末。湯調吞下。養正丹百粒。庶可引前藥到下。吐瀉兼作。心腹纏擾未安者。藿香正氣散加官桂木香各半錢。不愈則投四順湯。

吐利不止。元氣耗散。病勢危篤。或水粒不入。或口渴喜冷。或惡寒戰掉。手足冷逆。或發熱煩躁。欲去衣被。此蓋內虛陰盛。卻不可以其喜冷欲去衣被爲熱。宜理中湯。甚則附子理中湯。不效。則四逆湯並宜放十分冷服。

欲吐不吐。欲瀉不瀉。心腹纏擾。痛不可忍。上下不通。言語不定。如見鬼神。俗謂之乾霍亂。先以濃鹽湯頓服。次調蘇合香圓。吞下來復丹。仍進藿香正氣散加木香枳殼各半錢。近世俗醫謂之捲腸沙。多信之。殊不知卽是霍亂。僥倖而愈者。一通之功耳。

霍亂轉筋。理中湯加凍膠剉炒一錢。仍令其繫縛腿脛。若筋入腹。及通身轉筋者。不可治。筋轉者以造麴麥汁暖熱浸。或用濃鹽湯浸。

霍亂已透。而餘吐餘瀉未止。腹有餘痛。宜一味報秋荳葉煎服。乾者尤佳。

霍亂之後。陽氣已脫。或遺尿而不知。或氣少而不語。或膏汗如珠。或大躁欲入水。或四肢不收。皆不可治。霍亂并諸吐瀉後。胸膈高起。痞塞欲絕。理中湯加枳實半錢。茯苓半錢。名枳實理中湯。吐瀉已愈。而力怯。

精神未復者十補飲。

夏天感暑吐瀉如霍亂者六和湯香薷湯皆是要藥大吐瀉復厥逆躁擾審之因暑得之止宜香薷飲人於夏月多食瓜果及飲冷乘風以致食留不化因食成痞膈絕上下遂成霍亂六和湯倍藿香煎熟調蘇合香圓。

厥

厥者逆也手足逆冷也其證不一散之方書者甚多今始撮其大概寒熱厥逆見諸傷門風寒證

尸厥卽飛尸卒厥本門中惡證

虺厥見嘔吐門吐虺證

痰厥飲厥見嘔吐門各證

氣厥卽中氣見本門中氣證

祕傳證治要訣卷之二

諸傷門

傷風寒

附感冒 凡看病不令染用雄黃末塗鼻孔及須知避忌行從客位邊入男子病穢氣出於口女子病穢氣出於陰坐立對語間宜識得向背

傷風、傷寒、俗呼爲傷寒。傳經分三陽三陰。三陽是太陽、陽明、少陽經也。三陰太陰、少陰、厥陰經也。經之陰陽以臟腑言。腑爲陽。膀胱、胃、膽是也。臟爲陰。脾、腎、肝是也。病之陰陽乃是外邪之陰陽。陰氣陽氣是也。陰陽二氣皆能犯臟腑。故陽氣犯太陽則爲傷風。惡風而有汗。陰氣犯太陽則爲傷寒。惡寒而無汗。在太陽未得解轉入陽明。少陽二經則純乎陽。不如太陽易其治。若陽氣未能罷以次傳入陰經則爲陰中之陽。蓋緣陽經之陽氣來入陰經雖有自利、欲寢、脣青、手足厥冷、舌卷、囊縮等證不可妄投熱藥宜瀉其陽之在陰經也。

若陽病下之太過陽氣已脫遂變爲陰所謂害熱未已寒病復起或初得病便是陰證此是陰中之陰蓋緣陰氣攻陰經陰自得傳非自傳諸陽經來只當以溫藥回其陽故陽入陰者變陽以救陰陰入陽者用陽以救陽二者不可不辨。

傷風傷寒初得病時俱見發熱頭疼體痛屬太陽經但傷風惡風有汗傷寒惡寒無汗並宜和解散芎芷

香蘇散。或養胃湯加草芎各半錢。熱服溫覆。若的是傷風。有前自汗惡風等證。可用桂枝湯。令其熱服溫覆。喘加杏仁一錢。咳加五味子一錢。渴加參半錢。外熱未止者。敗毒散。熱而有汗者。敗毒散加桂枝半錢。或陽旦湯。嘔者不宜用桂枝湯。合於本方加半夏一錢。添姜煎。此非合病之嘔。係傷寒雜病。卽非正傷寒。故可用也。風寒二證。理當發汗。而其人虛不可汗者。宜桂枝湯加黃耆半錢。若的是傷寒。有前惡寒無汗等證。可用五積散。熱服。厚被覆之。取汗。喘嗽者。杏子湯加麻黃半錢。欲汗而不得汗者。再進。已汗而身熱不退者。參蘇飲。或敗毒散加桂枝半錢。嘔者。養胃湯。此非治合病之嘔。若風寒俱傷。或惡風而無汗。或惡寒而無汗。疑似之間。只宜五積散半貼。和敗毒散半貼。名交加散。喘嗽者。小青龍湯。有初得病太陽證。具但寒而未卽爲熱。至一二日後方熱。此傷於寒。若傷風卽有熱矣。但寒未有熱者。五積散發汗。有已服解表藥。不惡風。不惡寒。諸表證已罷。於裏又未躁未渴。小便亦未赤。大便如常。獨身熱未除者。宜香蘇飲。敗毒散。小柴胡湯加桂枝半錢。有已服解表藥。證已罷。又無裏證。其人體痛不減者。恐是發汗多。榮衛不和所致。宜小建中湯。用半厚半薄之桂。

若風寒二證。傳經後。身熱煩渴。小便赤。大便不通。言語不得。睡不寧。鼻乾頭目疼。日晡增劇。不惡寒。反惡熱。舌上白胎。中有斷文。或黑胎。方爲極熱。甚則昏不知人。此屬陽明經。宜大柴胡湯。小承氣湯下之。若具諸證。而大便自調者。宜白虎湯少加小柴胡湯。若胸脇俱痛。頭疼耳聾。口苦。或渴或嘔。大小便或利或不利。往來寒熱如瘧。此屬少陽證。宜小柴胡湯。嗽

加北五味子半錢。渴甚加括蔞根半錢。不渴而外有熱者。加桂枝半錢。自汗而尙惡風者。以小柴胡湯半貼。加桂枝湯半貼。

如婦人病中。經水適來。或經水失斷。此爲熱入血室。其血必結。故使寒熱往來如瘧。晝則明了。夜則譫語。宜小柴胡湯。或加生地黃半錢。

若胸膈不快。手足自溫。或自利而渴。或腹滿時痛。此屬太陰經。或自利不渴。宜理中湯。重則加附子四逆湯。此陰中之陰也。腹滿而痛。當得通壅。宜桂枝湯加芍藥。卽是小建中湯。但易厚桂爲桂枝耳。不愈。小柴胡湯。去黃芩加芍藥一錢。或枳芍各半錢。腹痛甚。大便秘不利者。桂枝湯加大黃一錢。臨熟入。或大柴胡湯。以諸實各痛當下。此陰中之陽也。

若兀兀欲吐。心煩喜寐。或自利口燥而渴。或口中和而背惡寒。此屬少陰經。但少陰用藥有陰陽之分。自利而渴者。宜猪苓湯。蓋陽熱傳入腎。少陰經腎係舌本。故自利口燥而渴。以猪苓湯利腎中之熱。不愈。則當自大便去之。古法合用大承氣湯。若難用大承氣湯。則用小承氣湯。或且進白頭翁湯。上項諸藥。爲陰中極陽者也。

泄利下重。其人四逆。先以水盞半。葱白二根。煎一盞去葱。煎四逆散至七分。咳加北五味子乾薑各半錢。悸加桂枝一錢。小便不利加茯苓一錢。腹痛加熟附半錢。

若審是下利清穀。手足四逆。其人而帶赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。四逆湯。倍乾薑。而赤者加葱一根。腹痛

加芍藥一錢半。嘔加生薑。咽病加桔梗一錢。

若口中和而背惡寒。宜正方四逆湯。不必加減。四逆散、四逆湯俱治少陰下利。四肢逆冷。泄利下重者。與

下利清穀者。一涼一溫。又自有陰有陽之別。四逆散是治四逆陽症。四逆湯是治四逆陰症。

若初得病。便見少陰證。其人發熱惡寒。身疼頭不痛者。宜麻黃細辛附子湯微汗之。或五積散加熟附半

錢。或五積散加以順元散。若煩悶厥逆。或舌捲囊縮。或下利清穀。裏寒外熱。此屬厥陰經。下利清穀者。陰

中之陰。宜進通脈四逆湯。或當歸四逆湯。加生薑萊菔。舌捲囊縮。不特陰中之陰有之。陽明之熱。陷入厥

陰。亦有之。蓋陽明主宗筋。宗筋爲熱毒風所致。故弗榮而急。引舌與卵風。以舌捲囊縮。當瀉陽以救陰。宜

大承氣湯。陽傳太陰而利。故用小建中湯。及小柴胡湯去黃芩加芍藥。此一藥治太陰洩利。腸鳴而痛。已

利而痛爲虛。虛則腸鳴。蓋爲傳陰之陽氣漸微。不敢過用冷劑。但以芍藥通壅耳。

南陽謂傷寒手足必微冷。若手足自溫者。係太陰也。說欠分曉。若陽明手足安得微冷。少陽厥陰而大冷。

安得言微冷。但當言三陰經。少陰厥陰。手足厥冷。惟有太陰。手足自溫耳。

凡渴問其所飲。欲冷欲熱。欲多欲少。若飲多而欲冷者。陽渴也。更須審其有何證在經也。其太陽證。小便

不利而渴者。五苓散。其陽明證。大便不利而渴者。宜於前本經求之。已利猶渴。宜白虎湯。其少陽證。寒熱

往來而渴者。小柴胡湯去半夏。加括蘆根如其數。陰亦有自利而渴。各已見本經。但陰有渴。古人多有冷

劑。以其皆挾陽氣耳。經雖陰而病則陽也。然亦有下利清穀。不係熱利。純是陰證。而反見渴者。此是陰在