

「黔版中草药彩色图谱」系列

# 特色

TESE ZHONGCAOYAO JI PEIFANG 1

# 中草药

及配方

1

杨卫平

夏同珩 / 主编

贵州出版集团  
贵州科技出版社

22  
1621  
本书获2016年贵州省出版传媒事业发展专项资金资助

# 特色中草药及配方

## 1

主 编 杨卫平 夏同珩  
副 主 编 李朝斗 陈谦海

编辑委员（按姓氏笔画顺序排列）

尹武燕	云雪林	刘 冬	刘 明
李 琼	李文科	李朝斗	沈 明
冷 丽	吴筱枫	陈 芳	陈谦海
何前松	张庆乾	张华海	杨卫平
杨成华	杨传东	周 静	周惟粲
苟光前	姜东辉	夏同珩	梅 颖
黄 敏	董发发	潘晓瑛	

贵州出版集团  
贵州科技出版社

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

特色中草药及配方. 1 / 杨卫平, 夏同珩主编. --

贵阳: 贵州科技出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5532-0487-1

I. ①特… II. ①杨… ②夏… III. ①中草药—图集

②中草药—验方 IV. ①R282.7-64②R289.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第157293号

---

出版发行	贵州出版集团 贵州科技出版社
地 址	贵阳市中天会展城会展东路A座 ( 邮政编码: 550081 )
网 址	<a href="http://www.gzstph.com">http://www.gzstph.com</a> <a href="http://www.gzkj.com.cn">http://www.gzkj.com.cn</a>
经 销	全国各地新华书店
印 刷	贵阳德堡印务有限公司
版 次	2016年8月第1版
印 次	2016年8月第1次
字 数	302千字
印 张	10.5
开 本	890 mm × 1240 mm 1/32
书 号	ISBN 978-7-5532-0487-1
定 价	43.00元

---

天猫旗舰店: <http://gzkjcs.tmall.com>

# 前 言

当前，环境问题已成为影响人类生存、经济发展和社会进步的一大问题，世界各国民众普遍关注，各国政府也高度重视，积极投入人力、物力，努力开展科学研究和对被破坏的生态及环境进行治理。与人类生老病死关系最为密切的医药卫生事业，也是环境问题的一个重要方面，一样颇受世人关注。生产各种用于防病、治病的化学药品，需要耗费大量的人力、物力、财力，也能对环境造成一定的影响。全世界工业化、现代化的高度发展，使人们生活在钢筋混凝土的高楼大厦缝隙之中，遭受汽车尾气、工业废气及各种噪声的刺激，再加上工作紧张，难免身心疲惫，渴求返璞归真，回到农耕田园生活之中；与此同时，也对防病治病提出了新的要求，希望能更多地使用天然药物，以避免或减少化学药物在防病、治病中的毒副作用对身体的伤害。这个要求，并不过分，同时也是最现实、能实现的要求。中医中药延续了几千年，在从事诊病治病的医疗实践中，历代医药人员努力工作，积累了丰富的诊病用药经验，使中国医药成了世界医药宝库的一个重要组成部分。中医中药防病治病的宝贵经验，可供世界各国借鉴和参考，这就为人们使用天然药物来防病治病打下了基础。为了充分发挥中草药这一天然药物毒副作用小、易取易得和在防病治病中的优势，本书作者在野外拍摄了近10万张有关中草药的照片，并从中挑选出近1800种常用中草药的照片，为其撰写相关文字，编著成了《特色中草药及配方》一书，分六册出版。

全书编排顺序是：植物药按植物分科科名的汉语拼音字母顺序排列，对每一科中的种类，基本上按拉丁学名的字母顺序排列；动物药、矿物药则排列在植物药之后。每个药按来源及药用部位（含拉丁名）、本草论

述、形态特征（含生境及分布）、性味功效、常用配方（一般3~5首）、主要化学成分、现代研究等条目列项叙述；每个药配有1~2张具有鉴别特征的在生长实地拍摄的彩色照片。本书具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

本书在编写过程中，参阅了国内较多的相关书籍及刊物，不能一一作谢，在此，特向相关参考书或文章的作者表示诚挚的谢意。

本书主编杨卫平和编辑委员云雪林、陈芳、刘明、周静、刘冬、梅颖、冷丽、何前松、吴筱枫系贵阳中医学院教师。

由于编著者的学识水平及见识有限，书中难免有疏漏和谬误之处，敬请广大读者批评指正，以备再版时订正，对此特表衷心感谢。

编 者

# 目 录

安息香·····	(1)	芦笋(石刁柏、小百部)·····	(30)
白客妈叶·····	(2)	文竹·····	(31)
野菜莉·····	(3)	蜘蛛抱蛋·····	(32)
八角枫(八角风、白金条)·····	(4)	大百合·····	(33)
小花八角枫(狭叶八角枫)·····	(5)	吊兰·····	(34)
芭蕉·····	(6)	玉竹·····	(35)
地涌金莲·····	(7)	万寿竹·····	(37)
紫金标(小蓝雪)·····	(8)	宝铎草·····	(38)
紫金莲(转子莲)·····	(9)	川贝母(川贝母)·····	(39)
白花丹·····	(10)	浙贝母·····	(40)
马槟榔·····	(11)	平贝母·····	(41)
雷丸·····	(12)	金针菜(黄花菜)·····	(42)
侧耳(平菇)·····	(13)	萱草根·····	(43)
百部·····	(14)	玉簪花·····	(44)
粉条儿菜(小肺筋草)·····	(15)	紫萼(紫玉簪)·····	(45)
细香葱(冻葱、香葱)·····	(16)	岩百合·····	(46)
洋葱(玉葱)·····	(17)	卷丹·····	(47)
大葱·····	(18)	细叶百合(山丹、岩百合)·····	(48)
小蒜(薤白)·····	(19)	山麦冬(土麦冬)·····	(49)
蒜头·····	(20)	麦冬·····	(50)
野葱(苦蒜、小蒜)·····	(21)	沿阶草(麦门冬、麦冬)·····	(51)
大蒜·····	(22)	蚤休(独脚莲、重楼)·····	(52)
韭菜·····	(23)	云南重楼(蚤休)·····	(54)
山韭菜·····	(24)	七叶一枝花(蚤休)·····	(55)
芦荟·····	(25)	黄精·····	(56)
知母·····	(27)	吉祥草(观音草)·····	(58)
天冬(天门冬)·····	(28)	万年青·····	(59)
羊齿天冬·····	(29)	鹿药·····	(60)



金刚藤·····	( 61 )	车前草·····	( 94 )
土茯苓·····	( 62 )	车前子·····	( 95 )
牛尾菜·····	( 63 )	平车前(车前草、车前子)·····	( 96 )
黑点草·····	( 64 )	香菇(香草)·····	( 97 )
藜芦·····	( 65 )	猴头菇(猴头)·····	( 98 )
延龄草(头顶一颗珠)·····	( 66 )	昆布(海带)·····	( 100 )
郁金香·····	( 67 )	西河柳(怪柳、三春柳)·····	( 101 )
桧柏(圆柏)·····	( 68 )	川续断(续断)·····	( 102 )
侧柏叶·····	( 69 )	藿香(土藿香)·····	( 104 )
柏子仁·····	( 70 )	筋骨草·····	( 105 )
甘松·····	( 71 )	白毛夏枯草(筋骨草)·····	( 106 )
墓头回·····	( 72 )	风轮菜(断血流)·····	( 107 )
败酱·····	( 73 )	剪刀草(细风轮菜)·····	( 108 )
白花败酱(败酱草)·····	( 74 )	断血流(山藿香)·····	( 109 )
蜘蛛香·····	( 75 )	沙虫药(鸡肝散、四方蒿)·····	( 110 )
缬草·····	( 76 )	野草香(木姜花)·····	( 111 )
点地梅(喉咙草、清明草)·····	( 77 )	咳嗽草(土香薷 野香薷)·····	( 112 )
虎尾草(狼尾巴草)·····	( 78 )	连钱草(活血丹)·····	( 113 )
香排草·····	( 79 )	佛座草(宝盖草)·····	( 114 )
金钱草(过路黄、大金钱草)·····	( 80 )	益母草(坤草)·····	( 115 )
珍珠菜·····	( 81 )	茺蔚子·····	( 116 )
过路黄(风寒草、金爪儿)·····	( 82 )	簪菜(白花茺蔚)·····	( 117 )
痲子草·····	( 83 )	泽兰(地笋叶)·····	( 118 )
小寸金黄(小茄)·····	( 84 )	地笋·····	( 119 )
灵香草·····	( 85 )	华西龙头草·····	( 120 )
大田基黄(红根草、星宿草)·····	( 86 )	薄荷·····	( 121 )
金爪儿(小救驾、枪伤药)·····	( 87 )	鱼香菜(圆叶薄荷)·····	( 122 )
花被单·····	( 88 )	留兰香·····	( 123 )
四块瓦(落地梅、重楼排草)·····	( 89 )	姜味草·····	( 124 )
追风伞(一把伞、狭叶落地梅)·····	( 90 )	香薷·····	( 125 )
报春花·····	( 91 )	石芥苧(野香薷)·····	( 126 )
狗脊(金毛狗脊、金毛狗)·····	( 92 )	罗勒·····	( 127 )
定心藤·····	( 93 )	牛至(土香薷、满坡香)·····	( 128 )

- 十二槐花(金槐)····· (129)
- 白苏子(荏子)····· (130)
- 紫苏(紫苏叶、苏叶)····· (131)
- 紫苏梗(苏梗)····· (132)
- 紫苏子(苏子)····· (133)
- 广藿香(藿香)····· (134)
- 夏枯草····· (135)
- 冬凌草····· (136)
- 溪黄草····· (137)
- 反背红(血盆草)····· (138)
- 石打穿(紫参、小丹参)····· (139)
- 丹参····· (140)
- 滇丹参(紫丹参)····· (142)
- 蜜蜂花(鼻血草、滇荆芥)····· (143)
- 荆芥····· (144)
- 黄芩····· (145)
- 半枝莲(溪边黄芩、牙刷草)····· (146)
- 韩信草(牙刷草)····· (147)
- 水苏····· (148)
- 野油麻····· (149)
- 草石蚕(甘露子)····· (150)
- 大风子····· (151)
- 柞木····· (152)
- 铁苋菜(海蚌含珠)····· (153)
- 山麻杆····· (154)
- 重阳木····· (155)
- 黑面神(黑面叶)····· (156)
- 土沉香····· (157)
- 巴豆····· (158)
- 火秧筋····· (159)
- 水黄花(括金板)····· (160)
- 乳浆大戟(猫眼草)····· (161)
- 泽漆····· (162)
- 大飞扬草····· (163)
- 地锦····· (164)
- 甘遂····· (165)
- 千金子(看园佬)····· (166)
- 银边翠(高山积雪)····· (167)
- 万年刺(铁海棠)····· (168)
- 大戟····· (169)
- 猩猩木(一品红)····· (170)
- 霸王鞭····· (171)
- 绿玉树····· (172)
- 草沉香(刮筋板)····· (173)
- 漆大姑····· (174)
- 算盘子····· (175)
- 算盘子根····· (176)
- 麻疯树(臭油桐、青桐木)····· (177)
- 大毛桐····· (178)
- 粗糠柴(红果果毛)····· (179)
- 石岩枫(杠香藤)····· (180)
- 木薯····· (181)
- 余甘子····· (182)
- 叶下珠····· (183)
- 蓖麻····· (184)
- 乌柏(木蜡树、椴子树)····· (185)
- 龙利叶····· (186)
- 一叶萩····· (187)
- 油桐····· (188)
- 油桐根····· (189)
- 野灯芯草····· (190)
- 灯芯草····· (191)
- 枸骨叶(枸骨冬青、功劳叶)····· (192)
- 枸骨根····· (193)
- 山枇杷(野枇杷)····· (194)
- 苦丁茶····· (195)



- 老鼠刺····· (196)
- 毛冬青····· (197)
- 冬青 (四季青、紫花冬青)····· (198)
- 铁冬青 (山冬青、救必应)····· (199)
- 三花冬青 (小冬青)····· (200)
- 鸡骨草····· (201)
- 儿茶····· (202)
- 蛇藤····· (203)
- 合萌····· (204)
- 合欢皮····· (205)
- 合欢花····· (206)
- 山合欢 (夜合欢)····· (207)
- 土圞儿 (土栾儿)····· (208)
- 花生 (落花生)····· (209)
- 沙苑子····· (210)
- 黄芪····· (211)
- 紫云英 (红花菜)····· (212)
- 夜合叶····· (213)
- 龙须藤 (九龙藤)····· (214)
- 双肾藤 (夜关门)····· (215)
- 大夜关门根····· (216)
- 苏木····· (217)
- 云实 (阎王刺)····· (218)
- 木豆····· (219)
- 锈钉子····· (220)
- 壮筋草····· (221)
- 爬山豆根 (大发表)····· (222)
- 刀豆····· (223)
- 阳雀花 (黄雀花)····· (224)
- 番泻叶····· (225)
- 水皂角 (山扁豆)····· (226)
- 决明子····· (227)
- 望江南····· (228)
- 紫荆皮 (紫荆花)····· (229)
- 响铃草····· (230)
- 化金丹····· (231)
- 黄檀····· (232)
- 降香 (降真香)····· (233)
- 凤凰木····· (234)
- 小槐花 (清酒缸、路边青)····· (235)
- 独摇草····· (236)
- 碎米柴····· (237)
- 饿蚂蝗····· (238)
- 粘人花····· (239)
- 千斤拔····· (240)
- 三点金草····· (241)
- 白扁豆 (扁豆)····· (242)
- 榼藤子····· (243)
- 象牙红 (龙牙花)····· (244)
- 海桐皮 (刺桐)····· (245)
- 猪牙皂 (小皂、眉皂)····· (246)
- 皂角····· (247)
- 天丁 (皂角刺)····· (248)
- 黑大豆····· (249)
- 鲁豆衣····· (250)
- 黄豆芽 (大豆黄卷)····· (251)
- 甘草····· (252)
- 野绿豆 (铁扫竹)····· (253)
- 血人参 (雪人参)····· (254)
- 鸡眼草····· (255)
- 胡枝子····· (256)
- 小夜关门····· (257)
- 马扫帚····· (258)
- 百脉根 (金花草)····· (259)
- 苜蓿····· (260)
- 辟汗草····· (261)

- 昆明鸡血藤(岩豆藤)····· (263)
- 亮叶崖豆藤····· (264)
- 苦檀····· (265)
- 含羞草····· (266)
- 大果油麻藤····· (267)
- 油麻血藤(油麻藤)····· (268)
- 红豆····· (269)
- 凉薯(地瓜、地萝卜)····· (270)
- 金雀花(蓝雀花)····· (271)
- 绿豆····· (272)
- 赤豆····· (273)
- 豌豆····· (274)
- 补骨脂····· (275)
- 倒钩藤(老虎刺)····· (276)
- 雪茶····· (277)
- 苦葛(苦葛根)····· (278)
- 甘葛(葛根)····· (279)
- 鹿藿····· (280)
- 洋槐花····· (281)
- 山豆根(小黄连、苦豆根)····· (282)
- 苦参····· (283)
- 槐花(中国槐)····· (284)
- 槐角(槐实)····· (285)
- 白刺花(白花刺)····· (286)
- 鸡血藤····· (287)
- 石莲藤(苦石莲子、南蛇勒)····· (288)
- 红三叶草(红车轴草)····· (289)
- 三消草(花生草、螃蟹花、和蓝翘摇)  
····· (290)
- 蚕豆····· (291)
- 野豌豆(大巢菜)····· (292)
- 歪头草(三玲子)····· (293)
- 豇豆····· (294)
- 紫藤····· (295)
- 人字草····· (296)
- 透骨香(滇白珠)····· (297)
- 小米柴····· (298)
- 小果珍珠花(緜木)····· (299)
- 马醉木····· (300)
- 小叶杜鹃(头花杜鹃)····· (301)
- 满山红····· (302)
- 马缨花(马缨杜鹃)····· (303)
- 紫杜鹃(紫花杜鹃)····· (304)
- 酒瓶花····· (305)
- 闹羊花(黄花杜鹃)····· (306)
- 白花杜鹃(白花映山红)····· (307)
- 映山红(杜鹃花)····· (308)
- 杜鹃根····· (309)
- 南烛子(乌饭果)····· (310)
- 越橘····· (311)
- 中文名笔画索引····· (312)
- 拉丁学名索引····· (318)

## 安息香

【来源及药用部位】安息香科植物安息香 *Styrax benzoin* Dryand或云南安息香 *Styrax tonkinensis* (Pierre) Craib ex Hartw.的树脂。

【本草论述】《新修本草》：“治心腹恶气。”

【形态特征】云南安息香：乔木，高5~20m。树皮灰褐色，有不规则纵裂纹；枝稍偏，被褐色长茸毛。叶互生，叶片椭圆形、椭圆状卵形，先端短渐尖，基部楔形或圆形，上面无毛或嫩叶脉上被星状毛，全缘，侧脉5~6对。顶生圆锥花序；苞片小；花萼杯状，5齿裂；花白色，5深裂，花萼及花冠被白色星状毛；雄蕊10，花丝扁平；子房上位，密被白色茸毛。果实近球形，外被星状柔毛。种子坚果状，栗褐色，被小瘤状突起和星状毛。

生于山坡、山谷疏林或林缘。分布于华南和西南等地。


【性味功效】辛、苦，平。开窍，祛痰，行气活血。

【常用配方】1.治热闭神昏、或中风痰厥 安息香、麝香、冰片、石菖蒲等适量，制成安息香丸内服。2.治气滞血瘀，心腹疼痛 安息香单用研末，2~3g，开水吞服；

或用木香、丁香各3~6g，水煎送服。3.治痹证腰痛 猪瘦肉120g，切片，裹安息香60g，置盛有灰的瓶中，隔火烧，将瓶口对准痛处熏。

【主要化学成分】含树脂约90%，其中有总苯甲酸和总桂皮酸等。

【现代研究】药理研究显示能刺激呼吸道黏膜分泌，具有祛痰作用。现代临床用于治疗慢性上呼吸道炎症，急性传染病或发热性疾病的高热引起的神昏、谵语、惊厥，脑血管意外和肝昏迷等。



## 白客妈叶

【来源及药用部位】安息香科植物垂珠花 *Styrax dasycanthus* Perk.的叶。

【本草论述】《贵州民间药物》：“润肺止咳。”

【形态特征】乔木，高3~20m。树皮暗灰色，嫩枝密被黄色星状毛，长大后脱落。叶互生；叶柄密被星状短毛；叶片倒卵形、倒卵状椭圆形，先端急尖或钝或渐尖，基部楔形或阔楔形，两面密被星状柔毛，边缘有细锯齿，侧脉5~7对。顶生或腋生圆锥花序；苞片小，钻形；花萼杯状，5齿裂；花白色，5裂，裂片外被白色星状柔毛；雄蕊10，花丝扁平；子房密被白色星状毛。果实卵形或球形，外被灰黄色星状柔毛。种子近

长圆形，褐色。花期5~6月，果熟期7~9月。

生于丘陵、山坡及溪边杂木林缘。分布于华东、华南和西南等地。

【性味功效】苦、甘，微寒。润肺，生津，止咳。

【常用配方】1. 治肺燥咳嗽 白客妈叶12~15g，研末，用开水吞；或水煎服。2. 治咽痛 白客妈叶10g，苦葛根15g，水煎液慢咽。

【现代研究】现代临床用于治疗慢性咽炎咳嗽和慢性支气管炎等。





## 野茉莉

【来源及药用部位】安息香科植物野茉莉 *Syrax japonicus* Sieb.et Zucc.的叶或果实。

【本草论述】《贵州草药》：“祛风除湿。”

【形态特征】灌木或小乔木，高4~8m。树皮灰褐色或黑褐色。叶互生；叶片椭圆形或长圆状椭圆形，先端急尖或渐尖，基部楔形或宽楔形，全缘或上半部具疏齿；侧脉5~7对。花单生叶腋或2~5朵成总状花序；花梗纤细，无毛；小苞片线形或线状披针形；花萼杯状；花白色，花冠5裂；雄蕊10。果实近球形至卵形，外面密被白色星状茸毛。种子褐色，表面具深皱纹。花期4~7月，果熟期7~11月。

生于海拔400~1800m的林下。分布于山



东、福建、云南、贵州、四川、广东、广西、台湾等地。

【性味功效】甘、淡，微寒。清热利湿，解毒活血。

【常用配方】1.治关节肿痛 野茉莉24g，木瓜15g，水煎服。2.治乳痛 野茉莉叶研末，酒调外敷。

【现代研究】现代临床用于治疗风湿性关节炎和乳腺炎肿痛等。



## 八角枫（八角风、白金条）



【来源及药用部位】八角枫植物八角枫 *Alangium chinense* (Lc Harms.)的根或叶。

【本草论述】《本草从新》“治麻痹风毒，打仆瘀血停积。”

【形态特征】落叶小乔木或木，高3~5m。小枝略呈“之”字形，幼枝紫绿色。叶互生，叶柄2.5~3.5cm；叶纸质，近圆形或椭圆形，先端渐尖或锐尖，基部阔楔形，两侧不对称，有角或3~7分裂，叶上面无毛，下面脉腋内有丝毛。聚伞花腋生，花7~30，小苞片线形；花萼先端分裂；花瓣6~8，初白色，后变为黄色；雄蕊6~8；子房2室。核果卵圆形，熟时黑色。花期5~7月，果熟期7~10月。

生于山野或林边。分布于长江流域以南各地。

生于山野或林边。分布于长江流域以南各地。

【性味功效】辛、苦，微温；有毒。祛风除湿，活血止痛。

【常用配方】**1.治风湿性关节炎** 八角枫10g，透骨香30g，泡酒内服又外搽。**2.治跌打损伤、四肢麻木** 八角枫10g，酒水各半煎服。**3.治咳嗽** 八角枫10g，山蚂蝗根30g，水煎服。**4.治疗疔肿痛** 八角枫叶适量，捣烂外敷。

【主要化学成分】须根及根皮含生物碱，酚类，氨基酸，有机酸和树脂等。须根还含糖苷，强心苷等。

【现代研究】药理研究显示有肌肉松弛作用，能抑制心脏使血压下降，调节呼吸。现代临床用于治疗风湿性关节炎麻木，跌打损伤，劳累后腰痛，喘咳和肺结核咳嗽等。



## 小花八角枫（狭叶八角枫）

【来源及药用部位】八角枫科植物小花八角枫 *Alangium faberi* Oliv.的根或叶。

【本草论述】《湖南药物志》：“祛风除湿，通经活络，行气止痛。”

【形态特征】落叶灌木。高1~4m。树皮平滑，灰褐色或深褐色；小枝纤细，近圆。叶互生，叶柄长1~1.5cm；叶片纸质，不裂或掌状3裂，不分裂者长圆形或披针先端渐尖或尾状渐尖，基部倾斜，上面绿色，下面淡绿色，幼时被粗伏毛，后几无主脉和侧脉在下面明显。聚伞花序腋生，花5~10朵，苞片三角形；花萼近钟形；5~6，线形；雄蕊5~6；子房1室。核果近卵圆形，熟时淡紫色。花期6月，果熟期

生于1600m以下的疏林边。分布于湖北、湖南、广东、海南、广西、四川和贵州等

【性味功效】辛、苦，微温。祛风除湿，活血止痛。

【常用配方】**1.治风湿性腰、腿、臂等关节痛** 小花八角枫根30g，丹参15g，水煎  
**2.治胃痛** 小花八角枫12~15g，水煎服。**3.治跌打损伤** 小花八角枫叶适量，捣烂患处。

【现代研究】现代临床用于治疗风湿病关节麻木，跌打损伤和胃痛等。



## 芭蕉

【来源及药用部位】芭蕉科植物芭蕉 *Musa basjoo* Sieb. et Zucc. 的根或花。

【本草论述】《本草从新》：“泻热解毒。治一切肿毒，发背欲死，赤游风疹，风热头痛……”

【形态特征】多年生草本。茎短，通常为叶鞘包围而形成高大的假茎，高约4m。叶长2~3m，基部圆形或不对称，先端钝，表面鲜绿色，有光泽，中脉明显粗大，侧脉平行；叶柄粗壮，长达30cm。穗状花序顶生，下垂，苞片佛焰苞状，红褐色或紫色。花单性，通常雄花生于花束上部，雌花在下部；花冠近唇形，先端5齿裂；雄蕊5，离生，生出花冠；雌花子房下位3室，花柱1。浆果三棱状长圆形。种子多数。

多栽培于庭院及农舍附近。分布于山东至长江流域以南地区。

【性味功效】甘、淡，寒。解毒，利水，化痰。

【常用配方】**1.治心悸** 芭蕉花、小贯众各15g，水煎服。**2.治消渴病** 芭蕉根、胖血藤、红禾麻根各20g，水煎服。**3.治水肿** 芭蕉根、毛蜡烛根、川木通各10g，水煎服。**4.治瘰疬** 芭蕉根捣烂外敷。

【主要化学成分】含水分，灰分，盐酸可溶物，粗蛋白质和粗纤维素等。

【现代研究】现代临床用于治疗头晕目眩，丹毒，疔疮，乳糜尿和带下等。





## 地涌金莲

【来源及药用部位】芭蕉科植物地涌金莲 *Musella lasiocarpa* (Franch.) C. Y. Wu ex H. W. Li 的根。

【本草论述】《滇南本草》：“治妇人白带，红崩日久，大肠下血。”

【形态特征】多年生草本。丛生，具假茎和匍匐茎，高约60cm，基部有宿存的叶鞘；叶长椭圆形，长达50cm，宽20cm，有白粉，具短柄。花序直立，密集，苞片黄色，由多枚苞片形成莲状花序，是观赏的重点；每苞片内有花2列，每列4~5朵花，在花序的下部为雌花，上部为雄花。

【性味功效】苦、涩、寒。清热解毒，止带止血。

【常用配方】**1.治崩漏带下** 地涌金莲15g，水煎服。**2.治肠风下血** 地涌金莲、鹿仙草各20g，水煎服。**3.治疮痈肿毒** 地涌金莲鲜品适量，捣烂外敷。

【现代研究】现代临床用于治疗丹毒，痈疮，便血，月经不调和带下等。

