

紧扣考试大纲
反映最新命题趋势

医师资格考试历年真题纵览与考点评析丛书

2016 临床执业助理医师

资格考试临考押题试卷及解析

主编 陈韵汀

军事医学出版社

医师资格考试历年真题纵览与考点评析丛书

2016 临床执业助理医师资格考试 临考押题试卷及解析

主 编 陈鹤汀

军事医学出版社
· 北 京 ·

各位考生,大家好!新的考试即将到来,新老考生团聚在此。为了迎接人生中的又一次挑战,大家不约而同地选择了这套全真模拟试卷,这是对我们的极大信任,在此深表谢意。

本套全真模拟试卷是军事医学出版社隆重推出的《医师资格考试历年真题纵览与考点评析丛书》的延续部分,其主要目的是让考生在研读历年真题后能够对自己新掌握的知识体系进行系统、科学地评估,并借此模拟考试来强化记忆、查漏补缺,最重要的是通过本试卷模拟真实考场,调节心态让自己在最终考试中不慌乱,发挥出真实水平。

本模拟试卷是由许多在临床一线工作,并在基础医学院代课、在临床医学院代教的优秀中青年教师认真编写而成。考题设计紧扣考试大纲,针对题库考点,内容准确、层次清晰、学科比例合理,试题难度系数符合真题要求。许多考生都有这样的经验,就是考前进行模拟考试具有重要的参考价值,可以熟悉命题思路,把握考试重点,提高应试技巧,强化考点记忆调整心理状态。因此,本套试题是考生难得的考前辅导工具。

鉴于本套模拟试卷的特点,建议考生根据自己的实际情况按相应方法使用:

①时间、精力充裕的考生应先通读本学科相关教材,将过去的旧知识进行温习,而后精读相关报考类别的《医师资格考试历年真题纵览与考点评析》,对照历年考题学习评析内容,并将每一道考题涉及的知识点在本科教材相关章节勾画出来,并加以详读、记忆。当距离考试1个月左右时,打开本套模拟卷,规定好时间,开始模拟真实考试。目的是使考生体会一下考试气氛,掌握考试节奏,平静心态,提高自己的应试能力。做完后给自己评分,了解自己所处的水平,随后对每一道错题进行查证,并单独记忆。间隔1周后可重复模拟再考一次,既是对心理承受力的锻炼,又是对漏点的强化。参照国内某高考著名中学经验,大量模拟题,以考促学,先做题,后看书,再模拟考场。如果能依此方法严格训练、复习,根据以往考生成绩的调研,通过率在90%以上。②由于生活、工作导致时间、精力不足的考生占大多数。建议可放弃泛读教科书,先精读军事医学出版社《医师资格考试历年真题纵览与考点评析》,用3个月时间对该书的知识点进行反复记忆,针对困惑查

书。然后使用本模拟试卷进行查漏、补缺,强化记忆。这部分考生如果能在《医师资格考试历年真题纵览与考点评析》上下一一定工夫,加上考前模拟训练,通过考试几率在 80% 左右。③部分考生平时工作认真,临床知识丰富,功底好,希望在考前单凭本套模拟试卷进行突击训练,根据以往经验,通过考试几率在 50% 左右。因为考试内容与工作中专科实用技术有一定距离,考点知识量大,覆盖面广泛,从基础到临床,从心理到社科,还涉及法律等许多内容,这不是一个优秀医师能单独应付的,而模拟押题最好成绩命中率也低于 40%,故不能单凭押题去赌考试过关。④还有部分考生依靠自学本科教材,加上做本套模拟试卷来应付本次考试,通过率也不会太高。这是因为近几年考题选择比较灵活,答案都似对或错,难以抉择,教材内容多伦理、法规内容比例增多,内容繁杂,记忆就容易模糊,重点不突出,更缺乏阶梯化的强化记忆,没有系统的知识体系。

总之,最好的方法是分三个阶段逐渐积累。第一阶段是通读教材;第二阶段研读《历年真题纵览与考点评析》;第三阶段用本套模拟试卷模拟考试。当然,直接进行第二、第三阶段积累,对自己易错易混的考点去针对性泛读教材亦不失为一种省事的方法。

由于时间仓促,仅能浅谈这些体会,谬误之处在所难免,希望广大考生指正,并来信或在网上交流考试体会与经验,将您的热情与爱心献给每一个需要帮助的人。

通讯地址:北京太平路 27 号军事医学出版社 考试图书编辑部

邮 编:100850

电 话:010-66931038

网 址:www.mmsp.cn

A1 型选择题(1~70 题)

210—1

答案说明

第一单元

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方格涂黑。

1. 最常引发 2 型呼吸衰竭的是

述,不正确的是

A. 支气管哮喘

A. 内心信念

B. 肺结核

医师资格考试临考押题试卷(一)

D. 慢性阻塞性肺疾病

(医学综合笔试部分)

E. 特发性肺动脉高压

2. 直接导致神经末梢递质释放递质的因素是

A. 末梢处的 Na^+ 内流

A. 生物性方法

C. 末梢处的 Ca^{2+} 内流

临床执业助理医师

D. 末梢处的 $\text{Na}^+ \cdot \text{Ca}^{2+}$ 交换

D. 模拟性方法

(报考类别代码:210)

3. 在神经纤维传导兴奋时,其兴奋传导速度主要取决于

A. 直径

B. 维生素 K

C. 维生素 E

D. 维生素 D

E. 维生素 A

4. 成熟红细胞的特点

A. 淋巴造血器官

C. 红细胞容量与全血相同

D. 血小板含量与全血相同

E. 粒细胞含量与全血相同

考生姓名: _____

准考证号: _____

5. 投射性测验的理论基础是

A. 认知理论

B. 精神分析理论

C. 人本主义理论

D. 行为主义理论

E. 心理生理学理论

10. 适度的应激对于大多数人来说可以

A. 加重疾病

B. 导致疾病

C. 促进个体健康

军事医学出版社

答题须知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
2. 在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
3. 在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
6. 答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
7. 考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
8. 考试结束时,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
9. 监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

A1 型选择题(1~70 题)

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 最常并发 2 型呼吸衰竭的是
 - A. 支气管哮喘
 - B. 肺结核
 - C. 肺炎
 - D. 慢性阻塞性肺疾病
 - E. 特发性肺动脉高压
2. 直接导致神经末梢递质释放递质的因素是
 - A. 末梢处的 Na^+ 内流
 - B. 末梢处的 K^+ 外流
 - C. 末梢处的 Cl^- 内流
 - D. 末梢处的 $\text{Na}^+ - \text{Ca}^{2+}$ 交换
 - E. 末梢处的 Ca^{2+} 内流
3. 在体内可由胆固醇转变成的维生素是
 - A. 泛酸
 - B. 维生素 K
 - C. 维生素 E
 - D. 维生素 D
 - E. 维生素 A
4. 洗涤红细胞特点是
 - A. 淋巴细胞含量很少
 - B. 血浆蛋白的含量很少
 - C. 红细胞含量与全血相同
 - D. 血小板含量与全血相同
 - E. 粒细胞含量与全血相同
5. 投射性测验的理论基础是
 - A. 认知理论
 - B. 精神分析理论
 - C. 人本主义理论
 - D. 行为主义理论
 - E. 心理生理学理论
6. 下列关于医务人员道德自律的实现途径描
 - 述,不正确的是
 - A. 内心信念
 - B. 道德修养
 - C. 自我道德教育
 - D. 自我道德评价
 - E. 外在道德教育
7. 流行病学的研究方法不包括
 - A. 实验性方法
 - B. 理论性方法
 - C. 描述性方法
 - D. 推论性方法
 - E. 分析性方法
8. 以下关于患者角色所具有的特征不包括
 - A. 疾病行为
 - B. 求医行为
 - C. 治疗行为
 - D. 与医疗系统发生关系
 - E. 以上都不是
9. 组成核酸的基本结构单位是
 - A. 碱基和核糖
 - B. 核糖和磷酸
 - C. 核苷酸
 - D. 脱氧核苷和碱基
 - E. 核苷和碱基
10. 适度的应激对于大多数人来说可以
 - A. 加重疾病
 - B. 导致疾病
 - C. 促进个体适应
 - D. 引起生理障碍
 - E. 引起心理障碍

11. 《医疗机构管理条例》规定,医疗机构不得使用非卫生技术人员从事的工作为
 - A. 医疗器械采购
 - B. 医院安全保卫
 - C. 医院财务审计
 - D. 医疗卫生技术
 - E. 医疗后勤服务
12. 下列有关移植植物抗宿主反应,错误的是
 - A. 是移植植物中免疫细胞对宿主成分发生免疫应答
 - B. 是骨髓移植的主要障碍
 - C. 是受者对移植植物产生的排斥反应
 - D. 是移植排斥的一种类型
 - E. 由此引起的疾病称移植植物抗宿主疾病
13. 不属于变异指标的是
 - A. 变异系数
 - B. 四分位数间距
 - C. 标准差
 - D. 全距
 - E. 中位数
14. 医疗机构发现甲类传染病应采取下列措施,除了
 - A. 对患者予以隔离治疗
 - B. 对疑似患者,确诊前在指定场所单独隔离治疗
 - C. 对医疗机构内与患者密切接触者,在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施
 - D. 拒绝隔离治疗的,可以由公安机关协助采取强制隔离治疗措施
 - E. 采取紧急措施并予以公告
15. 我国发病率最高的食物中毒是
 - A. 化学性食物中毒
 - B. 细菌性食物中毒
 - C. 霉菌毒素食物中毒
 - D. 有毒动物中毒
 - E. 有毒植物中毒
16. 临床试验中的双盲法指的是
 - A. 研究组与对照组互不熟悉
 - B. 观察者与被观察者不知道安慰剂的性质
 - C. 观察者与被观察者均不知分组情况和接受的治疗措施
 - D. 观察者与被观察者均不知道研究药物的性质
 - E. 研究组与对照组均不知分组情况和接受的治疗措施
17. 人格的核心是
 - A. 气质
 - B. 能力
 - C. 智力
 - D. 情绪
 - E. 性格
18. 当食物中蛋白质氨基酸模式与人体需要的蛋白质氨基酸模式越接近时,该蛋白质的
 - A. 利用率越高
 - B. 必需氨基酸含量越高
 - C. 吸收率越高
 - D. 含氮量越高
 - E. 消化率越高
19. 患者思维清晰,智能相对良好,但有近期记忆障碍和言谈虚构倾向,最可能的综合征是
 - A. 谵妄综合征
 - B. 慢性脑病综合征
 - C. 急性脑病综合征
 - D. 痴呆综合征
 - E. 遗忘综合征
20. 脑器质性精神障碍是指

41. A. 脑部病理或病理生理改变所致的一类精神障碍
B. 脑部感染所致精神障碍
C. 继发于全身性疾病或障碍,使脑部间接受到侵害或影响的精神障碍
D. 智力、记忆和人格的全面损害
E. 与脑部疾病同时存在的精神障碍
21. 属于器官特异性自身免疫病的是
A. SLE
B. 全身性硬皮病
C. 多发性肌炎
D. 斯耶格拉伦(Sjogren)综合征
E. 甲状腺功能亢进症(Graves病)
22. 对医术与医德之间关系的理解错误的是
A. “医乃仁术”
B. 有能力做的就应该去做
C. “大医精诚”
D. 临床医学决策同时也是伦理决策
E. 前沿医学技术应用于临床必须有医德参与
23. 我国古代最杰出的医德经典是
A. 肖纲的《劝医论》
B. 孙思邈的《大医精诚》
C. 李挺的《医学入门》
D. 孙实功的《五戒十要》
E. 张仲景的《伤寒杂病论》
24. 心理社会因素在下列哪种疾病的发病过程中起重要
A. 人格障碍
B. 心身疾病
C. 心理障碍
D. 精神疾病
E. 躯体障碍
25. 肽链合成后经羟化生成的是
A. 丝氨酸
B. 羟脯氨酸
C. 胱氨酸
D. 蛋氨酸
E. 苏氨酸
26. 下列有关酶的叙述,正确的是
A. 不能在胞外发挥作用
B. 能改变反应的平衡点
C. 能显著地降低反应活化能
D. 对底物都有绝对专一性
E. 生物体内的无机催化剂
27. 以下关于 RNA 分子中“帽子”的叙述哪一项是正确的
A. 存在于真核细胞的 mRNA 5'端
B. 存在于 tRNA 的 3'端
C. 是由聚合组成
D. 可使 tRNA 进行加工过程
E. 用于校正原核细胞 mRNA 翻译中的错误
28. 血清非结合胆红素增加,结合胆红素基本正常常见于
A. 胆总管梗阻
B. 肝内胆管梗阻
C. 肝外胆管梗阻
D. Dubin-Johnson 综合征
E. 急性血管内溶血
29. 存在于糖酵解和糖异生中的酶是
A. 葡萄糖激酶
B. 丙酮酸羧化酶
C. 磷酸甘油酸激酶
D. 果糖二磷酸酶
E. 丙酮酸激酶
30. 肝豆状核变性与下列哪种血浆蛋白异常有关
A. 清蛋白
B. 球蛋白
C. 纤维蛋白原
D. 转铁蛋白
E. 铜蓝蛋白

- B. γ -球蛋白
C. 结合珠蛋白
D. 铜蓝蛋白
E. 运铁蛋白
31. 用药的间隔时间主要取决于
A. 药物的排泄速度
B. 药物的吸收速度
C. 药物的消除速度
D. 药物的分布速度
E. 药物与血浆蛋白的结合率
32. 以下何种腹泻是由于肠黏膜分泌增多引起
A. 霍乱
B. 服 5% 硫酸镁
C. 服甘露醇
D. 肠蠕动过快
E. 服蓖麻油
33. 具有抗心律失常、抗高血压及抗心绞痛作用的药物是
A. 可乐定
B. 硝酸甘油
C. 氢氯噻嗪
D. 利多卡因
E. 普萘洛尔
34. 可以延长局麻药的作用时间,并能减少出血的药物是
A. 多巴胺
B. 麻黄素
C. 肾上腺素
D. 去甲肾上腺素
E. 异丙肾上腺素
35. 尿激酶属于
A. 抗血小板药
B. 抗贫血药
C. 纤维蛋白溶解药
D. 抗凝血药
E. 促凝血药
36. 吗啡的适应证是
A. 分娩止痛
B. 颅脑外伤疼痛
C. 哺乳期妇女止痛
D. 诊断未明急腹症疼痛
E. 急性严重创伤、烧伤所致疼痛
37. 能防止甚至逆转血管壁增厚和心肌肥大的抗高血压药物是
A. α 受体阻断药
B. 利尿降压药
C. β 受体阻滞剂
D. 血管紧张素转换酶抑制剂
E. 钙离子拮抗剂
38. 治疗心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是
A. 普罗帕酮
B. 利多卡因
C. 普萘洛尔
D. 胺碘酮
E. 奎尼丁
39. 三级预防措施中的第一级预防是
A. 临床前期预防
B. 临床期预防
C. 病因预防
D. 病残预防
E. 治疗副作用预防
40. 下列属于假膜性炎的疾病是
A. 肠伤寒
B. 肠结核
C. 急性细菌性痢疾
D. 阿米巴痢疾
E. 肠血吸虫病

41. 慢性肾脏病的诊断标准是:肾损伤或 GFR <60 ml/min 最少持续
A. 1 个月
B. 2 个月
C. 3 个月
D. 6 个月
E. 1 年
42. 下列叙述中属于右心衰竭典型临床表现的是
A. 劳力性呼吸困难
B. 端坐呼吸
C. 肝颈静脉回流征阳性
D. 夜间阵发性呼吸困难
E. 咯粉红色泡沫痰
43. 缺氧引起呼吸加深加快的原因是
A. 刺激呼吸肌
B. 刺激外周化学感受器
C. 刺激中枢化学感受器
D. 直接刺激呼吸中枢
E. 通过肺牵张反射
44. 贫血和甲亢对心脏产生的影响是
A. 左心室压力负荷加重
B. 左心室容量负荷加重
C. 右心室压力负荷加重
D. 右心室容量负荷加重
E. 左、右心室容量负荷加重
45. 心肌的等长调节要实现调节心脏的泵血功能需改变
A. 横桥 ATP 酶活性
B. 肌浆游离 Ca^{2+}
C. 心肌收缩能力
D. 肌小节初长
E. 肌钙蛋白活性
46. 下列哪项情况可导致肾小球滤过率减少
A. 血浆晶体渗透压升高
B. 血浆胶体渗透压下降
C. 血浆胶体渗透压升高
D. 血浆晶体渗透压下降
E. 肾小球毛细血管血压升高
47. 糖皮质激素能
A. 减少脂肪的分解
B. 促进肌肉组织蛋白质分解
C. 促进葡萄糖的利用
D. 降低机体抗伤害刺激的能力
E. 减少红细胞和淋巴细胞的数目
48. 既能使血管壁通透性升高,又对白细胞有趋化作用的炎症介质是
A. 缓激肽
B. 组胺
C. 细胞因子
D. 前列腺素
E. 血小板激活因子(PAF)
49. 肾炎时,毛细血管管壁增厚呈车轨状或分层状见于
A. 弥漫性膜性增生性肾小球肾炎
B. 弥漫性系膜增生性肾小球肾炎
C. 弥漫性硬化性肾小球肾炎
D. 弥漫性新月体性肾小球肾炎
E. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎
50. 消化性溃疡 X 线诊断的可靠依据是
A. 局部激惹
B. 局部压痛
C. 局部变形
D. 龛影在胃腔轮廓之外
E. 龛影在胃腔轮廓之内
51. “癌前病变”最确切的概念是
A. 有癌变潜在可能的良性病变,但必然会发展为癌肿

- B. 有癌变潜在可能的良性病变,有可能逆转
C. 一种恶性病变,不可逆转
D. 良性肿瘤发生了癌变
E. 癌肿的早期阶段
52. 羊水栓塞时,病理诊断的主要依据是
A. 肺泡腔内有角化上皮和胎粪小体等
B. 肺小动脉和毛细血管内有羊水成分
C. 肺透明膜形成
D. 肺水肿和出血
E. 微血管内透明血栓
53. 蜂窝织炎是指
A. 发生于皮下组织及阑尾的炎症
B. 以淋巴细胞渗出为主的炎症
C. 一种弥漫性化脓性炎症
D. 没有明显坏死的渗出性炎症
E. 由链球菌感染引起的局限性化脓性炎症
54. 关于肝性脑病,下述哪项是错误的
A. 血中 NH_3 易入血脑屏障
B. 低钾性碱中毒时 NH_3 易入脑组织
C. 肠道 pH 在 6 以下易使 NH_4^+ 变为 NH_3
D. 肠道 pH 在 5 时, NH_3 不易被吸收
E. 缺氧和高热增加氨的毒性
55. 下列属于法律中规定的孕产期保健服务内容的是
A. 胎儿保健
B. 母婴保健指导
C. 孕妇职业卫生保健
D. 孕妇、产妇保健
E. 新生儿保健
56. 许多冠心病患者都具备 A 型性格的个性特征,下列说法不正确的是
A. 办事较急躁
B. 情绪易冲动
C. 时间紧迫感
D. 竞争意识强
E. 过分依赖他人
57. 妄想指下列何项
A. 是可被说服的不现实想法
B. 在智力缺损时出现的离奇想法
C. 在意识障碍时出现的杂乱思维
D. 在意识中占主导地位的错误观念
E. 在意识清晰的情况下的病理性歪曲信念
58. 下列不属于精神分裂症的阳性症状是
A. 妄想
B. 幻觉
C. 联想散漫
D. 行为紊乱
E. 注意力不集中
59. 慢性支气管炎急性发作期的主要治疗措施是
A. 给予祛痰药物
B. 给予止咳药物
C. 控制呼吸道感染
D. 吸入糖皮质激素
E. 应用解痉平喘药
60. 缺铁性贫血患者给予补充铁剂治疗时,血红蛋白正常后,仍需继续补充铁剂多长时间
A. 1~3 月
B. 4~6 月
C. 6~9 月
D. 9~12 月
E. 1 年以上
61. 流行性乙型脑炎的炎症性质是
A. 纤维素性炎

- B. 变质性炎
C. 化脓性炎
D. 肉芽肿性炎
E. 出血性炎
62. 临床输注新鲜冰冻血浆的目的是补充
A. 凝血因子
B. 白蛋白
C. 免疫球蛋白
D. α -球蛋白
E. 电解质
63. 患者,女,65岁,冠脉介入手术时突感呼吸困难,欲坐起。查体:BP 100/70 mmHg,心率 102 次/分,律齐,心尖部新出现收缩期吹风样杂音。引起该患者杂音的最可能原因是
A. 左室流出道狭窄
B. 风湿性心脏瓣膜病
C. 主动脉瓣脱垂
D. 急性心包炎
E. 急性二尖瓣关闭不全
64. 患者,男,40岁。反复发作上腹部不适、疼痛 6 年。疼痛多发生在餐后约 60 分钟,1~2 小时后逐渐缓解。查体:腹平软,肝脾未触及,上腹轻度压痛,无反跳痛,移动性浊音(-)。上消化道 X 线钡餐造影:胃小弯侧 1.5 cm 壁外龛影,大弯侧有痉挛性切迹。最可能的诊断是
A. 胃憩室
B. 胃炎
C. 胃溃疡
D. 胃癌
E. 胃平滑肌瘤
65. 患者,男,26岁。饮酒后剧烈呕吐胃内容物数次,后呕鲜血约 600 ml。既往体健。查体:BP 90/60 mmHg。最可能的出血原因是
A. 胃癌
B. 消化道溃疡
C. 贲门黏膜撕裂
D. 急性胃黏膜病变
E. 胃血管畸形
66. 患者,男,45岁,反复上腹痛 3 个月。胃镜检查见十二指肠球部溃疡。快速尿素酶试验阳性。最佳治疗方案是
A. 质子泵抑制剂 + 两种抗生素
B. 胃黏膜保护剂 + H_2 受体拮抗剂
C. H_2 受体拮抗剂 + 两种抗生素
D. 质子泵抑制剂 + 胃黏膜保护剂
E. 抗酸剂 + 两种抗生素
67. 诊断急性肾小球肾炎最有价值的指标是
A. 影像学检查显示双肾增大
B. BUN、Ser 迅速升高
C. 50% 以上肾小球囊内有新月体形成
D. 血清抗中性粒细胞胞浆抗体阳性
E. 尿量减少但蛋白排泄量增加
68. 下列哪一项不提示 SLE 活动
A. 皮疹
B. 发热
C. 抗双链 DNA 抗体效价升高
D. C3、CH50 水平下降
E. 抗 Sm 抗体阳性
69. 慢性再障的治疗首选
A. 造血干细胞移植
B. 抗胸腺球蛋白
C. 丙酸睾酮肌肉注射
D. 维生素 B_{12} 肌注
E. 肾上腺糖皮质激素口服
70. 帕金森病患者的典型震颤是
A. 静止性震颤

- B. 意向性震颤
C. 姿态性震颤

- D. 扑翼样震颤
E. 动作性震颤

A2 型选择题(71 ~ 111 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

71. 某女青年因咳嗽发热就诊。拍胸片发现右肺有片状阴影,结核菌素试验红肿直径大于 2.0 cm。试问该患者可能是
- A. 机体对结核无免疫能力
B. 结核病恢复期
C. 结核病活动期
D. 注射过卡介苗
E. 结核病早期
72. 男性,26 岁,突然出现抽搐,从一侧手指开始,向腕部、臂部、肩部及半身扩展。诊断最大可能是
- A. 全面强直-阵挛发作
B. 精神运动性发作
C. 失神发作
D. 杰克逊(Jackson)癫痫
E. 部分性感觉性癫痫
73. 贾某感觉工作劳累欲休假 1 个月,但单位不予批准,贾某找到在县医院工作的陈某,执业医师陈某给贾某开出了“病毒性心肌炎,需在家休息 1 个月”的诊断证明。对于陈某的行为,县卫生局可给予
- A. 吊销其医师执业证书
B. 行政或纪律处分
C. 调离医师岗位
D. 警告或责令其暂停执业活动 3 ~ 6 个月,并接受培训和继续教育
E. 警告或责令其暂停执业活动 6 个月至 1 年
74. 甲医院于 2000 年从乙药品经营公司购进各种品牌和规格的药品,总计付款 80 万元。2001 年春节前夕,乙药品经营公司将 5 万元现金送给甲医院。甲医院将这 5 万元现金以会计个人名义存入银行,并没有存入甲医院的财务帐户,也没有在财务账簿上记载,更没有给乙药品经营公司开具收据。根据《药品管理法》规定,甲医院可能承担的法律責任是
- A. 罚款
B. 警告
C. 民事赔偿责任
D. 吊销医疗机构制剂许可证
E. 撤销药品批准证明文件
75. 女,25 岁,心悸、水肿 4 年。望诊心尖搏动左移,触及心尖区舒张期猫喘,对该病人心脏听诊时,可听到的最重要的杂音或异常心音是
- A. 心尖区舒张期杂音
B. 心尖区第一音亢进
C. 肺动脉第二音亢进
D. 肺动脉瓣区舒张期杂音
E. 主动脉瓣区舒张期杂音
76. 女,65 岁,经常出现头晕、四肢麻木感,注意力不易集中,自感记忆力下降半年,近 2 周突然加重。常半夜起床翻东西,怀疑家中被窃,易哭泣,对一些物品不能命名。既往高血压病史 15 年。头颅 CT 示:多发性脑梗死。最可能的诊断是

- A. 阿尔茨海默病
B. 血管性痴呆
C. 轻度认知功能损害
D. 高血压病伴精神障碍
E. 匹克病
77. 某地区欲找出对患者生命威胁最大的疾病,以便制定防治对策,需要计算和评价的统计指标为
A. 某病的死亡率
B. 某病的发病率
C. 某病的患病率
D. 某病的病死率
E. 某病的患病构成比
78. 一男性病人,因黄疸来诊,化验检查符合阻塞性黄疸。查体见胆囊肿大,为鉴别壶腹区癌与胆囊底部结石,下列体征哪项支持后者
A. 皮肤呈黄绿色
B. 皮肤呈金黄色
C. 皮肤呈柠檬色
D. 胆囊坚硬而不规则
E. 胆囊光滑
79. 在对一名强迫症患者的治疗中,医生鼓励患者回忆从童年起所遭受的精神创伤与挫折,帮助他重新认识,建立起现实性的健康心理,这种疗法属于
A. 自我调节
B. 系统脱敏
C. 催眠治疗
D. 自由联想
E. 厌恶疗法
80. 杨某,学生,入院后每日总站在床前向同宿舍的病友说:“我听到同桌说我偷他钢笔了,他诬陷我,还和别的同学议论我,说我作风不好。”此症状是
A. 幻听
B. 错觉
C. 情感障碍
D. 感觉障碍
E. 联想障碍
81. 14岁女性,中学生,外出旅游,夜间出室外解便时突感恐惧紧张,跑步回室途中,不慎跌倒,双手着地。站立起来时,发现双目失明。最可能的诊断是
A. 疑病性神经症
B. 焦虑性神经症
C. 恐怖性神经症
D. 癔症
E. 双目外伤失明
82. 一名车祸伤员被送至急诊时,主诉呼吸困难,腹部剧痛,检查发现左胸有一伤口,有气泡与血液从伤口涌出,右上腹皮肤有伤痕,意识清楚,血压 60/30 mmHg,心率 112 次/分,呼吸 41 次/分,B 超发现有肝破裂。此伤员应属于
A. 多发伤
B. 复合伤
C. 联合伤
D. 胸腹伤
E. 混合伤
83. 在支气管哮喘的治疗中,哪种药物既能抑制炎症反应,又能增加 β 受体数量,抑制组胺酸脱羧酶
A. 吸入异丙基肾上腺素
B. 吸入色甘酸二钠
C. 静脉缓注氨茶碱
D. 大量静点糖皮质激素
E. 口服麻黄碱
84. 就餐者在某食堂就餐 1 小时后,陆续出现唇、指甲以及全身皮肤青紫等症。对于

此种情况,应采取何种措施进行急救

- A. 洗胃、导泻、灌肠
- B. 洗胃、导泻
- C. 静脉注射美蓝
- D. 静脉注射维生素 C
- E. 洗胃,灌肠,导泻,静脉注射维生素 C 及美蓝

85. 男,20岁,农民,发热,头痛,恶心呕吐3天,查体:T 37.8℃,BP 60/40 mmHg,脉搏细速,躯干有淤点,双肾区叩击痛,检查血常规示:WBC $30 \times 10^9/L$,中性0.80,异常淋巴细胞0.10,血小板 $50 \times 10^9/L$,尿蛋白(++).诊断为

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 败血症,感染性休克
- C. 流行性肾综合出血热
- D. 钩端螺旋体病
- E. 传染性单核细胞增多症

86. 女性,64岁,近2年,偶有心悸感,无黑蒙及晕厥发作,多次查心电图均为房颤,心率65~89次/分。关于心律失常需如何治疗

- A. 口服地高辛
- B. 静注西地兰
- C. 应用乙胺碘呋酮复律
- D. 安置人工心脏起搏器
- E. 以上都不是

87. 70岁震颤麻痹患者最有效的治疗药物是

- A. 溴隐亭
- B. 金刚烷胺
- C. 复方左旋多巴
- D. 丙炔苯丙胺
- E. 卡马西平

88. 女性,45岁,反复发热1年,伴四肢大小关节肿痛。WBC $8.0 \times 10^9/L$,Hb 100 g/L,ANA(+),RF(+).经多种抗生素正规

治疗无效,可能的诊断是

- A. 骨关节炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 结核菌感染引起的关节炎
- D. 风湿性关节炎
- E. 类风湿性关节炎

89. 女性,75岁,原有肺心病,受凉后加重,咳脓性痰,伴发热、烦躁、呼吸困难,入院前3小时神志模糊,嗜睡。查体:明显发绀,昏迷,BP 100/60 mmHg,无病理反射,可能的并发症是

- A. 休克
- B. DIC
- C. 肺性脑病
- D. 脑血管意外
- E. 消化道出血

90. 男性,70岁,胃癌根治术后当天输血2000 ml,患者出现头部胀痛,呼吸困难,咳大量血性泡沫痰。应立即

- A. 半卧位、吸氧、利尿
- B. 输入碳酸氢钠使尿液碱化
- C. 大剂量应用地塞米松
- D. 输入血浆或5%白蛋白
- E. 抗感染治疗

91. 男性,30岁,慢性肾炎5年,查血 RUN 18 mmol/L, Cr 265 $\mu\text{mol/L}$,血红蛋白80 g/L,尿蛋白1 g/L。最合适的治疗为

- A. 腹膜透析
- B. 血液透析
- C. 肾移植
- D. 低蛋白饮食 + 酮酸 + ACEI
- E. 中药

92. 女性,70岁,昏迷一天入院,既往无糖尿病史。BP 160/85 mmHg,血糖38 mmol/L,血钠150 mmol/L,血 pH 7.35,血酮体弱阳