



# 560种


# 中草药 野外识别 彩色图鉴

车晋滇 编著

◎ 收录我国南北方中草药 176 科，560 种，配有彩色图片 1070 余幅。

◎ 以分科的形式进行编排，对每种中草药的识别特征、分布生境、药用功效等进行了简要介绍。

◎ 该书彩色图片清晰、识别特征明显、内容丰富、文字简练、通俗易懂、实用性强。



化学工业出版社

# 560<sup>种</sup> 中草药 野外识别 彩色图鉴

车晋滇 编著



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书收录了我国南北方中草药176科，560种，配有彩色图片1070余幅。以分科的形式进行编排，对每种中草药的识别特征、分布生境、药用功效等进行了简要介绍。该书具有图片清晰、识别特征明显、内容丰富、文字简练、通俗易懂、实用性强等特点。可供从事中草药学教育、资源开发的人员及医药工作者和中草药爱好者参考使用。

## 图书在版编目(CIP)数据

560种中草药野外识别彩色图鉴/车晋滇编著.  
北京:化学工业出版社,2016.6  
ISBN 978-7-122-26763-4

I. ①5... II. ①车... III. ①野生植物-中草药-图谱  
IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第072780号

---

责任编辑:李 丽  
责任校对:边 涛

装帧设计:关 飞

---

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)  
印 装:北京彩云龙印刷有限公司  
850mm×1168mm 1/32 印张13 $\frac{3}{4}$  字数376千字  
2016年7月北京第1版第1次印刷

---

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686)  
售后服务:010-64518899  
网 址: <http://www.cip.com.cn>  
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

---

定 价:79.00元

版权所有 违者必究

# 前言 Forework

我国是世界上利用中草药预防和治疗疾病最早的国家之一。在几千年的历史发展进程中，人们对中草药的认识不断完善提高，积累了丰富的临床经验，形成了独特的祖国传统中医药文化，在当今化学药品高度发达的时代，中草药仍然占有十分重要或不可替代的地位。

我国幅员辽阔，可用做中草药的动植物种类繁多，特别是山区蕴藏着极其丰富的中草药资源。在众多的野生动植物中，有些种类既可作为野菜食用，又可作为中草药治病；有些种类具有食疗保健作用；有些种类则有毒或有剧毒，误食误用后会影晌身体健康甚至危及生命。编写本书的目的旨在传承弘扬祖国中草药文化，帮助热爱与研究中草药的读者正确识别中草药，了解和掌握一些中草药方面的基本知识，科学利用中草药防病治病，增强自我保健意识。

有鉴于此，本书重点收载了我国南北方常见或较常见的野生中草药，对一些常见的有药用价值的栽培或饲养的动植物也进行了介绍。涉及176科，560种中草药，彩色图片1070余幅。其中，植物类中草药152科，533种（含蕨类植物14科，18种；裸子植物4科，5种；被子植物118科，490种；菌藻植物16科，20种）；动物类中草药24科，27种（含陆地动物13科，14种；水生动物11科，13种）。每种中草药均配有彩色图片，便于读者对照彩色图片和简要的文字描述识别中草药。本书可供从事中草药学教育、资源开发的人员及医药工作者和中草药爱好者参考使用。

由于作者水平有限，书中难免存在某些不足或疏漏之处，恳请专家学者和广大读者指正。

编著者

2016年2月15日



# 目录 Contents

## 第一章 植物类中草药

### 一、蕨类植物

#### 卷柏科 / 002

卷柏 / 002

#### 木贼科 / 003

节节草 / 003

问荆 / 004

#### 海金沙科 / 005

海金沙 / 005

#### 里白科 / 006

芒萁 / 006

#### 凤尾蕨科 / 007

蕨菜 / 007

凤尾草 / 007

#### 中国蕨科 / 008

银粉背蕨 / 008

#### 铁线蕨科 / 009

铁线蕨 / 009

#### 铁角蕨科 / 010

鸟巢蕨 / 010

北京铁角蕨 / 010

#### 球子蕨科 / 011

荚果蕨 / 011

#### 肾蕨科 / 012

肾蕨 / 012

#### 水龙骨科 / 013

槲蕨 / 013

有柄石韦 / 014

#### 蕨科 / 015

四叶蕨 / 015

#### 槐叶蕨科 / 016

槐叶蕨 / 016

#### 满江红科 / 017

满江红 / 017

### 二、裸子植物

#### 苏铁科 / 018

苏铁 / 018

#### 银杏科 / 019

银杏 / 019

#### 松科 / 020

白皮松 / 020

油松 / 021

#### 柏科 / 022

侧柏 / 022

### 三、被子植物

#### 三白草科 / 023

鱼腥草 / 023

#### 杨梅科 / 024

杨梅 / 024

#### 胡桃科 / 025

核桃 / 025

#### 桦木科 / 026

榛子 / 026

#### 壳斗科 / 027

板栗 / 027

#### 桑科 / 028

大麻 / 028

桑叶 / 029

构树 / 029

无花果 / 030

榕树 / 030

对叶榕 / 031

菠萝蜜 / 031

#### 荨麻科 / 032

麻叶荨麻 / 032

狭叶荨麻 / 033

苎麻 / 034

细穗苎麻 / 034

#### 马兜铃科 / 035

马兜铃 / 035

#### 蓼科 / 036

拳参 / 036

杠板归 / 036

何首乌 / 037

火炭母 / 038

篇蓄 / 038

酸模叶蓼 / 039

红蓼 / 039

水蓼 / 040

蚕茧草 / 040

叉分蓼 / 041

头花蓼 / 041

竹节蓼 / 042

巴天酸模 / 042

波叶大黄 / 043

金荞麦 / 044

苦荞麦 / 045

## 藜科 / 046

藜 / 046

猪毛菜 / 046

地肤 / 047

土荆芥 / 048

## 苋科 / 049

青葙 / 049

鸡冠花 / 050

千日红 / 050

牛膝 / 051

空心莲子草 / 052

刺苋 / 052

## 紫茉莉科 / 053

紫茉莉 / 053

叶子花 / 053

## 商陆科 / 054

垂序商陆 / 054

## 马齿苋科 / 055

马齿苋 / 055

土人参 / 055

## 落葵科 / 056

落葵薯 / 056

## 石竹科 / 057

瞿麦 / 057

石竹 / 057

牛繁缕 / 058

王不留行 / 059

米瓦罐 / 059

球序卷耳 / 060

## 睡莲科 / 061

莲 / 061

鸡头米 / 062

睡莲 / 063

## 毛茛科 / 064

芍药 / 064

牡丹 / 064

金莲花 / 065

草乌 / 066

白头翁 / 067

石龙芮 / 068

茴茴蒜 / 068

水葫芦苗 / 069

棉团铁线莲 / 069

## 防己科 / 070

蝙蝠葛 / 070

木防己 / 071

## 小檗科 / 072

阔叶十大功劳 / 072

南天竹 / 073

细叶小檗 / 074

## 木兰科 / 075

玉兰 / 075

白兰花 / 076

八角茴香 / 077

五味子 / 078

含笑 / 078

## 蜡梅科 / 079

蜡梅 / 079

## 番荔枝科 / 080

番荔枝 / 080

## 樟科 / 081

樟树 / 081

无根藤 / 081

## 罂粟科 / 082

野罂粟 / 082

白屈菜 / 082

## 十字花科 / 083

板蓝根 / 083

独行菜 / 084

播娘蒿 / 084

遏蓝菜 / 085

蔊菜 / 085

莱菔子 / 086

豆瓣菜 / 087

## 猪笼草科 / 088

猪笼草 / 088

## 景天科 / 089

垂盆草 / 089

瓦松 / 089

景天三七 / 090

茴香 / 198

## 杜鹃花科 / 199

杜鹃花 / 199

## 报春花科 / 200

过路黄 / 200

聚花过路黄 / 200

狼尾花 / 201

## 蓝雪科 / 202

二色补血草 / 202

## 山榄科 / 203

人心果 / 203

## 柿树科 / 204

柿蒂 / 204

黑枣 / 204

## 木犀科 / 205

连翘 / 205

茉莉花 / 206

迎春花 / 206

桂花 / 207

女贞 / 208

## 龙胆科 / 209

秦艽 / 209

小龙胆 / 209

中国扁蕾 / 210

花锚 / 210

苕菜 / 211

## 夹竹桃科 / 212

长春花 / 212

罗布麻 / 212

夹竹桃 / 213

黄花夹竹桃 / 213

鸡蛋花 / 214

## 萝藦科 / 215

杠柳 / 215

萝藦 / 215

地梢瓜 / 216

鹅绒藤 / 216

牛皮消 / 217

马利筋 / 218

## 旋花科 / 219

海红薯 / 219

甘薯 / 219

裂叶牵牛 / 220

圆叶牵牛 / 220

菟丝子 / 221

金灯藤 / 221

马蹄金 / 222

五爪金龙 / 222

茛苳 / 223

## 紫草科 / 224

麦家公 / 224

## 马鞭草科 / 225

马缨丹 / 225

马鞭草 / 225

假马鞭草 / 226

牡荆 / 226

臭牡丹 / 227

## 唇形科 / 228

黄芩 / 228

藿香 / 229

裂叶荆芥 / 229

活血丹 / 230

益母草 / 230

薄荷 / 231

留兰香 / 232

罗勒 / 232

紫苏 / 233

丹参 / 234

夏至草 / 235

夏枯草 / 235

香薷 / 236

地笋 / 237

甘露子 / 238

糙苏 / 239

蓝萼香茶菜 / 239

## 茄科 / 240

枸杞 / 240

龙葵 / 241

少花龙葵 / 241

水茄 / 242

刺天茄 / 242

茄子 / 243

天仙子 / 243

洋金花 / 244

曼陀罗 / 245

酸浆 / 246

小酸浆 / 246

假酸浆 / 247

朝天椒 / 248

西红柿 / 248

## 玄参科 / 249

地黄 / 249

冰糖草 / 250

泡桐 / 251

毛蕊花 / 252

阴行草 / 252

通泉草 / 253

返顾马先蒿 / 253

水苦葵 / 254

## 紫葳科 / 255

角蒿 / 255

凌霄 / 255

## 胡麻科 / 256

胡麻 / 256

## 列当科 / 257

黄花列当 / 257

紫花列当 / 257

## 苦苣苔科 / 258

牛耳草 / 258

## 爵床科 / 259

爵床 / 259

## 车前科 / 260

车前 / 260

## 茜草科 / 261

耳草 / 261

伞房花耳草 / 262

茜草 / 263

鸡矢藤 / 264

龙船花 / 265

蓬子菜 / 265

梔子 / 266

## 忍冬科 / 267

金银花 / 267

## 败酱科 / 268

黄花龙牙 / 268

糙叶败酱 / 269

异叶败酱 / 269

## 川续断科 / 270

续断 / 270

## 葫芦科 / 271

苦瓜 / 271

冬瓜 / 272

南瓜 / 272

西瓜 / 273

黄瓜 / 273

香瓜 / 274

丝瓜 / 274

蛇瓜 / 275

赤瓟 / 275

栝楼 / 276

盒子草 / 277

马交儿 / 277

## 桔梗科 / 278

党参 / 278

羊乳 / 279

桔梗 / 280

石沙参 / 281

展枝沙参 / 281

半边莲 / 282

## 仙人掌科 / 283

仙人掌 / 283

火龙果 / 283

## 菊科 / 284

胜红蓟 / 284

马兰 / 284

小飞蓬 / 285

一年蓬 / 285

旋覆花 / 286

沙旋覆花 / 286

土木香 / 287

天名精 / 288

苍耳 / 288

银胶菊 / 289

豨薟 / 289

鳢肠 / 290

菊芋 / 290

向日葵子 / 291

金腰箭 / 292

金钮扣 / 292

三叶鬼针草 / 293

鬼针草 / 294

小花鬼针草 / 294

辣子草 / 295

万寿菊 / 296

孔雀草 / 296

蓍草 / 297

菊花 / 297

野菊花 / 298

石胡荽 / 298

艾蒿 / 299

茵陈蒿 / 300

黄花蒿 / 301

大籽蒿 / 301

菱蒿 / 302

一点红 / 303

兔儿伞 / 303

羽叶千里光 / 304

狗舌草 / 304

蓝刺头 / 305

砂蓝刺头 / 305

苍术 / 306



牛蒡 / 307

飞廉 / 307

小蓟 / 308

大蓟 / 308

莲座蓟 / 309

水飞蓟 / 309

泥胡菜 / 310

祁州漏芦 / 310

红花 / 311

大丁草 / 312

蒲公英 / 312

苣荬菜 / 313

苦苣菜 / 313

山莴苣 / 314

莴笋 / 314

苦菜 / 315

抱茎苦苣菜 / 315

黄鹌菜 / 316

鼠麴草 / 316

臭灵丹 / 317

## 香蒲科 / 318

香蒲 / 318

小香蒲 / 318

## 露兜树科 / 319

露兜筋 / 319

## 黑三棱科 / 320

黑三棱 / 320

## 眼子菜科 / 321

眼子菜 / 321

## 泽泻科 / 322

野慈姑 / 322

泽泻 / 323

## 禾本科 / 324

芦苇 / 324

白茅 / 325

薏苡 / 326

玉米须 / 327

甘蔗 / 328

## 莎草科 / 329

香附子 / 329

风车草 / 330

荸荠 / 330

## 棕榈科 / 331

蒲葵 / 331

椰子 / 332

## 天南星科 / 333

天南星 / 333

半夏 / 334

掌叶半夏 / 335

海芋 / 336

芋头 / 337

大漂 / 338

菖蒲 / 339

## 浮萍科 / 340

青萍 / 340

紫萍 / 340

## 凤梨科 / 341

菠萝 / 341

## 鸭跖草科 / 342

鸭跖草 / 342

吊竹梅 / 342

## 雨久花科 / 343

凤眼莲 / 343

鸭舌草 / 343

雨久花 / 344

## 百合科 / 345

黄精 / 345

玉竹 / 346

卷丹 / 347

山丹 / 347

有斑百合 / 348

知母 / 349

山韭菜 / 350

葱子 / 350

薤白 / 351

大蒜 / 352

洋葱 / 352

萱草 / 353

黄花菜 / 353

沿阶草 / 354

天门冬 / 355

石刁柏 / 355

鹿药 / 356

玉簪 / 357

紫玉簪 / 357

绵枣儿 / 358

虎尾兰 / 359

金边虎尾兰 / 359

## 石蒜科 / 360

石蒜 / 360

红玉帘 / 360

朱顶红 / 361

水仙 / 361

## 薯蓣科 / 362

薯蓣 / 362

穿山龙 / 363

## 鸢尾科 / 364

射干 / 364

鸢尾 / 364

马蔺 / 365

藏红花 / 366

## 芭蕉科 / 367

香蕉 / 367

## 美人蕉科 / 368

美人蕉 / 368

## 兰科 / 369

麦斛 / 369

石斛 / 370

## 四、菌藻植物

## 口蘑科 / 371

鸡枞 / 371

松茸 / 372

金针菇 / 373

## 侧耳科 / 374

香菇 / 374

平菇 / 375

## 光柄菇科 / 376

草菇 / 376

## 鬼伞科 / 377

鸡腿菇 / 377

## 齿菌科 / 378

猴头菇 / 378

## 鬼笔科 / 379

竹荪 / 379

## 马勃科 / 380

马勃 / 380

## 木耳科 / 381

木耳 / 381

## 银耳科 / 382

银耳 / 382

## 多孔菌科 / 383

紫芝 / 383

灵芝 / 383

## 肉座菌科 / 384

竹黄 / 384

## 麦角菌科 / 385

冬虫夏草 / 385

## 海带科 / 386

昆布 / 386

## 翅藻科 / 387

裙带菜 / 387

## 石莼科 / 388

孔石莼 / 388

## 红毛藻科 / 389

紫菜 / 389

## 第二章 动物类中草药

### 一、陆地动物

## 斑翅蝗科 / 392

东亚飞蝗 / 392

## 斑腿蝗科 / 393

中华稻蝗 / 393

## 蚕蛾科 / 394

家蚕 / 394

## 蝉科 / 395

蚱蝉 / 395

## 蚁科 / 396

鼎突多刺蚁 / 396

## 蟋科 / 397

九香虫 / 397

## 鳖蠊科 / 398

土鳖 / 398

## 钳蝎科 / 399

东亚钳蝎 / 399

## 蜈蚣科 / 400

蜈蚣 / 400

## 鹿科 / 401

鹿茸 / 401

## 牛科 / 402

水牛角 / 402

雉科 / 403

乌骨鸡 / 403

鸡内金 / 404

鸠鸽科 / 405

鸽子 / 405

二、水生动物

龟科 / 406

龟甲 / 406

鳖科 / 407

鳖甲 / 407

田螺科 / 408

螺蛳 / 408

蚌科 / 409

河蚌 / 409

鲍科 / 410

石决明 / 410

牡蛎科 / 411

牡蛎 / 411

蚶科 / 412

瓦楞子 / 412

贻贝科 / 413

淡菜 / 413

乌贼科 / 414

海螵蛸 / 414

海龙科 / 415

刺海马 / 415

线纹海马 / 415

海龙 / 416

海燕科 / 417

海燕 / 417

索引 / 418

主要参考文献 / 425



## 第一章

Chapter 1

# 植物类中草药

# 一、蕨类植物

## 卷柏科

### 卷 柏

【别名】还魂草、万年青、石莲花等

【学名】*Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spr.

【识别特征】卷柏科。多年生草本。枝丛生成莲座状，干后内卷如拳状。枝扁平，2~3次羽状分枝。叶二型，侧生叶斜卵状钻形，长约2.5mm，宽约1.5mm，先端具长芒，外缘向下面反卷，具微细锯齿，内缘薄，宽膜质；中叶两排，斜向排列，内缘不成二平行线，斜卵状披针形，先端具长芒，边缘有微齿。孢子囊穗生枝顶，四棱形；孢子叶卵状三角形，先端具长芒。

【分布生境】全国大部分地区。生山坡湿润处、岩石缝中。

【药用功效】全草入药，春、秋季采集。性味辛，平。卷柏生用具破血功效。用于闭经，腹痛，跌打损伤，哮喘等症。炒用具收敛止血功效。用于吐血，便血，尿血，脱肛等症。





## 节节草

【别名】土麻黄、草麻黄、笔筒草等

【学名】*Equisetum ramosissimum* Desf.

【识别特征】木贼科。多年生草本。地下根茎横走，黑褐色。茎一型，无孢子茎和营养茎之分。地上茎灰绿色，粗糙，直立，中空，有棱脊6~20条；分枝近直立，与主茎近相等。鞘片背上无棱脊，鞘筒长为宽的2倍；鞘齿短三角形，黑色，有易脱落的膜质尾尖。孢子囊穗生茎顶，长圆形，有小尖头，无柄。孢子叶六角形，中央凹入，盾状着生，边缘生长形孢子囊。

【分布生境】全国大部分地区。生山坡、沙质地、林荫下。

【药用功效】全草入药，夏季采集。性味甘，苦，平。具祛风清热、除湿利尿等功效。用于目赤肿痛，翳膜遮眼，牙痛，衄血，便血，尿血，小便不利等症。



## 问荆

【别名】土麻黄、笔头草、马草等

【学名】*Equisetum arvense* L.

【识别特征】木贼科。多年生草本。地下根茎黑褐色。地上茎二型，孢子茎早春伸出，不分枝，黄褐色，无叶绿素；孢子囊穗顶生，长椭圆形，钝头；孢子叶六角形，盾状着生，边缘着生长形孢子囊，孢子一形。营养茎在孢子茎枯萎后伸出，绿色，多分枝，主茎有5~12条棱脊；鞘齿卵状三角形，尖端为黑色。分枝轮生，中实，有棱脊3~4条；小枝向上斜出至横向伸出，与主茎成锐角。

【分布生境】东北、华北、山东、湖北、四川、贵州、新疆、西藏等地。生山坡、丘陵、沙质地、土沟边、林荫下。

【药用功效】全草入药，5~7月采集。性味苦，凉。具清热、凉血、止咳、利尿等功效。用于咳嗽气喘，吐血，衄血，月经过多，尿路感染，小便涩痛，便血，痔出血等症。





# 海金沙

【别名】海金沙草、铁线藤、左转藤等

【学名】*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.

【识别特征】海金沙科。多年生攀缘草本。地下根茎细长，横走，黑褐色或栗色，被细柔毛。茎细长，有微毛，缠绕在其他植物上。叶二型，营养叶尖三角形，2回羽状，小羽片边缘有浅钝齿。孢子叶卵状三角形，羽片边缘有流苏状孢子囊穗。孢子囊梨形，很小，孢子粉鲜黄色或土黄色。孢子期5～11月。

【分布生境】河南以南等地。生山坡灌丛、路埂边杂草上。

【药用功效】孢子粉、全草入药，在孢子粉末脱落时采集。孢子粉性味甘，淡，寒。具清热解毒、利尿通淋等功效。用于尿路感染，尿路结石，肾炎水肿，咽喉肿痛，白带，肠炎，痢疾，湿疹等症。全草入药有抗菌、利尿等功效。用于上呼吸道感染，流行性腮腺炎，尿路感染，丹毒，烫伤等症。



## 芒 萁

【别名】山蕨、芒萁骨、蕨叶草等

【学名】*Dicranopteris dichotoma* (Thunb.) Bernh.

【识别特征】里白科。多年生草本。地下根状茎细长横走，棕褐色，被棕色鳞片。叶片疏生，叶轴1~2回或多回分叉，在每一交叉处两侧各有1片羽状托叶；末回羽片披针形，先端渐狭成尾尖；篦齿状羽裂深达羽轴，叶背面呈灰白色或灰蓝色；叶柄长，棕褐色，光滑无毛。孢子囊群无盖，着生于中脉的两侧。

【分布生境】长江以南等地。生山坡、林缘、酸性土壤中。

【药用功效】全草入药，全年可采集。性味苦，平。具清热利尿、活血止血等功效。用于妇女崩带，尿道炎，疝气，外伤出血，伤口溃烂，烫伤等症。

