

投げ五目釣り入門

远投 滩钓 基础入门

从基础开始
投钓五步
钓鱼入门
钓鱼信息 BOOKS

(日)《堤坝矶钓信息》编辑部/编
蔡 玮 颜彩彩 张静秋/译

投钓的基本知识
投钓鱼类图解
钓不同鱼类的方法



少鳞鲷/鰺鱼类/六线鱼/真鲷/带石鱼(黄姑鱼·白姑鱼)/黑鲷/丝背细鳞鲷
鲈鱼/牛尾/虾虎鱼/康吉鲷/金线鲷/马头鱼/蛇鲻(狗母鱼)/莒鲈/杜父鱼
斑点鲷/石斑鱼/比目鱼/箭柄鱼·花石鲈/伸鱼(花鳍海猪鱼)/绿鳍鱼/远东多线鱼

北京体育大学出版社

A man wearing a blue fishing jacket and a cap with 'IZU' on it, holding a large flatfish. The background is a bright, outdoor setting.

远投滩钓基础入门

“堤坝矶钓信息”编辑部 编
蔡 玮 颜彩彩 张静秋 译

北京体育大学出版社

春季

春季是真正开始进入投钓旺季的季节。这个时期的水温虽然还不稳定，但有许多鱼类都开始积极地吃食，钓到的鱼的种类着实会增加很多。

在冬季产完卵的鲷鱼类在回归深海前，会积极地找寻食物。这个时期的鲷鱼类也被称为“回家鲷鱼”、“赏花鲷鱼”，鱼肉肥厚，咬钩很积极，因此很受钓师们的喜爱。诸如黑鲷的鲷鱼类的投钓旺季，也开始于春季。

在日本北部很受欢迎的远东多线鱼等鱼类也是春季开始活跃的鱼类。



漫长的冬季结束，春季是鱼类开始活跃的季节



这个时期鲷鱼追饵很活跃，有时候甚至能一次钓上好几条。





春季是钓鲷鱼类的最后机会。鲷鱼在补回产卵时消耗掉的体力后，就开始返回深海。



在晴天投钓时心情会很好。



春季天气变暖，大批人马奔赴受欢迎的钓场。



这个时期不仅海水温度升高，气温也开始回升。



远东多线鱼是代表了北国之春的投钓目标鱼类。

夏季

初夏时节，钓师们迎来了少鳞鯧和加吉鱼的产卵期，也是一年之中最有可能钓到大鱼的时候。要钓这样的大型鱼类，最好采用夜钓的方法。再加上在梅雨期结束后，就进入了炎热的酷暑，从这个角度来说，凉爽舒适的夜钓是不二之选。

这个时期可以钓到很多大型鱼类，例如30厘米以上的大型少鳞鯧、50厘米以上的黑鲷，还可以享受箭柄鱼和胡椒鲷上钩时与其搏斗的乐趣。


胡椒鲷的数量虽然不多，但钓到时的激动却格外大。



夏季是少鳞鯧和加吉鱼的产卵期。在这个季节可以钓到很多大鱼。




在盛行海水浴场的季节里，只有在早上才能钓到少鳞鯧。



箭柄鱼体格很大，能以其强大的力量让钓鱼的人成为它的俘虏。



夜晚是钓牛尾的最好时候。鱼饵最好用秋刀鱼肉等鱼肉饵。



在初夏的夜晚可以钓到大型少鳞鳕。这个时期是一年中最高可能钓到大型少鳞鳕的时候。



即使不坐在船上，有时候在消极的夜晚也能钓到如此之大的加吉鱼。



夏季的夜晚天气凉爽，可以充分享受投钓的乐趣。




如果想在夏季的浪花之间钓上少鳞鳕，那就要选择禁止游泳的海岸！

秋季

说起适合秋天投钓的鱼，非海滨沙滩的少鳞鳎莫属。虽然这时的少鳞鳎体型像针一样细长，但是因为数量非常多，可以让人感受到满载而归的乐趣，而且你会惊奇的发现，有时海浪打到岩石上，会带来不少的少鳞鳎。所以对初学钓鱼的人来说，秋天是很好的时机。想要钓到更多的鱼，鱼竿的“多点多置”是关键。等到深秋的时候，有些未能跟随大部队去产卵的少鳞鳎成群地聚集在海岸上，它们的味道也很不错哦。

另外，秋天也是钓濑户内海大型黄姑鱼的好季节。有些人为了钓到黄姑鱼，甚至不辞劳苦地去深海区。



杜父鱼是北方特有的品种，味道非常鲜美！



投钓濑户内海大型黄姑鱼的最佳时机！



在秋天的海滨沙滩上，用多点多置的方法钓到少鳞鳕是非常容易的。



从沙滩上可以一连钓好几条少鳞鳕，非常开心！



广阔的沙滩上很容易抛鱼竿，心情真好！



风平浪静的天气，即使在海边，也可以钓到少鳞鳕。

冬季

冬天投钓，应首选比目鱼和六线鱼。从年底到1月是比目鱼的产卵期，孵卵中的比目鱼是最有人气的。有时一条大的比目鱼会超过40厘米，真让人兴奋。但是产卵后的比目鱼一段时间内就不好吃了，这个时候建议你去钓六线鱼，六线鱼也会让你有稳定的收获哦。

在一些深水区，就算是冬天，也可以钓到少鳞鳎，甚至可以钓到鲂鲷等很多意想不到的鱼。



冬天钓少鳞鳎时经常会意想不到的钓到漂亮的鲂鲷。




比目鱼是冬天最受欢迎的鱼。

冬天的丝背细鳞鲆肚子鼓鼓的，非常好吃！快来钓鱼吧！



期待在冬天的傍晚能钓到一条大鲈鱼。



冬天也有人在堤坝上钓比目鱼。



钓比目鱼时有时会钓上来不少六线鱼。

投钓鱼类图解

▶ 少鳞鲷

属鲈鱼目，鲷科鱼。

分布于日本北海道以南各地，全年都可以投钓，是投钓中很有代表性的一种鱼。再加上此鱼味道鲜美，很受欢迎！最长的可达35厘米。



▲ 鼠鲷鱼

属鲈鱼目。

在关东地区被叫做雌鲷，很美味。最长的可达35厘米左右。



▲ 黑尾龙鱼

属鲈鱼目。

和鼠鲷相同，钓少鳞鲷时经常会钓上钩，在关东一带被叫做雌鲷，和鼠鲷的叫法一样，很容易混淆。非常好吃，带回家吃的人很多。



▲ 斜棘鱼

属鲈鱼目。

有一种奇怪的臭味，放入冷藏箱时味道不能散去，所以即使上钩还是让它逃掉比较好。



▲ 黄姑鱼

属鲈鱼目，石首鱼科。

分布在东北以南地区，渔民们称它们为白黄花鱼或白姑鱼。白黄花鱼比较大，最大的有65厘米左右。

▲ 白黄花鱼

属鲈鱼目，石首鱼科。

分布在东北以南地区。白黄花鱼和白姑鱼外形近似，容易混淆，但是通过观察鳃盖上有没有黑色斑点是可以区分的，最大的有35厘米左右。



▲ 石鲽

属鲽科海水鱼。

在东北、北陆、濑户内海等地区会钓出很大的石鲽，最长的可达80厘米，身体表面没有鱼鳞，有眼一边的背鳍和腹鳍边缘均有坚硬状不规则的石骨数块。



▲ 母母鲽

属鲽科海水鱼。

主要分布在骏河湾（译注：日本本州岛东南岸海湾。湾口东西约50公里，静冈县西的御前崎与伊豆半岛南端的石廊崎之间）以北太平洋沿岸和日本海。体形呈长椭圆形，嘴较小，身体表面有大量的黏液。多在泥沙底和有岩石暗礁的海域活动。最长的可达70厘米。



▲ 黄盖鲽

属鲽科海水鱼。

分布在北海道以南，日本人熟知的比目鱼，非常美味！最长的有60厘米。





▲ 六线鱼

属葛鲉目，六线鱼科。

大量生存于从北海道到九州较浅的岩礁一带。身体呈茶褐色和红褐色，产卵期的雄性会变成黄色。最长可达60厘米。



▲ 单线六线鱼

和六线鱼外形非常近似，通过尾部明显的圆形纹理可以区分，最主要的是，六线鱼身体侧面有五条线，而单线六线鱼只有一条线。单线六线鱼最大可达到30厘米。



▲ 真沙鱼

属鲈鱼目。

一年中都会有的鱼，渔民经常捕捉20厘米左右的小鱼，养一个冬天后就会变得很大。



▲ 丝背细鳞鲈

属革鲈科。

剥掉坚硬的皮才可以煮，因此俗名“剥皮鱼”，小小的嘴精巧灵敏，捕捉食物的速度很快，被叫做觅食高手。最大的有40厘米左右。



▲ 黑鲷

属鲈鱼目，鲷科。

黑鲷的警惕性比较高，最好还是在晚上钓鱼。最长的可达65厘米。



▲ 红鲷鱼

属鲈鱼目，鲷科。

外形和颜色非常漂亮，再加上味道鲜美，很受人们欢迎，最长的可达到1米，但是一般能钓上来的是30~60厘米左右。



▲ 黄鳍鲷

书鲈鱼目，鲷科。

和黑鲷外形非常相似，可通过鱼尾边缘的黄色和鱼鳞大小来区别，最长的有50厘米。

投钓鱼类图解



▲ 远东多线鱼

属葛鲆目，六线鱼科。

集中分布在对马海峡以北的日本海沿岸和茨城县以北的太平洋沿岸。不同于六线鱼是底栖鱼，而是在海底与海面间来回游动。最长的有60厘米。



▲ 印度鲆

属葛鲆目。

习惯生活在海岸边较浅的泥沙地。初夏的产卵期过了以后是最活跃的时期。最长的有75厘米。



▲ 杜父鱼

属葛鲆目，杜父科。

主要分布在东北、北海道地区，因为非常美味，所以在北海道相当有人气。最长的杜父鱼有70厘米。



▲ 鲈鱼

属鲈鱼目，鲈鱼科。

不是伴随着成长幼鲈鱼，鳃盖上有尖锐的小刀状的物体，投钓的时候一定要注意。最大的有1米左右。



▲ 牙鲆

牙鲆科海水鱼。

体形和比目鱼很相似，只是眼睛的位置刚好相反，牙齿锋利，看起来很凶猛。最长的有1米左右。



▲ 许氏平鲈

属鲈形目，斑点鲈科。

颜色各不相同，有的身体上有褐状物，有的身体上有黑色斑点。是北方的鱼，生长在太平洋沿岸和东京湾。最长的有50厘米左右。



▲ 星斑裸颊鲷

属鲈鱼目，裸颊鲷科，箭柄鱼。

箭柄鱼有很多伙伴，但主要的就数星斑裸颊鲷了。体形比较大，投钓具有挑战性，因此很受欢迎。主要生活在千叶县以南。最长的有90厘米左右。



▲ 胡椒鲈

属鲈鱼目，石鲈科海水鱼。

数量很少的缘故，要专门去伊豆群岛、纪伊半岛等区域才能钓到。一般是钓箭柄鱼时偶尔会钓上来几条，最长的有70厘米左右。

▲ 厚头平鲈

属鲈形目，鲈科海水鱼。

生存于北海道南部以南较浅的岩礁地带的卵胎鱼，钓葛鲆时经常会混在一起，最大的有35厘米左右。



▲ 葛鲂

属鲂形目，斑点鲂科。

生存于日本海沿岸的岩礁一带，颜色各不相同。属于卵胎鱼，最长的有40厘米左右。



▲ 七带石斑鱼

属鲈鱼目，石斑鱼科。

生长于东日本以南的岩礁一带。小鱼身体上有7条很清晰的纹路，伴随着成长条纹会变淡，最长的有1米左右。



▲ 长蛇鳗

狗母鱼科，星蛇鳗属。

在日本多生长于濑户内海。最大体长为50厘米。



▲ 金线鱼

属鳗鲡目，金线鱼科，鲂鲱属。

成长在本州中部以南，粉色的鱼身上有8条黄色的花纹，上尾鳍有一条细长的线状体。最大体长在50厘米左右。



▲ 日本红方头鱼

属鳗鲡目，方头鱼科。

生长于本州中部以南。虽然鳗鲡目的鱼类有很多，但是属日本红方头鱼最容易投钓。最大体长有55厘米左右。



▲ 隆头鱼

属鲈鱼目，濑鱼科。

濑鱼是最美味的，尤其在关西、濑户一带很有人气。雌鱼和雄鱼的颜色不同，雄鱼被叫做青濑鱼，雌鱼被叫做红濑鱼。多生存于沙丘地带。



▲ 西氏拟隆头鱼

属鲈鱼目，濑鱼科。

生活在岩礁一带的濑鱼的伙伴，是九州地区主要的食用鱼，很受欢迎。



▲ 康吉鳗

属鳗鲡目，康吉鳗科。

主要生存于东日本以南的岩礁地带，是康吉鱼中体形最大的，最长的可以达到1米左右。



▲ 星康吉鳗

属鳗鲡目，康吉鳗科。

生长于北海道以南沿岸的泥沙深处。被认为是康吉鳗科中最美味的一种。为了一尝它的美味，很多人专门到栖息地去捕食它们。身体侧线呈白色。最大的体长在60厘米左右。

▲ 魴鲱

属鲂形目，魴鲱科。

经常被用作少鳞鳕和丝背细鳞河豚鱼的诱饵。新鲜成年魴鲱的鱼肚部分味道不错。最大体长有55厘米左右。

投钓鱼类图解



▲ 条石鲷

属鰩目，石鲷科。

生长于北海道南部以南。幼鱼的体侧有明显可见的黑色横带。用作丝背细鳞豚的诱饵时，能钓到罕见的30厘米的细鳞豚。最大的体长有80厘米左右。



▲ 虎鯊

属鰩目，虎鯊科。

分布于关东以南地区，生长于冲目的泥沙地中，冬天特别容易投钓。虽然长相有点奇怪，但是油炸后很美味。



▲ 斑石鲷

属鰩目，石鲷科。

和石鲷相比，生长地偏南，在本州中部以南。幼鱼身上有明显的石垣状的斑纹，成年后消失。最大的体长有80厘米左右。



▲ 颈带鰩

属鰩目，颈带鰩科。

用少鳞鳉做诱饵很容易钓上来。它的嘴的特殊结构利于它们捕食沙土中的小虾。体表带有黏液。



▲ 虾虎鱼

属鰩目，虾虎鱼科属。

比起黄鳍刺鲀虎鱼，虾虎鱼存在于海水和河口栖息地。它们的体长多在10厘米左右，最长15厘米左右。



▲ 日本须鰩

为舌鰩科须鰩属的鱼类。

俗称日本樱唇牛舌鱼、三线牛舌鱼。用其做诱饵可以钓少鳞鳉。最大体长为35厘米。



▲ 鰻鲇

鲇目鰻鲇科。

在夜间或在浑浊的湖里容易投钓。在第一个背鳍上和胸鳍上长有带毒的刺，如果不小心被它刺中，会感到剧烈的疼痛，但鰻鲇却是美味的菜肴。



▲ 草河豚

河豚目河豚科虎河豚属。

因为草河豚带有河豚毒素，所以外行绝对不能轻易用它做菜。河豚的牙齿锋利尖锐，成年草河豚具有一定的危险性。



▲ 环纹衰鰩

衰鰩目斑点圆鳞鲷科环纹衰鰩属。

在鳍上的刺里长有毒腺，毒性很强，外行不要轻易用它做菜。



▲ 赤魟

软骨鱼纲魟目赤魟科。

在它长长的尾巴上长有毒刺。这种鱼夜间投钓很容易上钩。



▲ 红鳍赤鲷

鳊鲷目红鳍赤鲷科。

虽然身长不过5-8厘米，但是背鳍却携带有毒液。即使死后身体仍然有毒，所以不要随便丢弃。



▲ 海鳊

鰩目海鳊科。

在夜间比较容易投钓，如果放上鱼诱饵，就更容易投钓了。因为海鳊有锋利的牙齿，所以有时候能够咬断钓鱼线逃之夭夭。



▲ 海毛虫

环节动物门多毛纲海毛虫科。

在入江处的深水处，放一根竹竿，就会有海毛虫“上钩”。但是有时候它也能咬断钓鱼线逃之夭夭。

004 投钓的四季

012 投钓鱼类图解

第一章

017 投钓的基本知识

018 投钓的基本装备

022 选择投竿的方法

026 卷轴的选择方法

030 钓箱的选择方法

032 其它渔具

036 投钓钓组的设计图

038 鱼线的选择方法



042 关于头线

044 钓组的基本式样

048 钓组的基本结构

054 连接钓钩、鱼线等部件的打结方法

062 掌握基本的抛竿姿势

072 关于天气和潮汐的基础知识

078 投钓使用的鱼饵种类

