



国家执业医师资格考试



直通车系列

2017

中西医结合执业医师资格考试 考点难点解析

主编 刘春莹 马艳芳

- ▶ **高含金量** 高频考点全覆盖，含历年真题
- ▶ **高针对性** 常见考点难点深度剖析
- ▶ **高附加值** 赠送《考试宝典》体验卡
- ▶ **高含金量+高针对性+高附加值=高通过率**

中国医药科技出版社

国家执业医师资格考试直通车系列

前言

2017

中西医结合执业医师资格 考试考点难点解析

主 编 刘春莹 马艳芳

编 委 (按姓氏笔画排序)

冯露夷 刘 锋 李文瑶

邹美萍 张登梅 陈磊鑫

贺果平 梁轶群 澹台佳梅

组织者 覃丽洁 杨丽芬

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书由相关专业老师严格按照实际考试的题型分布进行编写,能够有效地帮助考生考前自测、考查和反馈复习成果,对考生应试有较强的针对性和指导性,帮助考生尽快理解、掌握知识点和举一反三,可帮助广大考生做好考前复习。

图书在版编目(CIP)数据

2017 中西医结合执业医师资格考试考点难点解析/刘春莹,马艳芳主编. —北京:中国医药科技出版社,2017.3

(国家执业医师资格考试直通车系列)

ISBN 978-7-5067-8378-1

I. ①2… II. ①刘… ②马… III. ①中西医结合-资格考试-自学参考资料 IV. ①R2-031

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 070008 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889×1194mm^{1/16}

印张 17^{3/4}

字数 495 千字

版次 2017 年 3 月第 1 版

印次 2017 年 3 月第 1 次印刷

印刷 北京市密东印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-8378-1

定价 38.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话:010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



前 言

医师资格考试是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的考试。医师资格考试包括实践技能和医学综合笔试两部分。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，特组织有关专业教师编写了《2017 中西医结合执业医师资格考试考点难点解析》。《2017 中西医结合执业医师资格考试考点难点解析》严格按照实际考试的题型分布进行编写，能够有效地帮助考生考前自测、考查和反馈复习成果，对考生应试有较强的针对性和指导性。本书依托于考试大纲、历年常考知识点、重点难点进行选题，每道试题都有详细的解析，全面的分析考点、答题思路和方法，帮助考生尽快理解、掌握知识点和举一反三。特别是本书包含了部分历年真题中的重点、难点试题，对考生应试有较强的针对性和指导性。

本书亮点：

1. 专业的编写团队。编写专家组成员由在高校和医院任职的一线教师和一线医护人员组成，对医师考试有着长达十几年的教学、培训和研究经验。其中特别感谢陕西中医药大学及广西科技大学等单位的各位老师。

2. 试题的含金量高。紧扣考试大纲，精选历年常考知识点、重点、难点。还包含历年真题、冲刺试题。

3. 解析全面详细、举一反三。

4. 网络增值服务赠送《考试宝典》体验卡。更多试题、讲解视频免费听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活、免费使用。

最后预祝各位考生在本“直通车系列”保驾护航下，顺利通过考试。

编 者

2017 年 1 月

目 录

第一章 传染病学	1
第二章 方剂学	8
第三章 卫生法规	29
第四章 药理学	45
第五章 医学伦理学	53
第六章 针灸学	59
第七章 诊断学基础	67
第八章 中西医结合儿科学	74
第九章 中西医结合妇产科学	80
第十章 中西医结合内科学	108
第十一章 中西医结合外科学	132
第十二章 中药学	156
第十三章 中医基础理论	188
第十四章 中医诊断学	246

第一章 传染病学

一、A1/A2 型题

1. 目前对传染病预防起关键作用的是

- A. 预防接种
- B. 锻炼身体
- C. 注射丙种球蛋白
- D. 预防服药
- E. 加强营养

2. 下列病原携带状态, 属健康病原携带的是

- A. 发生于显性感染之后
- B. 发生于临床症状出现之前
- C. 发生于隐性感染之后
- D. 发生于潜伏性感染之后
- E. 发生于潜伏期之后

3. 下列有关重型肝炎的描述, 正确的是

- A. 急性重型肝炎和亚急性重型肝炎的主要区别是后者肝性脑病出现较早
- B. 急性重型肝炎的病程一般不超过 14 天
- C. 重型肝炎的病死率一般不高
- D. 在我国以 HBV 感染所致重型肝炎最常见
- E. 慢性重型肝炎是指重型肝炎的病程超过 24 周

4. 下列各项, 不属于流感特点的是

- A. 飞沫传播
- B. 潜伏期短
- C. 传染性强
- D. 传播迅速
- E. 夏秋季多见

5. 下列关于流感临床表现的叙述, 不正确的是

- A. 起病急骤
- B. 体温可高达 $39 \sim 40^{\circ}\text{C}$
- C. 以全身中毒症状为主
- D. 咳嗽、咽痛等呼吸道症状严重
- E. 少数有呕吐、腹泻等消化道症状

6. 人感染高致病性禽流感主要是指

- A. H5N1 感染
- B. H1N1 感染
- C. H9N2 感染
- D. H3N2 感染

E. H7N3 感染

7. 下列各项, 考虑为人禽流感疑似病例的是

- A. 1 周内流行病学接触史, 出现流感样症状
- B. 有流行病学史和临床表现, 呼吸道分泌物标本采用甲型流感病毒和 H5 型单克隆抗体抗原检测阳性者
- C. 有流行病学史和临床表现, 呼吸道分泌物标本中分离出特定病毒
- D. 无流行病学史, 有临床表现, 急性期和恢复期双份血清抗禽流感病毒抗体滴度 4 倍以上升高
- E. 有流行病学史和临床表现, 呼吸道分泌物标本检测到禽流感病毒基因

8. 下列药物, 对预防人禽流感病情恶化有较高价值的是

- A. 干扰素
- B. 奥司他韦
- C. 利巴韦林
- D. 阿司匹林
- E. 金刚烷胺

9. 下列关于治疗 SARS 使用糖皮质激素的叙述, 不正确的是

- A. X 线胸片示大片阴影并在 48 小时之内病灶面积增大 $>50\%$ 且在正位胸片上病灶面积占双肺总面积的 $1/4$ 以上
- B. 中毒症状重, 持续发热, 经对症治疗 3 天以上, 体温仍超过 38°C
- C. 目的在于抑制异常的免疫病理反应, 减轻肺的渗出及损伤
- D. 达到急性肺损伤的诊断标准
- E. 出现 ARDS

10. 下列抗病毒药物不属于艾滋病治疗的是

- A. 齐多夫定
- B. 双脱氧胞苷
- C. 双脱氧肌苷
- D. 阿糖胞苷
- E. 拉米夫定

11. 下述几项中,不是艾滋病主要传播途径的是

- A. 注射及输血和血制品
- B. 消化道
- C. 母婴传播
- D. 性接触
- E. 器官移植

12. 下列几项中,不是流行性出血热临床特点的是

- A. 出血性皮疹
- B. 眼眶痛
- C. 杨梅舌
- D. 热退后病情加重
- E. 腰痛

13. 下列关于狂犬病毒抵抗力的叙述,正确的是

- A. 耐热
- B. 不耐寒
- C. 易被紫外线灭活
- D. 40℃1 小时可灭活
- E. 甲醛不易将其灭活

14. 下列病理变化,为狂犬病特有的且有诊断价值的是

- A. 急性弥漫性脑脊髓炎
- B. 脑实质和脊髓充血
- C. 脑实质和脊髓水肿
- D. 脑实质和脊髓微小出血灶
- E. 脑神经细胞浆中见内基小体

15. 下列关于乙脑流行病学的叙述,不正确的是

- A. 为自然疫源性疾病
- B. 患者为主要传染源
- C. 主要通过蚊虫叮咬传播
- D. 猪的感染率高
- E. 蝙蝠为储存宿主

16. 乙脑最常见和最早出现的症状是

- A. 瘫痪
- B. 抽搐
- C. 呕吐
- D. 头痛
- E. 颈项强直

17. 下列治疗乙脑的措施中,不正确的是

- A. 高热者积极使用发汗药降温
- B. 缺氧者鼻导管或面罩给氧
- C. 脑水肿者应用脱水剂降颅压
- D. 抽搐者使用地西洋镇静

E. 微循环障碍者用东莨菪碱扩张血管

18. 患者,男性,30 岁。因发热、乏力、恶心、食欲减退 10 天来诊。查体:皮肤、巩膜黄染,肝右肋下 1cm,脾左肋下可及。WBC $5.0 \times 10^9/L$, N 0.48, L 0.50, Hb 130g/L, 血清总胆红素 $102 \mu\text{mol/L}$, 直接胆红素 $70.4 \mu\text{mol/L}$, ALT 1320U/L, ALP 102U/L。最可能的诊断是

- A. 淤胆型肝炎
- B. 伤寒
- C. 急性黄疸型肝炎
- D. 急性重型肝炎
- E. 慢性肝炎

19. 某小学饮用水污染造成“肝炎”暴发,最可能的诊断是

- A. 甲型肝炎
- B. 乙型肝炎
- C. 丙型肝炎
- D. 庚型肝炎
- E. 丁型肝炎

20. 患者,男性,45 岁,北京某医院呼吸科医生。2003 年 4 月初在救治不明原因肺炎患者 4 日后出现发热,体温 38.8℃,周身酸痛,实验室检查血 WBC $4.5 \times 10^9/L$, 胸片示两肺无明显异常。最适合的诊断是

- A. SARS 疑似病例
- B. SARS 临床诊断病例
- C. SARS 医学观察病例
- D. SARS 确定诊断病例
- E. 上呼吸道感染

21. 患者,女性,30 岁。农民。突起畏寒、发热、周身酸痛 5 日,于春节期间来诊,伴恶心、呕吐,近 2 日解小便时泡沫很多。查体:体温 39.6℃,眼睑浮肿,左腋下可见搔抓样出血痕,右腋下有点状出血。血象:WBC $34 \times 10^9/L$, Hb 160/L, 异型淋巴细胞 0.16, N 0.60, L 0.20, PLT $90 \times 10^9/L$, ALT 112U/L。最可能的诊断是

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 流行性出血热
- D. 传染性单核细胞增多症
- E. 急性病毒性肝炎

22. 患者,女性,30 岁,农民。高热、周身疼痛起病,病后第 7 天死于顽固性休克,经尸体解剖发现垂体前叶明显充血、出血、坏死,肾脏肿大,

间质极度水肿、充血，全身小血管内皮细胞肿胀，以后腹膜、纵隔水肿为主要损害。根据尸解所见诊断为

- A. 败血症
- B. 流行性出血热
- C. 暴发型流脑
- D. 中毒型菌痢
- E. 急性重型肝炎

23. 流脑的主要传播途径是

- A. 生活密切接触
- B. 蚊虫叮咬
- C. 消化道
- D. 呼吸道
- E. 输血或血液制品

24. 下列有关伤寒肥达反应的描述，正确的是

- A. 只要阳性就有明确诊断价值
- B. 阴性结果即可除外伤寒
- C. 可根据 O 抗体效价的不同区别伤寒或副伤寒
- D. H 抗体出现较早，消失快，更有利于诊断
- E. 只有 O 抗体效价的升高可能是早期

25. 伤寒的典型临床表现是

- A. 长期弛张热，肝脾不大，外周血白细胞、中性粒细胞升高，肥达反应阳性
- B. 长期低热，肝脾肿大，周围血象不高，肥达反应阳性
- C. 长期稽留高热，肝脾肿大，外周血白细胞不高，肥达反应阳性
- D. 长期间歇寒战、高热，肝脾肿大，外周血白细胞正常，贫血，肥达反应阳性
- E. 长期间歇高热，肝脾肿大，全血细胞减少，消化道出血，肥达反应阳性

26. 下列各项，不属于急性菌痢典型表现的是

- A. 里急后重
- B. 发热
- C. 黏液便
- D. 腹痛
- E. 呕吐

27. 霍乱的典型临床表现是

- A. 只泻不吐
- B. 先吐后泻
- C. 先泻后吐
- D. 吐泻同时发生
- E. 腹泻伴腹痛

28. 患儿，8 岁。春节期间因“上感”，注射青霉素 40 万 U，5 小时后出现高热，头痛，前胸有出血点，血压低。下列哪项诊断的可能性最大

- A. 青霉素过敏
- B. 菌痢

C. 流感

D. 流脑

E. 伤寒

29. 患者持续性发热 7 天，前胸有少量皮疹，最可能是

- A. 伤寒
- B. 流脑
- C. 药物疹
- D. 上呼吸道感染
- E. 猩红热

30. 患者，男性，30 岁。持续性发热 10 天，伴腹胀、腹泻入院，次日突然出现剧烈腹痛。查体：体温正常，血压 90/60mmHg，腹部压痛、反跳痛明显，肝浊音界消失。血 WBC $3.50 \times 10^9/L$ ，N 0.86，L 0.18，肥达反应“O”抗体效价 1:160，“H”抗体效价 1:320。其诊断是

- A. 中毒型菌痢
- B. 伤寒并发肠穿孔
- C. 肠结核并发结核性腹膜炎
- D. 胃溃疡穿孔
- E. 胆囊炎胆囊穿孔

31. 患儿，5 岁。8 月中旬来诊。高热 10 小时，抽搐 2 小时，呕吐 1 次，体温 40℃，血压 50/20mmHg，昏睡状，面色苍白，四肢紧张，肢冷，腱反射亢进，皮肤有“花纹”。血 WBC $16 \times 10^9/L$ ，N 0.90，L 0.10，粪便镜检：WBC 2~8/HP。应首先考虑

- A. 中毒型菌痢
- B. 流行性乙型脑炎
- C. 中毒型肺炎
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 中暑

32. 患者，男性，18 岁。暑假到海边旅游，返校后次日，突起腹泻，一天 20 余次，无明显腹痛。查体：体温 36.5℃，血压 75/50mmHg。大便镜检：水样便，未发现红白细胞。首先应做哪项检查以协助诊断

- A. 大便涂片染色检查
- B. 大便悬滴及培养检查
- C. 血培养
- D. 大便培养
- E. 血常规检查

33. 救治伴有休克的霍乱患者最关键的措施是

- A. 根据脱水程度快速静脉输注生理盐水等液体
- B. 静脉输注低分子右旋糖酐以扩充血容量

- C. 使用升压药提升血压纠正休克
- D. 使用利尿药防止肾功能不全
- E. 应用糖皮质激素及抗生素治疗

34. 有关医院感染的描述, 错误的是

- A. 有部分医院感染的发生与消毒隔离缺陷有关
- B. 标准预防是防控医院感染的重要措施
- C. 洗手是预防医院感染的重要措施
- D. 所有医院感染是可以预防的
- E. 新生儿经产道获得的感染属医院感染

二、B 型题

(35~36 题共用备选答案)

- A. IgD
- B. IgA
- C. IgE
- D. IgM
- E. IgG

35. 感染过程中首先出现, 常为近期感染标志的抗体是

36. 常在传染病恢复期出现, 持续时间较长的抗体是

(37~38 题共用备选答案)

- A. 隔离患者
- B. 隔离密切接触者
- C. 开窗通风
- D. 搞好“三管一灭”
- E. 注射疫苗

37. 流感的最佳预防措施是

38. 细菌性痢疾的最佳预防措施是

(39~40 题共用备选答案)

- A. 虫媒传播
- B. 疫水传播
- C. 飞沫传播
- D. 食物传播
- E. 直接接触传播

39. 细菌性痢疾主要经

40. SARS 主要经

(41~42 题共用备选答案)

- A. 伤口部位有麻木、刺痛或虫爬感
- B. 恐水、怕风
- C. 大汗、流涎

D. 肢体软瘫

E. 头痛、乏力、纳差

41. 上述各项狂犬病临床表现, 属病毒刺激周围神经元引起的是

42. 上述各项狂犬病临床表现, 属自主神经功能亢进的是

(43~44 题共用备选答案)

- A. 中毒型菌痢
- B. 慢性菌痢急性发作型
- C. 急性菌痢轻型
- D. 急性菌痢普通型
- E. 慢性菌痢隐匿型

43. 急起发热, 腹痛, 腹泻, 脓血便, 可诊断为

44. 突起高热, 面色青灰, 出冷汗及脉细数, 尿少, 可诊断为

答案与解析

一、A1/A2 型题

1. A. 对传染病的预防有管理传染病、切断传染源、保护易感人群, 增强特异性免疫力。人体可通过隐性感染、显性感染或预防接种获得对该种传染病的特异性免疫力。其中以预防接种起关键作用。

2. C. 健康病原携带者: 指过去从未患过某种传染病而能排出某病原体的人, 多为隐性感染的结果, 一般只能用实验方法证实, 但隐性感染不一定均能成为健康病原携带者。此型携带者一般排出病原体量较少, 持续时间短。

3. D. 急性重型肝炎肝性脑病出现较早。故 A 错误。急性重型肝炎病程 2 周内出现极度乏力, 明显消化道症状。故 B 错误。急性重型肝炎病死率为 50%~70%, 亚急性重型肝炎病死率 80% 以上, 故 C 错误。在我国以 HBV 或 HBV 合并 HDV 感染引起的多见, 故 D 正确。慢性重型肝炎在慢性肝病的基础上发病。故 E 错误。

4. E. 流感特点为飞沫传播、潜伏期短、传染性强、传播迅速, 一般发生于冬季。故本题选 E。

5. D. 本题主要考流感的临床表现。单纯性流感最常见, 骤起畏寒、发热, 体温可达 39℃~40℃, 头

痛全身酸痛、咽干、乏力及食欲减退等全身症状明显；咳嗽、流涕、鼻塞、咽痛等呼吸道症状较轻；少数患者有恶心呕吐、腹泻、腹痛等消化道症状。D选项错误，故本题选D。

6. A。根据致病性，禽流感病毒可分为高致病性、低致病性和非致病性三大类，其中H5和H7亚型为高致病型，又以H5N1亚型致病性最强。目前感染人类的禽流感病毒亚型主要有H5N1、H9N2、H7N7，其中感染H5N1亚型患者病情重，病死率高。

7. B。人禽流感疑似病例诊断标准是有流行病学史和临床表现，呼吸道分泌物标本检出甲型流感病毒和H5型单克隆抗体抗原检测阳性者。因病原学检查仅是抗原阳性而非特定甲型H5N1病毒阳性，故诊断为人禽流感疑似病例。

8. B。WHO在2006年颁布的《关于人感染禽流感病毒(H5N1)的药物学管理的快速建议指南》中认为，对确诊或高度怀疑的患者给予奥司他韦治疗，具有较高的预防疾病恶化的价值。故本题选B。

9. B。本题主要考SARS糖皮质激素的使用。
①有严重的中毒症状，持续高热不退，经对症治疗5天最高体温仍超过39℃；
②X线胸片显示多发或大片阴影，发展迅速，48小时之内病灶面积增大>50%且在正位胸片上占双肺总面积的1/4以上；
③达到急性肺损伤或ARDS的诊断标准。目的在于抑制异常的免疫病理反应，减轻肺的渗出及损伤。故本题选B。

10. D。抗艾滋病毒的药物主要有核苷类和非核苷类逆转录酶抑制剂等。阿糖胞苷为DNA合成酶抑制剂，而艾滋病毒为RNA病毒，复制过程不需要DNA酶的参与，故对其不起作用。

11. B。艾滋病的传播途径有性接触传播、血源传播、母婴传播、其他途径（接受HIV感染者的人工授精、医务人员被HIV污染的针头刺伤或皮肤破损处受污染等）。故本题选B。

12. C。本题主要考流行性出血热临床特点。发热期：典型三痛：头痛、腰痛、眼眶痛。少数患者有出血性皮肤病。低血压休克期热退后病情反而加重。除C选项其余均为流行性出血热的特点，故本题选C。

13. C。狂犬病毒易被紫外线、甲醛、70%乙醇、汞和季胺类化合物（如苯扎溴铵）等灭活。不耐热，40℃ 4小时、60℃ 30分钟可灭活。在冰冻干

燥条件下可保存数年。故本题选C。

14. E。内基小体为病毒集落，是狂犬病特异且具有诊断价值的病变。故本题选E。

15. B。人感染后病毒血症期短暂，血中病毒含量少，故人不是主要的传染源。猪的感染率高，感染后血中病毒含量多，病毒血症期长，且猪的饲养范围广，更新快，故猪是本病主要的传染源。

16. D。头痛是乙脑最常见和最早出现的症状，疼痛不定。故本题选D。

17. A。对高热病人以物理降温为主，药物降温为辅，同时降低室温，使肛温控制在38℃左右。若使用过量退热药物易致大量出汗而引起虚脱，加重病情。

18. C。发病10天，在急性期内，故可排除慢性肝炎的诊断，血清总胆红素102μmol/L，结合胆红素70.4μmol/L，ALT 1320U/L，均显著升高提示为黄疸性肝炎。由于ALP 102U/L正常，故可排除淤胆型肝炎的诊断。

19. A。本题主要考各型肝炎的传播途径。甲型肝炎：经口进入体内，经消化道进入血流，主要侵犯肝脏。乙型肝炎：感染肝细胞并在其中复制，一般认为并不直接引起肝细胞病变。丙型肝炎：肝细胞损伤可能是HCV的直接杀伤作用及感染HCV后诱发机体免疫反应等共同导致。丁型肝炎：HDV对肝细胞具有直接致病性，同时免疫机制也参与HDV导致的肝损伤。戊型肝炎：HEV经口进入肠道，经门静脉侵入肝脏。庚型肝炎：经血液传播、母婴垂直传播、医源性传播、性接触等。故本题选A。

20. A。SARS临床表现为以高热为首发和主要症状，体温一般高于38℃。常呈持续性高热，可伴有畏寒、肌肉及关节酸痛、头痛、乏力。多数患者血细胞计数正常或下降，淋巴细胞计数绝对值减少，部分病例血小板减少。X线胸片检查肺部阴影在发病第2天可出现，平均在4天时出现，95%患者在病程7天内出现肺部影响改变。分析本题的主要临床表现及实验室检查，对于有流行病学依据，有临床症状，但尚无肺部X线影像学变化者，也应作为疑似病例。对此类病例，需动态复查X线胸片或胸部CT，一旦肺部病变出现，在排除其他疾病的前提下，可以做出临床诊断。

21. C。流行性出血热早期临床表现为，①发热：38~40度，持续3~7天，一周以上也不少见。②胃肠道症状：食欲不振、恶心、呕吐、腹痛，少

数有腹泻。③三痛：头痛、腰痛、眼眶痛。④三红：颜面、颈部及上胸部皮肤充血潮红。眼结膜、眼睑水肿和面部浮肿。⑤出血：口内软腭、咽部及眼结膜出血，腋下、胸背部皮下出血，形如搔抓样。⑥肾损伤：出现蛋白尿、管型尿和血尿，肾功能下降。⑦验血异常：白细胞总数升高，淋巴细胞增多或出现异常淋巴细胞，血小板减少明显。根据题中患者症状、体征及实验室检查可诊断为流行性出血热。故本题选 C。

22. B. 流行性出血热的基本病理变化是全身小血管（包括小动脉，小静脉和毛细血管），广泛性损害，血管壁内皮细胞肿胀、变性，重者管壁可发生纤维蛋白样坏死和破裂等，内脏毛细血管高度扩张，瘀血，管腔内可见血栓形成，引起各组织、器官的充血、出血、变性，甚至坏死，肾脏、脑垂体前叶、肾上腺皮质、右心房内膜、皮肤等处病变尤为显著。根据题中关键词应为流行性出血热。

23. D. 流脑主要传播途径是通过咳嗽、喷嚏、说话等飞沫借空气经呼吸道传播。故本题选 D。

24. E. 伤寒的肥达反应使用的抗原为伤寒菌体（O）抗原、鞭毛（H）抗原和甲、乙副伤寒 H 抗原，不包含 Vi 抗原。需注意：①某些非伤寒性疾病如败血症可呈假阳性；②早期用抗菌药或有免疫缺陷，抗体效价可能不高。③仅 O 抗体效价高可能是伤寒早期反应。故本题选 E。

25. C. 伤寒的典型临床表现。持续性高热，多为稽留热型。消化系统表现：食欲不振，腹部不适或腹胀、便秘或腹泻，可有便血、腹部压痛以右下腹明显。神经系统表现：与病情轻重成正比，呈特殊的面容、表情淡漠、反应迟钝、听力减退等。循环系统表现：可有相对缓脉、重脉等。肝脾大，皮疹等。实验室检查白细胞计数减少或正常。血清学检查肥大反应阳性。故本题选 C。

26. E. 急性痢疾典型症状表现为起病急，有发热（体温高达 39℃ 或更高），腹痛、腹泻、里急后重、黏液或脓血便，并有头痛、乏力、食欲减退等全身中毒症状。综上所述，E 选项不属于急性菌痢症状。

27. C. 霍乱典型临床表现。吐泻期多以剧烈腹泻开始，呕吐多在腹泻数次后出现，呈喷射状，呕吐物初为胃内容物，后为水样。故本题选 C。

28. D. 流脑主要临床表现：前驱期（上呼吸道感染期）为 1~2 天，可有低热、咽痛、咳嗽等上

呼吸道感染症状。多数病人无此期表现。败血症期突发或前驱期后突然寒战、高热、伴头痛、肌肉酸痛、食欲减退及精神萎靡等毒血症症状。幼儿则有哭闹不安、因皮肤感觉过敏而拒抱，以及惊厥等。少数病人有关节痛、脾肿大。此期的特征性表现是皮疹，通常为瘀点或瘀斑，70%~90% 病人有皮肤或黏膜瘀斑点或瘀斑，直径 1mm~2cm，开始为鲜红色，后为紫红色，最早见于眼结膜和口腔黏膜，大小不一，多少不等，分布不均，以肩、肘、臀等易受压处多见，色泽鲜红，后变为紫红。严重者瘀斑迅速扩大，其中央因血栓形成而出现紫黑色坏死或形成大疱，如坏死累及皮下组织可留瘢痕。多数患者 12~24 小时发展致脑膜炎期。根据题中所提因“上感”，注射青霉素 40 万 U，5 小时后出现高热，头痛，前胸有出血点，血压低。提示为流脑。

29. A. 伤寒典型临床表现有持续性高热达 39℃~40℃。一般持续 10~14 天，部分患者于病程第 6~12 日皮肤出现暗红色小斑丘疹，称为玫瑰疹，散在分布于前胸和上腹部。根据题中提示患者持续性发热 7 天，前胸有少量皮疹。所以患者最有可能得的是伤寒。

30. B. 根据题中所提：患者腹胀、腹泻后出现剧烈腹痛，腹部压痛、反跳痛明显，肝浊音界消失。属于肠穿孔症状。肥达反应“O”抗体效价 1:160，“H”抗体效价 1:320 可诊断为伤寒。故本题选 B。

31. A. 根据题中所提，患儿，高热、抽搐、呕吐、血压 50/20mmHg，昏睡状，面色苍白，四肢紧张，肢冷，腱反射亢进，皮肤有“花纹”。均为中毒型菌痢典型症状，同时根据实验室检查：血 WBC $16 \times 10^9/L$ ，N 0.90，L 0.10，粪便镜检：WBC 2~8/HP。应首先考虑中毒型菌痢。

32. B. 根据该患者的表现：暑假到海边旅游，返校后次日，突起腹泻，一天 20 余次，无明显腹痛，查体：体温 36.5℃，血压 75/50mmHg。考虑有可能是霍乱弧菌感染，此时可以先做大便悬滴检查以协助诊断，将新鲜粪便做悬滴镜检，如果见到运动活泼呈穿梭状的弧菌，即为动力试验阳性，可以协助诊断。

33. A. 霍乱主要治疗措施为及时足量补液是治疗本病的关键。补液原则是早期、快速、足量、先盐后糖、先快后慢、纠酸补钙，见尿补钾。故本题选 A。

34. D。医院感染按其病原体的来源可分为内源性和外源性,外源性感染,亦称交叉感染或可预防性感染,这类感染通过现代的消毒、灭菌、隔离和屏障护理、无菌技术等措施的应用,基本上能达到有效地预防和控制。内源性感染也称自身感染或不可预防性感染。引起这类感染的微生物来自病人体内或体表的正常菌群或条件致病菌,包括虽从其他病人或周围环境中来的,但已在该病人身上定植的微生物。在平时定植于这些部位的正常菌群对宿主不致病,形成相互依存、相互制约的生态体系。但是,当病人健康状况不佳,抵抗力下降或免疫功能受损,以及抗生素的应用等因素,可导致菌群失调或使原有生态平衡失调,菌群移位(易位),从而引发感染。医院感染中的内源性感染是不可预防的,故D选项错误。

二、B型题

35~36. D E。特异性IgM型抗体的检出有助于近期感染的诊断。特异性IgG型抗体的检出,尤其是急性期和恢复期双份血清抗体效价增加4倍以上,才有助于诊断。故35题选D,36题选E。

37~38. E D。流感的最佳预防措施是接种流感疫苗。故37题选E。细菌性痢疾的最佳预防措施是切断传播途径,做好“三管一灭”(管好水源、食物和粪便,消灭苍蝇)。故38题选D。

39~40. D C。细菌性痢疾主要传播途径主要经粪-口途径传播。食物或饮用水被污染可引起爆发或流行。SARS的主要传播途径为近距离呼吸道飞

沫传播。故39题选D,40题选C。

41~42. A C。狂犬病病毒刺激周围神经元引起患者伤口部位及其附近有麻木、发痒、刺痛或虫爬、蚁走感。自主神经功能亢进患者出现大汗流涎。故41题选A,42题选C。

43~44. D A。①中毒型菌痢:突起高热,面色青灰,出冷汗及脉细数,尿少。②慢性菌痢急性发作型:其主要临床表现同急性典型菌痢,但程度轻,恢复不完全,一般是半年内有痢疾病史或复发史,而除外同群痢菌再感染,或异群痢菌或其他致腹泻细菌的感染。③急性菌痢轻型:体温正常或者稍高,腹痛不明显,腹泻每日3~5次,大便为黄色糊状或水样,带有少量黏液,里急后重也不明显,可有呕吐。④急性菌痢普通型:起病急,有中等度毒血症表现,见畏寒,发热,体温可高达39℃。发热的同时或数小时后,出现腹痛、腹泻等消化道症状,腹痛多为阵发性,位于脐周或左下腹部;腹泻每日10~20次或更多,大便初为水样,或黄色糊状,后粪质逐渐减少,待肠内容物排空后,转为黏液脓血便,每次量少,并伴有明显的里急后重,左下腹部有压痛,肠鸣音亢进。严重者发生脱水和代谢性酸中毒。⑤慢性菌痢隐匿型:慢性菌痢,有持续轻重不等的腹痛、腹泻、里急后重,排黏液脓血便的痢疾症状,病程超过两个月。慢性菌痢隐匿型指一年内有菌痢史,临床症状消失2个月以上,但粪培养可检出痢菌,乙状结肠镜检查可见肠黏膜病变。此型在流行病学上具有重要意义。综上所述,故43题选D,44题选A。

第二章

方剂学

一、A1/A2 型题

1. 下列各项中不属于消法的是
A. 活血化瘀 B. 消痞杀虫
C. 行气散滞 D. 通导大便
E. 化痰祛水
2. 九味羌活汤的功用是
A. 发汗祛湿、兼清里热
B. 解表散寒、温肺化饮
C. 发汗解表、兼清里热
D. 散寒祛湿、理气化痰
E. 发汗解表、散寒祛湿
3. 桂枝汤中具有调和营卫作用的配伍是
A. 桂枝、生姜 B. 生姜、大枣
C. 生姜、甘草 D. 桂枝、大枣
E. 生姜、芍药
4. 小青龙汤的功用是
A. 温肺化痰、止咳平喘
B. 宣肺降气、祛痰平喘
C. 解表散寒、温肺化饮
D. 温肺化痰、降气定喘
E. 解表化饮、降气平喘
5. 某患者素体气虚，近日见憎寒壮热而无汗，头项强痛，肢体酸痛，咳嗽有痰，胸膈痞满，舌苔白腻，脉重取无力。治疗应首选的方剂是
A. 九味羌活汤 B. 小青龙汤
C. 人参败毒散 D. 大秦艽汤
E. 大青龙汤
6. 患者热重寒轻，咳嗽咽痛，头痛口渴，舌尖红，苔薄白。治疗应首选的方剂是
A. 银翘散 B. 柴葛解肌汤
C. 大青龙汤 D. 桑菊饮
E. 清燥救肺汤
7. 不属于大承气汤主治证候的是
A. 腹痛便秘 B. 小便频数
C. 潮热谵语 D. 手足汗出
E. 下利清水
8. 功用为泻热通便、益气养血的方剂是
A. 温脾汤 B. 济川煎
C. 黄龙汤 D. 十枣汤
E. 麻子仁丸
9. 温脾汤中的组成药物除含有大黄、芒硝、甘草以外，其余的是
A. 附子、生姜、人参、当归
B. 干姜、生姜、人参、当归
C. 附子、干姜、人参、白芍
D. 干姜、生姜、人参、白芍
E. 附子、干姜、人参、当归
10. 升麻在济川煎中的配伍意义是
A. 润肠通便 B. 生津止渴
C. 清热解毒 D. 升举清阳
E. 解表透疹
11. 某患者，就诊症状为大便硬而不出，小便频数，苔薄黄，脉沉涩。治疗应首选的方剂是
A. 济川煎 B. 增液汤
C. 五仁丸 D. 麻子仁丸
E. 小承气汤
12. 某患者，出现大便秘结，脘腹胀满，硬痛拒按，身热口渴，谵语，口舌干燥，舌苔焦黄，神倦少气，脉虚。治疗应首选的方剂是
A. 大承气汤 B. 小承气汤
C. 黄龙汤 D. 调胃承气汤
E. 大黄牡丹汤
13. 蒿芩清胆汤的功效是
A. 透邪解郁、疏肝理脾

- B. 清胆利湿、和胃化痰
- C. 和解少阳、清胆利湿
- D. 清泻胆火、降逆止呕
- E. 和解少阳、和胃化痰

14. 逍遥散与柴胡疏肝散中均含有的药物是

- A. 柴胡、白芍
- B. 柴胡、当归
- C. 甘草、当归
- D. 川芎、白芍
- E. 柴胡、薄荷

15. 某患者，就诊症状为心烦喜呕，胸胁苦满，往来寒热，口苦咽干目眩。治疗应首选的方剂是

- A. 泻心汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 导赤散
- D. 小柴胡汤
- E. 清胃散

16. 患者寒热如疟，寒轻热重，口苦胸闷，吐酸苦水，甚则干呕呃逆，胸胁胀痛，舌红苔白，脉数而左弦右滑。治疗应首选的方剂是

- A. 小柴胡汤
- B. 大柴胡汤
- C. 左金丸
- D. 蒿芩清胆汤
- E. 柴葛解肌汤

17. 功用为清热解毒、凉血散瘀的方剂是

- A. 仙方活命饮
- B. 五味消毒饮
- C. 大黄牡丹汤
- D. 犀角地黄汤
- E. 黄连解毒汤

18. 下列各项中，不属于竹叶石膏汤组成药物的是

- A. 石膏、竹叶
- B. 人参、粳米
- C. 甘草、半夏
- D. 半夏、麦冬
- E. 知母、生地

19. 下列各项中，不属于当归六黄汤组成药物的是

- A. 黄芪、当归
- B. 生地、熟地
- C. 黄连、黄芩
- D. 栀子、牡蛎
- E. 黄柏、黄芩

20. 患者出现发热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，虚烦不眠，舌红少苔，脉虚数。治疗应首选的方剂是

- A. 竹叶石膏汤
- B. 清营汤

C. 白虎汤

D. 犀角地黄汤

E. 银翘散

21. 患者身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，脉数，舌绛而干。治疗应首选的方剂是

- A. 白虎汤
- B. 清营汤
- C. 犀角地黄汤
- D. 当归六黄汤
- E. 白虎加人参汤

22. 患者齿松牙衄，烦热干渴，舌红苔黄而干。治疗应首选的方剂是

- A. 玉女煎
- B. 芍药汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 清胃散
- E. 凉膈散

23. 患者身上有一疮疡初起，局部红肿焮痛，偶有身热凛寒，苔薄白淡黄，脉数有力。治疗应首选的方剂是

- A. 仙方活命饮
- B. 五味消毒饮
- C. 四妙勇安汤
- D. 阳和汤
- E. 普济消毒饮

24. 六一散的功用是

- A. 清暑除烦
- B. 清暑利湿
- C. 清暑化湿
- D. 清暑生津
- E. 祛暑清热

25. 患者暑令感寒夹湿，症见发热头痛，恶寒无汗，身重困倦，胸闷泛恶，舌苔白腻，脉浮。治疗应首选的方剂是

- A. 香薷散
- B. 加味香薷散
- C. 香苏散
- D. 藿香正气散
- E. 九味羌活汤

26. 阳和汤的功效是

- A. 温经散寒、益气活血
- B. 温经止痛、益气养血
- C. 散结止痛、补气升阳
- D. 散寒通滞、温阳补血
- E. 通络止痛、益气健脾

27. 下列不属于大建中汤功用的是

- A. 补虚
- B. 止痛
- C. 缓急
- D. 清热
- E. 散寒

28. 下列各项中，不属于小建中汤主治范围

的是

- A. 心中悸动, 虚烦不宁
- B. 腹中时痛, 得温痛减
- C. 手足烦热, 咽干口燥
- D. 心胸寒痛, 呕不能食
- E. 中焦虚寒, 里急腹痛

29. 下列选项中, 不属于阳和汤主治病证的是

- A. 脱疽
- B. 流注
- C. 痰核
- D. 贴骨疽
- E. 大头瘟

30. 吴茱萸汤中吴茱萸的作用不包括

- A. 温胃散寒
- B. 降逆止呕
- C. 疏肝解郁
- D. 助阳止泻
- E. 温胃暖肝

31. 患者素有胃中虚冷, 口不渴, 常常食谷欲呕。近日又添手足冰凉, 视其舌苔白滑, 诊脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A. 四逆汤
- B. 当归四逆汤
- C. 吴茱萸汤
- D. 阳和汤
- E. 回阳救急汤

32. 下列临床表现中, 不属于防风通圣散主治病证的是

- A. 憎寒壮热
- B. 头目眩晕
- C. 目赤睛痛
- D. 大便秘结
- E. 郁郁微烦

33. 葛根芩连汤适应的病证是

- A. 脾虚泄泻
- B. 久泄久痢
- C. 协热下利
- D. 热毒血痢
- E. 暑湿吐泻

34. 患者出现憎寒壮热, 头目眩晕, 目赤睛痛, 口苦口干, 咽喉不利, 胸膈痞闷, 咳呕喘满, 大便秘结, 小便赤涩。治疗应首选的方剂是

- A. 柴葛解肌汤
- B. 大柴胡汤
- C. 凉膈散
- D. 防风通圣散
- E. 大承气汤

35. 百合固金汤的功用是

- A. 滋养肺肾、止咳化痰
- B. 清肺润燥、益气养阴
- C. 清养肺胃、降逆下气

D. 轻宣温燥、润肺止咳

E. 清热润肺、理气化痰

36. 左归丸的功用是

- A. 温补肾阳, 填精补血
- B. 补益肝肾、强壮筋骨
- C. 滋阴补肾、填精益髓
- D. 滋阴补肾、涩精止遗
- E. 填精补髓、滋阴降火

37. 玉屏风散重用黄芪大补肺脾之气, 意在

- A. 行水消肿
- B. 通行血脉
- C. 化生营血
- D. 实卫固表
- E. 生肌敛疮

38. 下列选项中, 不属于补中益气汤组成药物的是

- A. 茯苓
- B. 陈皮
- C. 当归
- D. 白术
- E. 人参

39. 患者咳痰带血, 咽喉燥痛, 手足心热, 骨蒸盗汗, 舌红少苔, 脉细数。治疗首选的方剂是

- A. 补肺阿胶汤
- B. 百合固金汤
- C. 咳血方
- D. 琼玉膏
- E. 麦门冬汤

40. 患者心悸怔忡, 失眠, 食少, 肢体困倦, 面色萎黄, 舌淡脉弱。治疗应首选的方剂是

- A. 天王补心丹
- B. 朱砂安神丸
- C. 归脾汤
- D. 炙甘草汤
- E. 酸枣仁汤

41. 下列选项中, 不属于九仙散组成药物的是

- A. 人参、阿胶
- B. 款冬花、贝母
- C. 桔梗、桑白皮
- D. 乌梅、五味子、罂粟壳
- E. 紫菀、百部

42. 患者日前泻利日久, 且滑脱不禁, 有脐腹疼痛, 食少神疲, 舌淡苔白, 脉迟细。治疗应首选的方剂是

- A. 四神丸
- B. 真人养脏汤
- C. 六君子汤
- D. 参苓白术散
- E. 补中益气汤

43. 酸枣仁汤的组成药物中含有

- A. 龙眼肉
- B. 茯神
- C. 远志
- D. 柏子仁
- E. 知母

44. 酸枣仁汤中配伍川芎意在

- A. 调养肝血
- B. 活血行气
- C. 祛风止痛
- D. 活血止痛
- E. 宁心安神

45. 天王补心丹的主治病机是

- A. 心火偏亢, 阴血不足
- B. 肝血不足, 虚热内扰
- C. 心肝阳亢, 阴血不足
- D. 阴虚血少, 心肾两亏
- E. 心阳偏亢, 心肾不交

46. 安宫牛黄丸的功用是

- A. 清热开窍、豁痰解毒
- B. 清热开窍、镇痉安神
- C. 清热开窍、化浊解毒
- D. 清热开窍、辟秽解毒
- E. 开窍定惊、清热化痰

47. 患儿, 2岁, 高热烦躁, 神昏谵语, 痉厥, 口渴, 唇焦齿燥, 尿赤便秘, 舌红绛苔干黄, 脉数有力。治疗应首选的方剂是

- A. 紫雪丹
- B. 至宝丹
- C. 苏合香丸
- D. 安宫牛黄丸
- E. 防风通圣散

48. 厚朴温中汤适用于

- A. 寒湿气滞证
- B. 脾虚气滞证
- C. 寒凝气滞证
- D. 湿滞脾胃证
- E. 痰阻气逆证

49. 柴胡疏肝散与四逆散中均含有的药物是

- A. 柴胡、芍药、甘草
- B. 柴胡、枳实、芍药
- C. 柴胡、枳壳、芍药
- D. 柴胡、当归、芍药
- E. 柴胡、枳实、甘草

50. 患者平日痰涎壅盛, 动辄喘咳气短, 其下肢有浮肿, 不得长距离行走, 苔白滑, 脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 止嗽散
- B. 定喘汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 小青龙汤
- E. 苏子降气汤

51. 患者有慢性胃炎, 就诊时自诉常有暖气、反胃易呕症状, 胃部常有胀感, 诊其苔白滑, 脉弦虚。治疗应首选的方剂是

- A. 丁香柿蒂汤
- B. 旋覆代赭汤
- C. 半夏泻心汤
- D. 橘皮竹茹汤
- E. 蒿芩清胆汤

52. 桂枝茯苓丸的功用是

- A. 活血祛瘀、通络止痛
- B. 活血化瘀、缓消癥块
- C. 活血化瘀、温经止痛
- D. 活血祛瘀、散结止痛
- E. 温经散寒、养血祛瘀

53. 温经汤中配伍半夏的主要用意是

- A. 通降胃气而散结
- B. 和胃降逆而止呕
- C. 燥湿化痰而和胃
- D. 降逆散结而消痞
- E. 化痰开胃而行津

54. 补阳还五汤的功用是

- A. 补气、活血、通络
- B. 补气、活血、舒筋
- C. 补气、活血、解痉
- D. 补气、活血、止痛
- E. 补气、活血、行气

55. 温经汤中配伍半夏意在

- A. 燥湿化痰而和胃
- B. 和胃降逆而止呕
- C. 降肺胃虚逆之气
- D. 通降胃气而散结
- E. 降逆散结而消痞

56. 患者出现产后恶露不行, 小腹冷痛, 拒按, 脉细涩, 舌质暗淡。治疗应首选的方剂是

- A. 生化汤
- B. 温经汤
- C. 十灰散
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 温脾汤

57. 川芎茶调散中, 善治少阳、太阳、阳明经头痛的药是

- A. 川芎、荆芥、防风
- B. 川芎、羌活、白芷
- C. 细辛、白芷、川芎

D. 羌活、薄荷、川芎

E. 白芷、防风、薄荷

58. 镇肝息风汤的君药是

A. 生赭石

B. 怀牛膝

C. 生龙骨

D. 生牡蛎

E. 天冬

59. 具有“祛风除湿、化痰通络、活血止痛”功用的方剂是

A. 天麻钩藤饮

B. 大秦艽汤

C. 独活寄生汤

D. 牵正散

E. 小活络丹

60. 下列选项中, 不属于小活络丹主治范围的是

A. 风寒湿痹

B. 手足不仁

C. 腰腿沉重

D. 腿臂间作痛

E. 语言謇涩

61. 患者出现头痛眩晕, 失眠多梦, 舌红苔黄, 口苦面红, 脉弦数。治疗应首选的方剂是

A. 天麻钩藤饮

B. 大定风珠

C. 羚角钩藤汤

D. 镇肝息风汤

E. 川芎茶调散

62. 患者, 女, 35 岁。热病时久, 现见神倦, 有时时欲脱之象, 脉气虚弱, 舌绛苔少。治疗应首选的方剂是

A. 生脉散

B. 当归补血汤

C. 大定风珠

D. 大补阴丸

E. 镇肝息风汤

63. 以轻宣温燥、润肺止咳为主要功用的方剂是

A. 杏苏散

B. 养阴清肺汤

C. 桑杏汤

D. 增液汤

E. 清燥救肺汤

64. 以清肺润燥、益气养阴为主要功用的方剂是

A. 清暑益气汤

B. 白虎加人参汤

C. 养阴清肺汤

D. 桑杏汤

E. 清燥救肺汤

65. 患者咳唾涎沫, 短气喘促, 咽喉干燥, 舌干红少苔, 脉虚数。治疗应首选的方剂是

A. 清燥救肺汤

B. 杏苏散

C. 桑杏汤

D. 麦门冬汤

E. 百合固金汤

66. 患者, 男, 49 岁。症见: 头痛身热, 干咳无痰, 气逆而喘, 咽喉干燥, 鼻燥, 口渴, 舌干少苔, 脉虚大而数。治疗应首选的方剂是

A. 桑杏汤

B. 贝母瓜蒌散

C. 清燥救肺汤

D. 麦门冬汤

E. 九仙散

67. 患者症见头痛, 身热不甚, 口渴咽干鼻燥, 干咳无痰, 舌红, 苔薄白而干, 脉浮数而右脉大者。治疗应首选的方剂是

A. 九仙散

B. 桑杏汤

C. 杏苏散

D. 止嗽散

E. 清燥救肺汤

68. 八正散的组成药物中不含有

A. 木通

B. 车前子

C. 滑石

D. 栀子

E. 枳壳

69. 独活寄生汤与天麻钩藤饮中均含有

A. 桑寄生、杜仲、牛膝

B. 桑寄生、独活、牛膝

C. 黄芩、杜仲、益母草

D. 桑寄生、独活、甘草

E. 桑寄生、杜仲、独活

70. 具有“利水渗湿、温阳化气”功用的方剂是

A. 真武汤

B. 五苓散

C. 猪苓汤

D. 苓桂术甘汤

E. 实脾饮

71. 八正散与小蓟饮子均含有

A. 生地、滑石

B. 栀子、大黄

C. 木通、小蓟

D. 木通、滑石

E. 竹叶、甘草

72. 患者, 男, 65 岁。久痹不愈, 腰膝疼痛, 肢节屈伸不利, 或麻木不仁, 畏寒喜温, 心悸气短, 舌淡苔白, 脉象细弱。治疗应首选的方剂是

A. 当归四逆汤

B. 小活络丹

C. 羌活胜湿汤

D. 独活寄生汤