

中国科学院华南植物园
西南交通大学生命科学与工程学院

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主 编 叶华谷 曾飞燕 叶育石 袁 艺 第三辑 (十一—十五) (十一)



化学工业出版社

中国科学院华南植物园
西南交通大学生命科学与工程学院

中国药用植物

主 编 叶华谷 曾飞燕 叶育石 袁 芝
CHINESE MEDICINAL PLANTS
第三辑(十一—十五)
(十一)



化学工业出版社

· 北京 ·

本书以图文结合的形式，收录我国野生及栽培的药用植物共206种（包括亚种、变种及变型），主要从植物资源利用的角度，介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等，有些种类还有附方。为了安全起见，在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国药用植物. 十一 / 叶华谷等主编. — 北京: 化学工业出版社, 2016.9
ISBN 978-7-122-26762-7

I. ①中… II. ①叶… III. ①药用植物—介绍—中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第072781号

责任编辑: 李 丽
责任校对: 宋 玮

装帧设计: 百彤文化传播

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)
印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司
889mm×1194mm 1/32 印张13 字数500千字 2016年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 79.00元

版权所有 违者必究

本书编写人员


主 编：叶华谷 曾飞燕 叶育石 袁 艺
副主编：邹 滨 郑 珺 付 林 刘 冰
编写人员：于 慧 王发国 邓乔华 付 琳 叶华谷 叶育石
全 健 刘 冰 刘 念 朱 强 吴林芳 张 征
张丽霞 张忠廉 张慧晔 李书渊 陆颂规 李如良
李泽贤 李海涛 杜怡枫 杨 毅 杨科明 肖 波
陈巧明 陈玉笋 陈有卿 陈海山 易思荣 林汝顺
林惠蓉 林锦锋 邹 滨 郑 珺 金慧英 侯惠婵
夏 静 秦新生 莫结丽 袁 艺 贾宜军 曹洪麟
曹照忠 符同浩 黄 娅 黄均成 黄珊珊 曾飞燕
曾宪禹 童 毅 童毅华 管志斌 管燕红 翟俊文
倪静波

摄 影：王 斌 叶华谷 叶育石 李泽贤 刘 冰 邹 滨
袁 艺 曾飞燕 易思荣 肖 波 杨 毅

本书承

“中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项 (CZBZX-1)、
财政部战略生物资源科技支撑运行专项 (KSCX2-YW-Z-1004)、
植物园国家标准体系建设与评估 (Y421051001)、植物园迁地
保护植物编目及信息标准化 (2009FY120200)”项目资助出版。





前言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类以字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物**206种**（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《广东中药志》《华南药用植物》《湖南药物志》和《广西药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

降真香	<i>Acronychia pedunculata</i>	2
杏叶沙参	<i>Adenophora hunanensis</i>	4
无柄沙参	<i>Adenophora stricta</i> subsp. <i>sessilifolia</i>	6
轮叶沙参	<i>Adenophora tetraphylla</i>	8
米仔兰	<i>Aglaia odorata</i>	10
毛八角枫	<i>Alangium kurzii</i>	12
土坛树	<i>Alangium salviifolium</i>	14
看麦娘	<i>Alopecurus aequalis</i>	16
阿丁枫	<i>Altingia chinensis</i>	18
细柄阿丁枫	<i>Altingia gracilipes</i>	20
水蕉草	<i>Apluda mutica</i>	22
广防己	<i>Aristolochia fangchi</i>	24
管花马兜铃	<i>Aristolochia tubiflora</i>	26
菴草	<i>Arthraxon hispidus</i>	28
芦竹	<i>Arundo donax</i>	30
尾花细辛	<i>Asarum caudigerum</i>	32
花叶细辛	<i>Asarum geophilum</i>	34
大叶马蹄香	<i>Asarum maximum</i>	36
五岭细辛	<i>Asarum wulingense</i>	38
酒饼簕	<i>Atalantia buxifolia</i>	40
桃叶珊瑚	<i>Aucuba chinensis</i>	42
野燕麦	<i>Avena fatua</i>	44
凤尾竹	<i>Bambusa multiplex</i> cv. <i>Fernleaf</i>	46
车筒竹	<i>Bambusa sinospinosa</i>	48
青皮竹	<i>Bambusa textilis</i>	50
佛肚竹	<i>Bambusa ventricosa</i>	52

黄金间碧竹	<i>Bambusa vulgaris</i> cv. <i>Vittata</i>	54
臭节草	<i>Boenninghausenia albiflora</i>	56
柔弱斑种草	<i>Bothriospermum tenellum</i>	58
灯台树	<i>Bothrocaryum controversum</i>	60
毛臂形草	<i>Brachiaria villosa</i>	62
鸦胆子	<i>Brucea javanica</i>	64
雀舌黄杨	<i>Buxus bodinieri</i>	66
黄杨	<i>Buxus sinica</i>	68
白藤	<i>Calamus tetradactylus</i>	70
大花金钱豹	<i>Campanumoea javanica</i>	72
土党参	<i>Campanumoea javanica</i> subsp. <i>japonica</i>	73
橄榄	<i>Canarium album</i>	74
乌榄	<i>Canarium tramdenum</i>	76
樱桃椒	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>cetasiforme</i>	78
竹节树	<i>Carallia brachiata</i>	80
浆果苔草	<i>Carex baccans</i>	82
十字苔草	<i>Carex cruciata</i>	84
条穗苔草	<i>Carex nemostachys</i>	86
花荵苔草	<i>Carex scaposa</i>	88
基及树	<i>Carmona microphylla</i>	90
翅荚决明	<i>Cassia alata</i>	92
腊肠树	<i>Cassia fistula</i>	94
短叶决明	<i>Cassia leschenaultiana</i>	96
含羞草决明	<i>Cassia mimosoides</i>	98
望江南	<i>Cassia occidentalis</i>	100
黄槐	<i>Cassia surattensis</i>	102
决明	<i>Cassia tora</i>	104
紫荆	<i>Cercis chinensis</i>	106
方竹	<i>Chimonobambusa quardrangularis</i>	108
散尾葵	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	110

麻楝	<i>Chukrasia tabularis</i>	112
毛麻楝	<i>Chukrasia tabularis</i> var. <i>velutina</i>	114
椰子	<i>Cocos nucifera</i>	116
野芋	<i>Colocasia antiquorum</i>	118
芋	<i>Colocasia esculenta</i>	120
蜡瓣花	<i>Corylopsis sinensis</i>	122
白薇	<i>Cynanchum atratum</i>	124
牛皮消	<i>Cynanchum auriculatum</i>	126
凤凰木	<i>Delonix regia</i>	128
头状四照花	<i>Dendrobenthamia capitata</i>	130
香港四照花	<i>Dendrobenthamia hongkongensis</i>	132
吊丝球竹	<i>Dendrocalamopsis beecheyana</i>	134
麻竹	<i>Dendrocalamus latiflorus</i>	136
参薯	<i>Dioscorea alata</i>	138
大青薯	<i>Dioscorea bentharii</i>	140
黄独	<i>Dioscorea bulbifera</i>	142
薯蓣	<i>Dioscorea cirrhosa</i>	144
福州薯蓣	<i>Dioscorea futschauensis</i>	146
白薯蓣	<i>Dioscorea hispida</i>	148
日本薯蓣	<i>Dioscorea japonica</i>	150
薯蓣	<i>Dioscorea opposita</i>	152
五叶薯蓣	<i>Dioscorea pentaphylla</i>	154
杨梅叶蚊母树	<i>Distylium myricoides</i>	155
光头稗	<i>Echinochloa colonum</i>	156
稗	<i>Echinochloa crusgalli</i>	158
稔	<i>Eleusine coracana</i>	160
牛筋草	<i>Eleusine indica</i>	162
绿萝	<i>Epipremnum aureum</i>	164
麒麟叶	<i>Epipremnum pinnatum</i>	166
丁公藤	<i>Erycibe obtusifolia</i>	168
格木	<i>Erythrophleum fordii</i>	170

大果马蹄荷	<i>Exbucklandia tonkinensis</i>	172
肥肉草	<i>Fordiophyton fordii</i>	174
山橘	<i>Fortunella hindsii</i>	176
金橘	<i>Fortunella margarita</i>	177
岭南山竹子	<i>Garcinia oblongifolia</i>	178
山小橘	<i>Glycosmis parviflora</i>	180
两广禾叶蕨	<i>Grammitis lasiosora</i>	182
西域青莢叶	<i>Helwingia himalaica</i>	184
青莢叶	<i>Helwingia japonica</i>	186
黄茅	<i>Heteropogon contortus</i>	188
千年健	<i>Homalomena occulta</i>	190
夜花藤	<i>Hypserpa nitida</i>	192
白茅	<i>Imperata cylindrica</i>	194
箬竹	<i>Indocalamus tessellatus</i>	196
蕹菜	<i>Ipomoea aquatica</i>	198
番薯	<i>Ipomoea batatas</i>	200
五爪金龙	<i>Ipomoea cairica</i>	202
七爪龙	<i>Ipomoea digitata</i>	204
厚藤	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	206
灯心草	<i>Juncus effusus</i>	208
笄石菖	<i>Juncus prismatocarpus</i>	210
刺芋	<i>Lasia spinosa</i>	212
镰翅羊耳蒜	<i>Liparis bootanensis</i>	214
见血青	<i>Liparis nervosa</i>	216
扇唇羊耳蒜	<i>Liparis stricklandiana</i>	218
半边莲	<i>Lobelia chinensis</i>	220
江南山梗菜	<i>Lobelia davidii</i>	222
线萼山梗菜	<i>Lobelia melliana</i>	224
十萼茄	<i>Lycianthes biflora</i>	226
单花红丝线	<i>Lycianthes lysimachioides</i>	228
芒果	<i>Mangifera indica</i>	230

川楝	<i>Melia toosendan</i>	232
尖山橙	<i>Melodinus fusiformis</i>	234
山橙	<i>Melodinus suaveolens</i>	236
篱栏网	<i>Merremia hederacea</i>	238
大萼	<i>Micromelum falcatum</i>	240
小芸木	<i>Micromelum integerrimum</i>	242
千里香	<i>Murraya exotica</i>	244
盾蕨	<i>Neolepisorus ovatus</i>	246
慈竹	<i>Neosinocalamus affinis</i>	248
夹竹桃	<i>Nerium indicum</i>	250
烟草	<i>Nicotiana tabacum</i>	252
多毛富贵草	<i>Pachysandra axillaris</i> var. <i>stylosa</i>	254
细圆藤	<i>Pericampylus glaucus</i>	256
裂叶牵牛	<i>Pharbitis nil</i>	258
圆叶牵牛	<i>Pharbitis purpurea</i>	260
石仙桃	<i>Pholidota chinensis</i>	262
锦香草	<i>Phyllagathis cavaleriei</i>	264
桂竹	<i>Phyllostachys bambusoides</i>	266
水竹	<i>Phyllostachys heteroclada</i>	268
毛竹	<i>Phyllostachys heterocycla</i> cv. <i>Pubescens</i>	270
篾竹	<i>Phyllostachys nidularia</i>	272
紫竹	<i>Phyllostachys nigra</i>	274
金鸡脚	<i>Phymatopteris hastata</i>	276
苦蕒	<i>Physalis angulata</i>	277
毛苦蕒	<i>Physalis angulata</i> var. <i>villosa</i>	278
苦木	<i>Picrasma quassioides</i>	280
半夏	<i>Pinellia ternata</i>	282
黄连木	<i>Pistacia chinensis</i>	284
苦竹	<i>Pleioblastus amarus</i>	286
独蒜兰	<i>Pleione bulbocodioides</i>	288
鸡蛋花	<i>Plumeria rubra</i> cv. <i>Acutifolia</i>	290

友水龙骨	<i>Polypodiodes amoena</i>	292
飞蛾藤	<i>Porana racemosa</i>	294
大果飞蛾藤	<i>Porana sinensis</i>	296
帘子藤	<i>Pottsia laxiflora</i>	298
铜锤玉带草	<i>Pratia nummularia</i>	300
萝芙木	<i>Rauvolfia verticillata</i>	302
盐肤木	<i>Rhus chinensis</i>	304
月季花	<i>Rosa chinensis</i>	306
小果蔷薇	<i>Rosa cymosa</i>	308
金樱子	<i>Rosa laevigata</i>	310
粉团蔷薇	<i>Rosa multiflora</i> var. <i>cathayensis</i>	312
玫瑰	<i>Rosa rugosa</i>	314
南丹参	<i>Salvia bowleyana</i>	316
贵州鼠尾草	<i>Salvia cavaleriei</i>	318
华鼠尾草	<i>Salvia chinensis</i>	320
朱唇	<i>Salvia coccinea</i>	322
鼠尾草	<i>Salvia japonica</i>	324
荔枝草	<i>Salvia plebeia</i>	326
长叶柄野扇花	<i>Sarcococca longipetiolata</i>	328
野扇花	<i>Sarcococca ruscifolia</i>	330
尼泊尔肉穗草	<i>Sarcopyramis nepalensis</i>	332
黑鳞珍珠茅	<i>Scleria hookeriana</i>	334
珍珠茅	<i>Scleria levis</i>	336
韩信草	<i>Scutellaria indica</i>	338
风龙	<i>Sinomenium acutum</i>	340
茵芋	<i>Skimmia reevesiana</i>	342
蜂斗草	<i>Sonerila cantonensis</i>	344
溪边蜂斗草	<i>Sonerila rivularis</i>	346
苞舌兰	<i>Spathoglottis pubescens</i>	348
绶草	<i>Spiranthes sinensis</i>	350
少花马蓝	<i>Strobilanthes oliganthus</i>	352

榄仁树	<i>Terminalia catappa</i>	354
诃子	<i>Terminalia chebula</i>	356
庐山香科科	<i>Teucrium pernyi</i>	358
铁轴草	<i>Teucrium quadrifarium</i>	360
黄花夹竹桃	<i>Thevetia peruviana</i>	362
盾果草	<i>Thyocarpus sampsonii</i>	364
青牛胆	<i>Tinospora sagittata</i>	366
宽筋藤	<i>Tinospora sinensis</i>	368
紫丹	<i>Tournefortia montana</i>	370
紫花络石	<i>Trachelospermum axillare</i>	372
络石	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	374
附地菜	<i>Trigonotis peduncularis</i>	376
水烛	<i>Typha angustifolia</i>	378
香蒲	<i>Typha orientalis</i>	380
毛杜仲藤	<i>Urceola huaitingii</i>	382
花皮胶藤	<i>Urceola micrantha</i>	384
蓝花参	<i>Wahlenbergia marginata</i>	386
筋党花椒	<i>Zanthoxylum avicennae</i>	388
刺壳花椒	<i>Zanthoxylum echinocarpum</i>	390
大叶臭椒	<i>Zanthoxylum myriacanthum</i>	391
异叶花椒	<i>Zanthoxylum ovalifolium</i>	392
花椒筋	<i>Zanthoxylum scandens</i>	394
野花椒	<i>Zanthoxylum simulans</i>	396
参考文献.....		398
拉丁名索引.....		399
中文名索引.....		401



降真香

Acronychia pedunculata (Linn.) Miq.

【别名】山油柑、山橘

【基原】来源于芸香科山油柑属降真香 *Acronychia pedunculata* (Linn.) Miq. 的根、心材、叶、果实入药。

【形态特征】树高5~15 m。树皮灰白色至灰黄色，平滑，不开裂，内皮淡黄色，剥开时有柑橘叶香气，当年生枝通常中空。叶有时呈略不整齐对生，单小叶，叶片椭圆形至长圆形，或倒卵形至倒卵状椭圆形，长7~18 cm，宽3.5~7 cm，或有较小的，全缘；叶柄长1~2 cm，基部略增大呈叶枕状。花两性，黄白色，直径1.2~1.6 cm；花瓣狭长椭圆形，花开放初期，花瓣的两侧边缘及顶端略向内卷，盛花时则向背面反卷且略下垂，内面被毛、子房被疏或密毛，极少无毛。果序下垂，果淡黄色，半透明，近圆球形而略有棱角，直径1~1.5 cm，顶部平坦，中央微凹陷，有4条浅沟纹，富含水分，味清甜，有小核4个，每核有1种子；种子倒卵形，长4~5 mm，厚2~3 mm，种皮褐黑色、骨质，胚乳小。花期4~8月；果期8~12月。

【生境】生于海拔约600 m以下的山坡或平地杂木林中。

【分布】香港、广东、海南、福建、台湾、广西、云南。越南、印度、菲律宾等国也有分布。

【采集加工】夏秋采收，根、心材、叶、果晒干。

【性味功能】味甘，性平。根、干木、叶：祛风活血，理气止痛。果实：健脾消食。

【主治用法】根、干木或叶：治风湿性腰腿痛，跌打肿痛，支气管炎，胃痛，疝气痛。果实：治食欲不振，消化不良。用量根、干木15~30 g；果实9~15 g。



杏叶沙参

Adenophora hunanensis Mannf.**【别名】**湖南沙参**【基原】**来源于桔梗科沙参属杏叶沙参 *Adenophora hunanensis* Mannf. 的根入药。**【形态特征】**草本，高60~120 cm，不分枝，无毛或稍有白色短硬毛。茎生叶至少下部的具柄，稀近无柄，叶片卵圆形、卵形至卵状披针形，基部常楔状渐尖，或近于平截形而突然变窄，沿叶柄下延，顶端急尖至渐尖，边缘具疏齿，两面被短硬毛，较少被柔毛，稀全无毛的，长3~10 (15) cm，宽2~4 cm。花序分枝长，几乎平展或弓曲向上，常组成大而疏散的圆锥花序，极少分枝很短或长而几乎直立因而组成窄的圆锥花序。花梗极短而粗壮，长仅2~3 mm，极少达5 mm，花序轴和花梗有短毛或近无毛；花萼常有或疏或密的白色短毛，稀无毛，筒部倒圆锥状，裂片卵形至长卵形，长4~7 mm，宽1.5~4 mm，基部通常彼此重叠；花冠钟状，蓝色、紫色或蓝紫色，长1.5~2 cm，裂片三角状卵形，为花冠长的1/3；花盘短筒状，长1~2.5 mm，顶端被毛或无毛；花柱与花冠近等长。蒴果球状椭圆形，或近于卵状，长6~8 mm，直径4~6 mm。种子椭圆状，有一条棱，长1~1.5 mm。花期7~9月。**【生境】**生于山地草丛或疏林下。**【分布】**广东、广西、贵州、四川、湖南、湖北、江西、河南、河北、山西、陕西。**【采集加工】**夏秋采收，根晒干。**【性味功能】**味甘、苦，性微寒。养阴清热，润肺化痰，止咳。**【主治用法】**治肺热咳嗽，燥咳痰少，虚热喉痹，津伤口渴。用量10~15 g。