

世界维管植物

(第二版)

• 第二卷 •
分类系统

傅德志



VASCULAR PLANTS OF THE WORLD

(Second Edition)

• **Volume 2** •

CLASSIFICATION SYSTEMS

De-Zhi Fu

青岛出版社
QINGDAO
PUBLISHING HOUSE



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

VASCULAR PLANTS OF THE WORLD

(Second Edition)

• **Volume 2** •

CLASSIFICATION SYSTEMS

De-Zhi Fu

世界维管植物

(第二版)

• 第二卷 •

分类系统

傅德志

青岛出版社
QINGDAO
PUBLISHING HOUSE

说明和凡例

Specifications and examples

1. 本卷内容

本卷按照分类系统排列全世界维管植物 818 科,科内按照字母顺序排列可接受属,异名按照字母顺序排列在可接受属之后。异名关系不确定的属,前面标记“ $\cong$ ”符号,按照字母顺序排列在各科最后。本卷总计有 34782 属名(可接受属 18850 属,包含 290713 – 307963 种),其中有蕨类植物 67 科,491 属(8683 种),按照秦仁昌(1978)分类系统排列;有裸子植物 17 科,93 属(1093 种),按照傅德志等(2004)分类系统排列;有被子植物 732 科,18412 属(297176 种),按照数字标准被子植物分类系统(傅德志 2010)排列。被子植物中有双子叶植物 581 科,14347 属(208381 种);有单子叶植物 151 科,4065 属(88795 种)。卷后附录 1 为全球植物科、属、种分布类型(地理码、气候码)统计;附录 2 为被子植物分类系统科号转换表(按傅德志 2010 年数字分类系统排列)。

2. 编写格式

各条记录前为分类系统科号(类群 – 科号)。F 为蕨类植物;G 为裸子植物;M 为被子植物(MD 为双子叶植物,MM 为单子叶植物);科、属定名人缺省,后面【】内为分布编码;其后为文献引证。文献引证中,(BR)为来自美国纽约树木园杂志文献;(CN)为来自中国植物志及有关刊物的文献;(IAPT)为来自国际植物分类协会的文献;(IK)为来自英国邱园植物名称索引的文献;(IPNI)为来自国际植物名称索引网站的文献;其他表示来源不确定(UC:uncertain)或未知(UN:unknown)。黑体标注内容为出版物、编者等内容,其后为卷册页码和出版年代等内容。

编写格式示例:

F-1 松叶蕨科 **Psilotaceae** [0/R – RST] [cit. (BR) **Microgr. Dict.** 540. (1855)]

F-1 **Bernhardia** [1 – AU/R] [cit. (IK) **Schrader's Journal für die Botanik** 2 (1802)]

F-1 **Psilotum** [0/R – RT] [cit. (IK) **Prodr. Aethéogam.** 106112: 106. (1805)]

F-2 梅溪蕨科 **Tmesipteridaceae** [1 – AU/R] [cit. (BR) **Chosakuronbun Mokuroku (Ord. Fam. Trib. Nov.)** 206. (1943)]

F-2 **Tmesipteris** [1 – AU/R] [cit. (IK) **Journal für die Botanik** (2) (1801)]

目 录

说明和凡例	(1)
分类系统、分布编码和原始文献	(1)
附录 1 全球植物科、属、种分布类型(地理码、气候码) 统计	(875)
附录 2 被子植物分类系统科号转换表(按傅德志 2010 年数字分类 系统排列)	(882)

Contents

Specifications and examples	(1)
Classification systems, distribution codes and references	(1)
Appendix 1: Distribution codes and patterns of families, genera and species	(875)
Appendix 2: Systematic arrangement of alternation familial codes of major angiosperm classification systems(sorted by digital classification system of Fu 2010)	(882)

分类系统、分布编码和原始文献

Classification systems, distribution codes and references

F

蕨类植物 Filicopsidae (Pteridophytina) = Pteridopsida = Ferns

F-1 松叶蕨科 **Psilotaceae** [0/R - RST] [cit. (BR) **Microgr. Dict.** 540. (1855)]

F-1 **Bernhardia** [1 - AU/R] [cit. (IK) **Schrader's Journal für die Botanik** 2 (1802)]

F-1 **Psilotum** [0/R - RT] [cit. (IK) **Prodr. Aethéogam.** 106112; 106. (1805)]

F-2 梅溪蕨科 **Tmesipteridaceae** [1 - AU/R] [cit. (BR) **Chosakuronbun Mokuroku (Ord. Fam. Trib. Nov.)** 206. (1943)]

F-2 **Tmesipteris** [1 - AU/R] [cit. (IK) **Journal für die Botanik** (2) (1801)]

F-3 石杉科 **Huperziaceae** [0/R - RST] [cit. (BR) **Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.** 66; 236. (1962)]

F-3 **Huperzia** [0/R - RT] [cit. (IK) **Journal für die Botanik** (2) (1801)]

F-3 **Mirmau** [cit. (UC) **Verh. Naturf. Ges. Basel** 66; 43. 1955.]

F-3 **Plananthus** [cit. (UC) **Prodr. Aethéogam.** 293]

F-3 **Phlegmariurus** [13/T - RT] [cit. (IK) **Preslia** 36; 17. (1964)]

F-4 石松科 **Lycopodiaceae** [0/R - RST] [cit. (BR) **J. B. A. P. M. de Lamarck & C. F. B. de Mirbel Hist. Nat. Vég.** 4; 293. (1802)]

F-4 **Austrolycopodium** [1 - AU/R] [cit. (IK) **Folia Geobotanica & Phytotaxonomica** 26 (1991)]

F-4 **Diphasiastrum** [0/T - RT] [cit. (IK) **Preslia** 47; 104. (1975)]

F-4 **Stachygynandrum** [cit. (IK) **Hist. Nat. Vég. (Lam. & Mirbel)** 3; 477. (1802)]

F-4 **Diphasium** [2 - EU/T] [cit. (IK) **Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis** 54 (1944)]

F-4 **Lepidotis** [23/R] [cit. (IPNI) **Hist. Nat. Vég. (Lam. & Mirbel)** 3; 477. (1802)]

F-4 **Pseudolycopodium** [cit. (IK) **Folia Geobot. Phytotax.** 18(4); 441 (1983)]

F-4 **Lycopodiastrum** [1 - AS/S - RST] [cit. (IK) **J. Bombay Nat. Hist. Soc.** 77(3); 540 (1980)]

F-4 **Lycopodiella** [0/R - RT] [cit. (IK) **Preslia** 36 (1964)]

F-4 **Lateristachys** [cit. (IK) **Folia Geobot. Phytotax.** 18(4); 440 (1983)]

F-4 **Lycopodium** [0/R - RT] [cit. (IK) **Species Plantarum** 2 (1753)]

F-4 **Bryodesma** [cit. (IK) **Preslia** 64(2); 154 (1992)]

F-4 **Dendrolycopodium** [cit. (IK) **Fam. Huperziaceae & Lycopodiaceae New England** 84 (2003)]

F-4 **Diplostachyum** [cit. (IK) **fürns S.** 422 (1938)]

F-4 **Pseudodiphasium** [cit. (IK) **Folia Geobot. Phytotax.** 18(4); 440 (1983)]

F-4 **Spinulum** [cit. (IK) **Fam. Huperziac. Lycopodiac. New England** 85 (2003)]

F-4 **Palhinhaea** [13/T - RT] [cit. (IK) **Vasc. in Carv. Vasc. & Franco Bol. Soc. Brot.** ser. 2, 41: 24. (1967)]

F-4 **Pseudolycopodiella** [13/S - RST] [cit. (IK) **Folia Geobot. Phytotax.** 18(4): 441 (1983)]

F-4 **Urostachys** [3/R - RT] [cit. (IK) **Bärlappgewächse** 70 (1939)]

F

F-5 石葱科 **Phylloglossaceae** [1 - AU/R] [cit. (BR) **Bot. Zeitung (Berlin)** 1: 722. (1843)]

F-5 **Phylloglossum** [1 - AU/R] [cit. (IK) **Botanische Zeitung** 1 (1843)]

F-6 卷柏科 **Selaginellaceae** [0/R - RST] [cit. (BR) **Anleit. Stud. Bot.** 2: 163. (1854)]

F-6 **Lycopodioides** [1 - AU/R] [cit. (UC) **Def. Gen. Pl.** ed. 3. 485. (1760)]

F-6 *Lycopodiodes* [cit. (UC) **Revis. Gen. Pl.** 295]

F-6 **Selaginella** [0/R - RT] [cit. (IAPT) **Prodr. Aethéogam.** 101. 10 Jan 1805. (nom. cons.)]

F-6 *Didiclis* [cit. (IK) **Expos. Fam. Nat.** 1: 39. (1805)]

F-6 *Muscus* [cit. (UC) **Mus. Pet. Cent. Sexta** 52. 1690.]

F-6 *Trispermium* [cit. (UC) **Gen. Nat. Hist.** 2: 113. 1751.]

F-7 水韭科 **Isoëtaceae** [0/R - RST] [cit. (BR) **Bot. Damen** 309.]

F-7 **Calamaria** [1 - AU/R] [cit. (UC) **Definitiones Generum Plantarum** ed. 3 (1760)]

F-7 *Cephaloceraton* [cit. (IK) **Comment. Soc. Crittog. Ital.** 1: 111. (1862)]

F-7 *Isoetella* [cit. (IK) **Comment. Soc. Crittog. Ital.** 1: 114. (1862)]

F-7 **Isoëtes** [0/R - RT] [cit. (IK) **Obs. Bot.** (1772) 36. t. 2. f. 7 cf. pub. 1753]

F-7 **Stylites** [3 - SA/R] [cit. (UN)]

F-8 木贼科 **Equisetaceae** [0/T - RST] [cit. (BR) **Essai Propr. Méd. Pl.** 49. (1804)]

F-8 **Equisetum** [0/T - RT] [cit. (IK) **Sp. Pl.** 2: 1061. (1753)]

F-8 **Hippochaete** [13/T] [cit. (IK) **Bot. Zeitung (Berlin)** 23: 297. (1865)]

F-8 $\cong$ *Allostelites* [cit. (UC) **Fl. Deut. Volk** 291]

F-9 瓶尔小草科 **Ophioglossaceae** [0/R - RST] [cit. (BR) **Tekhno - Bot. Slovar** 438. (1820)]

F-9 **Cheiroglossa** [3 - SA/R] [cit. (IK) **Suppl. Tent. Pterid.** 56 (1845)]

F-9 **Mankyua** [1 - AS/T] [cit. (IK) **Taxon** 50(4): 1020 (2001)]

F-9 **Ophioderma** [13/T - RT] [cit. (IK) **Gen. Pl. (Endlicher)** 66 (1836)]

F-9 **Ophioglossum** [0/R - RT] [cit. (IK) **Sp. Pl.** 2: 1062. (1753)]

F-9 **Rhizoglossum** [2 - AF/R] [cit. (IK) **Suppl. Tent. Pterid.** 48 (1845)]

F-10 阴蒂蕨科 **Botrychiaceae** [0/T - RST] [cit. (BR) **Char. Ess. Fam.** 15. (1847)]

F-10 **Botrychium** [0/T - RT] [cit. (IK) **Schrader's Journ.** (2): 8 (1800)]

F-10 *Japanobotrychium* [cit. (UC) **J. Soc. Trop. Agric.** 290]

F-10 *Osmundopteris* [cit. (IK) **fürns SE.** 377: 482. (1938)]

F-10 **Botrypus** [1 - AS/T] [cit. (IK) **Cat. Hort. Med. Paris** 120 (1801)]

F-10 **Sceptridium** [3 - NA/T] [cit. (IK) **Bot. Gaz.** 40: 457. (1905)]

F-10 *Holubiella* [cit. (IK) **Preslia** 68(4): 345 (1996)]

F-11 七指蕨科 **Helminthostachyaceae** [1/S - RST] [cit. (BR) **Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot.** ser. 10: 235. (1941)]

F-11 **Helminthostachys** [1/S - RST] [cit. (UC) **Enumeratio Filicum** 1824]

- F-11 *Botryopteris* [cit. (IK) **Reliq. Haenk.** 1: 76. (1825)]
- F-11 *Ophiala* [cit. (IK) **Mém. Soc. Linn. Paris** 6(2): 195 (1827)]
- F-12 莲座蕨科 **Angiopteridaceae** [13/T-RST] [cit. (BR) **Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique** 5: 345, 359. (1867)]
- F-12 **Archangiopteris** [1-AS/T-RT] [cit. (IK) **Flora** 86: 72. (1899)]
- F-12 **Protomarattia** [3-SA/R] [cit. (IK) **Bot. Gaz.** 67: 88. (1919)]
- F-13 合囊蕨科 **Marattiaceae** [0/T-RST] [cit. (BR) **Enum. Filic.** 31. (1824)]
- F-13 **Angiopteris** [0/T-RT] [cit. (IPNI) **Commentat. Soc. Regiae Sci. Gott.** 12: 29. 1796. (nom. cons.)]
- F-13 *Protangiopteris* [cit. (IK) **Bot. Mag. Tokyo** 42: 305. (1928)]
- F-13 **Eupodium** [3-SA/R] [cit. (IK) **Gen. Fil. (Hooker)** t. 118. (1842)]
- F-13 **Macroglossum** [1-AS/T] [cit. (IK) **Philipp. J.** 3: 342. (1909)]
- F-13 **Marattia** [0/R-RT] [cit. (IK) **Prod. Fl. Ind.** 128 (1788)]
- F-13 *Discostegia* [cit. (IK) **Suppl. Tent. Pterid.** 11 (1845)]
- F-13 *Myriotheca* [cit. (IPNI) **Gen. Pl. (Jussieu)** 15. 1789 (4 Aug 1789) (IF)]
- F-13 *Ptisana* [cit. (IK) **Taxon** 57(3): 744 (2008)]
- F-14 多孔蕨科 **Danaeaceae** [3/R-RST] [cit. (BR) **Aphor. Bot.** 117. (1822)]
- F-14 **Danaea** [3/R-RT] [cit. (IPNI) **Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin)** 5: 420. 1793. (nom. cons.)]
- F-14 *Danaeopsis* [cit. (IK) **Suppl. Tent. Pterid.** 39 (1845)]
- F-14 *Heterodanaea* [cit. (IK) **Suppl. Tent. Pterid.** 38 (1845)]
- F-15 天星蕨科 **Christenseniaceae** [1-AS/S-RST] [cit. (BR) **Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot.** 10: 227. (1940)]
- F-15 **Christensenia** [1-AS/S-RST] [cit. (IK) **Proc. Biol. Soc. Washington** 18: 239. (1905)]
- F-16 紫萁科 **Osmundaceae** [0/R-RST] [cit. (BR) **Tekhno-Bot. Slovar** 445. (1820)]
- F-16 **Osmunda** [0/T-RT] [cit. (IK) **Species Plantarum** 2 (1753)]
- F-16 *Aphyllocalpa* [cit. (IK) **Anal. Cienc.** 5: 164. (1802)]
- F-16 *Plenasium* [cit. (IK) **Tent. Pterid** 109 (1836)]
- F-16 **Osmundastrum** [1-AS/T] [cit. (IK) **Gefässbündel fürn** 18 (1847)]
- F-16 **Todea** [12/R] [cit. (IK) **Journal für die Botanik** (2) (1801)]
- F-17 瘤足蕨科 **Plagiogyriaceae** [13/T-RST] [cit. (BR) **Ann. Bot. (London)** 40: 484. (1926)]
- F-17 **Plagiogyria** [13/T-RT] [cit. (IPNI) **Abh. Her. Sen. Nat. Ges.** 2 (1858)]
- F-18 里白科 **Gleicheniaceae** [0/R-RST] [cit. (BR) **Reliq. Haenk.** 1: 70. (1825)]
- F-18 **Acropterygium** [3-SA/R] [cit. (IK) **Nat. Pfl.** 1: (4) (1900)]
- F-18 **Dicranopteris** [0/R-RT] [cit. (IK) **Neues J.** 1(2): 38 (1805)]
- F-18 **Diplopterygium** [13/T-RT] [cit. (IPNI) **Nat. Pflanzenfam.** 1: (4) (1900)]
- F-18 **Gleichenella** [3-SA/R] [cit. (IK) **Sunyatsenia** 5: 276. (1940)]
- F-18 **Gleichenia** [0/R-RT] [cit. (IPNI) **Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin)** 5: 419. 1793. (nom. cons.)]
- F-18 *Calymella* [cit. (IK) **Tent. Pterid.** 48 (1836)]
- F-18 *Gleicheniastrum* [cit. (IK) **Abh. Boehm. Ges. Wiss.** v: 5. (1848)]

- F-18 **Hicriopteris** [3-SA/R] [cit. (IK) **Epimel. Bot.** 26 (1851)]
- F-18 **Phanerosorus** [1/S-RST] [cit. (IK) **Philipp. J.** 3: 344. (1909)]
- F-18 **Platyzoma** [1-AU/R] [cit. (UC) **Prodromus Florae Novae Hollandiae** 1810]
- F-18 **Sticherus** [0/R-RT] [cit. (UC) **Tentamen Pteridographiae** 1836]
- F-18 **Stromatopteris** [1-AU/R] [cit. (IK) **Bot.** 4 15: 84. (1861)]
- F-19 莎草蕨科 **Schizaeaceae** [0/R-RST] [cit. (BR) **Wesen Farrenkr.** (119) (1827)]
- F-19 **Actinostachys** [13/R] [cit. (IK) **Gen. Fil.** t. 111A. (1842)]
- F-19 **Anemia** [23/R-RT] [cit. (IPNI) **Syn. Fil.** 6 155. Mar-Apr 1806. (nom. cons.)]
- F-19 **Anemidictyon** [cit. (UC) **Lond. JoB.** 297]
- F-19 **Aneimiaebotrys** [cit. (IK) **Crypt. Vasc. Bresil** 1: 267. (1869)]
- F-19 **Mohria** [cit. (IPNI) **Gard. and For.** vi. (1893) 433-34 cf. 363]
- F-19 **Ornithopteris** [cit. (IK) **neu. Journ.** 1: (2) (1806)]
- F-19 **Spathepteris** [cit. (IK) **Suppl. Tent. Pterid.** 95 (1845)]
- F-19 **Trochopteris** [cit. (IK) **London J.** 1: 74. (1842)]
- F-19 **Anemirhiza** [3-SA/R] [cit. (IPNI) **Bot. Voy. Herald (Seemann)** 6: 243. 1854 (late 1854 or v. early (1855))]
- F-19 **Colina** [cit. (UC) **Erythea** 279]
- F-19 **Hemianemia** [3-SA/R] [cit. (IK) **Bol. Soc. Brot.** 2 21: 154. (1947)]
- F-19 **Hydroglossum** [3-SA/R] [cit. (IK) **Schr. Akad. Wiss. Erfurt** 20 (1802)]
- F-19 **Lophidium** [3-NA/T] [cit. (IK) **Actes Soc. Hist. Nat. Paris** 1: 114. (1792)]
- F-19 **Microschizaea** [1-AU/R] [cit. (IK) **Bol. Soc. Brot.** 2 21: 133. (1947)]
- F-19 **Schizaea** [0/R-RT] [cit. (IAPT) **Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin)** 5: 419. 1793. (nom. cons.)]
- F-20 海金沙科 **Lygodiaceae** [0/S-RST] [cit. (BR) **Handb. Allg. Bot.** 3: 520. (1840)]
- F-20 **Lygodium** [0/S-RST] [cit. (IAPT) **J. Bot. (Schrader)** 1800(2): 7, 106. Oct-Dec 1801. (nom. cons.)]
- F-20 **Cteisium** [cit. (UN)]
- F-20 **Gisopteris** [cit. (IK) **Schrad. Journ.** (2): 129 (1800)]
- F-20 **Lygodictyon** [cit. (IK) **Gen. Fil. (Hooker)** t. 111. (1842)]
- F-20 **Odontopteris** [cit. (IK) **Schrad. Journ.** (2): 127 (1800)]
- F-20 **Ugena** [cit. (IK) **Icon. (Cavanilles)** 6: 73. (1801)]
- F-21 膜蕨科 **Hymenophyllaceae** [0/R-RST] [cit. (BR) **Consp. Regni Veg.** 3. (1835)]
- F-21 **Abrodictyum** [1-AS/T] [cit. (IK) **Hymenophyllaceae (Presl)** 20 (1843)]
- F-21 **Habrodictyum** [cit. (UC) **Hymenophyll. Javan.** 17 t. 12. 1863.]
- F-21 **Buesia** [3-SA/R] [cit. (IK) **Bot. Gaz.** 93: 336. (1932)]
- F-21 **Callistopteris** [1/S-RST] [cit. (IK) **Occ. Pap. Bishop Mus.** 14: 49. (1938)]
- F-21 **Cardiomanes** [1-AU/R] [cit. (IK) **Hymenophyllaceae (Presl)** 12 (1843)]
- F-21 **Cephalomanes** [12/T-RT] [cit. (IK) **Hymenophyllaceae (Presl)** 17 (1843)]
- F-21 **Vandenboschia** [cit. (IK) **Philipp. J.** 67: 51. (1938)]
- F-21 **Craspedophyllum** [1-AU/R] [cit. (IK) **Hymenophyllaceae (Presl)** 33 (1843)]
- F-21 **Crepidomanes** [0/T-RT] [cit. (UC) **Epimeliae Botanicae** 1851]
- F-21 **Craspedoneuron** [cit. (IK) **Hymenoph. Jav.** 12 t. 10. (1861)]
- F-21 **Taschneria** [cit. (IK) **Epimel. Bot.** 258 (1851)]
- F-21 **Davalliopsis** [3-SA/R] [cit. (IK) **Verslagen Meded. Afd. Natuurk. Kon. Akad. Wetensch.** 11:

323. (1861)]

- F-21 *Didymoglossum* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Mémoires de la Société Linneenne de Paris* 6(2) (1827)]
- F-21 *Feea* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Dict. Class. d'Hist. Nat.* 6: 446. (1824)]
- F-21 *Homoeotes* [cit. (IK) *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* v: 5. (1848)]
- F-21 *Psilophyllum* [cit. (IK) *Verslagen Meded. Afd. Natuurk. Kon. Akad. Wetensch.* 11: 321. (1861)]
- F-21 *Gonocormus* [1/R - RT] [cit. (UC) *Hymenophyllaceae Javanacae sive descriptio Hymenophyllacearum Archipelagi indici* 1861]
- F-21 *Hemicyatheon* [1 - AU/R] [cit. (IPNI) *Bibl. Bot.* 85: 20. (1913)]
- F-21 *Hemiphlebiium* [13/R] [cit. (IK) *Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin ser. 5*, 3 1845 (1843)]
- F-21 *Humblotiella* [2 - AF/R] [cit. (IK) *Mém. Inst. Sci. Madagascar sér. B, Biol. Vég.* 7: 38. (1956)]
- F-21 *Hymenoglossum* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Hymenophyllaceae (Presl)* 35 (1843)]
- F-21 *Hymenophyllopsis* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Flora* 124: 3. (1929)]
- F-21 *Hymenophyllum* [0/R - RT] [cit. (IK) *Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin)* 5: 418. (1793)]
- F-21 *Myrmecostylum* [cit. (IK) *Hymenophyllaceae (Presl)* 27 (1843)]
- F-21 *Ptychophyllum* [cit. (IK) *Hymenophyllaceae (Presl)* 28 (1843)]
- F-21 *Hymenostachys* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Dict. Class. d'Hist. Nat.* 6: 588. (1825)]
- F-21 *Lacostea* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Verslagen Meded. Afd. Natuurk. Kon. Akad. Wetensch.* 11: 320. (1861)]
- F-21 *Lacosteopsis* [1 - AS/T] [cit. (IK) *Enum. Pterid. Jap. Filic.* 21 (1975)]
- F-21 *Lecanium* [3/S - RST] [cit. (IK) *Flora* 8(2; Beil) (1825)]
- F-21 *Lecanolepis* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Webbia* 28: 449. (1973)]
- F-21 *Leptocionium* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Hymenophyllaceae (Presl)* 26 (1843)]
- F-21 *Loxosomopsis* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Bull. Herb. Boissier* ii: 4. (1904)]
- F-21 *Macroglena* [12/R] [cit. (IK) *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* v: 5. (1848)]
- F-21 *Mecodium* [cf. 0/R] [cit. (IK) *Epimel. Bot.* 258 (1851)]
- F-21 *Meringium* [1/R - RT] [cit. (IK) *Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin ser. 5*, 3 1845 (1843)]
- F-21 *Microgonium* [2 - AF/R] [cit. (IK) *Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin ser. 5*, 3 1845 (1843)]
- F-21 *Microtrichomanes* [12/R] [cit. (IK) *Hymenoph.* 51 (1875)]
- F-21 *Nesopteris* [1 - AS/T] [cit. (IK) *Philipp. J.* 67: 65. (1938)]
- F-21 *Pleuromanes* [1 - AS/T] [cit. (UC) *Epimeliae Botanicae* 1851]
- F-21 *Polyphlebiium* [1 - AU/R] [cit. (IK) *Philipp. J.* 67: 55. (1938)]
- F-21 *Reediella* [1 - AU/R] [cit. (IK) *Webbia* 24: 718. (1970)]
- F-21 *Crepidophyllum* [cit. (IK) *American fürn Journal* 38 (1948)]
- F-21 *Rosenstockia* [1 - AU/R] [cit. (IK) *Gen. Fil. (Copeland)* 36 (1947)]
- F-21 *Selenodesmium* [1/R - RT] [cit. (IK) *Philipp. J.* 67: 80. (1938)]
- F-21 *Serpyllopsis* [3 - SA/R] [cit. (IPNI) *Afd. Natuurk. Kon. Akad. Wetensch.* 11: 318. (1861)]
- F-21 *Sphaerocionium* [0/R - RT] [cit. (IK) *Hymenophyllaceae (Presl)* 33 (1843)]
- F-21 *Trichomanes* [0/R - RT] [cit. (IAPT) *Sp. Pl.* 1097. 1 Mai 1753. (nom. cons.)]
- F-21 *Odontomanes* [cit. (IK) *Epimel. Bot.* 20 (1851)]
- F-21 *Neuromanes* [cit. (IK) *Atti Ist. Veneto* ii: 2. (1851)]
- F-21 *Ragatelus* [cit. (IK) *Hymenophyllaceae (Presl)* 16 (1843)]
- F-21 $\cong$ *Mortoniopteris* [cit. (IK) *Webbia* 31: 243. (1977)]
- F-21 $\cong$ *Pteromanes* [cit. (IK) *Webbia* 31(1): 244 (1977)]
- F-21 $\cong$ *Selanodesmium* [cit. (UC) *Acta Phytotax. Sin.* 269]

- F-21 $\cong$ *Trigonophyllum* [cit. (IK) *Webbia* 31(1): 242 (1977)]
- F-22 蚌壳蕨科 *Dicksoniaceae* [0/R-RST] [cit. (BR) *Reis. Br.* 2: 1047. (1848)]
- F-22 *Calochlaena* [1-AU/R] [cit. (IK) *J. Wash. Acad. Sci.* 12: 459. (1922)]
- F-22 *Cibotium* [0/T-RT] [cit. (IK) *Berlinisches Jahrbuch für der Pharmacie und für die damit Verbundenen Wissenschaften* 21 (1820)]
- F-22 *Pinonia* [cit. (IK) *Ann. Sci. Nat. (Paris)* 3: 507. (1824)]
- F-22 *Culcita* [0/R] [cit. (IK) *Tent. Pterid.* 135 (1836)]
- F-22 *Dicksonia* [13/R-RT] [cit. (IK) *Sert. Angl.* 30 (1788)]
- F-22 *Thyrsopteris* [cf. 3/R] [cit. (IK) *Linnaea* 9: 507. (1834)]
- F-23 桫欏科 *Cyatheaceae* [0/R-RST] [cit. (BR) *Wesen Farrenkr.* (119) (1827)]
- F-23 *Alsophila* [13/R-RT] [cit. (IK) *Prodr. Fl. Nov. Holland.* 158 (1810)]
- F-23 *Amphicosmia* [cit. (IK) *London J.* 1: 441. (1842)]
- F-23 *Amphidesmium* [cit. (IK) *Gen. Fil. (Schott)* t. 5. (1834)]
- F-23 *Chnoophora* [cit. (IK) *Enum. Filic.* 250 (1824)]
- F-23 *Dichorexia* [cit. (IK) *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* v: 5. (1848)]
- F-23 *Disphenia* [cit. (IK) *Tent. Pter.* 55 (1836)]
- F-23 *Nephelea* [cit. (IK) *Contr. Gray Herb.* 200: 37. (1970)]
- F-23 *Schizocaena* [cit. (IK) *Gen. Fil. (Hooker)* t. 2. (1838)]
- F-23 *Trichosorus* [cit. (IK) *Vid. Selsk. Skr.* v: 1. (1849)]
- F-23 *Thysanobotrya* [cit. (IK) *Bull. Buit.* ii: no. (1918)]
- F-23 *Cnemidaria* [3-SA/R] [cit. (UN)]
- F-23 *Hemistegia* [cit. (IK) *Fl. Tellur.* iii. 89 (1836)]
- F-23 *Microstegnus* [cit. (IK) *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* v: 5. (1848)]
- F-23 *Cyathea* [0/R-RT] [cit. (IK) *Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin)* 5: 416. (1793)]
- F-23 *Acanthea* [cit. (IPNI) *Pflanzenstoffe* 710 (1911) nomen.]
- F-23 *Gymnosphaera* [1-AS/T] [cit. (IK) *Enum. Pl. Javae* 2: 242. (1828)]
- F-23 *Hemitelia* [13/R] [cit. (IK) *Prodr. Fl. Nov. Holland.* 158 (1810)]
- F-23 *Actinophlebia* [cit. (IK) *Gefäßbündel für* 47 (1847)]
- F-23 *Cormophyllum* [cit. (IK) *Phytologist* 5: 237. (1857)]
- F-23 *Lophosoria* [13/S-RST] [cit. (IPNI) *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* v: 5. (1848)]
- F-23 *Sphaeropteris* [13/R-RT] [cit. (IPNI) *Journal für die Botanik* (2) (1801)]
- F-23 *Trichipteris* [3/S-RST] [cit. (IK) *Delic. Prag.* 1: 172. (1822)]
- F-24 硬蕨科 *Metaxyaceae* [3-SA/R] [cit. (BR) *Webbia* 24: 701. (1970)]
- F-24 *Metaxya* [3-SA/R] [cit. (IK) *Tent. Pterid.* 59 (1836)]
- F-25 稀子蕨科 *Monachosoraceae* [1/T-RST] [cit. (BR) *Acta Phytotax. Sin.* 16(4): 17. (1978)]
- F-25 *Monachosorum* [1/T-RT] [cit. (IK) *Bot. Zeitung (Berlin)* 6: 119. (1848)]
- F-25 *Monachosorella* [cit. (IK) *Bot. Mag. Tokyo* 41: 573. (1927)]
- F-25 *Ptilopteris* [1-AS/S-RST] [cit. (IK) *J. Bot.* 22: 138. (1884)]
- F-26 碗蕨科 *Dennstaedtiaceae* [0/T-RST] [cit. (BR) *Vorträge Bot. Stammesgesch.* 2: 655. (1909)]
- F-26 *Blotiella* [23/R] [cit. (IK) *Contr. Gray Herb.* 191: 96. (1962)]
- F-26 *Costaricia* [3-SA/R] [cit. (IK) *Bull. Soc. Bot. Genève* ii: 1. (1909)]

- F-26 *Dennstaedtia* [13/R - RT] [cit. (IPNI) *Journal für die Botanik* 2 (1801)]
- F-26 *Alectum* [cit. (IK) *Fil. Spec.* 41; 42. (1841)]
- F-26 *Coptodipteris* [cit. (IPNI) *Cytologia Fujii Jub.* Vol. 365. 1937. 1937]
- F-26 *Coptodipteris* [cit. (UC) *Cytologia* 315]
- F-26 *Fuziifilix* [cit. (IK) *Cytologia Fujii Jub.* Vol. 365 (1937)]
- F-26 *Paradennstaedtia* [cit. (IK) *J. Jap. Bot.* 27; 213. (1952)]
- F-26 *Patania* [cit. (IK) *Tent. Pterid.* 137 (1836)]
- F-26 *Sitobolium* [cit. (UC) *J. Bot. (Hooker)* 3; 418. 1841 cf. *Lond. Journ. Bot.* 1. 434. 1842]
- F-26 *Emodiopteris* [1 - AS/T] [cit. (IK) *Acta Phytotax. Sin.* 16(4): 21 (1978)]
- F-26 *Leptolepia* [1 - AU/R] [cit. (IK) *Festschr.* 50; jahr. (1882)]
- F-26 *Microlepia* [0/T - RT] [cit. (UN)]
- F-26 *Scyphofilix* [cit. (IK) *Gen. Nov. Madagasc.* 1 (1806)]
- F-26 *Scypholepia* [cit. (IK) *Hist. Fil.* 261 (1875)]
- F-26 *Odontosoria* [13/T - RT] [cit. (IK) *Mém. Foug.* 5; Gen. (1850)]
- F-26 *Lindsayopsis* [cit. (IK) *Die Chaetopterides* 347 (1882)]
- F-26 *Oenotrichia* [1 - AU/R] [cit. (IK) *University Publications in Botany* 16 (1929)]
- F-26 *Ormoloma* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Proc. Biol. Soc. Washington* 46; 143. (1933)]
- F-26 *Orthiopteris* [1/S - RST] [cit. (IK) *Bull. Bernice P. Bishop Mus.* 59; 14. (1929)]
- F-26 *Saccoloma* [13/R - RT] [cit. (IPNI) *Berl. Jahrb. f. d. Pharmacie.* 51 (1820)]
- F-26 *Sitobolium* [1 - AU/R] [cit. (IK) *Mém. Soc. Linn. Paris* 6(3): 262 (1827)]
- F-26 *Sphenomeris* [0/T - RT] [cit. (IAPT) *J. Wash. Acad. Sci.* 3; 144. 1913. (nom. cons.)]
- F-26 *Xyropteris* [cit. (IK) *Acta Bot. Neerl.* 6; 599. (1957)]
- F-27 鳞始蕨科 *Lindsaeaceae* [0/R - RST] [cit. (BR) *Reis. Br.* 2; 883. (1848)]
- F-27 *Cystodium* [1/R] [cit. (IAPT) *Hooker Gen. Fil. ad t.* 96. 1841. (nom. cons.)]
- F-27 *Lindsaea* [0/R - RT] [cit. (IK) *Mém. Acad. Roy. Sci. Turin* 5; 413. (1793)]
- F-27 *Lindsaya* [cit. (UC) *Enumeratio Filicum* 1824]
- F-27 *Lindsaenium* [cit. (IK) *Mém. Soc. Mus. Hist. Nat. Strasbourg* 4(1): 201 (1850)]
- F-27 *Sambirania* [cit. (IK) *Mém. Inst. Sci. Madagascar sér. B Biol. Vég.* 7; 34. (1956)]
- F-27 *Schizoloma* [cit. (IK) *Annales des Sciences Naturelle Botanique* 3 (1824)]
- F-27 *Synaphlebium* [cit. (IK) *J. Bot. (Hooker)* 3; 415. (1841)]
- F-27 *Stenoloma* [1/S - RST] [cit. (IPNI) *Mém. Foug.* 5; Gen. (1850)]
- F-27 *Tapeinidium* [1/S - RST] [cit. (IK) *Index Filic.* 631 (1906)]
- F-27 *Protolindsaya* [cit. (UN)]
- F-28 竹叶蕨科 *Taenitidaceae* [1/R - RST] [cit. (BR) *Webbia* 29; 1. (1975)]
- F-28 *Taenitis* [1/R - RT] [cit. (IK) *Anleit.* 3; 374. (1804)]
- F-28 *Oetasis* [cit. (UC) *Revis. Gen. Pl.* 2; 817. 1891.]
- F-29 姬蕨科 *Hypodematiaceae* [12/T - RST] [cit. (BR) *Acta Phytotax. Sin.* 13(1): 96. (1975)]
- F-29 *Hypodematium* [12/T - RT] [cit. (IPNI) *Flora* 16(2): 690 (1833)]
- F-30 蕨科 *Pteridiaceae* [0/R - RST] [cit. (BR) *Acta Phytotax. Sin.* 13(1): 96. (1975)]
- F-30 *Paesia* [13/R - RT] [cit. (IK) *Voy. Distr. Diam.* 1; 381. (1833)]
- F-30 *Pteridium* [0/T - RT] [cit. (IAPT) *Fl. Carniol.* 169. 15 Jun - 21 Jul 1760. (nom. cons.)]
- F-30 *Eupteris* [cit. (IK) *Phytologist* 2; 278. (1845)]

F-30 *Filix - foemina* [cit. (IK) **Family Herbal British Herbal**. (1755)]

F-31 凤尾蕨科 **Pteridaceae** [0/T - RST] [cit. (BR) **Schul - Bot.** 109. (1831)]

F-31 *Actiniopteris* [12/R - RT] [cit. (IK) **Fil. Spec.** 73: 79. (1841)]

F-31 *Acropteris* [cit. (IK) **Hort. Berol.** 2: 55. (1833)]

F-31 *Afropteris* [2 - AF/R] [cit. (IK) **Bol. Soc. Brot.** 2 30: 5, (err. typogr. Aropteris) (1956)]

F-31 *Ananthacorus* [3/S - RST] [cit. (IPNI) **Contr. U. S. Natl. Herb.** 10: 487. (1908)]

F-31 *Pteropsis* [cit. (IPNI) **Desv. Mém. Soc. Linn. Paris** 6: 218. (1827)]

F-31 *Anopteris* [3 - NA/T] [cit. (IK) **Nat. Pflanzenfam.** 1: (4) (1899)]

F-31 *Argyroschisma* [3/T - RT] [cit. (IK) **J. Bot. (Hooker)** 4: 50. (1841)]

F-31 *Astrolepis* [3/T - RT] [cit. (IK) **Amer. fürn J.** 82: 55. (1992)]

F-31 *Nothochlaena* [cit. (UC) **Enumeratio Filicum** 1824]

F-31 *Campteria* [1 - AU/R] [cit. (IK) **Tent. Pterid.** 146 (1836)]

F-31 *Chrysodium* [13/R] [cit. (IK) **Hist. d'Acrost.** 22 (1845)]

F-31 *Copelandiopsis* [cit. (IK) **Webbia** 28(2): 493 (1973)]

F-31 *Haplopteris* [1/T - RT] [cit. (IK) **Tent. Pterid.** 141 (1836)]

F-31 *Heterophlebium* [3 - SA/R] [cit. (IK) **Mém. Foug.** 5: Gen. (1850)]

F-31 *Histiopteris* [0/S - RST] [cit. (UN)]

F-31 *Litobrochia* [cit. (UC) **Tentamen Pteridographiae** 1836]

F-31 *Idiopteris* [1 - AS/T] [cit. (IK) **Kew Bull.** 431. t. 1. (1957)]

F-31 *Neurocallis* [13/S - RST] [cit. (IK) **Mém. Foug.** 2: Hist. (1845)]

F-31 *Ochropteris* [2/S - RST] [cit. (IK) **J. Bot. (Hooker)** 4: 158. (1841)]

F-31 *Paraceterach* [1 - AU/R] [cit. (IK) **Fragm. (Mueller)** 5(36): 138 (1866)]

F-31 *Parahemionitis* [1 - AS/S - RST] [cit. (IK) **Abstr. & Souv. Nation. Symp. Curr. Trends Pterid.** 4-6: October. (1991)]

F-31 *Pteris* [0/R - RT] [cit. (IPNI) **Fl. Carniol.** 170 (1760)]

F-31 *Pycnodoria* [cit. (IK) **Epimel. Bot.** 100 (1851)]

F-31 *Schizostege* [cit. (IK) **Fl. Hawaiian Isl. (Hillebrand)** 631 (1888)]

F-31 *Scoliosorus* [3 - SA/R] [cit. (IK) **Index Fil.** xxix. (1857) (1857)]

F-31 *Stemaria* [1 - AU/R] [cit. (IK) **Wiener Zeitschrift für Kunst Literatur Theater und Mode** 4 (155): 4 (1829)]

F-31 *Trismeria* [3 - NA/T] [cit. (IK) **Mém. Foug.** 5: Gen. (1850)]

F-32 卤蕨科 **Acrostichaceae** [0/R - RST] [cit. (BR) **J. Leunis Syn. Pflanzenk.** ed. 2, 3: 1453, 1458. (1874)]

F-32 *Acrostichum* [0/R - RT] [cit. (IK) **Species Plantarum** 2 (1753)]

F-32 *Chlamydogramme* [cit. (IK) **Gard. Bull. Singapore** 39(2): 157 (1987)]

F-32 *Pityrogramme* [cit. (UC) **Handb. Gewächsk.** ed. 3: 20. 1833.]

F-32 *Mesophlebion* [1/S - RST] [cit. (IK) **Blumea** 19: 29. (1971)]

F-32 *Mesoneuron* [cit. (IK) **Acta Phytotax. Sin.** 8: 325. (1963)]

F-33 光叶蕨科 **Stenochlaenaceae** [0/T - RST] [cit. (BR) **Acta Phytotax. Sin.** 16(4): 18. (1978)]

F-33 *Stenochlaena* [0/T - RT] [cit. (UN)]

F-33 *Chrisodium* [cit. (UC) **Fl. Graeff.** 73. 1871.]

F-33 *Lomariobotrys* [cit. (IK) **Mém. Foug.** 5: Gen. (1850)]

- F-34 中国蕨科 **Sinopteridaceae** [0/T-RST] [cit. (BR) **Acta Phytotax. Geobot.** 3: 50. (1934)]
- F-34 **Aleuritopteris** [13/T-RT] [cit. (IK) **Mém. Foug.** 5: Gen. (1852)]
- F-34 **Cheiloplecton** [3-NA/T] [cit. (UC) **Mém. Foug.** 311]
- F-34 **Cheilosoria** [1/T-RT] [cit. (IK) **Atti Ist. Veneto** v: 3. (1877)]
- F-34 **Pteridella** [cit. (UN)]
- F-34 **Cryptogramma** [0/T-RT] [cit. (IK) **Franklin Narr. Of a journey** 767 (1823)]
- F-34 **Phorolobus** [cit. (IK) **Mém. Soc. Linn. Paris** 6(3): 291 (1827)]
- F-34 **Doryopteris** [0/R-RT] [cit. (IAPT) **J. Bot. (Hooker)** 3: 404. Mai 1841. (nom. cons.)]
- F-34 **Calciophilopteris** [cit. (IK) (Tryon) **Yesilyurt & H. Schneid. Phytotaxa** 10: 55. (2010)]
- F-34 **Platyloma** [cit. (IK) **J. Bot. (Hooker)** 4: 160. (1841)]
- F-34 **Leptolepidium** [1-AS/T] [cit. (IK) **Acta Bot. Yunnan.** 1(1): 115 (1979)]
- F-34 **Mildella** [3-SA/R] [cit. (IK) **Rendic. Istituto Lombardo sci. & lett.** ii: 9. (1876)]
- F-34 **Negripteris** [cf. 2/R] [cit. (IK) **Nuovo Giorn. Bot. Ital.** ser. 2, 53: 130, t. 14-16. (1946)]
- F-34 **Rutheopsis** [cit. (IK) **Cuad. Bot. Canar.** 26-27: 61 (1976) nom.]
- F-34 **Notholaena** [0/R-RT] [cit. (IK) **Prodr. Fl. Nov. Holland.** 145 (1810)]
- F-34 **Ormopteris** [3-SA/R] [cit. (IK) **Hist. Fil.** 281 (1875)]
- F-34 **Pellaea** [0/T-RT] [cit. (IAPT) **Fil. Spec.** 59. 3-10 Sep 1841. (nom. cons.)]
- F-34 **Choristosoria** [cit. (IK) **v. Deck. Reisen** 3: 3() (1879)]
- F-34 **Sinopteris** [1-AS/T] [cit. (IK) **Bull. Fan Mem. Inst. Biol.** 4: 359. (1933)]
- F-35 铁线蕨科 **Adiantaceae** [0/R-RST] [cit. (BR) **Hist. Brit. Ferns** 5. (1840)]
- F-35 **Adiantopsis** [3/R-RT] [cit. (IK) **Mém. Foug.** 5: Gen. (1852)]
- F-35 **Allosorus** [3-SA/R] [cit. (IK) **Schrad. Neues Journ. Bot.** 1(2): 36 (1805) (nom. cons.)]
- F-35 **Myriopteris** [cit. (IK) **Mém. Foug.** 5: Gen. (1850)]
- F-35 **Aspidotis** [23/R] [cit. (IPNI) **Gen. Fil. (Copeland)** 68. 1947 (IF)]
- F-35 **Aspleniopsis** [1-AU/R] [cit. (IK) **Chaetopterides** 324 (1882)]
- F-35 **Austrogramme** [cit. (IK) **Ann. Sci. Nat. Bot.** 5 18: 278. (1873)]
- F-35 **Rheopteris** [cit. (IK) **Nova Guinea** ser. 2, 7: 2. (1956)]
- F-35 **Bommeria** [3-NA/T] [cit. (IPNI) **Dict. de Bot.** 1. 448. 1876; **Bull. Soc. Fr.** 27. 327. 1880. (1876)]
- F-35 **Stenogramma** [cit. (UC) **Mexic. Pl.** 309]
- F-35 **Cassebeera** [3-SA/R] [cit. (IK) **Enum. Filic.** 216 (1824)]
- F-35 **Ceropteris** [3-SA/R] [cit. (IK) **Fil. sp.** 141 (1841)]
- F-35 **Cerosora** [1-AS/T] [cit. (IK) **J. Linn. Soc. Bot.** 24: 260. (1887)]
- F-35 **Cheilanthes** [0/R-RT] [cit. (IAPT) **Syn. Fil.** 5 126. Mar-Apr 1806. (nom. cons.)]
- F-35 **Cosentinia** [cit. (IK) **Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo** 1: 219. (1866)]
- F-35 **Hemionanthes** [cit. (IK) **Fl. Novo-Galiciana** 17: 286. (1992)]
- F-35 **Oosporangium** [cit. (IK) **Atti Ist. Veneto** iii: 12. (1867)]
- F-35 **Pomatophytum** [cit. (IK) **Contrib. West. Bot.** no. 16: 12. (1930)]
- F-35 **Chrysochosma** [3-SA/R] [cit. (IK) **Hist. Fil.** 279 (1875)]
- F-35 **Cincinalis** [3-SA/R] [cit. (IK) **Syst. Pl. (Gleditsch)** 290 (1764)]
- F-35 **Dictyogramme** [3-SA/R] [cit. (IK) **Mém. Foug.** 5: Gen. (1850)]
- F-35 **Eriochasma** [1-AU/R] [cit. (IK) **Paxton's Botanical Dictionary** 2nd: edition. (1868)]
- F-35 **Eriosorus** [3/R-RT] [cit. (IK) **Mém. Foug.** 5: Gen. (1850)]
- F-35 **Gymnogramme** [cit. (IK) **Mém. Soc. Linn. Paris** 6: 214. (1827)]
- F-35 **Psilogramme** [cit. (IK) **Chaetopterides** 12 (1882)]

- F-35 *Gymnogramma* [3-SA/R] [cit. (UC) *Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk.* 5: 304. (1811)]
- F-35 *Eriosonia* [cit. (IK) *Webbia* 31(1): 242 (1977)]
- F-35 *Pityromeria* [cit. (IK) *Brenesia* 16: 96. (1979)]
- F-35 *Holttumia* [cit. (IK) *Philipp. J.* 74: 153. (1941)]
- F-35 *Jamesonia* [3-SA/R] [cit. (IK) *Icon. Filic. t.* 178. (1830)]
- F-35 *Neurogramma* [1-AU/R] [cit. (IK) *Fil. sp.* 136: 138. (1841)]
- F-35 *Neurosoria* [1-AU/R] [cit. (IPNI) *Botanische Zeitung* 27 (1869)]
- F-35 *Pentagramma* [3-NA/T] [cit. (IK) *Amer. fürn J.* 80(1): 13 (1990)]
- F-35 *Pterozonium* [3-SA/R] [cit. (IK) *Mém. Foug.* 5: Gen. (1850)]
- F-35 *Syngrammatopsis* [cit. (IK) *Mutisia.* no. 7: 7. (1952)]
- F-35 *Saffordia* [3-SA/R] [cit. (IK) *Smithsonian Misc. Collect.* 61: No. (1913)]
- F-35 *Syngramma* [1/S-RST] [cit. (UN)]
- F-35 *Craspedodictyum* [cit. (IK) *Philipp. J.* 6: 84. (1911)]
- F-35 *Toxopteris* [cit. (IK) *Atti Ist. Veneto v.* 3. (1877)]
- F-35 *Trachypteris* [23/R] [cit. (IPNI) *Monogr. Elaphoglossum* 150. 1899 (IF)]
- F-36 水蕨科 *Parkeriaceae* [0/S-RST] [cit. (BR) *Exot. Fl.* 2: ad t. (1825)]
- F-36 *Ceratopteris* [0/S-RST] [cit. (IPNI) *Bull. Sci. Soc. Philom. Paris* 8: 186. (1821)]
- F-36 *Ellobocarpus* [cit. (IK) *Enum. Filic.* 117 (1824)]
- F-36 *Parkeria* [cit. (IK) *Exot. Fl.* 2 t. 147. (1825)]
- F-36 *Teleozoma* [cit. (IK) *Narr. of a journey* 767 (1823)]
- F-37 裸子蕨科 *Hemionitidaceae* [0/T-RST] [cit. (BR) *Webbia* 21: 487. (1966)]
- F-37 *Anogramma* [0/R-RT] [cit. (IPNI) *Filicum Species in Horto Regio Botanico Berolinensis Cultae* 1841]
- F-37 *Coniogramme* [0/T-RT] [cit. (IAPT) *Mém. Soc. Mus. Hist. Nat. Strasbourg* 5: 167. 1852. (nom. cons.)]
- F-37 *Dyctiogramme* [cit. (IK) *Epimel. Bot.* 263 (1851)]
- F-37 *Neurosorus* [cit. (IPNI) *Atti Ist. Veneto II.* 2. 168. 1851. 1851]
- F-37 *Neurogramme* [cit. (UC) *Engl. Prantl Nat. Pflanzenfam.* 1 (4): 264. 1899.]
- F-37 *Notogramma* [cit. (UC) *Epimel. Bot.* 263. 1849.]
- F-37 *Notogramme* [cit. (IK) *Epimel. Bot.* 263 (1851)]
- F-37 *Gymnopteris* [13/R-RT] [cit. (IK) *Tent. Pterid.* 244 (1836)]
- F-37 *Hemionitis* [13/R-RT] [cit. (IPNI) *Sp. Pl.* 2: 1077. (1753)]
- F-37 *Paragymnopteris* [1-AS/T-RT] [cit. (IK) *Indian fürn J.* 10(1-2): 227 (1994)]
- F-37 *Pityrogramma* [0/S-RST] [cit. (IK) *Handbuch zur Erkennung* 3 (1833)]
- F-38 车前蕨科 *Antrophyaceae* [0/R-RST] [cit. (BR) *Acta Phytotax. Sin.* 16(3): 11. (1978)]
- F-38 *Antrophyum* [0/R-RT] [cit. (IK) *Willd. Sp. Pl.* 5: 127. (1810)]
- F-38 *Solenopteris* [cit. (UC) *List.* n. 43. 1828, nom. nud.]
- F-38 *Polytaenium* [3-SA/R] [cit. (IPNI) *Bull. Torrey Bot. Club* 38: 169. (1911)]
- F-39 书带蕨科 *Vittariaceae* [0/T-RST] [cit. (BR) *Sunyatsenia* 5: 210, 232. (1940)]
- F-39 *Anetium* [13/R-RT] [cit. (IPNI) *Tijdschr. Nat. Gesch.* 7. 395. 1840. 1840 (IF)]
- F-39 *Pteridanetium* [cit. (IK) *Gen. Fil. (Copeland)* 224 (1947)]

- F-39 *Diclidopteris* [1 - AU/R] [cit. (IK) **United States Exploring Expedition (Wilkes Expedition)** 16 (1854)]
- F-39 *Hecistopteris* [3/R - RT] [cit. (IK) **Lond. Journ. Bot.** 1: 193. (1842)]
- F-39 *Monogramma* [0/R - RT] [cit. (UC) **Krypt. Gewächsk.** 1809]
- F-39 *Pleurofossa* [cit. (IK) **J. Jap. Bot.** 12: 408. (1936)]
- F-39 *Vaginopteris* [cit. (IK) **Fam. Prof. Nakai** 203 (1943)]
- F-39 *Vaginularia* [1/S - RST] [cit. (IK) **Dix. Sess. D. Congr. Sci. France** 1: 178. (1843)]
- F-39 *Vittaria* [0/T - RT] [cit. (IK) **Mém. Ac. Turin** 5: 413. (1793)]
- F-39 *Radiovittaria* [cit. (IK) **Syst. Bot.** 22(3): 514 (1997)]
- F-40 蹄盖蕨科 *Athyriaceae* [0/T - RST] [cit. (BR) **Taxon** 5: 25. (1956)]
- F-40 *Acystopteris* [1 - AS/S - RST] [cit. (IK) **Taxon** 26(2-3): 326 (1977)]
- F-40 *Allantodia* [1/T - RT] [cit. (IPNI) **Acta Phytotax. Sin.** 9(1): 53-54 (1964)]
- F-40 *Microstegia* [cit. (IK) **Epimel. Bot.** 90 (1851)]
- F-40 *Anisocampium* [1 - AS/T - RT] [cit. (IK) **Epimel. Bot.** 58 (1851)]
- F-40 *Athyriopsis* [1/T - RT] [cit. (IPNI) **W. M. Chu Fl. Reipubl. Popularis Sin.** 3(2): 331 (1999)]
- F-40 *Athyrium* [0/T - RT] [cit. (IPNI) **Bull. Herb. Boissier** 4: 668. (1896)]
- F-40 *Anisogonium* [cit. (IK) **Handb. fürns Brit. India** 192 (1883)]
- F-40 *Homalosorus* [cit. (IK) **Webbia** 31: 246. (1977)]
- F-40 *Hypochlamys* [cit. (IK) **Mém. Foug.** 5: Gen. (1850)]
- F-40 *Pseudathyrium* [cit. (UC) **Phytologist** 314]
- F-40 *Callipteris* [1/R - RT] [cit. (IK) **Brittonia** 51(4): 360f (1999)]
- F-40 *Cornopteris* [1 - AS/T - RT] [cit. (IK) **Mém. Inst. Sci. Madagascar sér. BBiol. Vég.** 7: t. 2, f. 5 - 7 t. 2 (1956)]
- F-40 *Neoathyrium* [cit. (IK) **Acta Phytotax. Sin.** 20(1): 76 (1982)]
- F-40 *Cystoathyrium* [1 - AS/T] [cit. (IK) **Acta Phytotax. Sin.** 11: 22. (1966)]
- F-40 *Cystopteris* [0/T - RT] [cit. (IAPT) **Neues J.** 1(2): 5, 26. Oct - Nov 1805. (nom. cons.)]
- F-40 *Cystea* [cit. (UN)]
- F-40 *Cyclopteris* [cit. (UC) **Nat. Arr. Brit. Pl.** 304]
- F-40 *Cyste* [cit. (UC) **Fl. Hautes - Pyrénées** 303]
- F-40 *Filicula* [cit. (IK) **Pl. veron. Suppl.** 55 (1754)]
- F-40 *Diplaziopsis* [1/T - RT] [cit. (UC) **Index Filicum** 1857]
- F-40 *Diplazium* [0/R - RT] [cit. (IK) **Schrad. Journ.** 1800 (2) 61. (1801)]
- F-40 *Digrammaria* [cit. (IPNI) **Tent. Pterid.** 116 (1836)]
- F-40 *Lotzea* [cit. (IK) **Linnaea** 20: 358. (1847)]
- F-40 *Trichiogramme* [cit. (IK) **Chaetopterides** 5 (1882)]
- F-40 *Dryoathyrium* [1 - AS/T - RT] [cit. (IK) **Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot.** 11: 79. (1941)]
- F-40 *Arcynospermum* [cit. (IK) **Bull. Soc. Nat. Mosc.** (1858) I. 191.]
- F-40 *Drypteris* [cit. (UC) **Ind. Fil. Suppl.** 3: 41. 1934.]
- F-40 *Gymnocarpium* [0/T - RT] [cit. (IK) **The Phytologist** 4: 371. (1851)]
- F-40 *Carpogymnia* [cit. (UN)]
- F-40 *Curraria* [cit. (UC) **Bartonia** 301]
- F-40 *Kuniwatsukia* [1 - AS/T] [cit. (IK) **Webbia** 28: 455. (1973)]
- F-40 *Lunathyrium* [13/T - RT] [cit. (IK) **Acta Phytotax. Geobot. Kyoto** 1 (1932)]
- F-40 *Monomelangium* [1 - AS/T - RT] [cit. (IK) **Bot. Mag. Tokyo** 42: 343. (1928)]
- F-40 *Pseudocystopteris* [1 - AS/T - RT] [cit. (IK) **Vasc. Pl. Hengduan Mountains** 1: 77. (1993)]

- F-40 *Rhachidosorus* [1 - AS/T - RT] [cit. (IK) *Acta Phytotax. Sin.* 9: 73. (1964)]
- F-42 金星蕨科 *Thelypteridaceae* [0/T - RST] [cit. (BR) *Webbia* 24: 709. (1970)]
- F-42 *Abacopteris* [1/S - RST] [cit. (IK) *Congr. sci. de France* x. (me) sess. 1: 178. (1843) (me) sess. 1: 178. (1843)]
- F-42 *Ampelopteris* [12/S - RST] [cit. (IPNI) *Copel. Gen. Fil.* (Copeland) 144 (1947)]
- F-42 *Amphineuron* [12/R - RT] [cit. (IK) *Blumea* 23(2): 215 (1977)]
- F-42 *Chingia* [1/R - RT] [cit. (IK) *Blumea* 19 (1971)]
- F-42 *Christella* [2 - EU/T] [cit. (IPNI) *African Bot.* 40(2): 147 (1974)]
- F-42 *Coryphopteris* [1 - AS/S - RST] [cit. (IK) *Blumea* 19: 33. (1971)]
- F-42 *Craspedosorus* [1 - AS/T] [cit. (IK) *Acta Phytotax. Sin.* 16(4): 24 (1978)]
- F-42 *Cyclogramma* [1 - AS/T - RT] [cit. (IK) *Acta Phytotax. Geobot.* 7(1): 55 (1938)]
- F-42 *Cyclosorus* [0/T - RT] [cit. (IPNI) *Fl. Madagasc.* 5(1): 296 (1958)]
- F-42 *Dimorphopteris* [cit. (IK) *Acta Phytotax. Geobot.* 19: 8. (1961)]
- F-42 *Steiropteris* [cit. (IK) *Webbia* 28: 449. (1973)]
- F-42 *Dictyocline* [1 - AS/T - RT] [cit. (IK) *Dictyocline Gard. Chron.* 854 (1855)]
- F-42 *Dictyogramma* [cit. (UC) *Atti Reale Ist. Veneto Sci. Lett. Arti* 5 (3): 591. 1877.]
- F-42 *Glaphyopteridopsis* [1 - AS/T] [cit. (IK) *Acta Phytotax. Sin.* 8: 320. (1963)]
- F-42 *Goniopteris* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Tent. Pterid.* 181 (1836)]
- F-42 *Lastrea* [13/R - RT] [cit. (IK) *Dict. Class. d'Hist. Nat.* 6: 588. (1824)]
- F-42 *Leptogramma* [1 - AS/T - RT] [cit. (IPNI) *J. Bot. (Hooker)* 4(no. 25): 51 (-52) 1841 (Jun 1841)]
- F-42 *Macrothelypteris* [0/T - RT] [cit. (IK) *Acta Phytotaxonomica Sinica* 8 (1963)]
- F-42 *Meniscium* [13/T - RT] [cit. (IPNI) *Gen. Pl.* ed. 8(a) 2: 757. (1791)]
- F-42 *Mesopteris* [1 - AS/S - RST] [cit. (IK) *Acta Phytotax. Sin.* 16(4): 21 (1978)]
- F-42 *Metathelypteris* [1 - AS/T - RT] [cit. (IK) *Acta Phytotax. Sin.* 8: 305. (1963)]
- F-42 *Oreopteris* [1 - AS/T] [cit. (IK) *Folia Geobot. Phytotax.* 4: 46. (1969)]
- F-42 *Parathelypteris* [1 - AS/T - RT] [cit. (IK) *Acta Phytotax. Sin.* 8(4): 303 (1963)]
- F-42 *Amphineuron* [cit. (UC) *Bulmea* 23: 211. 1977, pro parte.]
- F-42 *Wagneriopsis* [cit. (UN)]
- F-42 *Phegopteris* [0/R - RT] [cit. (IPNI) *Watt Canad. Naturalist & Quart. J. Sci.* n. s. 3: 29. (1866)]
- F-42 *Plesioneuron* [1 - AU/R] [cit. (IK) *Blumea* 22: 232. (1975)]
- F-42 *Pneumatopteris* [0/R - RT] [cit. (IPNI) *Blumea* 21(2): 304 (1973)]
- F-42 *Pronephrium* [1/T - RT] [cit. (IPNI) *Blumea* 20(1): 118 (1972)]
- F-42 *Pseudocyclosorus* [12/T - RT] [cit. (IK) *Acta Phytotax. Sin.* 8(4): 324 (1963)]
- F-42 *Pseudophegopteris* [13/T - RT] [cit. (IK) *Acta Phytotax. Sin.* 8(4): 314 (1963)]
- F-42 *Toppingia* [cit. (IK) *Fl. Hawaiiensis* (Degener) 7: fam. (1968)]
- F-42 *Sphaerostephanos* [0/S - RST] [cit. (IK) *African Bot.* 40: 165. (1974)]
- F-42 *Stegnogramma* [12/T - RT] [cit. (IK) *Enum. Pl. Javae* 2: 172. (1828)]
- F-42 *Thelypteris* [0/T - RT] [cit. (IAPT) *Icon. Pl.* ed. Keller; 3, 45. 18 Oct 1763. (nom. cons.)]
- F-42 *Trichoneuron* [1 - AS/T] [cit. (IK) *Acta Phytotax. Sin.* 10: 118. (1965)]
- F-42 *Trigonospora* [1 - AS/S - RST] [cit. (IK) *Blumea* 19: 29. (1971)]
- F-43 铁角蕨科 *Aspleniaceae* [0/R - RST] [cit. (BR) *Hist. Brit. Ferns* 6. (1840)]
- F-43 *Antigramma* [3 - SA/R] [cit. (IK) *Tent. Pterid.* 120 (1836)]