

中國傳世醫學醫藥史料匯編
(第三輯)



中國傳世醫學醫藥史料匯編

(第三輯)

二



霍亂門

霍亂

內經云歲土不及風乃大行民病飧泄霍亂體重腹痛
筋骨繇併○巢氏病源云霍亂吐瀉皆由溫涼不調陰陽
淆混二氣相干致腸胃之間變而為霍亂寒氣客於
脾則瀉客於胃則吐亦由飲酒肉腥膾生冷過度或因
坐卧濕地當風取涼使風冷之氣歸於三焦傳於脾胃
脾胃得冷水穀不消皆成霍亂○陳無擇曰霍亂者
心腹卒痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛眩暈先心痛則
先吐先腹痛則先利心腹俱痛吐利並作甚則轉筋
入腹則斃霍亂惡證無越於斯蓋陰陽反戾清濁相
干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔逸治
之唯宜溫煖更詳別三因以調外之因諸風則惡

風有汗傷寒則惡寒無汗胃濕則重著傷暑則熱
燠內因九氣所致鬱聚痰涎飲痞膈不通遂致滿
悶隨其勝復必作吐利或諸飽食膾炙恣食乳酪水腫
寒將水肯酒胃既膜脹脾藏停凝必內鬱發遂或吐利當
從不內外因也○內經云脉伏者霍亂○脉訣云霍亂脉
微細者生微遲氣少不言者死

治法

霍亂陽明證宜和中平胃建中輩或四君子湯脉浮自
汗四君子加桂主之脉浮無汗四君子加麻黃吐利轉筋
脇下痛脉弦者不尅土也故痛甚平胃加木瓜五苓或建
中加柴胡木瓜

吐利轉筋腹中痛體重脉沉而細者四君子加白芍良姜

吐利四肢拘急，脈沉而遲，此少陰霍亂。四君子加姜、附厚朴。

吐利四肢厥冷，脈微緩，屬厥陰。建中加歸附。

吐利頭痛而身熱，熱多，飲水者五苓散；寒多，不用水者理中丸主之。

大陰證，霍亂，理中湯加橘紅名湯中湯。

若吐下必腹作痛，手足逆冷，理中去白朮加熟附名四順湯。

吐利後轉筋者，理中加火煨石膏兩。

大法生薑理中湯，嘔好，不渴，可如渴者用五苓散。

有吐者，以二陳湯探吐，亦有可下者。

轉筋皆屬少血，熱四物湯加酒芩、紅花、蒼朮、南星煎服。

乾霍亂者最難治死在頃刻升降不通當以吐提其氣
極是良法世多用鹽湯此條內有物所傷外有邪氣所遏
有用吐者則蕤發散之義有用溫藥解散者不可用
涼藥三陳湯加川芎蒼朮防風白芷生薑煎服

人於夏月多食瓜果多飲冷乘風以致食留不化因食
成痞隔絕上下遂成霍亂以六和湯倍加藿香煎服
霍亂切不可預米粥湯飲之立死

○附養生方導引法轉筋不住男子以手挽其陰女子以
手攢亂近兩邊

一法偃卧展兩脛兩手外踵者相向亦鼻內氣自極七息
除兩膝寒脛骨疼轉筋

一法覆卧傍視立兩踵生腰鼻內氣去轉筋

四君子湯

平胃散方並見脾胃門

建中湯方見虛損門

五苓散

理中丸並見傷寒門

治中湯方見溫病門

二陳湯方見痰飲門

六和湯

砂仁

半夏

杏仁

人參

甘草

炙各二兩

赤茯苓

藿香

扁豆炒

木瓜各二兩

右咬咀每服五升水二盞姜三片棗一枚煎八分溫服

附子粳米湯治霍亂四逆吐少嘔多者

中附子一枚炮

粳米五合

半夏二兩半

大棗十枚

乾姜

仲景方無

甘草

炙各二兩

右咬咀每服八錢水二盞煎至米熟去滓服

天水散 治霍亂吐瀉轉筋厥冷煩躁飲水者宜用生薑細

切如絲新汲井水漬之調藥可服之若吐再服多服有效

五苓散 方見傷寒門 治霍亂吐瀉熱多飲飲水者効

糯米彊水 治上吐下瀉心腹疼痛者水食不下

糯米 一百二十粒 生薑 一兩 搗細新汲水解服

寒卒 無染地清水亦可掘地放水澄清飲之

桂苓甘露飲 治濕氣霍亂吐瀉

官桂 人參 霍香 各五兩 茯苓

白朮 甘草 炙 葛根 澤瀉

石膏 寒水石 各兩 滑石 三兩 木香 二兩

右為末每服二升白湯或姜湯調服煎亦可 一方無指參

理中湯 見傷寒門 治霍亂吐瀉轉筋厥冷寒多不飲水病退不食

本方內加後藥

砂仁

肉豆蔻

姜黃

木瓜湯

治霍亂吐瀉頭旋眼暈手足轉筋四肢逆冷

吳茱萸

泡十次

木瓜

鹽

右三味各等分炒焦為末每服三升入白沸湯內再煎二
二沸冷熱如意服

治乾霍亂俗呼絞腸痧不可忍或展轉在地或起或倒其腸
絞縮冷汗出須臾能令人死上不得吐下不得瀉上下不能得
透陰陽不得升降致令如此危惡急用此吐之

炒鹽

半匙

右以百沸湯二三碗泡之令患者盡服却以鷄翎探吐鹽
湯盡出其涎即定若腹尚痛乃下末通故也宜服末復

丹升降陰陽續以理中加陳皮調理霍亂所下過手足
逆冷六脉沉細氣少不語宜附子理中湯腹中痛加桂
一方 鹽湯吐後將砂石炒赤色用冷水淬之良久旋清服
一二合効

一方 陳壁土 陳艾 陳樟木 各等分

右三味濃煎連進三四服即安

黃連香薷湯 治夏月霍亂上吐下瀉心腹疼痛轉筋厥冷

香薷三升 黃連二升 厚朴二升 生薑四升

右先將朴姜黃三味一處搗於砂石器內炒紫色取出同
香薷用水一斗酒一斗煎八分去粗用磁器盛坐新汲水中
浸水冷服未効再一服無有不愈但煎炒皆不犯銅鉄
暑溫腫滿合香薷散加姜三片木香車前子霍亂加

木瓜 藿香 脚氣作痛加木瓜羌活蒼朮枳殼陳皮半

夏甘草姜葱 嘔逆惡心丹加烏梅 煩燥加苦竹葉山

梔子茵陳車前子 加丁香人參白朮茯苓陳皮黃芪

木瓜甘草名十味香薰飲

木瓜湯 治霍亂吐瀉轉筋擾悶

吳茱萸湯洗七次乾炒一斗 木瓜一斗半 茴香炒一斗

紫蘇葉 五斗 甘草 冬三斗

右吹咀作一服用水二斗要姜五片煎八分食前服

訶子散 治心脾冷痛霍亂吐利如神

訶子 去核 甘草 炙 厚朴 製 乾姜

草藥 陳皮 良姜 茯苓

神效 妙各等分

右為細末每服二勺入鹽豉小水煎服

七氣湯治七氣鬱結五臟之間互相刑剋陰陽不和揮霍變

亂吐利交作

半夏湯洗五兩

厚朴姜製

桂心各三兩

白芍藥

茯苓

去皮各二兩

紫蘇葉

橘皮各三兩

人參去蘆二兩

右咬咀每服四勺水一盞姜七片棗一枚煎七分空心溫服

止渴湯治霍亂煩渴

甘草炙

人參去芦

麥門冬去心

茯苓

去皮

桔梗

瓜蒌根

葛根

澤瀉各五勺

右為細末每服二勺蜜服調服

既濟湯

治霍亂後霍亂不得眠

人參去芦

甘草

淡竹葉

各一兩

麥門冬

洗心

附子炮半兩

半一反湯洗五分

右咬咀每服四升水煮姜五片粳米百餘粒煎空心溫服

麥門冬湯

治霍亂已愈煩熱不鮮多洩飲水小便不利

麥門冬去心

陳皮去白

半夏湯洗去

白茯苓去皮

白朮

炒冬三

甘草

人參冬一升二分

小麥一升半

右咬咀分三貼每貼水二升生薑五片烏梅一箇煎八分服

洗法

治霍亂轉筋用蓼一把去兩頭水煎薰洗一方用陳大蓼

漬法

治霍亂轉筋入腹鹽多用煎湯漬之

沙證

沙證狀類傷寒頭痛嘔惡渾身壯熱手足指末微厥或腹痛

悶亂煩更難知人先濃煎艾湯試之如吐即是發沙證也

沙證

內經

(二)

醫林類證集要

(二)

二

一方 可用三月香退紙剪碎安枕中以碟蓋之以百沸湯
泡半碗仍以別紙封閉枕縫良久乘熱服就睡以厚
被蓋汗出愈

又近時多有頭額上及胸前兩邊有小紅點在皮膚者却用紙
燃條或大燈草微蘸香油於燈上點燒紅點上燦爛者是
又名水傷寒用樟木煎湯服或以葱豉湯蓋令汗出即
愈如腹痛不止又用針於兩手十指近甲稍針出黑血即愈
一方 治乾霍亂及沙証用苧麻蘸油水於項頸兩肋兩膝
腕處搖見血凝紅點起了然後蓋覆喫熱湯或葱豉湯或
葱豉湯得汗即愈誠不藥之良法也

一方 白礬 土先

右等分為末每服二分白滾湯調服

水沙證乃兩足墜痛可兩脚兩腠內兩筋兩骨間即委中穴刺之出血立愈

鹽湯吐法 即前治乾霍亂方同 治心腹痞痛冷汗出脹悶欲絕俗呼絞腸沙今考之乃乾霍亂亦山嵐瘴氣飢飽失宜陰陽暴亂而致

一方治絞腸沙腹痛嘔吐泄瀉及霍亂中暑煩渴不省人馬糞研同蜜搗濾過新汲水化下隨手安

一方治絞腸沙先以姜湯飲之立吐方是其證用白礬末白湯調一另泡起服之

灸法 治霍亂已死腹中尚有暖氣用鹽內臍中灸之七壯仍灸氣海二七壯在臍下一寸半

一法 灸霍亂吐瀉 上管在巨關下一寸去蔽骨三寸灸

二十七壯

灸管在上腕下寸灸二十七壯

神闕當臍中

灸三壯

水分在下腕下一寸臍上一寸灸七壯蓋水穀不分

而後泄瀉此穴能分水穀也

一法治轉筋入腹痛欲死者使四人捉手足灸臍左邊二

十四壯

轉筋十指攣急不得屈伸灸脚外踝骨上七壯

○易簡諸方

一方

治霍亂吐瀉其効如神用生薑三兩搥碎酒一升煮

三四沸頓服

一方

治霍亂吐瀉服藥即吐無法可治此方之効用井泉

水半碗百沸湯半碗相合服之

外臺秘要

備急霍亂吐利用火灸高良薑今焦香每用

二兩剉碎酒一升煎三四沸去粗頓服

亦治腹痛惡氣

一方 治霍亂吐瀉取菜豆葉搗絞汁和少醋服之

一方 治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下飲好若酒三盞少老羸者可飲三盞

一方 治霍亂心腹脹滿氣未得吐下小蒜一升吹咀以水三升煮取一升半分服

一方 治霍亂轉筋用皂角為末吹二豆入鼻中得嚏便瘥

本草云 治霍亂煩躁卧不安穩葱白二十茎大棗二十枚以水二升煎取一升以綿濾過去滓頓服

一方 治霍亂卒熱心煩渴研粟米泔取汁飲數升瘥

一方 治霍亂不吐不下用丁香十四枚為末以沸湯一盞調服

一方 治沙瀉發用水紅花根去苗洗淨剉水一碗新磁瓶內