

国家护士（师）资格考试



直通车系列

2016

护理学（护师）考试 易混易错2000题

主编 许健瑞

- ▶ **高含金量** 高频考点全覆盖，含历年真题
- ▶ **高针对性** 2000个易混易错知识点深度剖析（含真题）
- ▶ **高附加值** 赠送《考试宝典》体验卡
- ▶ **高含金量+高针对性+高附加值=高通过率**

中国医药科技出版社

国家护士（师）资格考试直通车系列

2016

护理学（护师）考试 易混易错 2000 题

主编 许健瑞
编者 黄琳俐 侯建炜 阮 丽
孙 英 韦海滔 王继昌
潘 敏 岳 娟
组织 覃丽洁 杨丽芬

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为国家护士(师)资格考试直通车系列丛书之一,全书共20套单元测试卷,每套测试卷的题型划分均按考试标准进行,试题紧扣考试大纲,依托于《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据,选取2000道考生易错易混淆知识点试题,由名师对易错知识点进行深度剖析,对易混淆知识点试题进行对比解析,使考生更容易去区分、掌握这些易错易混淆的知识点,提高考生做题正确率。

图书在版编目(CIP)数据

2016 护理学(护师)考试易混易错2000题 / 许健瑞主编. —北京:
中国医药科技出版社, 2016. 1

国家护士(师)资格考试直通车系列

ISBN 978-7-5067-7921-0

I. ①2… II. ①许… III. ①护理学—护士—资格考试—习题集
IV. ①R47-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第265912号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889×1194mm¹/₁₆

印张 15¹/₄

字数 396千字

版次 2016年1月第1版

印次 2016年1月第1次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-7921-0

定价 32.00元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前 言

护理学（护师）考试是为贯彻原人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自 2001 年正式开始实行。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力，作为单位聘任相应技术职务的必要依据。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，我们特组织有关专业教师编写了《2016 护理学（护师）考试易混易错 2000 题》。本书适合考生在复习中期使用，立足考试大纲，依托《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据，选取 2000 道考生易错、易混淆知识点试题，由名师对易错知识点进行深度剖析，对易混淆知识点试题进行对比解析，让考生轻松掌握试题要点，特别是本书包含了部分历年真题中易混易错试题，供考生参考复习。

《2016 护理学（护师）考试易混易错 2000 题》全书的亮点：

1. 专业的编写委员会。编写成员均是在高校任职的一线教师兼在医院任职，对护理学（护师、主管护师）专业技术资格考试有着十多年的教学、培训经验。
2. 试题的含金量高。全书紧扣考试大纲，精选历年考生易混易错的试题。
3. 解析全面详细、举一反三。
4. 赠送《考试宝典》体验卡。更多试题讲解视频免费试听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活体验卡使用。《考试宝典》是集医学类考试、经济类考试、建筑类考试等为一体的、专业的职称类考试题库软件。海量题库、网络视频课程是考生首选的数字化复习资料。

编 者
2015 年 12 月

目 录

单元一	1
单元二	18
单元三	34
单元四	51
单元五	65
单元六	75
单元七	87
单元八	98
单元九	110
单元十	120
单元十一	130
单元十二	141
单元十三	152
单元十四	163
单元十五	175
单元十六	187
单元十七	198
单元十八	210
单元十九	219
单元二十	229

单元一

一、A1/A2 型题

1. 患者男, 80 岁。平素体健, 社区医生为其查体测量血压结果为 140/60mmHg, 心率 59 次/分, 律齐, 心尖部偶可闻及第三心音, 呼吸 18 次/分。请问该检查结果中哪项的病理意义最大

- A. 呼吸频率加快
- B. 收缩压升高
- C. 出现异常心音
- D. 心率低于正常
- E. 脉压增大

2. 患者, 近 1 周来感乏力、食欲不振、巩膜黄染, 医嘱要求查碱性磷酸酶, 应何时取血

- A. 饭前
- B. 饭后 2 小时
- C. 即刻
- D. 睡前
- E. 晨起空腹时

3. 患者, 几日来大便次数增加, 每日 10 次左右, 便中带血及黏液, 呈果酱样, 疑阿米巴痢疾, 需取便标本, 留取的标本应置于

- A. 无菌蜡纸盒
- B. 培养管
- C. 加盖的便盆
- D. 加温的容器
- E. 普通便盆

4. 患者, 1 周前行胃大部切除术, 术后持续高热不退, 痰多, 黄色黏稠, 不易咳出, 双肺底满布湿啰音, 疑肺炎, 需作痰培养。以下叙述不正确的是

- A. 应用多贝尔液及清水漱口后留取
- B. 嘱病人做深呼吸后用力咳痰
- C. 应准备广口的无菌培养瓶
- D. 应即刻留取痰标本
- E. 应立即送检

5. 患者, 高热 5 天, 可疑败血症, 医嘱做血培养, 其目的是

- A. 查血中白细胞数量
- B. 查血中红细胞数量
- C. 测氨基转移酶活性

D. 查心肌酶活性

E. 找致病菌

6. 患者女, 2 岁。白血病, 化疗过程中因口腔溃疡需做咽拭子培养, 采集标本部位应选

- A. 口腔溃疡面
- B. 两侧腭弓
- C. 舌根部
- D. 扁桃体
- E. 咽部

7. 一个急诊病人, 检查时发现病人呼之不应, 但压迫其眶上神经有痛苦表情, 病人的意识障碍程度是

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 意识模糊
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

8. 肺炎球菌肺炎患者咳出的痰液为

- A. 白色泡沫痰
- B. 脓绿色痰
- C. 铁锈色痰
- D. 红色胶冻样痰
- E. 脓痰放置后分三层

9. 下列哪项不符合慢性支气管炎咳痰特点

- A. 多为白色黏痰
- B. 急性发作期可出现黏液脓痰
- C. 可为浆液泡沫痰
- D. 夜间痰量较多
- E. 偶有痰中带血

10. 全胃肠外营养 (TPN) 支持病人可能发生的最严重的代谢并发症是

- A. 高钾血症
- B. 低钾血症
- C. 肝功能异常
- D. 高血糖高渗性非酮性昏迷
- E. 高氨血症

11. 患者女, 50 岁。因胰腺癌入院, 经中心静脉导管接受胃肠外营养支持, 下列对导管护理正确的是

- A. 可经中心静脉导管抽血
- B. 每周消毒穿刺部位一次
- C. 可经中心静脉途径应用抗生素
- D. 输液结束后用肝素稀释液封管
- E. 可经中心静脉途径输血

12. 抗休克治疗时, 下列哪项药物对改善肾缺血有利

- A. 去甲肾上腺素
- B. 肾上腺素
- C. 小剂量多巴胺
- D. 麻黄碱
- E. 去氧肾上腺素

13. 下面防治类风湿关节炎的要点中哪项是错误的

- A. 使用阿司匹林等非甾体抗炎药
- B. 缓解晨僵和疼痛等关节症状
- C. 长期坚持使用糖皮质激素
- D. 适当选用免疫抑制剂
- E. 注意锻炼关节功能

14. 下列关于 SLE 的说法错误的是

- A. 盘状红斑狼疮可发展为 SLE
- B. 大多有皮肤损害
- C. 紫外线可使皮肤症状恶化
- D. 妊娠期病情好转
- E. 肾损伤常见

15. 下列关于系统性红斑狼疮患者的护理措施不妥的是

- A. 经常用清水洗脸
- B. 忌用碱性肥皂
- C. 避免使用肾脏损害药物
- D. 多食芹菜、香菜等绿叶蔬菜
- E. 经常检查口腔和皮肤病情况

16. SLE 患者应用糖皮质激素时, 下列哪项不正确

- A. 维持用药时间较长
- B. 通常采用泼尼松
- C. 病情好转后缓慢逐渐减量
- D. 每日或隔日顿服
- E. 用药剂量应逐渐加大

17. 几乎所有系统性红斑狼疮病人均有的表现为

- A. 发热
- B. 皮疹
- C. 关节痛
- D. 肾脏损害
- E. 中枢神经损害

18. 患者女, 32 岁。有系统性红斑狼疮 7 年, 一直服用药物治疗, 最近主诉视力下降, 可能因为服用了

- A. 阿司匹林
- B. 吲哚美辛
- C. 抗疟药
- D. 布洛芬
- E. 地塞米松

19. 患者女, 30 岁。面部水肿, 疲倦、乏力半个月, 双侧脸颊和鼻梁部有蝶形红斑, 表面光滑, 指掌部可见充血红斑。实验室检查: 血沉 66mm/h, 尿蛋白(+++), 抗核抗体(+), 抗 Sm 抗体(+). 最可能的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 慢性肾炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 类风湿关节炎

20. 患者男, 35 岁。1 周前受凉后出现发热, 体温 37.8℃, 咽痛, 颌下淋巴结肿大, 轻度心悸、气短, 伴关节疼痛, 以肩、肘、腕为主, 血沉 85mm/h, 血白细胞 $10.9 \times 10^9/L$, 免疫学检查异常, 可能的诊断是

- A. 风湿性心脏病
- B. 风湿性关节炎
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 风湿热
- E. 类风湿关节炎

21. 患者双手掌指关节肿胀疼痛 2 年, 晨起有黏着感, 活动后渐缓, 查血类风湿因子(+), 诊断为类风湿关节炎, 为保持关节功能应注意

- A. 进食高热量、高蛋白饮食
- B. 长期卧床休息
- C. 坚持进行关节功能锻炼
- D. 短期卧床休息
- E. 长期服抗生素预防感染

22. 下列哪一项不是生活中毒的常见原因

- A. 谋害
- B. 自杀

- C. 成瘾
D. 生产农药时不注意防护
E. 误服毒物
23. 关于急性中毒下列哪项说法是错误的
A. 氰化物中毒呼气有苦杏仁味
B. 呼吸或呕吐物有蒜臭味仅见于有机磷农药中毒
C. 皮肤黏膜樱桃红色可见于一氧化碳中毒
D. 亚硝酸盐中毒一定有发绀出现
E. 铅中毒时口中可有金属味
24. 急性中毒首先采取的措施是
A. 清除尚未吸收的毒物
B. 促进体内已吸收的毒物排出
C. 应用特效解毒剂
D. 对症治疗
E. 迅速脱离中毒环境
25. 有机磷农药急性中毒, 瞳孔变化是
A. 可略缩小 B. 明显缩小
C. 大小不等 D. 扩大
E. 无变化
26. 有机磷中毒时, 下列哪一项不符合毒蕈碱样表现
A. 肌力减弱
B. 呕吐、腹痛、腹泻
C. 瞳孔针尖样缩小
D. 心率减慢
E. 多汗
27. 误服强酸后, 以下哪一项不宜采用
A. 清洁洗胃
B. 静脉滴注碳酸氢钠
C. 服牛奶
D. 经口腔气管插管
E. 肌内注射镇静剂
28. 有机磷杀虫剂中毒引起昏迷时, 最佳的解毒治疗方案是
A. 阿托品
B. 碘解磷定或氯磷定
C. 碘解磷定 + 阿托品
D. 纳洛酮
E. 尼可刹米 (可拉明)
29. 判断有机磷农药中毒程度的检查是
A. 血清丙氨基转移酶
B. 碳氧血红蛋白测定
C. 残留农药测定
D. 神经靶酯酶
E. 胆碱酯酶活力测定
30. 肺癌病人进行纤维支气管镜检查后不能立即喝水, 是为了防止
A. 呕吐 B. 喷嚏
C. 呃逆 D. 误吸
E. 咳嗽
31. 肺真菌病诊断主要依靠
A. 临床表现
B. X线典型表现
C. 血清学试验
D. 抗原皮肤试验
E. 痰真菌培养及菌型鉴定
32. 关于医院获得性肺炎, 哪项不正确
A. 多继发于有各种原发疾病的危重患者, 治疗困难
B. 革兰阳性球菌所占比例最高, 常为混合感染
C. 耐药细菌日益增多
D. 一些非致病菌亦常导致医院获得性肺炎
E. 在医院内感染的肺炎
33. 下列哪项是单纯性肠梗阻与绞窄性肠梗阻的主要区别
A. 肠管壁有无血运障碍
B. 有无并发症
C. 梗阻的病因
D. 梗阻的严重程度
E. 梗阻的时间
34. 患者男, 57岁。因绞窄性肠梗阻行“回肠部分切除术”, 术后4天患者出现以脐周最为明显的腹痛, 腹腔引流管间断引出血性液每天约200ml。体检: T 38.7℃, R 22次/分, P 95次/分, BP 135/76mmHg。腹胀, 脐周中度压痛, 未达1级肿块, 肠鸣音弱。血常规: 白细胞 $13.7 \times 10^9/L$, 中性粒细胞比例 0.83。关于该患者的护理, 以下不正确的是
A. 取低半坐卧位
B. 予全胃肠外营养

- C. 充分负压引流
D. 如行灌洗,应用等渗盐水
E. 若引流管堵塞,应高压冲洗
35. 关于肺炎链球菌肺炎,下列哪项错误
A. 可表现为大叶性肺炎或小叶性肺炎
B. 一般不引起肺组织坏死或形成空洞
C. 肺炎消散后,多留有纤维瘢痕
D. 治疗首选青霉素
E. 少数患者可并发脓胸
36. 关于肺炎链球菌肺炎的临床表现,下列哪
项是错误的
A. 最常见的症状是突发的寒战、发热、咳嗽、
咳痰与胸痛
B. 咳痰呈红棕色胶冻状
C. 可出现呕吐、腹痛、腹泻
D. 严重者可出现昏迷
E. 可出现发绀与口周疱疹
37. 慢性呼吸衰竭缺氧的典型表现是
A. 呼吸频率变慢 B. “三凹征”
C. 发绀 D. 头痛
E. 肺性脑病
38. 最常见的成人肺结核是
A. 原发型肺结核
B. 血行播散型肺结核
C. 浸润型肺结核
D. 慢性纤维空洞型肺结核
E. 结核性胸膜炎
39. 急性白血病化疗期间多饮水是因为
A. 加强血流动
B. 稀释血中药浓度
C. 多尿可缓解对肾的损害
D. 预防尿酸性肾病
E. 减少对膀胱的刺激
40. 某病人,72岁,1个月来大便带血,消瘦,
拟行直肠镜检查。应采用的卧位是
A. 膝胸卧位 B. 左侧卧位
C. 截石位 D. 蹲位
E. 平卧位
41. 心脏病病人脉搏呈一强一弱交替出现而节

律正常,应安排他

- A. 卧床休息
B. 正常作息,但限制剧烈活动
C. 参与日常生活活动
D. 做康复期锻炼
E. 恢复半天轻工作
42. 毛细血管搏动征可见于
A. 二尖瓣狭窄
B. 二尖瓣关闭不全
C. 主动脉瓣狭窄
D. 主动脉瓣关闭不全
E. 三尖瓣狭窄
43. 下列哪种情况下不易出现发绀
A. 肺心病心力衰竭
B. 严重贫血
C. 重度一氧化碳中毒
D. 先天性心脏病
E. 急性呼吸道阻塞
44. 尿常规检查的标本采集不正确的是
A. 盛尿的容器要清洁
B. 留取尿量以 100~200ml 为宜
C. 查肾脏疾病以留取晨尿最佳
D. 女病人避免白带混入尿液内
E. 月经期取后段尿
45. 库斯莫尔呼吸特征是
A. 呼吸幅度由浅至深,再浅至停
B. 呼吸与暂停相交替
C. 呼吸表浅、快速
D. 呼吸深大、频率稍快
E. 呼吸急促、有屏气
46. 急性病期患者对疾病缺乏思想准备易产生
哪种情绪
A. 恐惧 B. 焦虑
C. 沮丧 D. 消极
E. 悲观
47. 利福平的正确口服方法是
A. 3餐前 B. 3餐后
C. 3餐后及临睡前 D. 早晨空腹顿服
E. 临睡前1次

48. 心室颤动的脉搏特征是

- A. 快而规则
- B. 慢而规则
- C. 快而不规则
- D. 慢而不规则
- E. 触不到

49. 某消化性溃疡病人,大量出血停止后,护士在对他进行饮食指导时应告诉他

- A. 继续禁食 24 小时
- B. 可以吃馒头、软饭
- C. 可以吃煮鸡蛋
- D. 可以喝肉汤
- E. 可以喝豆浆

50. 男性,69 岁,发现前颈部无痛性肿块半年。肿块约杏核大小。质硬,表面不光滑,随吞咽上下移动。¹³¹I 扫描为冷结节。首先考虑的疾病是

- A. 结节性甲状腺肿
- B. 甲状腺腺瘤
- C. 甲状腺癌
- D. 颈部恶性淋巴瘤
- E. 颈淋巴结结核

51. 万女士是不孕门诊的新诊病人,医嘱测量基础体温。护士给万女士讲解测量方法,其中讲解不全的一项是

- A. 从月经来潮第 1 天起测量
- B. 连续睡眠 6~8 小时后
- C. 每晚备好待用的体温表
- D. 醒后不活动先测 5 分钟体温
- E. 有发热、失眠、用药需注明

52. 护理健康教育学属于

- A. 护理学科
- B. 教育学科
- C. 人文学科
- D. 综合应用学科
- E. 交叉应用学科

53. 健康教育学的主要理论基础是

- A. 教育学理论
- B. 行为学理论
- C. 预防医学理论
- D. 传播学理论
- E. 伦理学理论

54. 护理健康教育学的研究对象是

- A. 病人及其家属
- B. 病人、家属和护士
- C. 所有医务人员
- D. 病人、家属、社会人群及护士
- E. 所有工作人员

55. 以下哪项不属于压力源中的心理社会因素

- A. 人际关系紧张
- B. 迁居
- C. 离婚
- D. 怀孕
- E. 考试

56. 自我照顾模式是由谁提出的

- A. 纽曼
- B. 佩皮劳
- C. 汉斯·塞利
- D. 马斯洛
- E. 奥瑞姆

57. 护士与一糖尿病病人及其家属共同研究病人出院后的饮食安排,此时护士的角色是

- A. 教育者
- B. 治疗者
- C. 帮助者
- D. 咨询者
- E. 策划者

58. 患者女,28 岁。突发右下腹剧烈腹痛,伴恶心、呕吐,诊断为“宫外孕”,根据马斯洛的需要层次论,此时首先应保证患者

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

59. 纽曼认为护理干预是通过

- A. 一级预防完成的
- B. 二级预防完成的
- C. 三级预防完成的
- D. 四级预防完成的
- E. 五级预防完成的

60. 自我护理能力训练不包括下列哪项

- A. 日常生活能力训练
- B. 自数脉搏训练
- C. 自测血糖定性训练
- D. 胸腔闭式引流自我护理训练
- E. 戒烟训练

61. 患者患糖尿病 11 年,护理人员帮助患者自行注射胰岛素,其属于哪种护患关系模式

- A. 共同参与型
- B. 指导参与型
- C. 主动参与被动型
- D. 父母与儿童式的关系
- E. 管理服从型

62. 患者女,62 岁。双眼晚期白内障待手术,在护理过程中,有效的沟通方式是

- A. 让患者用点头或摇头回答问题

- B. 用手势或面部表情来加强信息传递
C. 让患者用“是”或“不是”回答问题
D. 及时对患者所听到的声响作出解释
E. 必要时用文字进行交流
63. 制定护理法时必须首先确定护理立法的
A. 意义 B. 过程
C. 目标 D. 质量
E. 内容
64. 患者, 全心衰竭, 全身重度水肿, 每日钠的摄入量不超过
A. 0.3g B. 0.5g
C. 1g D. 1.2g
E. 3g
65. 患者男, 50 岁。高空作业不慎坠落损伤脑部, 出现深昏迷, 脑干反射消失, 脑电波消失, 无自主呼吸, 患者以上表现应属于
A. 濒死期 B. 临床死亡期
C. 生物学死亡期 D. 疾病晚期
E. 脑死亡期
66. 下列哪项不是触诊的内容
A. 肢体末梢湿度
B. 心包摩擦音
C. 腹部包块的位置
D. 颈部淋巴结的移动度
E. 心前区震颤
67. 巴宾斯基征阳性见于
A. 锥体束损害 B. 周围神经损伤
C. 脑膜炎 D. 蛛网膜下腔出血
E. 甲状腺功能亢进
68. 患者肢体可脱离床面, 但不能对抗阻力, 肌力为
A. 0 级 B. 1 级
C. 2 级 D. 3 级
E. 4 级
69. 不符合脑死亡的判断标准的是
A. 对刺激无感受性及反应性
B. 无呼吸
C. 无反射
D. 脑电波平坦
E. 心跳停止
70. 在严重创伤或感染时, 最易受损的器官是
A. 肾 B. 肝
C. 脑 D. 肺
E. 心
71. 外科病房护士, 在为多位患者换药时, 她首先应安排换药的伤口是
A. 脓肿切开引流的伤口
B. 甲状腺手术后拆线
C. 胃手术后拔腹腔引流管
D. 压疮创面
E. 破伤风伤口
72. 患者男, 55 岁。车祸造成多发性损伤, 急救车首先要处理的情况是
A. 开放性骨折
B. 腹部外伤后肠管脱出
C. 外伤性大出血
D. 颅脑外伤
E. 膀胱破裂
73. 患者男, 38 岁。铁钉刺伤足底 6 小时, 伤口深约 2.5cm, 来院时出血已止, 伤口污染较重, 创缘肿胀, 下列处理正确的是
A. 冲洗、消毒后包扎
B. 清创后不予包扎
C. 清创后一期缝合
D. 清创后油纱条填塞
E. 清创后注射破伤风抗毒血清
74. 患者, 1 周前工作时受外伤, 今日为清创缝合后 5 天, 护士在检查伤口时发现有一针眼发红并且有小脓疱, 护士正确的处理方法是
A. 局部热敷
B. 拆除缝线, 置管引流
C. 提前拆去此缝线
D. 70% 乙醇湿敷
E. 拆除缝线, 敞开引流
75. 患者男, 32 岁。头部被菜刀砍伤 7 天, 伤口裂开, 脓性分泌物较多。处理方法是
A. 清创处理伤口不缝合
B. 控制感染, 定期更换敷料
C. 彻底清创并缝合

- D. 清创、湿敷、包扎
- E. 清创、缝合并放置引流

76. 患者男, 20 岁。左足被开水烫伤, 疼痛剧烈, 局部有水疱, 其烧伤面积及深度为

- A. 3.5%, 浅Ⅱ度
- B. 3.5%, Ⅰ度
- C. 7%, 浅Ⅱ度
- D. 4%, 深Ⅱ度
- E. 3%, Ⅰ度

77. 患者女, 30 岁。体重 50kg, 烧伤Ⅱ度面积为 80%, 烧伤部位剧痛, 有水疱, 部分基底苍白, 第二个 24 小时应补液体总量为

- A. 8000ml
- B. 9000ml
- C. 1000ml
- D. 3000ml
- E. 5000ml

78. 患者男, 30 岁。大面积烧伤 6 小时, 转送途中输液 1000ml。入院后监测 CVP 4cmH₂O (0.39kPa), 血压 80/60mmHg, 尿量 20ml/h, 四肢厥冷。正确的处理是

- A. 减慢输液速度加升压药
- B. 维持原输液速度
- C. 减慢输液, 加利尿剂
- D. 减慢输液速度
- E. 加快输液速度

79. 以下移植方法哪一类存活率最高

- A. 自体移植
- B. 同质移植
- C. 充分配血及组织配型后移植
- D. 同种异体移植
- E. 异种异体移植

80. 下列哪个部位的肿瘤可出现精神障碍

- A. 中央前回肿瘤
- B. 额叶前部肿瘤
- C. 枕叶肿瘤
- D. 听神经肿瘤
- E. 脑干肿瘤

81. 顶叶肿瘤典型的临床表现是

- A. 癫痫发作
- B. 感觉功能障碍
- C. 垂体功能低下或亢进
- D. 听力和前庭功能障碍
- E. 共济失调性运动障碍

82. 脑瘤术后引流管拔出的时间一般为术后

- A. 3~4 天
- B. 5~7 天
- C. 4~5 天
- D. 3~7 天
- E. 4~8 天

83. 肿瘤患者的体位一般采取

- A. 半卧位
- B. 侧卧位
- C. 斜坡卧位
- D. 自由体位
- E. 平卧位

84. 可作为肿瘤定性诊断的检查是

- A. CT
- B. B 超
- C. X 线造影
- D. MRI
- E. 病理检查

85. 下列有关恶性肿瘤的特征的描述不正确的是

- A. 边界不清楚
- B. 表面高低不平
- C. 早期出现疼痛
- D. 质地坚硬
- E. 固定、不活动

86. 患者男, 38 岁。颈部肿块 2 个月, 无痛, 生长速度快, 位于胸锁乳突肌周围、锁骨上三角处, 肝、脾大, 纵隔淋巴结肿大。应考虑为

- A. 颈部淋巴结化脓性炎
- B. 恶性淋巴瘤
- C. 甲状舌管囊肿
- D. 颈部淋巴结结核
- E. 淋巴结转移癌

87. 患者男, 68 岁。因肝癌进行化疗。下列护理措施错误的是

- A. 每周查血常规 1~2 次
- B. 限制饮食, 以防呕吐
- C. 白细胞低于 $3 \times 10^9/L$ 时, 给予升血细胞药
- D. 鼓励患者多饮水
- E. 静脉用药应稀释到要求浓度

88. 患者男, 60 岁。肺癌患者, 在护士静脉推注化疗药物阿霉素 20mg + 生理盐水 20ml 的过程中, 不慎将药液漏至血管外。以下哪项处理错误

- A. 停止注射, 拔出针头
- B. 支托痛处
- C. 普鲁卡因注入局部皮下
- D. 局部热敷
- E. 氢化可的松油膏外敷

二、A3 型题

(89~91 题共用题干)

患者女, 30 岁。心悸、牙龈出血、头晕、月经量过多, 曾服止血药治疗未愈。近几天因呼吸道感染、发热、牙龈出血严重来医院检查, 诊断为再生障碍性贫血。

89. 经雄激素治疗后, 首先升高的是

- A. 血清铁蛋白
- B. 红细胞计数
- C. 网织红细胞数
- D. 血小板计数
- E. 白细胞计数

90. 鉴别急性白血病和再生障碍性贫血主要的依据是

- A. 胸片检查
- B. 治疗效果
- C. 骨髓象检查
- D. 预后观察
- E. 临床表现

91. 数天后, 患者在活动时突然呕吐、意识障碍、头痛、视物模糊, 下列护理措施错误的是

- A. 头戴冰帽
- B. 平卧位
- C. 迅速开放静脉
- D. 吸氧
- E. 头部略低, 保证脑部供氧

(92~93 题共用题干)

患者男, 30 岁。打篮球过程中, 突然出现胸痛, 呼吸困难, 大汗淋漓。查心率 140 次/分, 呼吸 38 次/分, 右侧胸部叩诊鼓音, 右肺呼吸音消失。

92. 该患者最可能的诊断是

- A. 支气管扩张
- B. 急性胸膜炎
- C. 肋骨骨折
- D. 气胸
- E. 肺脓肿

93. 该患者应采取的体位是

- A. 仰卧位
- B. 右侧卧位
- C. 左侧卧位
- D. 半坐位
- E. 俯卧位

(94~96 题共用题干)

患者男, 28 岁。因外出春游出现咳嗽、咳白色黏痰伴喘息 1 天入院, 体检: 体温 36.6℃, 脉搏

90 次/分, 呼吸 28 次/分, 血压 120/80mmHg, 在肺部可闻及广泛哮鸣音, 既往有哮喘史。

94. 该患者最可能的诊断是

- A. 肺炎
- B. 支气管扩张
- C. 肺心病
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性支气管炎

95. 该患者哮喘发作最可能的诱因是

- A. 花粉
- B. 尘螨
- C. 动物的毛屑
- D. 病毒感染
- E. 精神因素

96. 患者因感冒使原有支气管哮喘发作, 呼吸困难, 有轻微发绀, 神志清醒。该患者属于哪种呼吸困难

- A. 喘息性
- B. 吸气性
- C. 浮浅性
- D. 呼气性
- E. 混合性

三、B 型题

(97~98 题共用备选答案)

- A. 连续 3 次或以上快而规则的房性或交界性期前收缩
- B. 心室内心肌纤维发生快而微弱的不协调乱颤, 心室完全丧失射血功能
- C. 各种原因引起心脏冲动起源或冲动传导的异常, 可引起心脏活动规律发生紊乱
- D. 异位起搏点兴奋性增高, 过早发生冲动引起的心脏搏动
- E. 连续 3 次或 3 次以上室性期前收缩

97. 阵发性室上性心动过速是指

98. 期前收缩是指

(99~100 题共用备选答案)

- A. 刺激咽部引起呕吐反射
- B. 按压颈动脉窦
- C. 安装人工心脏起搏器
- D. 非同步直流电复律
- E. 同步直流电复律

99. 非洋地黄中毒引起的阵发性室上性心动过速, 用药物治疗无效时应采用的方法是

100. 一旦发生心室颤动应立即给予的处理是

答案与解析

一、A1/A2 型题

1. E. 脉压指收缩压与舒张压之差, 正常范围是 30 ~ 40mmHg。一般大于 60mmHg, 称为脉压增大, 小于 20mmHg 称为脉压减小。该患者血压结果为 140/60mmHg, 提示脉压增大。故选 E。解题关键: 凡能影响收缩压和舒张压的因素, 都可以影响到脉压。

2. E. 不同的血液化验项目, 对其标本的采集时间要求不同。如平时检查红细胞、血红素、白细胞以及血小板等随时都可以查。但是, 如查肝功能、肾功能、生化检查、葡萄糖耐量试验和血液血清学检查等, 则要求病人在第二天清晨空腹时抽血送检。空腹时机体处于基础代谢相对稳定状态, 能排除饮食、运动、精神等因素对血液中各种化学成分浓度的影响。故选 E。解题关键: 肝功能、肾功能、血糖检查需要空腹。

3. D. 阿米巴痢疾的大便腥臭, 多呈暗红色似果酱状, 有脓血及黏液。取标本时应取脓血粪便相邻处, 避免接触消毒剂 and 污染尿液, 并注意一定要保温 (36 ~ 37℃), 因在低温下, 阿米巴原虫失去活力, 不易查出。便前可将便器先用温水冲洗, 便后立即取样, 其量略多于普通便标本, 以广口瓶为宜, 送检查时可用棉垫包住盛标本的瓶 (或盒) 以便保温。故选 D。解题关键: 低温下不易查出阿米巴原虫, 应用加温容器。

4. D. 采集时间以清晨的痰为好。留取痰标本为减少口腔常居菌的污染, 应先漱口再从气管深部咳出痰液 (非唾液) 吐入广口无菌容器内。痰液最好立即送检, 以免污染影响检查结果。气管穿刺法主要用于厌氧菌培养。检查结核分枝杆菌时, 为提高阳性率应收集 24 小时痰液。故选 D。解题关键: 为减少口腔常居菌的污染, 应先漱口再从气管深部咳出痰液。

5. E. 血培养是将新鲜离体的血液标本接种于营养培养基上, 在一定温度、湿度等条件下, 使对营养要求较高的细菌生长繁殖并对其进行鉴别, 从而确定病原菌的一种人工培养法。对菌血症、败血症及脓毒败血症的病因学诊断、对症治疗有极高的

应用价值。故选 E。解题关键: 血培养主要是明确致病菌, 进行病因学诊断。

6. A. 咽部拭子细菌培养能分离出致病菌, 有助于白喉、化脓性扁桃体炎、急性咽喉炎等的诊断。咽拭子标本就是用医用的棉签, 从人体的咽部蘸取少量分泌物, 口腔溃疡者应取溃疡面。故选 A。

7. D. 嗜睡表现为持续性睡眠状态, 但可唤醒。昏睡患者的觉醒水平、意识内容和随意运动明显降低, 有痛觉。意识模糊属轻度意识障碍。浅昏迷: 随意活动消失, 对疼痛刺激有反应, 各种生理反射 (吞咽、咳嗽、角膜反射、瞳孔对光反应等) 存在, 体温、脉搏、呼吸多无明显改变。深昏迷: 随意活动完全消失, 对各种刺激皆无反应。故选 D。解题关键: 浅昏迷随意活动消失, 对疼痛刺激有反应, 各种生理反射存在。

8. C. ①白色泡沫痰: 见于慢性气管炎、支气管肺炎及支气管哮喘而无严重感染时; ②脓绿色痰: 首先考虑铜绿假单胞菌 (绿脓杆菌) 肺炎; ③脓痰放置后分三层: 肺脓肿患者的痰; ④红色胶冻样痰: 克雷白杆菌肺炎; ⑤铁锈色痰: 肺炎链球菌肺炎。故选 C。解题关键: 肺炎链球菌肺炎病人咳出的痰液为铁锈样。

9. D. 慢性支气管炎患者常在寒冷季节发病, 出现咳嗽、咳痰, 尤以晨起为重, 痰呈白色黏液泡沫状, 黏稠不易咳出。在急性呼吸道感染时, 症状迅速加剧, 痰量增多, 黏稠度增加或为黄色脓性, 偶有痰中带血。故选 D。解题关键: 长期、反复、逐渐加重的咳嗽是慢性支气管炎的突出表现。

10. D. 最严重的代谢性并发症——非酮性高渗性高血糖性昏迷, 常见原因: ①单位时间内输入过量葡萄糖; ②胰岛素相对不足, 临床主要表现为血糖升高、渗透性利尿、脱水、电解质紊乱、中枢神经系统功能受损, 甚至昏迷。尤其在老年人, 有糖尿病、尿毒症及严重应激状态下, TPN 输液太快, 糖浓度相对过高时易于发生。故选 D。解题关键: 肠外营养代谢最严重并发症为非酮性高渗性高血糖性昏迷。

11. D. 肠外营养的中心静脉导管护理应每天消毒穿刺部位, 为专用的全胃肠外营养通道, 禁止在中心静脉导管抽血、输血和输注其他药液等, 输液结束后可用肝素稀释封管, 保持管路通畅。故正确答案为 D。解题关键: 掌握中心静脉导管的护理要点。

12. C。用于抗休克的血管活性药物种类很多,常用的有:①多巴胺是最常用的血管收缩剂。小剂量,兴奋多巴胺受体具有扩张内脏血管作用;大剂量,收缩外周血管,外周阻力增加。②多巴酚丁胺。③去甲肾上腺素。④垂体后叶素(加压素)。故选 C。解题关键:多巴胺是生成去甲肾上腺素的儿茶酚胺的前体,可以改变心排血量的分布,使肾血流量增加,具有双重作用,小剂量扩张内脏血管;大剂量收缩血管,主要为外周血管。

13. C。类风湿关节炎的治疗使用阿司匹林等非甾体抗炎药,适当选用免疫抑制剂;使用糖皮质激素时应小剂量,短期应用,避免长期使用引起诸多副作用。治疗的目的:①控制关节及其他组织的炎症,缓解晨僵和疼痛等关节症状;②保持关节功能和防止畸形;③修复受损关节以减轻疼痛和恢复功能。故选 C。解题关键:类风湿关节炎是以关节滑膜炎为特征的慢性全身性自身免疫性疾病。

14. D。盘状红斑狼疮可分两型:①局限型皮肤损害仅限于颈部以上的皮肤;②播散型皮损累及全身广泛部位的皮肤,播散型容易转变为系统性红斑狼疮。系统性红斑狼疮是一种涉及许多系统和脏器的自身免疫性疾病,由于细胞和体液免疫功能障碍,产生多种自身抗体,可累及皮肤、浆膜、关节、肾及中枢神经系统等。患者多有光敏感,紫外线可使皮肤症状恶化。妊娠可诱发狼疮活动,在非缓解期,应严格避孕。无中枢神经系统、肾脏或其他脏器严重损害、病情处于缓解期达半年以上者,一般可安全妊娠。故选 D。解题关键:系统性红斑狼疮是一种自身免疫性疾病。

15. D。系统性红斑狼疮患者需用清水洗脸,保持面部清洁,忌用碱性肥皂、劣质化妆品;应避免使用肾脏损害药物;要定期检查是否有口腔溃疡和皮疹,以了解病情进展。芹菜、香菜类含补骨脂素,久食引起光过敏,使患者面部红斑皮损加重,故不宜食用,是系统性红斑狼疮病人禁忌的蔬菜。故选 D。解题关键:系统性红斑狼疮需避免各种过敏现象、避免感冒和感染、避免口服避孕药、避免意外怀孕、避免紫外线照射等。

16. E。系统性红斑狼疮病人治疗:糖皮质激素是目前治疗本病的主要药物,适用于急性或暴发性病例,通常采用泼尼松(强的松),每日或隔日顿服。用药原则:起始剂量要足、减量要慢、维持时间要长。故选 E。解题关键:糖皮质激素治疗系统

性红斑狼疮原则:起始剂量要足、减量要慢、维持时间要长。

17. D。SLE 的临床表现多种多样,常呈多器官受累,多数早期表现为非特异的全身症状。几乎所有病人肾脏均有病理变化,狼疮性肾炎在早期即发生,病变持续多年,临床有表现约 75%,可表现为急性肾炎、急进性肾炎、隐匿性肾小球肾炎、慢性肾炎和肾病综合征等。故选 D。

18. C。抗疟药主要适用于盘状红斑狼疮和系统性红斑狼疮的以皮损、关节病变为主要临床表现者,代表药物主要有氯喹、羟基氯喹、奎宁。其副作用有食欲不振、恶心呕吐、腹泻等胃肠道症状;皮肤瘙痒、湿疹,皮炎及中枢神经系统症状;该药易沉积于视网膜色素上皮细胞,引起视力下降;有降低白细胞、致畸胎等作用。故选 C。解题关键:抗疟药对于患有视网膜病变者、孕妇及严重贫血者禁用。

19. D。SLE 是一种全身性自身免疫病,主要累及皮肤黏膜、骨骼肌肉、肾脏及中枢神经系统,肺、心脏、血液等多个器官和系统。好发于年轻女性。全身表现:发热、疲劳、乏力及体重减轻等。皮肤黏膜:蝶形红斑、盘状皮损、光过敏、红斑或丘疹等。肾脏:尿蛋白阳性。血沉加快。抗核抗体(+),敏感性 99%。抗 Sm 抗体(+),特异性 99%。故选 D。解题关键:系统性红斑狼疮好发于年轻女性,抗核抗体(+),敏感性 99%。抗 Sm 抗体(+),特异性 99%。血沉正常值 0~12mm/h。

20. D。风湿热是链球菌感染后引起的一种自身免疫性疾病,可累及关节、心脏、皮肤等多系统。临床表现:①前驱症状:咽喉炎或扁桃体炎等上呼吸道感染表现,如发热、咽痛、颌下淋巴结肿大等。②风湿性关节炎:呈游走性、多发性关节炎。以膝、踝、肘、肩等大关节受累为主。③其他:心脏炎、皮下结节、环形红斑和舞蹈病。血沉快,白细胞增多。故选 D。解题关键:风湿热:①前驱症状:发热、咽痛、颌下淋巴结肿大。②风湿性关节炎。③心脏炎、皮下结节、环形红斑和舞蹈病。血沉快,白细胞增多。

21. C。类风湿关节炎是一种以关节滑膜炎为特征的慢性全身性自身免疫性疾病。滑膜炎持久反复发作,可导致关节内软骨和骨的破坏,关节功能障碍,甚至残废。治疗类风湿关节炎的目的:①控制关节及其他组织的炎症,缓解症状;②保持关节功

能和防止畸形,应坚持进行关节功能锻炼;③修复受损关节以减轻疼痛和恢复功能。故选C。解题关键:类风湿关节炎应坚持进行关节功能锻炼,以保持关节功能和防止畸形。

22. D。生产农药时不注意防护是属于生产性中毒(生产性中毒也可因设备密闭不严等出现中毒),其他属于生活中毒的常见原因,故选D。

23. D。亚硝酸盐为强氧化剂,进入人体后,可使血中低铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,失去运氧的功能,致使组织缺氧,出现青紫而中毒,称为“肠源性发绀”。一般只有当血中高铁血红蛋白含量增至20%~50%,才会有发绀出现,皮肤黏膜呈青紫色,故选D。

24. E。急性中毒的治疗原则:①立即脱离中毒现场;②清除进入人体内已被吸收或尚未吸收的毒物;③如有可能,选用特效解毒药;④对症治疗。故选E。

25. B。急性有机磷中毒症状有:①毒蕈碱样症状:这组症状出现最早,主要是副交感神经末梢兴奋所致,表现为平滑肌痉挛和腺体分泌增加。临床表现有恶心、呕吐、腹痛、多汗、尚有流泪、流涕、流涎、腹泻、尿频、大小便失禁、心跳减慢和瞳孔缩小。支气管痉挛和分泌物增加、咳嗽、气急,严重患者出现肺水肿。②烟碱样症状:中枢神经系统症状等。故选B。

26. A。急性有机磷中毒的毒蕈碱样表现(M样症状):这组症状出现最早,主要是副交感神经末梢兴奋所致,类似毒蕈碱作用,表现为平滑肌痉挛和腺体分泌增加。临床表现有恶心、呕吐、腹痛、多汗、尚有流泪、流涕、流涎、腹泻、尿频、大小便失禁、心跳减慢和瞳孔缩小;支气管痉挛和分泌物增加、咳嗽、气急,严重患者出现肺水肿。故选A。解题关键:急性有机磷中毒毒蕈碱样表现平滑肌痉挛和腺体分泌增加;烟碱样症状:肌束颤动、肌力减退、肌痉挛、呼吸肌麻痹;注意两者区别。

27. A。误服强酸强碱性化学液体,应立即经口腔气管插管、肌内注射镇静剂等治疗,立即给予牛奶、豆浆、鸡蛋清服下,以减轻强碱性液体对胃肠道的腐蚀;给予清水及催吐急救易引起胃穿孔。故选A。

28. C。有机磷中毒最佳解毒治疗方案是胆碱酯酶复活药与阿托品两药合用:①胆碱酯酶复活药,即碘解磷定,对解除烟碱样毒作用较为明显;②抗

胆碱药阿托品,阿托品有阻断乙酰胆碱对副交感神经和中枢神经系统毒蕈碱受体的作用,对缓解毒蕈碱样症状和对抗呼吸中枢抑制有效,但对烟碱样症状和恢复胆碱酯酶活力没有作用。两者合用效果最佳,故选C。解题关键:有机磷中毒时需胆碱酯酶复活药和抗胆碱药联合应用。

29. E。血清丙氨酸转移酶主要反映肝脏功能,故A不正确;碳氧血红蛋白测定主要用于一氧化碳中毒程度的检查,故B项错误;残留农药测定用于农产品引起中毒或在现场使用,故C项错误;神经靶酯酶被认为是迟发神经毒性的有机磷酸酯类化合物作用的主要靶标,故D项错误;血胆碱酯酶(ChE)活力测定可作为判断有机磷农药中毒程度,以及观察药物治疗效果的重要指标。故选E。解题关键:血胆碱酯酶活力测定可作为判断有机磷农药中毒程度的重要检查。

30. D。纤维支气管镜是目前呼吸系统疾病诊断和治疗的主要方法之一。因为检查时需行咽喉局部麻醉,导致患者的吞咽反射减弱,易使食物误入气管造成误吸,因此术后不能立即喝水。故选D。

31. E。病原体检查是肺真菌病诊断的最重要依据。其中痰涂片或培养及菌型鉴定是肺真菌病诊断最常应用的方法。故选E。解题关键:痰涂片、培养及菌型鉴定是肺真菌病诊断最常应用的方法。

32. B。医院获得性肺炎是指病人在入院时既不存在、也不处于潜伏期,而是在住院48小时后发生的感染,也包括出院后48小时内发生的肺炎。主要是由于口咽部定植菌误吸引起,目前其耐药细菌日益增多。致病菌中革兰阴性杆菌所占比例最高。故选B。解题关键:医院获得性肺炎致病菌主要是革兰阴性杆菌。

33. A。肠梗阻依据肠壁血运有无障碍分为单纯性肠梗阻和绞窄性肠梗阻,这也是两者之间的主要区别,因此A是正确答案。根据有无并发症、原因、梗阻程度、时间分别有相应分类。解题关键:熟悉肠梗阻各种分类的根据。

34. E。术后嘱患者取半卧位,促进引流液排出,A做法对。禁食,给予全胃肠外营养,B做法对。密切观察引流管状况,保证引流通畅,给予负压引流,必要时进行腹腔灌洗,灌洗液要用等渗盐水,若引流管堵塞时用负压吸引堵塞物,因此C、D做法对,E错误,故本题正确答案为E。解题关键:术后重在保证引流管通畅,熟悉引流管的护理

要点。

35. C. 肺炎链球菌是大叶性肺炎和小叶性肺炎的主要病原菌, 一般不会引起组织坏死和肺损伤, 常见的并发症有脓胸、肺脓肿、心包炎、心肌炎及中毒性肝炎等, 绝大多数肺炎链球菌菌株对青霉素很敏感, 一般应用青霉素可迅速治愈, 故选 C。解题关键: 肺炎链球菌感染后一般不会引起组织坏死和肺损伤。

36. B. 肺炎链球菌肺炎的症状是发病前常有、受凉、醉酒、疲劳、病毒感染和生活在拥挤环境等诱因, 可有数日上呼吸道感染的前驱症状。典型表现为起病急骤、畏寒或寒战、高热, 体温可在数小时内达 $39 \sim 40^{\circ}\text{C}$, 呈稽留热, 或高峰在下午或傍晚。全身肌肉酸痛, 患侧胸痛明显, 可放射至肩部, 深呼吸或咳嗽时加剧, 病人常取患侧卧位。开始时痰少, 可带血丝, $24 \sim 48$ 小时后可呈铁锈色, 与肺泡内浆液渗出和红细胞、白细胞渗出有关。重症时有惊厥、谵妄及昏迷等中毒性脑病的表现, 较大儿童可见唇部疱疹。故选 B。解题关键: 肺炎链球菌肺炎多起病急剧, 表现为突发高热、咳嗽、胸痛、纳差、疲乏和烦躁不安, 咳铁锈色痰。早期可有呕吐、腹痛、腹泻的症状。重症时有惊厥、谵妄及昏迷等中毒性脑病的表现, 较大儿童可见唇部疱疹。

37. B. 慢性呼吸衰竭时患者可有呼吸困难、发绀、精神症状以及心血管系统症状的表现, 其中呼吸困难是最早、最突出的表现, 表现为呼吸浅速、出现“三凹征”, 严重者有呼吸节律的改变。呼吸中枢受损时, 呼吸频率变慢且常伴节律的变化, 如潮式呼吸。故选 B。解题关键: 呼吸困难是慢性呼吸衰竭时最早最突出的表现。

38. C. 肺结核可分为四型: 原发型肺结核 (I 型), 血行播散型肺结核 (II 型), 浸润型肺结核 (III 型), 慢性纤维空洞型肺结核 (IV 型), 其中原发型肺结核 (I 型) 最常见于小儿, 而浸润型肺结核 (III 型) 最常见于成人。故选 C。解题关键: 原发型肺结核最常见于小儿, 浸润型肺结核最常见于成人。

39. D. 急性白血病患者大剂量化疗时, 特别是高细胞白血病, 由于化疗大量白血病细胞溶解破坏, 血清及尿中尿酸浓度明显增高, 积聚肾小管, 引起阻塞而发生尿酸性肾病肾衰, 主要表现为尿少、无尿、水肿。在化疗期间应给予大量补液并嘱其多饮水, 以稀释血液, 一般液体入量在 $3000 \sim 4000\text{ml/d}$, 使尿量维持在 $2000 \sim 2500\text{ml/d}$, 并应用

碳酸氢钠以碱化尿液, 减少尿酸结晶形成, 预防尿酸性肾病。故选 D。解题关键: 急性白血病的治疗。

40. A. 肛门、直肠、乙状结肠镜检查及治疗要采取膝胸卧位。故答案为 A。

41. A. 交替脉是一种节律正常而强弱交替出现的脉搏, 主要由于心室的收缩功能强弱交替出现所致, 是心肌损害的一种表现。见于高血压性心脏病、心功能不全和冠状动脉粥样硬化性心脏病, 所以应该卧床休息。故选 A。解题关键: 生命体征的观察与护理。

42. D. 用手指轻压病人指甲末端或以玻片轻压病人口唇黏膜, 可使局部发白, 当心脏收缩时则局部又发红, 随心动周期局部发生有规律的红白交替即为毛细血管搏动征。见于主动脉瓣重度关闭不全或外周毛细血管壁扩张。故选 D。解题关键: 心脏瓣膜病病人的护理。

43. B. 只要是引起心脏缺氧的疾患都会引起发绀。贫血不会引起心脏缺氧, 故不会引起发绀。故选 B。解题关键: 呼吸系统疾病的护理。

44. E. 女患者月经期一般不宜留取小便送检, 以免经血混入小便, 造成血尿的假象。故选 E。解题关键: 尿标本采集的方法。

45. D. 库斯莫尔呼吸又称深度呼吸, 是一种深而规则的大呼吸。见于糖尿病酮症酸中毒和尿毒症酸中毒等, 以便排出较多的二氧化碳, 调节血中的酸碱平衡。故选 D。呼吸和呼吸暂停现象交替出现为间断呼吸 (比奥呼吸); 呼吸幅度由浅至深, 再浅至停为潮式呼吸; 浅表不规则的呼吸, 有时呈叹息样, 为浮浅呼吸。解题关键: 库斯莫尔呼吸的特征。

46. B. 患者常存在的心理问题有: ①焦虑、急躁: 由于疾病来得突然, 自觉症状明显, 患者没有足够的思想准备, 因而往往产生紧张及焦虑。故选 B。有的患者病情重, 害怕疾病恶化, 表现出急躁情绪。②恐惧及忧虑: 患者对入院后进行的必要诊断方法和综合治疗措施不了解, 可产生恐惧和不安心理。部分需要长期治疗的慢性患者也会产生忧虑。③丧失信心: 内科疾病病程长, 常反复发作, 药物疗效差, 患者往往对疾病的恢复缺乏信心。解题关键: 内科患者的心理护理。

47. D. 利福平一般是用于抗结核病。抗结核治疗时需与其他药物联用, 成人早晨空腹顿服, 一日 4 粒, 最多不超过 8 粒。老年患者用成人的 $3/4$ 剂