

最佳畅销书

2016

全国卫生专业技术  
资格考试权威推荐用书

# 主管护师 考试冲刺试卷

(第四版)

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写



更多免费题库

考前辅导授课名师，紧扣考纲精选试题

涵盖突出考试重点，提高考前冲刺效率

中国医药科技出版社

主要内容

2016全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书

# 主管护师考试冲刺试卷

(第四版)

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写

免费赠送本书互动电子版 阿虎医书



- 1. 万人同测、自动排行，评估自身水平
- 2. 错题重做、自动收藏，好题时时温故
- 3. 习题评论、纵情吐槽，考友共同进步
- 4. 书本太重、工作太忙，考点随身背诵

授权码

册账号—输入授权码

中国医药科技出版社

## 内 容 提 要

本书紧扣2016年主管护师考试大纲,精心甄选习题1200余道,科学合理组卷3套,本书试卷题型与主管护师考试题型一致,考点分布接近于真题,有助于考生了解主管护师考试内容,提前熟悉考试题型,合理安排复习备考内容,抓住考试重点和易考点,模拟考场情景,考前自测,以从容面对考试。本书适合备战2016年主管护师考试的考生参阅。

### 图书在版编目(CIP)数据

主管护师考试冲刺试卷 / 卫生专业技术资格考试研究专家组编写. —北京:  
中国医药科技出版社, 2016. 1

2016 全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 8075 - 9

I. ①主… II. ①卫… III. ①护理学—资格考试—习题集  
IV. ①R47 - 44

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第321030号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www.cmstp.com](http://www.cmstp.com)

规格 787 × 1092mm <sup>1</sup>/<sub>16</sub>

印张 9

字数 180千字

初版 2012年2月第1版

版次 2016年1月第4版

印次 2016年1月第1次印刷

印刷 三河市国英印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 8075 - 9

定价 29.00元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 前 言

为贯彻原人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自2001年起，全国卫生专业初、中级技术资格以考代评工作正式实施。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平 and 能力，作为单位聘任相应技术职务的依据。

主管护师考试设置基础知识、相关专业知识和专业知识、专业实践能力4个科目。全部4个科目在2年内全部合格者可申请该级专业技术资格。考试内容涵盖了内、外、妇、儿、基础护理学、医疗机构从业人员行为规范与医学伦理学的相关知识。

2016年主管护师考试在即，相信很多考生正在全面复习备考，那么主管护师考试到底考什么内容？怎么考呢？为了让广大考生对主管护师资格考试有一个全面的了解，熟悉实战情景，我们精心编写了这本《主管护师考试冲刺试卷》。本书紧扣2016年主管护师考试大纲，精心甄选习题。试卷题型与主管护师考试一致，考点分布接近于真题，有助于考生提前熟悉考试题型，让考生从容面对考试。

本书旨在帮助考生了解主管护师考试内容，分析历年真题，合理安排内容，抓住考试重点和易考点，指导考生进行2016年主管护师考试复习备考。虽然每一年的考试内容略微有所变化，但是常考点、易考点和重点几乎是不变的。考生在练习冲刺试题的过程中可以加深对重点知识的巩固，并可以此进行考前自测，查漏补缺，根据自身对知识的掌握情况进行针对性的复习。

让您惊喜的是：本书将附赠电子书版本，方便您充分利用碎片时间，随时随地在手机端阅读、做题、判卷等互动学习。“阿虎医考”团队为您答疑解惑，提供专业的复习指导。

选择一本好的辅导书可以让考生在复习中事半功倍，做到有的放矢。相信有了这本书的帮助，大家的复习一定会更有效！

书中如有错漏之处，欢迎广大考生批评指正，意见反馈邮箱：[kszx405@163.com](mailto:kszx405@163.com)。最后祝所有考生在主管护师考试中都能取得好的成绩！

本书编委会  
2015年10月

为了更好地服务本书读者，我们与阿虎医考合作为大家答疑解惑，获取更多本书相关知识，请关注微信订阅号



# 目 录

冲刺试卷	1
冲刺试卷一	3
基础知识	3
相关专业知识	13
专业知识	23
专业实践能力	33
冲刺试卷二	43
基础知识	43
相关专业知识	53
专业知识	63
专业实践能力	73
冲刺试卷三	83
基础知识	83
相关专业知识	93
专业知识	103
专业实践能力	113
参考答案	123
冲刺试卷一	125
基础知识	125
相关专业知识	126
专业知识	127



# 冲刺试卷

## 基础知识

# 冲刺试卷

一、以下每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 关于巨幼细胞性贫血的实验室检查，不正确的是

- A. 网织红细胞增高
- B. 白细胞、血小板减少
- C. 骨髓涂片可见巨幼红细胞，可见巨核细胞
- D. 血清维生素B<sub>12</sub>及叶酸水平降低
- E. 血清叶酸水平增高

2. 小儿肥胖症是指体重超过同年龄、同性别小儿正常体重的

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 40%
- E. 50%

3. 诊断为单纯性肥胖症的体格检查特点

- A. 皮下脂肪多
- B. “三多三少”表现
- C. 腹部膨隆
- D. 脂肪性肝炎
- E. 嗜吃的病人

4. 肥胖小儿应做检查，首先应作下列哪项检查

- A. 头颅
- B. 心电图
- C. 身高的测量

- D. 上下肢骨
- E. 身高

5. 甲状腺功能亢进最典型的脉率特征是

- A. 舒张期快
- B. 收缩期快
- C. 收缩期慢
- D. 舒张期慢

6. 我国流行性乙脑的流行季节主要是

- A. 夏季
- B. 冬季
- C. 夏秋季
- D. 秋冬季

7. 诊断单纯性甲状腺肿时，最不可能出现的检查方式是

- A. 放射性碘
- B. 甲状腺核素扫描
- C. 甲状腺核素显像
- D. 甲状腺核素扫描
- E. 甲状腺核素扫描

8. 甲状腺功能亢进症的表现，不正确的是

- A. 有一过性心动过速
- B. 各系统器官可有弥漫性肿大
- C. 多数患者是腺垂体分泌过多
- D. 多数患者是腺垂体分泌过多
- E. 神经系统的兴奋是突出的表现

9. 甲亢病人上肢的伸展试验

- A. 阳性
- B. 阴性
- C. 阳性
- D. 阴性





# 冲刺试卷一

## 基础知识

一、以下每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- 关于巨幼细胞性贫血的实验室检查结果，不妥的是
  - 属大细胞性贫血
  - 白细胞、血小板增生显著
  - 骨髓检查见红系增生活跃，可见各阶段巨幼红细胞
  - 血清维生素 B 低于正常
  - 血清叶酸低于正常值
- 小儿肥胖症是指体重超过同年龄、同身高小儿正常标准的
  - 10%
  - 20%
  - 30%
  - 40%
  - 50%
- 诊断为系统性红斑狼疮的特征性依据为
  - 苏木紫小体
  - “洋葱皮样”病变
  - 疣状心内膜炎
  - 狼疮性肾炎
  - 狼疮性肺炎
- 欲衡量小儿营养状况，首先应作下列哪项检查
  - 头围
  - 测体重
  - 身长的测量
  - 上、下部量
  - 坐高
- 脊髓型颈椎病最易出现的阳性体征
  - Babinski 征
  - Foment 征
  - Gaenslen 征
  - Thomas 征
  - Lasegue 征
- 我国流行性乙脑的流行季节主要是
  - 春季
  - 春夏季
  - 夏秋季
  - 秋冬季
  - 冬季
- 诊断原发性下肢深静脉瓣膜功能不全最可靠的检查方法为
  - 波氏试验
  - 下肢深静脉造影
  - 屈氏试验
  - Pratt 试验
  - 电阻抗血流测定
- 关于儿童生长发育规律，不正确的是
  - 有一定的个体差异性
  - 各系统器官发育速度不平衡
  - 生长发育是遵循一定规律的
  - 生长发育是一个连续过程
  - 神经系统的发育先快而后回缩
- 狂犬病的主要传染源是
  - 犬
  - 猪
  - 狐狸
  - 食血蝙蝠

E. 病人

10. 用农历计算预产期, 应如何推算

- A. 月份减3或加9, 日期加7
- B. 月份减3或加9, 日期加8
- C. 月份减3或加9, 日期加10
- D. 月份减3或加9, 日期加13
- E. 月份减3或加9, 日期加15

11. 何种腹腔内脏损伤检查时腹膜刺激征不明显

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 胰破裂
- D. 肠穿孔
- E. 胃穿孔

12. 下述哪项不利于生殖器局部的防御功能

- A. 阴道维持酸性环境
- B. 阴道黏膜有横纹皱襞
- C. 子宫颈内口紧闭
- D. 宫颈管分泌物形成黏液栓
- E. 子宫内膜周期性剥脱

13. 初乳具有下列特点, 但除外

- A. 是产后5~7天分泌的乳汁
- B. 量足
- C. 含蛋白质多, 脂肪少
- D. 富含免疫物质
- E. 有生长发育调节因子

14. 心室充盈不受限的疾病是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 限制性心肌病
- C. 缩窄性心包炎
- D. 心包积液
- E. 肥厚性心脏病

15. 损伤后机体的代谢特点是

- A. 分解代谢减弱
- B. 合成代谢增强
- C. 分解代谢亢进
- D. 合成代谢减弱

E. 与受伤前相同

16. 支气管自哪级开始参与气体交换

- A. 支气管
- B. 终末细支气管
- C. 呼吸性细支气管
- D. 肺泡管
- E. 肺泡囊

17. 与蜘蛛痣形成有关的因素是

- A. 血小板减少
- B. 血中雌激素增加
- C. 毛细血管脆性增加
- D. 凝血机制障碍
- E. 严重感染

18. 心源性休克时提高心排出量最有效的方法是

- A. 毛花苷C
- B. 多巴酚丁胺
- C. 胺碘酮
- D. 主动脉内气囊反搏
- E. 硝酸甘油

19. 中央型肺癌一般是指发生在

- A. 主支气管
- B. 叶支气管
- C. 段支气管
- D. 段以下支气管
- E. 段以上支气管

20. 以下关于甲状腺功能亢进症的叙述哪一项是不正确的

- A. 女性发病率大大高于男性
- B. 育龄女性多见
- C. 甲状腺大小与病情严重程度不成正相关
- D. 女性无血管杂音及(或)震颤, 可排除诊断
- E. 突眼严重程度与疾病亦不呈正相关

21. 下列哪一项不是小儿生长发育的一般规律

- A. 由上至下  
 B. 由粗到细  
 C. 由低级到高级  
 D. 由远到近  
 E. 由简单到复杂
22. 高钾血症的原因不包括  
 A. 静脉补钾过快  
 B. 急性肾功能衰竭  
 C. 输入大量库存血  
 D. 持续胃肠减压  
 E. 代谢性酸中毒
23. 脑出血最常见的原因是  
 A. 颅内肿瘤破裂  
 B. 颅内动脉瘤破裂  
 C. 高血压脑动脉硬化  
 D. 动静脉畸形  
 E. 头部创伤
24. 小儿的脊髓下端位置偏低, 其脊髓下端上移至第一腰椎的年龄为  
 A. 2岁                      B. 3岁  
 C. 4岁                      D. 6岁  
 E. 10岁
25. 下列不属于冠心病的危险因素的是  
 A. 高血压  
 B. 血脂异常  
 C. 女性绝经前  
 D. 40岁以上  
 E. 吸烟
26. 小儿出生时存在, 以后永不消失的神经反射是  
 A. 吞咽反射              B. 吸吮反射  
 C. 拥抱反射              D. 觅食反射  
 E. 握持反射
27. 关于消毒的概念, 下列哪项是错误的  
 A. 病室的日常卫生处理、餐具消毒等属  
     预防性消毒  
 B. 预防性消毒是指对可能受病原体污染的场所、物品所做的消毒措施  
 C. 终末消毒指预防性消毒  
 D. 疫源地消毒包括随时消毒和终末消毒  
 E. 消毒的种类包括疫源地消毒和预防性消毒
28. 心力衰竭最重要的诱因是  
 A. 摄入钠盐过多      B. 静脉输液过快  
 C. 情绪激动            D. 过度劳累  
 E. 感染
29. 癌细胞局限在膀胱黏膜内, 无乳头亦无浸润, 称为  
 A. 原位癌                B. 癌前病变  
 C. 乳头状癌              D. 浸润性癌  
 E. 表浅性癌
30. 关于切断传播途径的措施, 下列概念哪项是错误的  
 A. 经皮肤传染的疾病主要应搞好个人防护, 如在血吸虫病流行区下水前涂防护剂  
 B. 对接触性传染病首先应接种疫苗  
 C. 对虫媒传染病应因地制宜采取药物或其他措施, 以防虫、杀虫、驱虫  
 D. 对呼吸道传染病应保持室内空气流通, 戴口罩, 必要时进行空气消毒  
 E. 对肠道传染病应着重做好“三管一灭”措施
31. 正常月经周期的调节轴  
 A. 下丘脑-垂体-卵巢轴相互调节控制  
 B. 下丘脑控制  
 C. 大脑皮质控制  
 D. 精神情绪控制  
 E. 环境和工作控制
32. 对胰腺癌有定性诊断意义的是

- A. 超声波  
B. CT  
C. 癌胚抗原测定  
D. 细胞学检查  
E. X线造影
33. 根据领导生命周期理论, 最适宜对成熟的护士采取的领导方式是  
A. 低工作, 高关系  
B. 高工作, 低关系  
C. 高工作, 高关系  
D. 低工作, 低关系  
E. 不分配任务, 高关系
34. 导致慢性肺心病的最常见病因是  
A. 支气管哮喘  
B. 慢性纤维空洞型肺结核  
C. 尘肺  
D. 慢性支气管炎  
E. 弥漫性支气管扩张
35. 心肺复苏后持续生命支持脑复苏的措施不包括  
A. 建立静脉通道  
B. 脑电图监测  
C. 监测心肺功能  
D. 电除颤  
E. 应用脱水剂降低脑温
36. 新生儿出生后, 开始喂哺母乳时间是  
A. 15~30分      B. 3~4小时  
C. 6~8小时      D. 12小时  
E. 24小时
37. 骨肉瘤病人最常见的肿瘤转移部位是  
A. 肺              B. 肝  
C. 脑              D. 肾  
E. 胰腺
38. 小儿最常见的结核病类型是  
A. 盆腔结核  
B. 结核性脑膜炎  
C. 原发型肺结核  
D. 粟粒型肺结核  
E. 支气管淋巴结核
39. 急性乳腺炎最常见的致病菌是  
A. 溶血性链球菌  
B. 变形杆菌  
C. 大肠埃希菌  
D. 厌氧菌  
E. 金黄色葡萄球菌
40. 下列属于临产的标志的是  
A. 见红, 规律宫缩, 胎头下降  
B. 规律宫缩, 破膜, 胎头下降  
C. 见红, 破膜, 宫口扩张  
D. 见红, 破膜, 规律宫缩  
E. 规律宫缩, 胎头下降, 宫口扩张
41. 关于肠痿病患者负压引流与灌洗的护理措施, 正确的叙述是  
A. 负压以15mmHg~22.5mmHg为宜  
B. 痿管形成后, 漏出液减少时, 应降低压力  
C. 若肠液黏稠, 刺激性强时, 应减慢冲洗速度  
D. 每天灌洗量应800~1000ml  
E. 灌洗液以无菌蒸馏水为主
42. 颅内压增高最常见的临床表现是  
A. 头痛  
B. 呕吐  
C. 视力模糊  
D. 复视  
E. 生命体征改变
43. 新生儿胎粪的特点是  
A. 褐色、干厚  
B. 金黄色、糊状  
C. 陶土色、软膏状

- D. 淡黄色水样便  
E. 墨绿色、黏稠状
44. 血液中 pH 值主要取决于血浆中的  
A.  $\text{CO}_2\text{CP}$                       B.  $\text{PaCO}_2$   
C.  $\text{HCO}_3^-$                       D.  $\text{H}_2\text{CO}_3$   
E.  $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$
45. 用冰毯治疗中暑时, 人体主要通过下列哪种方式散热  
A. 蒸发  
B. 辐射  
C. 对流  
D. 调节体温中枢  
E. 传导
46. 结肠癌最常见的组织学类型是  
A. 黏液癌                      B. 腺癌  
C. 未分化癌                      D. 黏液腺癌  
E. 类癌
47. 关于前列腺素, 下列哪项不恰当  
A. 可使子宫肌肉收缩  
B. 月经血中可有前列腺素  
C. 是产生痛经的原因  
D. 对下丘脑及垂体功能无影响  
E. 存在于子宫内膜、卵巢中
48. 不属于肾移植术后排斥反应的表现是  
A. 体温升高  
B. 移植肾区自觉胀痛  
C. 血压升高  
D. 尿量大于 4000ml/天  
E. B 超发现移植肾明显肿大
49. 关于粟粒型肺结核, 下列哪项叙述正确  
A. 是小儿肺结核的主要类型  
B. 多见于儿童  
C. 多在感染结核 1 年后起病  
D. 起病慢, 低热  
E. 可伴有结核性脑膜炎
50. 20 周末胎儿发育特征为  
A. 吸吮反射良好  
B. 四肢活动活泼  
C. 指甲已超过指端  
D. 临床上用普通听诊器可听到胎心  
E. 身长 25cm, 皮下脂肪发育良好
51. 未曾接种卡介苗的 3 岁以下儿童结核菌素试验阳性, 提示  
A. 机体反应性差  
B. 需接种卡介苗  
C. 患有活动性结核病  
D. 曾有结核菌感染  
E. 严重营养不良
52. 关于外阴癌的叙述, 正确的是  
A. 外阴癌多发生在小阴唇部位  
B. 出现结节肿物是外阴癌最常见的症状  
C. 外阴癌的癌前病变为外阴上皮内瘤样病变  
D. 外阴癌患者的治疗原则以化学治疗为主  
E. 外阴癌中最常见的是黑色素瘤
53. 好发于儿童的卵巢肿瘤是  
A. 无性细胞瘤                      B. 内胚窦瘤  
C. 畸胎瘤                      D. 颗粒细胞瘤  
E. 勃勒纳瘤
54. 引起急性继发性化脓性腹膜炎最主要的病原菌是  
A. 混合性细菌                      B. 大肠杆菌  
C. 葡萄球菌                      D. 链球菌  
E. 肺炎双球菌
55. 属于肾性肾衰竭的病因是  
A. 肾中毒  
B. 前列腺增生  
C. 大出血、休克  
D. 双侧输尿管结石

- E. 盆腔肿瘤压迫输尿管
56. 以下关于静脉血栓形成的病因叙述不正确的是
- A. 静脉壁损伤
  - B. 血流缓慢
  - C. 血液高凝状态
  - D. 多发生于手术后或制动患者
  - E. 静脉闭塞
57. 血吸虫病所致的门静脉高压症的主要阻塞部位在
- A. 肝内窦前
  - B. 肝内窦内
  - C. 肝内窦后
  - D. 肝前
  - E. 肝后
58. 慢性化脓性骨髓炎显示脓腔概况的方法
- A. X线平片
  - B. CT
  - C. 穿刺
  - D. 水溶性碘溶液造影
  - E. 手术
59. 关于产后恶露的描述下列哪项不正确
- A. 血性恶露色鲜红, 含大量血液, 量多
  - B. 血性恶露内有少量胎膜及坏死蜕膜组织
  - C. 浆液性恶露色淡红, 含少量血液
  - D. 浆液性恶露内有较多的坏死蜕膜组织、子宫颈黏液、阴道排液
  - E. 白色恶露色较白、内有胎膜组织及坏死蜕膜组织
60. 确诊一氧化碳中毒的主要依据是
- A. 血液中脱氧血红蛋白量大于50g/L
  - B. 血液中脱氧血红蛋白量大于70g/L
  - C. 血液胆碱酯酶活性降低
  - D. 血液检查碳氧血红蛋白定性阳性
  - E. 血液中氧分压降低
61. 护理咯血病人的关键措施是
- A. 消除心理不良因素
  - B. 保持呼吸道通畅
  - C. 减少活动, 保持安静
  - D. 准备好急救药品和器械
  - E. 作镇静、镇咳等对症处理
62. 大便潜血持续阳性多提示
- A. 浅表性胃炎
  - B. 萎缩性胃炎
  - C. 胃溃疡
  - D. 十二指肠壶腹部溃疡
  - E. 胃癌
63. 手术后病人出现腹胀的最主要原因是
- A. 细菌代谢产生气体
  - B. 血液内的气体弥散到肠腔内
  - C. 胃肠道功能受到抑制
  - D. 肠内容物分解产生气体
  - E. 术后咽下大量空气
64. 脉压增大伴有周围血管征的先天性心脏病是
- A. 房间隔缺损
  - B. 室间隔缺损
  - C. 动脉导管未闭
  - D. 肺动脉狭窄
  - E. 法洛四联症
65. 关于脊柱外伤和脊髓损伤的关系的叙述, 下列哪项是错误的
- A. 脊髓损伤阶段与椎体手术平面不一致
  - B. 胸椎较固定, 所以胸椎的脱位多无脊髓损伤
  - C. 有的病例表现为明显的脊髓损伤, 但X线片却无骨折脱位
  - D. 屈曲型骨折脱位造成脊髓损伤最多见
  - E. 椎管狭窄患者, 脊柱创伤更易发生脊髓损伤
66. 患者, 男性, 59岁。因腰骶痛3个月伴

头晕就诊。检查：血压正常，腰椎压痛，双下肢水肿，血红蛋白87g/L，尿蛋白(+)，血钙3.9mmol/L，碱性磷酸酶280U/L， $\gamma$ -球蛋白45%，其蛋白尿类型可能是

- A. 肾小球性蛋白尿
- B. 肾小管性蛋白尿
- C. 组织性蛋白尿
- D. 溢出性蛋白尿
- E. 分泌性蛋白尿

67. 患者，女性，48岁，8月初由外地来京探亲，因“发热、头痛5天，神志不清2天”于9月18日入院，经查后确诊为流行性乙型脑炎。该病人确诊为流行性乙型脑炎的最主要依据是

- A. 血培养
- B. 骨髓培养
- C. 脑脊液常规检查
- D. 脑脊液涂片检查
- E. 特异性IgM抗体

68. 王某，36岁，近几天感到外阴瘙痒，白带增多，呈稀薄状且有腥臭味。应建议她到医院做

- A. 阴道分泌物悬滴检查
- B. 子宫颈刮片
- C. 子宫颈管涂片
- D. 阴道侧壁涂片
- E. 阴道窥器检查

69. 男性，20岁。入学查体胸透，发现左侧胸腔第6胸椎旁有直径约6cm圆形肿块影。最可能的诊断是

- A. 畸胎瘤
- B. 胸腺瘤
- C. 中央型肺癌
- D. 神经源性肿瘤
- E. 淋巴源性肿瘤

70. 女性，20岁，2周前发热，体温38.6℃，伴咽痛、流涕，经治疗好转。2天来感活动后心悸、胸闷、气促，伴心前区不适；查体：心界扩大，体温36.5℃，脉搏108次/分。心电图示普遍导联ST-T波改变，三度房室传导阻滞；化验：血沉增快，C反应蛋白阳性，CPK增高。其原因最可能是

- A. 缩窄性心包炎
- B. 病毒性心肌炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 扩张型心肌病
- E. 心脏神经官能症

71. 女性，12岁。轻度乏力、厌食25天，无恶心、呕吐、尿色进行性加深，皮肤瘙痒。肝功ALT 100U/L，TBIL 310 $\mu$ mol/L，ALP 900u/L，GGT 800u/L，CH 15mmol/L，根据上述病历资料。病人最可能的诊断是

- A. 慢性活动性肝炎
- B. 急性重型肝炎
- C. 肝性脑病
- D. 肝肾综合征
- E. 淤胆型肝炎

72. 男，56岁，近3个月来排便次数增多，每天3~4次，为黏液脓血便，且有里急后重感，首选的检查方法是

- A. B超
- B. X线钡剂灌肠
- C. 直肠指诊
- D. 纤维结肠镜
- E. 血清癌胚抗原

73. 男，3岁，高热2小时，腹泻、抽搐3次，神志不清，于2002年8月急诊入院。应首先作的检查是

- A. 脑脊液检查

- B. 脑电图检查  
 C. 血白细胞分类  
 D. 血涂片找疟原虫  
 E. 灌肠或肛门拭子检查粪便常规
74. 初孕妇, 28 岁。于预产期当日出现规律宫缩临产入院。测血压 22.6/14.6 kPa (170/110mmHg), 尿蛋白 (+ + +), 浮肿 (+ +)。产科检查, 枕左前位, 胎头已衔接, 胎心率 128 次/分。肛查宫口开大 3cm。胎胞已形成。突然抽搐发作, 继之意识丧失。本病例首先应考虑是
- A. 癫痫  
 B. 分离 (转换) 性障碍  
 C. 子痫  
 D. 先兆子痫  
 E. 脑血管意外
75. 患者, 男性, 40 岁, 发现右肾多发结石, 左肾盂结石直径 1.2cm, 当发生肾绞痛时, 护士可准备哪些药物
- A. 哌替啶 + 山莨菪碱  
 B. 吗啡  
 C. 复方氨基林巴比妥注射液  
 D. 巴比妥  
 E. 氯丙嗪
76. 患者女, 30 岁。发现血压高 3 年。常规体检: BP 150mmHg/105mmHg, 双下肢无水肿, 查尿蛋白 (+ + +), 镜下见红细胞, 尿比重 1.027, 无高血压家族史。最可能的诊断是
- A. 急性肾小球肾炎  
 B. 急进性肾小球肾炎  
 C. 肾病综合征  
 D. 慢性肾小球肾炎  
 E. 隐匿性肾小球肾炎
77. 男性, 38 岁。阑尾切除术后 2 天, 突发高热, 查看伤口红肿, 有波动感。应如何处理
- A. 大剂量抗生素治疗  
 B. 拆除切口缝线, 敞开伤口  
 C. B 超检查  
 D. 物理治疗  
 E. 继续观察
78. 女性, 45 岁。肝区痛伴高热、畏寒 3d。巩膜轻度黄染, 右季肋区饱满有叩痛, 肝右肋下 2cm。CT 示右肝后叶低密度灶, 边界清, 6cm × 5cm × 4cm 大小。诊断为
- A. 原发性肝癌  
 B. 细菌性肝脓肿  
 C. 阿米巴性肝脓肿  
 D. 肝包虫病  
 E. 肝囊肿
79. 28 岁孕妇, G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>。妊娠 24 周糖筛查血糖值为 9.5mmol/L。为明确诊断, 该孕妇应进一步接受的检查
- A. 尿糖检测  
 B. 空腹血糖  
 C. OGTT  
 D. 尿酮体检测  
 E. 尿蛋白检测
80. 一建筑工地因野蛮施工使煤气管破裂, 煤气外溢, 致使多名工人及附近居民中毒。此时最有效的抢救措施是
- A. 血液透析  
 B. 20% 甘露醇快速静脉滴  
 C. 亚冬眠治疗  
 D. 鼻导管吸氧  
 E. 以上都不是
81. 病人, 男性, 18 岁。自儿童时期起哮喘即反复发作。昨天上午因受凉感冒而致哮喘再次发作, 初起感胸闷、鼻痒, 后即咳嗽打喷嚏、流清水鼻涕。继之气急明显, 不能平卧, 口唇发绀, 鼻翼扇动。



- 虽经口服磺胺药、氨茶碱、麻黄素等，仍未控制。因病情加剧而于今天下午来院急诊。拟诊断为
- 外源性哮喘
  - 内源性哮喘
  - 混合源性哮喘
  - 心源性哮喘
  - 哮喘持续状态
82. 经产妇，枕左前位足月分娩，胎头已达盆底，宫口开全，已破膜。此时胎心率突然变快，180次/分，出现胎儿窘迫征象。此病例应立即采取的措施是
- 立即行剖宫产术
  - 会阴侧切并行产钳术
  - 胎头吸引术
  - 缩宫素静脉滴注
  - 观察产程
83. 4个月男婴，哭闹烦躁，夜惊多汗，不发热。查体：神志清，面色可，前囟平坦，有枕秃，枕部颅骨有乒乓球感，心肺(-)，克氏征(±)性，巴氏征(±)性。最可能的诊断是
- 佝偻病活动期
  - 化脓性脑膜炎
  - 结核性脑膜炎
  - 病毒性脑炎
  - 甲状腺功能低下
84. 时某，男性，65岁，右腰痛2年余，无痛性全程肉眼血尿3天；查体：右肾区叩痛，右肾可触及季肋下3指。尿常规：红细胞充满视野；肾盂静脉造影可见右肾中盏移位、拉长、变形。应诊断为
- 肾癌
  - 肾结核
  - 肾盂癌
  - 肾胚胎癌
  - 肾囊肿
85. 男性，31岁，下腹部外伤6小时，病人出现小腹隐痛伴排尿困难，试插导尿管可以顺利进入膀胱，注入50ml生理盐水后抽出不足50ml。此种情况应首先考虑
- 后尿道断裂
  - 前尿道断裂
  - 输尿管损伤
  - 膀胱损伤合并尿道损伤
  - 膀胱破裂
86. 患者女，25岁，已婚未育。阴道有脱出物，拟诊为子宫脱垂Ⅱ度轻。导致该患者发生子宫脱垂的最可能原因是
- 分娩损伤
  - 手术损伤
  - 腹压增加
  - 盆底组织发育不良
  - 盆底组织退行性变
87. 25岁初产妇，胎膜早破。自然分娩后第3天突然出现畏寒高热体温40℃，伴有恶心、呕吐。查体：下腹压痛、反跳痛，腹肌紧张明显，初步诊断为急性盆腔腹膜炎。为进一步明确病原体，应选择的实验检查项目是
- 血常规
  - 血培养
  - 阴道分泌物涂片
  - 尿常规
  - 尿细菌学检查
88. 7岁患儿，高热5小时，反复抽搐，意识不清，于7月7日入院。血白细胞 $15 \times 10^9/L$ 。肛门拭子取粪便检查：脓细胞3~5个低倍视野，最可能的诊断是
- 中毒性细菌性痢疾
  - 暴发型流脑
  - 流行性乙型脑炎
  - 败血症
  - 高热惊厥