



考霸四宝

2016 全国卫生专业技术资格考试 护理学专业(护师)

押题宝

主编 ○ 张淑彦 魏保生

- 化解偏题
- 搞定怪题
- 直逼考官命题

中国医药科技出版社

2016

全国卫生专业技术资格考试

——护理学专业（护师）

押题宝

主 编	张淑彦	魏保生					
副主编	霍利敏	张宁宁					
编 委	聂长杰	杨 伟	闫丽娟	魏立强	高幼帛	王力芳	王建国
	谭建平	孙洪强	牛换香	魏 云	刘彦才	刘庆华	刘红旗
	李 慧	贾竹清	陈红燕	齐 欢	张利萍	王淑华	倪 宁
	张 娟	郭文兵	于文红	任艳萍	李晓静	李爱玲	崔永华
	崔清华	江 莉	吴婕妮	连风梅	段龙芝	李 芳	赵源祥
	王秀丽	周 翠	方文英	闻飞飞	魏宾燕	尤 蔚	付 涛
	邵晨燕	洪 惠	牛 菲	晋雪女	刘 钊	吴佚革	张素英
	未耀成	刘葆升	魏保生	霍利敏	张宁宁	刘月梅	张淑彦

中国医药科技出版社

内 容 提 要

《2016 全国卫生专业技术资格考试——护理学专业（护师）押题宝》是护考四宝系列丛书之一，《高分宝》：锁定考点，破解难点，勇攀高分之巅；《押题宝》：化解偏题，搞定怪题，直逼考官命题；《得分宝》：丢掉死记，不屑硬记，看我纵横妙记；《冲刺宝》：考前演练，模拟实战，挑战人生考验。

本书分两个模块：【破解命题规律】：揭秘命题方法，备考有的放矢。【驾驭经典考题】：精选各种题型，解析精准到位。

这套丛书具有高效、全面的特点，是参加护理考试的首选辅导系列。全体编者和作者祝广大考生，在激烈的竞争中能如愿以偿！

图书在版编目（CIP）数据

2016 全国卫生专业技术资格考试·护理学专业（护师）
押题宝 / 张淑彦，魏保生主编. —北京：中国医药科技出版社，2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5067 - 7832 - 9

I. ①2… II. ①张… ②魏… III. ①护理学 - 护士 -
资格考试 - 习题集 IV. ①R47 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 247802 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm¹/₁₆

印张 23¹/₂

字数 530 千字

版次 2016 年 1 月第 1 版

印次 2016 年 1 月第 1 次印刷

印刷 北京市昌平百善印刷厂

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7832 - 9

定价 79.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前言

五步大法，陪你过关——命题规律、复习方法、记忆窍门、解题策略与避错诀窍

第一步：透析命题规律，做到知己知彼

对待所有考试第一步都是要了解考试范围（即了解考点）与命题方式。其中考试范围包括：①考题类型；②各门课程所占的大致比例；③各章节试题分布情况。这可以参照大纲。在此不做赘述。

下面就考试命题的方式做深入探讨。首先来看总的出题方式，不外乎有四种。

第一种：1对1型 也就是说题干所问是一个点，所有备选项都是围绕该“点”而设，例如：题干问“最”“首选”“主要”“首先”“数据”“部位”“适应证”“并发症”“诊断”“检查”“治疗”等的就属于这一类。这种类型的题目最多见。所以也是复习时要重点下功夫的地方。命题者可以根据课本上任何一句话来命题，类似填空。这就要求考生在看书的时候有敏感的“火眼金睛”找出哪些内容是可能的考点。同时这也是有些考生认为自己复习得很到位（花费了很多时间和很大精力）但就是不能上线。换句话夸张地说，你复习到的都没有考，你没有复习的都考了。因此，锁定或者找出哪些是可能的考点成为每个考生第一要务而不是盲目地看书和做题。下面的复习方法中我们会提醒大家哪些是容易考的考点。另外一个好的方法就是看真题，仔细分析历年的真题是怎么考的无疑是最佳的办法。这也是我们出版这套书的根本出发点。

第二种：1对多型 也就是说题干所问是一个点，备选项中是针对该“点”的不同侧面而设，例如：题干问“临床表现”“不包括”“不属于”“除外”“不正确”等就属于这类题。这类题目越来越多，也就是说考试的难度加大了。考生对一个问题方方面面都要牢固的掌握，而不是像1对1型的题目那样单纯而重点在“点”。这类题实际上是“以点带面”，最常见的三种考法有：一是串联地考，例如把一个疾病的病因、病机、表现、检查、诊疗和预防作为选项。二是横向地考，例如把一个疾病的与另外一个疾病的不同或者相同的病因、病机、表现、检查、诊疗和预防作为选项。三是纵深地考，例如把某个疾病的病因（或者病机、表现、检查、诊疗和预防等等）综合起来考察。与1对1型题一样，这类题的标准答案往往在课本上能直接找到，但是不像1对1型题目能够在某一段或者一句话中找到，而是在几个段落甚至几页才能找到。也就是说，这种题找答案都这么费劲，可想而知复习的时候要把这类题的考点找出来就非常的困难。对待这类题有两个方法：第一是平时多总结，功夫在平时，第二是多做比较综合的题，锻炼自己的这方面能力。

第三种：多对1型 也就是说题干描述了多个“点”，备选项中有一个与其对应，例如：绝大多数的病例题就是多对1型典型的代表。这类题考查综合能力，看似很难，因为往往在课本上不能直接找到答案。但是实际上，题干会有很多提示，如何找出关键的“题眼”便迎刃而解。这类题往往在题干中已经考察了，例如题干中提到了血常规的值，那么实际上已经

对你是否记住了血常规的正常值进行了考查。因此，对待多对1型的题目，第一要把正常的化验、检查、药物剂量、诊疗标准等等牢固掌握以便能对题干提出的数据、检查、剂量、标准做出正常的判断。第二是，抓题干中的特征性的字眼。这一点也需要通过大量的练习才能达到。

第四种：多对多型 也就是题干描述了多个“点”，备选项中也从不同侧面来对应该题干，这类题比较少见，大多见于病历题。这类题属于天马行空的题目，类似临床上的疑难病例。好在这类题并不多。应对的唯一方法就是提高自己的专业水平而不仅仅是考生水平。

通过以上分析，可见考试还是有规律的，针对命题规律进入下一步——复习方法。

第二步：掌握复习方法，不走弯路、错路

既然我们了解了命题规律，那么就应该为我们的复习做指导，下面是大家复习时候要时时注意的。

1. 牢记数值 包括常见的化验检查的正常值、常见疾病的发病率、药物剂量、比例等等。

2. 极端或者特殊的点要特别注意

(1) 最先、最后、最好、最坏、最大、最小、最高、最低。

(2) 首选、首要、根本、主要。

(3) 特点、特征、特性。

(4) 相同、不同。

(5) 不包括、不属于、除外、不正确。

以上的命题规律，请参见本书的上篇（命题规律）部分。

3. 容易混淆的概念要掌握 每年都有概念题或者定义题。因为对课本出现的概念应该熟练地掌握。

4. 牢固掌握历年考过的真题 不能错误地认为以前考过的内容，今年不会再考了。恰恰相反，有些考点不但每年都考，而且有的就是以原题的形式出现。当然现在考原题的越来越少，但是考点是不变的。因为对于真题，不但要知道正确答案，而且要把错误选项也能分析为什么不对，同时要对题干的问法细致地体会，做到耳熟能详。

5. 要注意归纳总结及鉴别比较 虽然这样做会费点时间，但是在你总结归纳的过程中，实际上就是记忆和提高的过程。就像查单词的过程，实际上就是记忆单词的过程。有些过程看似浪费时间，实际上是在大大地节省时间。

6. 考高分的最好法宝就是多做题 无数的实践证明，医护考试的高分来自于做题。一方面由于做题过程本身就是分析理解、加深记忆的过程，一方面可以发现命题的方法，最后，还能找到做题的感觉。

所以，复习方法的最后都归于一点：做题，做题，再做题!!!

第三步：探究记忆窍门，攻破记忆瓶颈

记忆的方法有很多种，这里只列举以下常见而且有效的医学知识记忆法：

1. 谐音记忆法 根据发音的相同或者类似，来记忆抽象的或者少见的医学知识。

2. 形象或者场景记忆法 设想一种特定的场景来加强医学知识的记忆。

3. 口诀记忆法 编成口诀，朗朗上口，帮助记忆。

4. 对比记忆法 对类似或者容易混淆的知识点列表对比记忆。

5. 顺序记忆法 对于一些疾病的发生过程，按照发生、发展、消退的顺序记忆。

6. 横向联系记忆法 对于同一系统的疾病，可以通过由此及彼的联系来加深巩固。

第四步：展示解题策略，锁定正确答案

1. 正答法 根据题干所问直接根据记忆找出答案。前述的1对1型题大部分可以采用这种方法。这也是最常规最传统最符合医学特点的答题方法。因为毕竟熟练的记忆基本知识、基本理论是应用的基础。

2. 逆答法（或称套用法） 就是从备选项着手，把5个选项一一套入题干描述的情况，这种方法往往适用于多对1型的病例题或者不能通过直接记忆找出答案的1对1型题目。

3. 巧妙运用排除法 因为考试全部采用选择题，所以只要把不是题干问的选项一一排除就能找出正确答案。这种答题方法很常用而且也很有效，常用的技巧是：

（1）有两个（或者两类）矛盾选项者，很可能答案就是其中之一（注意：有些情况两个都不是正确答案）。

（2）找出相似选项，很可能答案就是其中之一。

4. 优选答题法 根据备选项的重要性找答案，最重要的选项往往是正确答案。首先，大纲中没有出现的疾病或者内容常常不是正确答案，其次是临床上重要的疾病或者治疗方法常常是正确答案。

5. 辩证答题法（或者叫常理答题法） 把某种情况绝对化的选项常常是错误的，因为其不符合辩证观或者不符合常理。所以要注意选项中的“所有、均有、都有、100%、必须、绝对”常常不是正确选项。

6. 猜题法（或者叫蒙题法） 反正也不倒扣分，所以实在不会的题就猜一个答案。

第五步：规避错误陷阱，成就一通百通

尽管你有很好的复习方法，你也做了大量的习题，但是如何规避错误也许没有太多的经验与技巧。实际上一个医生的成长正是从无数的前人或者自己的错误中锻炼出来的。因此我们组织相关专家编写了这套四宝丛书，帮助切实过关。

那么有没有护考一次过的秘籍？四宝系列为你过关保驾护航！

《高分宝》 锁定考点，破解难点，勇攀高分之巅；

《押题宝》 化解偏题，搞定怪题，直逼考官命题；

《得分宝》 丢掉死记，不屑硬记，看我纵横妙记；

《冲刺宝》 考前演练，模拟实战，挑战人生考验。

具体来讲：

《高分宝》分三个模块：【大纲精讲】：详解大纲，考点尽收眼底；【提分训练】：精选习题，巩固单元所学；【高频考点】：真题掘金，掌握历年考点。

《押题宝》分两个模块：【破解命题规律】：揭秘命题方法，备考有的放矢。【驾驭经典考题】：精选各种题型，解析精准到位。

《得分宝》分四个模块：【得分必背】化整为零，学习记忆随时随地；【解题要诀】抛砖引玉，献上考试锦囊妙计；【考点并联】合纵连横，搜索考点举一反三；【速记口诀】轻松活泼，记忆变得有趣有味。

《冲刺宝》分两个模块：【模拟冲刺】：实战演练，考前必做；【考点纵览】：考点串联，考前必背。

本书具有高效、全面的特点，是参加护理考试的首选辅导系列。全体编者和作者祝广大考生，在激烈的竞争中能如愿以偿！

目 录

第一模块 破解命题规律	1
命题规律一 数据计算，应牢固掌握以避错	1
命题规律二 数据，应牢固记忆以避错	2
命题规律三 临床表现，但是是反着考：根据表现推断疾病。经常考， 所以要牢固掌握	10
命题规律四 考查程度，极端的地方常常是考点	12
命题规律五 考查病理，是常考点，要掌握	12
命题规律六 注意题干的“首选”二字，这是 A1/A2 型题最容易出题的方式之一， 所以复习时一定要特别留意	12
命题规律七 注意题干的“方式”二字，这种题也常考，所以要留意	13
命题规律八 治疗必然是医务人员的最终行为，所以必然考到，要牢固掌握	13
命题规律九 指标是常考题，因此要掌握牢固	14
命题规律十 影响因素是常考点，要掌握	15
命题规律十一 因为典型，所以才有代表意义，因而也是常考点。应该牢固掌握	15
命题规律十二 医学讲究轻重缓急，因此“首先”出现的地方也是常考的地方， 要特别留意掌握	15
命题规律十三 药物是必考题，因此要掌握牢固	19
命题规律十四 药物的副作用是常考点	20
命题规律十五 向来因果关系都是考试的重中之重，因此，复习时特别注意因果关系	20
命题规律十六 题干中问“错误”，与问“不正确”是一个含义。这类题是一大类，首先要 看清题意，其次要对其余正确的选项也要掌握。这样才能避错	22
命题规律十七 题干问的是“不属于”的选项，言外之意，其他选项都是正确的， 因此，第一要看清题意，第二要全面掌握	30
命题规律十八 题干问的是“不包括”的选项，言外之意，其他选项都是正确的（包括在 内），对于这类题目，第一要看清题意，第二要全面掌握	32
命题规律十九 顺序是常考点，因此要熟练掌握	34
命题规律二十 首先看清问的是哪项不正确，其次，对于其他正确的选项也应全面掌握才	

能以不变应万变	34
命题规律二十一 时间在生活中重要，同时在考试中也特别重要，因为时间就是生命，所以要特别牢记	36
命题规律二十二 请留意题干的“除外”二字，相当于“不包括”或者“不属于”，这类题要看清题再作答	38
命题规律二十三 临床表现是常考点，因此要熟练掌握	38
命题规律二十四 “类型”常常考到，因此要留意	39
命题规律二十五 课本中有“特征”二字的地方，是命题者的青睐，所以要留意	39
命题规律二十六 课本中有“特点”二字的地方，是命题者的青睐，所以要留意	40
命题规律二十七 “最有效”是常考点	41
命题规律二十八 最突出实际上是最明显的，是常考点	42
命题规律二十九 最常见属于“极端”型题目，每年必考，因此要重点记忆	42
命题规律三十 注意题干的“最主要”三个字，这是 A1/A2 型题最容易出题的方式，所以复习时一定要留意	43
命题规律三十一 注意题干的“最重要”三个字，是 A1 型题最容易考的地方，所以要特别注意	44
命题规律三十二 疾病的诊断是一大类题，每年必考，因为是关系着治疗方案，因此要熟练掌握	45
命题规律三十三 机制是一类题，常常考到，因此要留意	47
命题规律三十四 护理学中常考到“体位”是必然的，每种体位都有它的原理，所以应该理解记忆	48
命题规律三十五 概念题每年必考，属于死记硬背题	49
命题规律三十六 三主征是常考点	50
命题规律三十七 三联征是常考点	50
命题规律三十八 部位是一大类考题，必然是护理学常考内容，因此与体位一样有重要临床和考试意义	50
命题规律三十九 不但要掌握不正确的选项，还要掌握其他正确选项才能避错	51
命题规律四十 病因必然是考试重点，因此，一定要熟练掌握	52
命题规律四十一 “目的”，应牢固掌握	53
命题规律四十二 “最”题眼，也是命题的出发点。每年的考试必然有此类题目，因此是掌握的重中之重	55
命题规律四十三 “属于”是一大类题，特别容易改成“不属于”类考题，因此要注意与“不属于”的题目结合掌握	60
命题规律四十四 “主要”是命题者出题时经常寻找的字眼，因此复习时处处在意有这两	

个字的地方	61
命题规律四十五 “适应证”是常考点，应特别注意	63
命题规律四十六 “禁忌证”是常考点，应特别注意	63
命题规律四十七 “不妥”实际上考查“不正确”，是常考点，要牢固记忆。同时要掌握其 他正确选项的做法以避错	63
命题规律四十八 “并发症”是常考点，应重点掌握	67
命题规律四十九 “标志”是常考点，要牢固记忆	69
第二模块 驾驭经典考题	70
第一章 基础护理学	70
第二章 内科护理学	129
第三章 外科护理学	208
第四章 妇产科护理学	286
第五章 儿科护理学	328
第六章 伦理与法规	363

第一模块 破解命题规律

命题规律一 数据计算，应牢固掌握以避免错

1. 某女士，30岁，诊断为甲亢。清晨测得脉率96次/分，血压17.3/9.3kPa（130/70mmHg）。计算基础代谢率是属于

A. 正常
B. 正常范围偏高
C. 重度甲亢
D. 中度甲亢
E. 轻度甲亢

【答案】D

2. 吸氧浓度为33%，每分钟氧流量为

A. 1L
B. 2L
C. 3L
D. 4L
E. 5L

【答案】C

3. 配制0.1%苯扎溴铵4000ml，需用5%苯扎溴铵多少毫升

A. 50
B. 60
C. 80
D. 90
E. 100

【答案】C

4. 某病人6小时内需输液1500ml，应调节滴速为每分钟

A. 60滴
B. 62滴
C. 65滴
D. 70滴
E. 72滴

【答案】B

5. 8岁男孩，开水烫伤。双下肢有水疱，剧痛，胸腹部为红斑。估计该患儿Ⅱ度烫伤面积是

A. 20%
B. 41%
C. 42%
D. 46%
E. 59%

【答案】C

6. 男，28岁。被沸水烫伤，右手掌焦痂呈皮革样，不痛，面部红斑，表面干燥，左上肢、颈部、胸腹部、双足和双小腿均为水疱，有剧痛。并发生低血容量性休克。估计该病人Ⅱ度

烧伤面积为

A. 54%
B. 49%
C. 58%
D. 45%
E. 40%

【答案】E

7. 男性，46岁。体重60kg，Ⅱ度烧伤面积50%，医嘱大量补液，第一天补液总量应为

A. 4500ml
B. 5400ml
C. 6000ml
D. 6500ml
E. 8000ml

【答案】D

8. 女性，30岁。体重50kg，烧伤面积为80%，烧伤部位剧痛，有水疱，部分基底苍白，第一个24小时应补液体总量为

A. 3000ml
B. 5000ml
C. 6000ml
D. 8000ml
E. 9000ml

【答案】D

9. 小儿出生时体重为3.2kg，生后6个月的体重按公式计算约为

A. 6.0kg
B. 6.2kg
C. 6.8kg
D. 7.0kg
E. 7.4kg

【答案】E

10. 按热量计算，5kg婴儿每日需要8%糖牛乳量为

A. 100~110ml
B. 200~220ml
C. 400~440ml
D. 500~550ml
E. 600~660ml

【答案】D

11. 8个月婴儿，体重6.5kg，身长70cm，腹部皮下脂肪0.5cm，精神不振，爱哭闹。判断该患儿最可能是

A. 佝偻病
B. 轻度营养不良
C. 中度营养不良
D. 重度营养不良
E. 中度脱水

【答案】B

12. 腹泻、脱水患儿经补液治疗后已排尿，按医嘱继续输液 400ml，需加入 10% 氯化钾最多不应超过

A. 6ml B. 8ml
C. 10ml D. 12ml
E. 14ml

【答案】D

13. 一健康小儿体重 18kg，身高 100cm。其年龄约为

A. 3 岁 B. 4 岁
C. 5 岁 D. 6 岁
E. 7 岁

【答案】C

14. 6 岁小儿平均体重约为

A. 12kg B. 14kg
C. 16kg D. 18kg
E. 20kg

【答案】E

命题规律二 数据，应牢固记忆以避免错

1. 国际护士节定于

A. 4 月 12 日 B. 5 月 1 日
C. 5 月 4 日 D. 5 月 12 日
E. 9 月 10 日

【答案】D

2. 当患者的动脉血氧分压低于多少千帕（kPa）时需给予吸氧

A. 4. 6kPa（35mmHg） B. 5. 6kPa（42mmHg）
C. 6. 6kPa（50mmHg） D. 7. 6kPa（57mmHg）
E. 8. 6kPa（65 mmHg）

【答案】C

3. 中度缺氧病人的动脉血氧分压低于

A. 4. 6kPa B. 6. 6kPa
C. 9. 3kPa D. 12. 0kPa
E. 13. 3kPa

【答案】B

4. 冬季病室内最适宜的温度是

A. 14 ~ 16℃ B. 16 ~ 18℃
C. 18 ~ 22℃ D. 24 ~ 26℃
E. 26 ~ 28℃

【答案】C

5. 病室内最适宜的湿度是

A. 20% ~ 30% B. 30% ~ 40%

C. 40% ~ 50%

D. 50% ~ 60%

E. 60% ~ 70%

【答案】D

6. 紫外线灯管消毒，应从灯亮后几分钟开始计时

A. 1 ~ 3 分钟 B. 3 ~ 5 分钟
C. 5 ~ 7 分钟 D. 7 ~ 9 分钟
E. 9 ~ 11 分钟

【答案】C

7. 用于浸泡金属器械的高效类消毒剂是

A. 0. 5% 过氧乙酸 B. 2% 戊二醛
C. 0. 1% 苯扎溴铵 D. 3% 漂白粉澄清液
E. 70% 乙醇

【答案】B

8. 成人生命体征测量值在正常范围内的一组是

A. T 37℃ P 102 次/分 R 22 次/分 BP 16/10kPa
B. T 38℃ P 98 次/分 R 24 次/分 BP 15/9kPa
C. T 36℃ P 88 次/分 R 20 次/分 BP 17/11kPa
D. T 35. 8℃ P 58 次/分 R 15 次/分 BP 14/8. 5kPa
E. T 36. 5℃ P 70 次/分 R 18 次/分 BP 19/13kPa

【答案】C

9. 正常小儿的头围与胸围大致相等的年（月）龄是

A. 出生时 B. 6 个月时
C. 1 岁时 D. 2 岁时
E. 3 岁时

【答案】C

10. 2 岁以内小儿乳牙总数推算的公式是

A. 月龄 - （2 ~ 4） B. 月龄 - （2 ~ 6）
C. 月龄 - （2 ~ 8） D. 月龄 - （4 ~ 6）
E. 月龄 - （6 ~ 8）

【答案】D

11. Ⅲ度营养不良患儿腹壁皮下脂肪厚度应是

A. 0. 7 ~ 0. 8cm B. 0. 5 ~ 0. 6cm
C. 0. 3 ~ 0. 4cm D. 0. 1 ~ 0. 2cm
E. 基本消失

【答案】E

12. 煮沸消毒时，为增强杀菌可在水中加入

A. 5% ~ 10% 硫代硫酸钠
B. 3% ~ 4% 对氨基水杨酸钠
C. 4. 5% ~ 5% 亚硝酸钠
D. 1 % ~ 2% 碳酸氢钠
E. 0. 1% ~ 0. 25% 苯妥英钠

【答案】D

13. 某房间长 4m、宽 3m、高 3m，用食醋熏蒸消毒空气，食醋用量为

A. 100ml B. 120ml
C. 140ml D. 160ml
E. 180ml

【答案】E

14. 配制灭头虱液，下列哪组是正确的

A. 10g 百部酊、30% 乙醇 60ml
B. 20g 百部酊、40% 乙醇 80ml
C. 30g 百部酊、50% 乙醇 100ml
D. 40g 百部酊、60% 乙醇 120ml
E. 50g 百部酊、70% 乙醇 140ml

【答案】C

15. 检查体温计准确性的正确方法是将体温计的水银柱甩至 35℃ 以下，同一时间放入 39℃ 的水中

A. 1 分钟后取出检视，读数相差上下 0.2℃ 以上的不能使用
B. 1 分钟后取出检视，读数相差上下 0.1℃ 以上的不能使用
C. 3 分钟后取出检视，读数相差上下 0.2℃ 以上的不能使用
D. 3 分钟后取出检视，读数相差上下 0.1℃ 以上的不能使用
E. 如用体温计检测仪，则一支一支检测，误差大于 0.1℃ 的弃去

【答案】C

16. 哮喘持续状态是指严重哮喘持续时间达

A. 6 小时 B. 10 小时
C. 24 小时 D. 48 小时
E. 12 小时

【答案】C

17. 低盐饮食要求每日限用食盐

A. 2g B. 4g
C. 6g D. 8g
E. 10g

【答案】A

18. 患者孙某，男，26 岁。慢性肾衰竭，饮食中每日蛋白含量不应超过

A. 20g B. 30g
C. 40g D. 50g
E. 60g

【答案】C

19. 为降温做温水擦浴，水温宜选用

A. 56 ~ 60℃ B. 45 ~ 50℃
C. 40 ~ 45℃ D. 37 ~ 40℃
E. 32 ~ 34℃

【答案】E

20. 多尿指昼夜尿量至少超过

A. 2000ml B. 2300ml
C. 2500ml D. 2800ml
E. 3000ml

【答案】C

21. 上消化道出血量达到多少时可产生黑便

A. 5ml B. 30ml
C. 60ml D. 70ml
E. 80ml

【答案】C

22. 患者刘某，明日在硬膜外麻醉下行左肾切除术，给予大量不保留灌肠，灌肠液的温度应是

A. 32 ~ 35℃ B. 35 ~ 37℃
C. 39 ~ 41℃ D. 42 ~ 45℃
E. 47 ~ 49℃

【答案】C

23. 链霉素过敏试验液 0.1ml 含链霉素

A. 200U B. 250U
C. 300U D. 400U
E. 500U

【答案】B

24. 检查痰中癌细胞，固定标本的溶液宜选

A. 10% 草酸钾 B. 5% 苯酚
C. 95% 乙醇 D. 40% 甲醛
E. 0.1% 苯扎溴铵

【答案】C

25. 使用人工呼吸器，吸呼比应为

A. 1: (0.5 ~ 1) B. 1: (0.5 ~ 2)
C. 1: (1.0 ~ 3) D. 1: (1.5 ~ 2)
E. 1: (1.5 ~ 3.5)

【答案】D

26. 成人使用人工呼吸机，潮气量的标准是每千克体重

A. 5ml B. 6ml
C. 8ml D. 17ml
E. 12ml

【答案】E

27. 正常人瞳孔直径为

A. 1 ~ 2mm B. 2 ~ 3mm

C. 3 ~ 4mm D. 4 ~ 5mm

E. 5mm 以上

【答案】C

28. 临时备用医嘱的有效时间是

A. 6h

B. 8h

C. 10h

D. 12h

E. 24h

【答案】D

29. 正常人的肠鸣音为

A. 2 ~ 3 次/分

B. 4 ~ 5 次/分

C. 7 ~ 8 次/分

D. 5 ~ 10 次/分

E. > 10 次/分

【答案】B

30. 血中白蛋白/球蛋白正常比例为

A. (1 ~ 2) : 1

B. (1.5 ~ 2) : 1

C. (1.5 ~ 3) : 1

D. (1.5 ~ 2.5) : 1

E. (1.5 ~ 3.5) : 1

【答案】D

31. 做尿常规检查应留取

A. 12 小时尿液

B. 24 小时尿液, 加入 5ml 甲苯防腐

C. 新鲜尿液

D. 24 小时尿液, 加入 5ml 浓盐酸防腐

E. 24 小时尿液, 检查前低蛋白饮食 3 天

【答案】C

32. 腹部叩及移动性浊音, 标志有腹水量

A. 100ml 以上

B. 200ml 以上

C. 500ml 左右

D. 600 ~ 800ml

E. 1000ml 以上

【答案】E

33. 洋地黄与钙剂应避免同时应用, 如有必要至少应间隔

A. 2h

B. 4h

C. 7h

D. 8h

E. 10h

【答案】B

34. 抢救急性肺水肿病人加压吸氧时, 湿化瓶内乙醇浓度是多少

A. 10% ~ 20%

B. 20% ~ 30%

C. 30% ~ 40%

D. 40% ~ 50%

E. 50% ~ 70%

【答案】B

35. 急性心肌梗死患者应绝对卧床休息至少达

A. 24 小时

B. 48 小时

C. 1 周

D. 2 周

E. 3 ~ 5 周

【答案】C

36. 严重呕血病人应暂禁食

A. 2 ~ 4 小时

B. 4 ~ 6 小时

C. 6 ~ 8 小时

D. 1 ~ 2 小时

E. 8 ~ 24 小时

【答案】E

37. 肝硬化腹水患者, 每日进水量限制在

A. 1500ml

B. 1000ml

C. 800ml

D. 500ml

E. 300ml

【答案】B

38. 血液病患者的白细胞低于下列哪项时需进行保护性隔离

A. $1.0 \times 10^9/L$

B. $1.5 \times 10^9/L$

C. $2.0 \times 10^9/L$

D. $2.5 \times 10^9/L$

E. $3.0 \times 10^9/L$

【答案】A

39. 某下肢瘫痪患者, 经查肢体可在床面移动, 但不能自行抬起, 此肌力应判为

A. 0 级

B. 1 级

C. 2 级

D. 3 级

E. 4 级

【答案】C

40. 胎盘在妊娠后几周末形成

A. 12 周

B. 14 周

C. 16 周

D. 18 周

E. 20 周

【答案】A

41. B 超显像检查, 妊娠几周才可见到妊娠环

A. 2 周

B. 3 周

C. 4 周

D. 5 周

E. 6 周

【答案】D

42. 自我胎动计数哪项为异常

A. > 3 次/小时

B. > 5 次/小时

C. < 10 次/12 小时

D. > 20 次/12 小时

E. > 30 次/12 小时

【答案】C

43. 孕妇末次月经为 1994 年 5 月 8 日, 那么她的预产期是

A. 1994 年 2 月 16 日

B. 1994 年 4 月 15 日

C. 1995 年 2 月 15 日

D. 1995 年 5 月 15 日

E. 1995 年 6 月 16 日

【答案】C

44. 哪项属正常胎心音次数

- A. 100 次/分 B. 80 次/分
C. 105 次/分 D. 170 次/分
E. 132 次/分

【答案】E

45. 中期妊娠是指孕

- A. 11 ~ 25 周 B. 12 ~ 28 周
C. 13 ~ 28 周 D. 18 ~ 28 周
E. 20 ~ 28 周

【答案】C

46. 正常人每日无形失水量为

- A. 200ml B. 400ml
C. 850ml D. 1000ml
E. 1200ml

【答案】C

47. 体内代谢产物经溶解被排出, 至少需尿量

- A. 100 ~ 200ml B. 200 ~ 300ml
C. 300 ~ 400ml D. 500 ~ 600ml
E. 800 ~ 1000ml

【答案】D

48. 一患者因高热 2 日未能进食, 自述口渴、口干、尿少色黄。查: 有脱水症, 尿比重 1.028, 血清钠浓度为 156mmol/L。治疗首先应给

- A. 3% ~ 5% 的高张盐水
B. 5% 碳酸氢钠
C. 5% 葡萄糖溶液
D. 葡萄糖盐水
E. 平衡液

【答案】C

49. 为防止全麻时呕吐和手术后腹胀。手术前禁饮的时间是

- A. 4h 禁食, 2h 禁水 B. 6h 禁食, 4h 禁水
C. 8h 禁食, 6h 禁水 D. 10h 禁食, 4h 禁水
E. 12h 禁食, 4 ~ 6h 禁水

【答案】E

50. 心肺复苏后, 如患者有气管插管, 该插管不得超过

- A. 24h B. 48h
C. 72h D. 84h
E. 96h

【答案】C

51. 脑复苏中首选的脱水剂为

- A. 25% 葡萄糖液 B. 50% 葡萄糖液
C. 20% 甘露醇 D. 呋塞米
E. 尿素

【答案】C

52. 全营养混合液配置后冷藏的有效期为

- A. 2 小时 B. 4 小时
C. 8 小时 D. 12 小时
E. 24 小时

【答案】E

53. 通过周围静脉途径进行肠外营养支持的患者, 接受营养支持的时间不能超过

- A. 1 周 B. 2 周
C. 3 周 D. 4 周
E. 5 周

【答案】B

54. 患者, 男性, 58 岁, 患结肠癌, 拟行左结肠癌根治术, 术前需几日开始服用肠道消炎药

- A. 1 日 B. 2 日
C. 3 日 D. 4 日
E. 5 日

【答案】C

55. 妊娠期血容量增加达高峰是在

- A. 24 ~ 26 周 B. 27 ~ 28 周
C. 29 ~ 30 周 D. 32 ~ 34 周
E. 36 ~ 40 周

【答案】D

56. 一位初孕 50 天的妇女, 在“妇儿卫生保健咨询日”向护士咨询, 孕期哪段时间应禁止性生活, 正确回答是在妊娠

- A. 2 个月内及最后 1 个月
B. 2 个月内及最后 2 个月
C. 3 个月内及最后半个月
D. 3 个月内及最后 1 个月
E. 3 个月内及最后 2 个月

【答案】E

57. 从胎儿娩出至胎盘娩出所需的时间不超过

- A. 15min B. 30min
C. 1h D. 2h
E. 3h

【答案】B

58. 产褥期一般为

- A. 3 ~ 4 周 B. 4 周
C. 6 周 D. 8 周

- E. 10 周
【答案】C
59. 胎盘娩出后子宫底每天下降
A. 5 ~ 6cm B. 4 ~ 5cm
C. 3 ~ 4cm D. 2 ~ 3cm
E. 1 ~ 2cm
【答案】E
60. 羊水过多的概念是指妊娠期羊水量超过
A. 1000ml B. 2000ml
C. 3000ml D. 4000ml
E. 5000ml
【答案】B
61. 新生儿沐浴的水温应保持在
A. 35 ~ 37℃ B. 38 ~ 40℃
C. 41 ~ 43℃ D. 44 ~ 47℃
E. 48 ~ 51℃
【答案】B
62. 正常骨盆出口平面的横径应为
A. 9cm B. 10cm
C. 11cm D. 12cm
E. 13cm
【答案】A
63. 化脓性脑膜炎患儿以免影响药效，静脉输入青霉素应在多长时间内输完
A. 1h 内 B. 2h 内
C. 3h 内 D. 4h 内
E. 5h 内
【答案】A
64. 因颅内压增高患者每日液体的入量不宜超出
A. 1000ml B. 1500ml
C. 2000ml D. 2500ml
E. 3000ml
【答案】C
65. 某颅脑损伤患者，唤之睁眼，回答问题错误，躲避刺痛，其格拉斯哥昏迷计分为
A. 15 分 B. 12 分
C. 11 分 D. 8 分
E. 5 分
【答案】C
66. 正常耻骨弓角度约为
A. 60° B. 70°
C. 80° D. 90°
E. 100°
【答案】D
67. 子宫内膜增殖期变化发生在月经周期的第
A. 5 ~ 14 天 B. 15 ~ 24 天
C. 1 ~ 4 天 D. 25 ~ 28 天
E. 10 ~ 12 天
【答案】A
68. 黄体发育达高峰在排卵后
A. 7 ~ 8 天 B. 9 ~ 10 天
C. 11 ~ 12 天 D. 13 ~ 14 天
E. 15 ~ 16 天
【答案】A
69. 正常足月妊娠时，羊水量约为
A. 350ml B. 500ml
C. 1000ml D. 2000ml
E. 250ml
【答案】C
70. 刘女士，末次月经日期记不清，来医院检查时子宫底在脐上一横指，胎心音正常。估计妊娠为
A. 16 周末 B. 20 周末
C. 24 周末 D. 28 周末
E. 32 周末
【答案】C
71. 绒毛膜癌治愈观察年限为
A. 1 年 B. 2 年
C. 3 年 D. 4 年
E. 5 年
【答案】E
72. 头罩法给氧时，每分钟氧流量为
A. 1 ~ 3L B. 2 ~ 5L
C. 3 ~ 6L D. 4 ~ 7L
E. 5 ~ 8L
【答案】E
73. 使用蓝光箱时，上灯管与患儿皮肤的距离应为
A. 10 ~ 15cm B. 15 ~ 20cm
C. 30 ~ 50cm D. 55 ~ 60cm
E. 60 ~ 70cm
【答案】C
74. 常用 OT 试验皮试液的浓度是
A. 1:100 B. 1:200
C. 1:1000 D. 1:2000
E. 1:10000
【答案】D
75. 对结核杆菌正确的消灭方法是
A. 5% 苯酚浸泡 12 小时

- B. 5% 漂白粉浸泡 24 小时
C. 干热 80℃ 20 分钟
D. 湿热 65℃ 30 分钟
E. 冰冻 4 周

【答案】D

76. 产妇进入第二产程每次听胎心间隔时间约在
A. 5min B. 10min
C. 20min D. 30min
E. 40min

【答案】A

77. 宫口扩张潜伏期需要的时间为
A. 4h B. 6h
C. 8h D. 10h
E. 12h

【答案】C

78. 初产妇总产程为
A. 8 ~ 10h B. 13 ~ 18h
C. 16 ~ 20h D. 20 ~ 22h
E. 22 ~ 26h

【答案】B

79. 过期妊娠的概念是指妊娠达到或超过
A. 40 周末 B. 41 周末
C. 42 周末 D. 43 周末
E. 44 周末

【答案】C

80. 李女士娩一女婴，身长 35cm，体重 1000g，皮下脂肪少，头发、指甲已长出。新生儿娩出后能啼哭、吞咽，但生活能力很差。估计该新生儿娩出时孕周为
A. 8 周 B. 16 周
C. 20 周 D. 28 周
E. 40 周

【答案】D

81. 急产是指总产程在
A. 3h 内 B. 4h 内
C. 5h 内 D. 6h 内
E. 7h 内

【答案】A

82. 初产妇第一产程活跃期延长是指活跃期时间超过
A. 14 小时 B. 12 小时
C. 10 小时 D. 8 小时
E. 6 小时

【答案】D

83. 遇可疑头盆不称的孕妇，进行试产的时间应是
A. 2 ~ 4 小时 B. 3 ~ 5 小时
C. 4 ~ 6 小时 D. 5 ~ 7 小时
E. 6 ~ 8 小时

【答案】A

84. 胎儿娩出后胎盘多长时间尚未娩出者，称为胎盘滞留
A. 15min B. 20min
C. 30min D. 1min
E. 2min

【答案】C

85. 胎膜早破患者，为预防感染而使用抗生素的时间，是指胎膜早破超过
A. 4h B. 6h
C. 8h D. 10h
E. 12h

【答案】E

86. 晚期产后出血，多发生在产后
A. 24 小时内 B. 48 小时内
C. 1 ~ 2 周 D. 3 ~ 4 周
E. 5 ~ 6 周

【答案】C

87. 子宫颈刮片的标本应放入下列哪项溶液中
A. 0.9% 氯化钠 B. 1% 氢氧化钠
C. 10% 氢氧化钠 D. 75% 乙醇
E. 95% 乙醇

【答案】E

88. 某女士流产两次，无早产史，足月产一次，现有一女，其生育史可简写为
A. 1 - 0 - 2 - 1 B. 1 - 2 - 0 - 1
C. 2 - 0 - 1 - 1 D. 1 - 1 - 0 - 2
E. 0 - 1 - 2 - 1

【答案】A

89. 用阴道分泌物悬滴法检查念珠菌时，应用下述哪种液体作悬液
A. 4% 碳酸氢钠 B. 10% 氢氧化钠
C. 0.9% 盐水 D. 0.2% 新洁尔灭
E. 1% 乳酸液

【答案】B

90. 宫颈中度糜烂，系指糜烂面积占宫颈面积的
A. 1/2 以下 B. 1/3 ~ 1/2
C. 1/3 以上 D. 1/3 ~ 2/3
E. 2/3 以上

【答案】D

91. 老年性阴道炎进行阴道灌洗常用的药液是
A. 1% 乳酸 B. 2% ~4% 碳酸氢钠
C. 0.1% 苯扎溴铵 D. 0.1% 呋喃西林
E. 0.9% 生理盐水

【答案】A

92. 某患者，患滴虫性阴道炎，准备用自助冲洗器灌洗阴道，护士应告知她冲洗的醋酸溶液浓度为
A. 0.5% B. 1%
C. 2% D. 3%
E. 4%

【答案】A

93. 关于继发性闭经的概念，正确的是
A. 18 岁未初潮
B. 月经周期建立后，连续停经 1 个月
C. 月经周期建立后，连续停经 1.5 个月
D. 月经周期建立后，连续停经 2 个月
E. 月经周期建立后，连续停经 3 个月或以上

【答案】E

94. 葡萄胎术后要求随访的时间是
A. 1 年 B. 2 年
C. 3 年 D. 4 年
E. 5 年

【答案】B

95. 广泛子宫切除和盆腔淋巴结清除术后留置尿管的时间为
A. 1 ~2 天 B. 3 ~4 天
C. 5 ~6 天 D. 7 ~8 天
E. 10 ~14 天

【答案】E

96. 下列具有正常生育能力的精子数量是
A. 2000 万 ~3000 万/ml
B. 3000 万 ~4000 万/ml
C. 4000 万 ~5000 万/ml
D. 5000 万 ~6000 万/ml
E. >6000 万/ml

【答案】E

97. 人工流产吸宫术适用于妊娠
A. 6 周内 B. 8 周内
C. 10 周内 D. 12 周内
E. 14 周内

【答案】C

98. 服用短效避孕药期间如漏服，补服的时间应限制在

- A. 4h 内 B. 8h 内
C. 12h 内 D. 24h 内
E. 36h 内

【答案】C

99. 口服第一片短效口服避孕药的时间是月经来潮的第
A. 3 天 B. 5 天
C. 10 天 D. 14 天
E. 21 天

【答案】B

100. 张女士，第一胎。足月顺产，会阴 I 度裂伤，产后两天裂伤缝合处水肿明显，会阴护理措施中错误的是
A. 1:2000 苯扎溴铵冲洗会阴
B. 放置消毒会阴垫
C. 50% 硫酸镁湿敷伤口
D. 1:5000 高锰酸钾坐浴，一天 2 次
E. 取伤口对侧卧位

【答案】D

101. 使用胎头吸引术助产时，全部牵引时间不宜超过
A. 10 分钟 B. 15 分钟
C. 20 分钟 D. 25 分钟
E. 30 分钟

【答案】C

102. 按儿科病房管理特点，儿童病房温度、湿度以何者为宜
A. 16 ~18℃，40% ~50%
B. 18 ~20℃，50% ~60%
C. 20 ~22℃，50% ~60%
D. 22 ~24℃，50% ~60%
E. 24 ~26℃，60% ~70%

【答案】B

103. 正常小儿前囟闭合的年龄是
A. 10 ~12 个月 B. 12 ~18 个月
C. 18 ~20 个月 D. 2 岁
E. 2 岁半

【答案】B

104. 按运动功能的发育规律，小儿坐起的年龄一般为
A. 3 ~4 个月 B. 5 ~7 个月
C. 8 ~9 个月 D. 9 ~10 个月
E. 10 ~12 个月

【答案】B