

图解

以图解的形式诠释育儿知识

全方位图解 美绘版

从宝宝的实际情况出发，介绍宝宝发育特点和养护方式，是中国人自己的育儿百科。

# 育儿知识一本通

一本写给新手爸妈的科学育儿大全

本书向你介绍养育孩子的灵活、细心的方法，提供一些复杂却又有意思的育儿习惯。  
它帮助你了解你的孩子并照顾他、陪伴他成长。

科学、实用、前沿的育儿理念，  
育儿专家全程指导，快乐育儿每一天。

朱定华  
编著



中医古籍出版社

# 图解育儿知识一本通

朱定华◎编著

中医古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图解育儿知识一本通 / 朱定华编著. -- 北京 : 中医古籍出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5152-1177-0

I. ①图… II. ①朱… III. ①婴幼儿—哺育—图解  
IV. ①TS976.31-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第068590号



# 图解 育儿知识一本通

朱定华◎编著



责任编辑 于 峥  
封面设计 张 楠  
出版发行 中医古籍出版社  
社 址 北京东直门内南小街 16 号 (100700)  
印 刷 北京富达印务有限公司  
开 本 787mm × 1092mm 1/16  
印 张 22  
字 数 320千字  
版 次 2016年 6月第 1 版第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5152-1177-0  
定 价 49.80元

版权所有 翻印必究




## 简单的姿势 反射检查

### 拉起反射

仰卧位、头正中。将拇指伸入婴儿手掌，其余4指握住腕部（注意不要触碰手背），将宝宝从床上拉起，使躯干与床面成45度角。

### 通过拉起反射检查的正常反应


0~3个月




2~5个月




4~6个月



6~10个月



8~12个月






## 简单的姿势 反射检查

### 拉起反射

有以下反应或较正常反应有3个月以上的延迟。

### 通过拉起反射检查的异常反应




简单的姿势  
反射检查

悬垂反射


婴儿呈俯卧位，以手掌支撑婴儿胸腹部水平托起。

俯卧位悬垂反射检查的正常反应


0~1.5个月



1.5~3.5个月



3.5~12个月







## 简单的姿势 反射检查

### 悬垂反射

婴儿作出以下反应或较正常反应有3个月以上的延迟。

#### 俯卧位悬垂反射检查的异常反应




## 简单的姿势 反射检查

### 立位 悬垂反射


婴儿呈俯卧位或垂直位。在宝宝背后，用双手支撑宝宝腋下将其垂直提起。（注意不要触碰宝宝背部）

### 立位悬垂反射检查的正常反应


0~4个月



3.5~7.5个月



6.5~12个月





简单的姿势  
反射检查

立位  
悬垂反射

婴儿有以下反应或较正常反应有3个月以上的延迟。

立位悬垂反射检查的异常反应




## 简单的姿势 反射检查

### 侧位 悬垂反射

婴儿呈俯卧位，用双手支撑婴儿躯干迅速提起并向侧方倾斜于水平位（注意先伸开上侧的手指）。

### 侧位悬垂反射检查的正常反应

0~2.5个月



2.5~5个月




7~9个月



4.5~8个月



8.5~12个月





简单的姿势  
反射检查

侧位  
悬垂反射

婴儿有以下反应或较正常反应有3个月以上的延迟。

侧位悬垂反射检查的异常反应




## 简单的姿势 反射检查

### Collis 水平反射


婴儿呈仰卧位或侧卧位。握住一侧的上下肢将宝宝从床上水平提起（注意先张开手指）。

### Collis 水平反射检查的正常反应


0~2个月



2~6个月



6~12个月



4~8.5个月





## 简单的姿势 反射检查

### Collis 水平反射

婴儿有以下反应或较正常反应有3个月以上的延迟。

#### Collis 水平反射检查的异常反应




简单的姿势  
反射检查

倒位  
悬垂反射


3个月以前的婴儿呈仰卧位，3个月以后呈俯卧位。用双手握住宝宝大腿，急速倒立提起（注意先张开手指）。

倒位悬垂反射检查的正常反应


0~2.5个月



3~7个月



1.5~4.5个月




简单的姿势  
反射检查


倒位  
悬垂反射

倒位悬垂反射检查的正常反应

5.5 ~ 10个月



8 ~ 12个月



简单的姿势  
反射检查

倒位  
悬垂反射

婴儿有以下反应或较正常反应有3个月以上的延迟。

倒位悬垂反射检查的异常反应

