

紧扣考试大纲
反映最新命题趋势

卫生专业技术资格考试辅导丛

2016 护士执业资格考试

考前冲刺试卷与解析

主编 李文慧 苍 薇

 军事医学科学出版社

卫生专业技术资格考试辅导丛书

2016 护士执业资格考试考前冲刺 试卷与解析

主 编 李文慧 苍 薇

军事医学科学出版社
· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

2016 护士执业资格考试考前冲刺试卷与解析/李文慧,苍薇主编.

- 北京:军事医学科学出版社,2015.9

(卫生专业技术资格考试辅导丛书)

ISBN 978-7-5163-0698-7

I. ①2… II. ①李… ②苍… III. ①护士-资格考试-题解

IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 214509 号

策划编辑:赵艳霞 于庆兰

责任编辑:曹继荣

出版:军事医学科学出版社

地址:北京市海淀区太平路 27 号

邮编:100850

联系电话:发行部:(010)66931049

编辑部:(010)66931038,66931127,66931039

传真:(010)63801284

网址:<http://www.mmsp.cn>

印装:三河市双峰印刷装订有限公司

发行:新华书店

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:9.75

字数:242 千字

版次:2015 年 10 月第 1 版

印次:2015 年 10 月第 1 次

定价:38.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

前 言

为了帮助广大考生做好考前复习冲刺,我们组织了有多年护考辅导经验的权威专家,并结合历年护考真题,对考试的命题规律和考试特点进行精心分析与研究,严格按照最新考试大纲知识点及试题设置要求,科学、严谨、客观地选取难度适宜、考查全面的题目,参照护士执业资格考试科目划分、题型分配、题量设置原则组编了这套试卷。

本套试卷包括两部分内容:第一部分是3套考前仿真模拟试卷,这3套试题由专业实务和实践能力两部分组成。根据历年真题与近几年高频考点,对每道题目进行合理选编和设置,符合考试命题热点及考查趋势。第二部分是答案及解析,针对3套仿真模拟试卷进行解析,涵盖大纲知识点,帮助考生复习提高效率。

在编写中我们注意整体优化,处理好不同试题之间的衔接与联系,避免遗漏和不必要的重复;另外,我们还注重突出综合能力的考核,考题模拟临床情景,着重考查考生的护理专业知识和临床操作能力,使学生更准确地完成与临床运用能力相关的题目。本套试卷的宗旨是帮助考生熟悉考试题型,掌握考试范围和难度,准确把握和分配答题时间,是考生考前冲刺的必备用书。

本套试卷在编写过程中得到了出版社相关领导、编辑的鼎力相助,在此,衷心地感谢所有给我们无私帮助的朋友们!

李文慧 苍薇
2015年7月

专业实务

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 骨质疏松最常见的症状是

- A. 疼痛
- B. 身长缩短
- C. 驼背
- D. 骨折
- E. 呼吸困难

2. 出生时存在而以后逐渐消失的反射是

- A. 拥抱反射
- B. 咽反射
- C. 角膜反射
- D. 腹壁反射
- E. 提睾反射

3. 10 个月的健康小儿乳牙数量为

- A. 4~6 颗
- B. 6~8 颗
- C. 8~10 颗
- D. 10~12 颗
- E. 12~14 颗

4. 小儿腹泻时,维护和修复小儿肠道黏膜屏障功能的药物是

- A. 制霉菌素
- B. 黄连素
- C. 青霉素
- D. 蒙脱石散
- E. 双歧杆菌

5. 正常小儿断母乳适宜的年龄是

- A. 10~12 个月

B. 18 个月

C. 1.5~2 岁

D. 2~2.5 岁

E. 3 岁

6. 正确服用脊髓灰质炎减毒活疫苗的做法是

- A. 热开水溶解后服用
- B. 用热开水送服
- C. 冷开水送服或含服
- D. 用温热水送服
- E. 服后半小时可饮用热牛奶

7. 李老师,50 岁,因工作劳累,突发心脏病被送至急诊室。值班护士在医生未到达前首先应

- A. 记录患者抵院时间和病情变化
- B. 向家属了解病史,耐心解释
- C. 通知住院处,办理入院手续
- D. 测生命体征,建立静脉通路
- E. 注射止血药物,抽血标本配血

8. 护士小李排列出院病历,体温单的上面应是

- A. 检验报告单
- B. 医嘱单
- C. 病史及体格检查
- D. 护理记录单
- E. 住院病历封面

9. 下列传染病预防中保护易感人群的措施是

- A. 计划免疫
- B. 封锁疫区
- C. 环境消毒
- D. 限制集会
- E. 停工停课

10. 患者李阿姨的亲属,应学习掌握的隔离技术不包括
A. 测量血压
B. 穿脱隔离衣
C. 洗手
D. 戴口罩
E. 使用避污纸
11. 护理人员实施保护性隔离时不妥的是
A. 护理人员必须穿无菌衣
B. 接触患者前后必须认真洗手
C. 护士感冒后可带双层口罩接触患者
D. 病室应严格消毒并通风换气
E. 所有物品必须经消毒、灭菌后带入病室
12. 患儿,男,2岁,玩耍时突然剧咳、面色发青遂就诊,急拍胸片未见异常,为明确诊断,应考虑的检查方法是
A. 胸部CT
B. 食管镜
C. 直接喉镜
D. 间接喉镜
E. 纤维支气管镜
13. 患者,女性,40岁。因甲亢行甲状腺大部切除术,术后发生口唇针刺感,手足抽搐。最可能的原因是
A. 喉返神经损伤
B. 甲状旁腺损伤
C. 喉上神经内支损伤
D. 喉上神经外支损伤
E. 甲状腺危象
14. 人体供应热能的营养素有
A. 糖类、维生素、矿物质
B. 糖类、脂肪、蛋白质
C. 脂肪、糖类、维生素
D. 蛋白质、脂肪、维生素
E. 蛋白质、糖类、微量元素
15. 新生儿期是指自出生脐带结扎起至生后满
A. 3天
B. 7天
C. 14天
D. 21天
E. 28天
16. 下列哪种是传染性较强,应与健康小儿隔离的口腔炎
A. 口角炎
B. 鹅口疮
C. 疱疹性口腔炎
D. 单纯性口腔炎
E. 溃疡性口腔炎
17. 80%小儿病毒性脑膜炎、脑炎的病原体为
A. 肠道病毒
B. 虫媒病毒
C. 腮腺炎病毒
D. 疱疹病毒
E. 脊髓灰质炎病毒
18. 营养不良患儿最先出现的症状是
A. 消瘦
B. 体重不增
C. 皮下脂肪逐渐减少
D. 皮肤苍白
E. 精神不振
19. 乙肝疫苗初种的年龄是
A. 出生时
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
E. 4个月
20. 阑尾发生炎症时,容易坏死的解剖因素是
A. 阑尾为盲管状器官
B. 管腔细长且开口较小

- C. 阑尾动脉为终末动脉
D. 静脉回流至门静脉
E. 其位置随盲肠而变异
21. 口服避孕药的禁忌证不包括
A. 糖尿病患者
B. 严重心血管疾病患者
C. 产后 8 个月妇女
D. 精神病生活不能自理者
E. 甲状腺功能亢进者
22. 服用短效避孕药期间如果漏服, 补服的时间应在
A. 7 小时内
B. 12 小时内
C. 24 小时内
D. 48 小时内
E. 6 小时内
23. 目前我国引起产妇死亡占首位的原因是
A. 产后出血
B. 产褥感染
C. 子宫破裂
D. 脐带脱垂
E. 羊水栓塞
24. 正常情况下, 产妇顺产后继续留在产房观察的时间是
A. 1 小时
B. 2 小时
C. 3 小时
D. 4 小时
E. 5 小时
25. 绒毛膜癌最常见的转移部位是
A. 盆腔
B. 阴道
C. 肺
D. 肝
E. 脑
26. 子宫内膜癌发病可能的相关因素是
A. 雌激素刺激
B. 早婚早育
C. 遗传
D. 高胆固醇饮食
E. 环境因素
27. 巨大胎儿是指胎儿体重达到或超过
A. 3800 g
B. 4000 g
C. 3200 g
D. 4600 g
E. 5800 g
28. 女性生殖器官最常见的良性肿瘤是
A. 外阴癌
B. 卵巢癌
C. 子宫内膜癌
D. 子宫肌瘤
E. 葡萄胎
29. 护士小王, 在手术中发现手套破裂, 正确的处理方法是
A. 立即更换
B. 用胶布将破裂处粘好
C. 用乙醇棉球擦拭手套
D. 用无菌纱布将破裂处缠好
E. 再加套一副手套
30. 王老伯, 脑干出血昏迷, 呼吸道分泌物蓄积时, 可出现
A. 库斯莫呼吸
B. 叹息样呼吸
C. 蝉鸣样呼吸
D. 鼾声呼吸
E. 潮式呼吸

31. 患者,女,37岁,出租车司机,每天工作10小时,今日以尿频、尿急、尿痛1天,诊断肾盂肾炎收入院。护士向其进行健康宣教时,应说明最可能的感染途径是
 - A. 上行感染
 - B. 下行感染
 - C. 血液感染
 - D. 直接感染
 - E. 淋巴系统感染
32. 治疗风湿性二尖瓣狭窄药物中,苄星青霉素的作用是防止
 - A. 风湿热
 - B. 心力衰竭
 - C. 动脉栓塞
 - D. 心律失常
 - E. 心绞痛
33. 患者,男,73岁,慢性肾功能不全尿毒症期患者,需行维持性血液透析治疗。常抱怨照顾欠周到。今天早上对护士说:“你们治来治去,怎么也治不好,干脆不治了!”下列护士的答复中,最恰当的是
 - A. 您的心情我理解,我们也在努力,希望您的配合
 - B. 要是不治疗,您的病情比现在严重多了
 - C. 尿毒症是终末期疾病,治愈是不可能的
 - D. 您觉得治疗效果不理想,可以找其他治疗途径
 - E. 你这样扰乱了病房秩序,影响我们工作
34. 属于乙类传染病,但按甲类管理的疾病是
 - A. 伤寒
 - B. 霍乱
 - C. 禽流感
 - D. 鼠疫
 - E. 非典型肺炎
35. 患者,男,28岁,在大排档聚餐后出现高热、腹泻,诊断为急性肠炎。对该患者采取的护理措施中不正确的是
 - A. 给予胃肠道隔离
 - B. 给予高脂肪饮食
 - C. 酌情给予流质或半流质食物
 - D. 记录排便的形状、次数
 - E. 留取便标本送检
36. 患者,男,33岁。干咳、胸痛,以自发性气胸入院。经积极治疗后已痊愈准备出院,护士告诉患者为预防复发最重要的措施是
 - A. 戒烟
 - B. 清淡饮食
 - C. 避免屏气用力
 - D. 积极锻炼身体
 - E. 保持情绪稳定
37. 患者,女,28岁,颈部增粗,伴失眠、易激动、眼突,食欲亢进。对该患者的心理疏导措施不包括
 - A. 理解患者,态度温和地与其沟通
 - B. 对患者关心的问题予以耐心解释
 - C. 适当的外表修饰可增加自信
 - D. 指导患者多做运动
 - E. 鼓励患者家属给予其关爱和理解
38. 患者,男性,28岁,头部受伤后意识不清约20分钟,头痛、恶心、呕吐,追问受伤经过不能回忆,查体无异常发现。应诊断为
 - A. 脑震荡
 - B. 脑挫裂伤
 - C. 颅骨骨折
 - D. 硬脑膜外血肿
 - E. 颅内脓肿
39. 下肢静脉曲张术后早期活动是为了防止
 - A. 患肢肿胀
 - B. 血管痉挛
 - C. 患肢僵直

- D. 术后复发
- E. 深静脉血栓形成

40. 成人基础代谢率为 +45%，其甲状腺功能为

- A. 轻度甲亢
- B. 正常范围
- C. 功能低下
- D. 中度甲亢
- E. 重度甲亢

41. 患者,男性,65岁,诊断胃溃疡23年,1个月来持续上腹痛,给予西咪替丁、洛赛克、制酸剂等无效,伴黑便多次,首先应考虑的是

- A. 胃溃疡活动期伴上消化道出血
- B. 癌变
- C. 慢性穿孔
- D. 幽门梗阻
- E. 下消化道出血

42. 预防早产儿营养性缺铁性贫血,应于生后多久补充铁剂

- A. 2周
- B. 1个月
- C. 2个月
- D. 4个月
- E. 6个月

43. 流行性腮腺炎患儿具有传染性的时间是

- A. 出现发热至腮腺肿大
- B. 接触患者至出现发热
- C. 腮腺肿大前1日至消肿
- D. 腮腺肿大前1日至腮腺消肿后3日
- E. 腮腺肿大至消肿后7日

44. 小儿惊厥选择镇静止惊药物,首选的是

- A. 硫酸镁
- B. 苯妥英钠

- C. 水合氯醛
- D. 苯巴比妥
- E. 地西洋

45. 左向右分流型先天性心脏病患儿晚期出现持续性青紫,此征象被称为

- A. 缺氧发作
- B. 阿斯综合征
- C. 周围血管征
- D. 差异性发绀
- E. 艾森曼格综合征

46. 造成婴幼儿营养性缺铁性贫血的主要原因是

- A. 生长发育快,需铁量增加
- B. 铁摄入不足
- C. 铁贮存不足
- D. 铁丢失过多
- E. 某些疾病的影响

47. 一般患者短时间行肛门直肠检查常用的体位是

- A. 左侧卧位
- B. 膝胸卧位
- C. 蹲位
- D. 截石位
- E. 俯卧位

48. 由门静脉高压症引起的肛门疾病是

- A. 肛裂
- B. 肛痿
- C. 痔
- D. 直肠脱垂
- E. 直肠息肉

49. 患者,男性,20岁,不慎从高处跌下,头部着地。伤后数小时出现头痛、眼睑青紫,鼻孔有血性水样液体流出,应诊断为

- A. 颅前窝骨折

- B. 颅中窝骨折
C. 颅后窝骨折
D. 鼻骨骨折
E. 面部外伤
50. 尿路感染女性发病率明显高于男性,是因为女性尿道较男性尿道
A. 短而直
B. 长而窄
C. 扁而平
D. 宽而长
E. 短而窄
51. 患者,女性,19岁。大学生,平素体健,学校体检时心率96次/min,律齐,心尖区闻及2/6级收缩期吹风样杂音,心界增大不明显。最恰当的健康指导是
A. 卧床休息1个月
B. 加强营养
C. 坚持服用利尿剂
D. 加强体育锻炼
E. 适当锻炼,避免剧烈运动,防止感染,定期随访
52. 患者,男性,71岁。处于病理性睡眠状态,可被唤醒,醒后能保持短时期的觉醒状态,但反应较迟钝。这种意识状态称为
A. 嗜睡
B. 意识模糊
C. 熟睡
D. 昏睡
E. 朦胧状态
53. 咯血患者饮食护理错误的是
A. 大咯血者暂禁食
B. 少量咯血者宜进少量或温凉的流质饮食
C. 可饮用浓茶、咖啡、酒等刺激性饮料
D. 饮豆浆
E. 饮用果汁
54. 慢性阻塞性肺疾病发生气流阻塞的主要原因是
A. 双肺哮鸣音
B. 小气道病变
C. 大气道阻塞
D. 肺纹理增粗
E. 桶状胸
55. 关于风湿性心脏病主动脉瓣狭窄引起心绞痛的发病机制,正确的是
A. 冠状动脉易激惹发生痉挛
B. 风湿性炎症累及心包
C. 左心室排出量显著降低使冠状动脉血流量减少
D. 病变累及冠状动脉造成冠脉狭窄
E. 主动脉瓣狭窄时,冠状动脉不易形成侧支循环
56. 增加黏膜抵抗力、促进消化性溃疡愈合的药物是
A. 奥美拉唑
B. 枸橼酸铋钾
C. 丙谷胺
D. 西米替丁
E. 氢氧化铝镁
57. 肝硬化患者的实验室检查最常出现的是
A. 血清白蛋白升高
B. 血清转氨酶升高
C. 凝血酶原时间正常
D. 血清钾含量升高
E. 甲胎蛋白增高
58. 有关 Graves 病的病因,叙述正确的是
A. 与遗传、免疫均有关
B. 与遗传有关,与免疫无关
C. 与免疫有关,与遗传无关
D. 由病毒引起
E. 由细菌引起

59. 小细胞低色素性贫血常见于

- A. 巨幼细胞贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 急性失血性贫血
- E. 再生障碍性贫血

60. 患者腹壁静脉曲张,脐以上腹壁静脉血流方向由下而上,脐以下腹壁静脉血流方向由上而下,应考虑

- A. 门静脉高压
- B. 上腔静脉回流受阻
- C. 下腔静脉回流受阻
- D. 大量腹水
- E. 腹水

61. 为年老体弱患者退热时,重点观察患者有无

- A. 皮肤苍白、寒战
- B. 头晕、出汗、疲倦
- C. 洪脉、呼吸增快、出汗
- D. 脉细速、四肢湿冷、出汗
- E. 脉速、面部潮红、头晕

62. 丙型肝炎的主要传播途径是

- A. 媒介传播
- B. 水传播
- C. 食物传播
- D. 血液传播
- E. 粪-口传播

63. 踝关节扭伤后 5 小时的患者,肿胀明显到医院冷敷。冷疗控制炎症扩散的机制是

- A. 溶解坏死组织
- B. 降低生物病原体活力
- C. 降低神经兴奋性
- D. 提高白细胞的吞噬功能
- E. 提高免疫功能

64. 下列外文缩写的中文译意,错误的是

- A. qod:隔日 1 次
- B. qd:每日 1 次
- C. Hs:每晚 1 次
- D. qid:每日 4 次
- E. biw:每周 2 次

65. 护士小张,遵医嘱为患者行 10% 葡萄糖酸钙 10 ml 缓慢静脉推注,局部略肿胀,抽吸无回血。发生上述情况的原因可能是

- A. 静脉痉挛
- B. 针头刺入过深穿破对侧血管壁
- C. 针头斜面一半在血管外
- D. 针头斜面紧贴血管内壁
- E. 针头刺入皮下

66. 一名心脏病患者,监测心电图如下。关于此患者心电图特点的描述正确的是



- A. QRS 波群提前出现,形态与窦性心律相同
- B. QRS 时限正常
- C. QRS 波群前或中或后有逆行的 P 波,T 波常与主波方向相反
- D. T 波常与主波方向相反
- E. 期前收缩后的代偿间歇多为不完全性代偿间歇

67. 成人白血病中最常见的类型是

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 急性红白血病
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 慢性粒细胞白血病
- E. 慢性淋巴细胞白血病

68. 医嘱的内容不包括

- A. 护理级别
- B. 护理常规
- C. 术前准备
- D. 隔离种类
- E. 护理计划

69. 在产褥期,胎盘面子宫内膜完全修复的时间是在产后

- A. 8 周
- B. 6 周
- C. 5 周
- D. 4 周
- E. 7 周

70. 在产褥期,除了胎盘面外,其他部位子宫内膜修复的时间是在产后

- A. 5 周
- B. 3 周
- C. 6 周
- D. 4 周
- E. 7 周

71. 方女士,28 岁,孕 9 周,先天性心脏病,妊娠后表现为一般体力活动受限,活动后感觉心悸,轻度气急,休息时无症状。该患者整个妊娠期间心脏负担最重的时期是

- A. 孕 24 ~ 26 周
- B. 孕 12 周内
- C. 孕 32 ~ 34 周
- D. 孕 39 ~ 40 周
- E. 孕 36 ~ 38 周

72. 羊水过多的常见病因是

- A. 多胎妊娠
- B. 前置胎盘
- C. 先兆流产
- D. 胎膜早破
- E. 胎盘早剥

73. 输卵管妊娠最常见的着床部位是

- A. 峡部
- B. 壶腹部与峡部连接部
- C. 壶腹部
- D. 间质部
- E. 伞部

74. 晚期产后出血通常发生的时间为

- A. 产后 24 小时
- B. 产后 1 周
- C. 产后 1 ~ 2 周
- D. 产后 2 小时
- E. 产后 4 周

75. 张女士,29 岁,孕 6 周,医生建议其口服叶酸。孕妇向门诊护士询问服用该药的目的时,正确的回答是

- A. 预防脑神经管畸形
- B. 防止发生前置胎盘
- C. 预防缺铁性贫血
- D. 促进胎盘的形成
- E. 防止胎儿生长受限

76. 引起产褥感染最常见的病原菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 产气荚膜杆菌
- D. 厌氧性链球菌
- E. 阴道杆菌

77. 关于外科感染特点的描述,不恰当的是

- A. 多需手术治疗或发生于创伤和手术后
- B. 多为混合感染
- C. 多有明显的局部症状和体征
- D. 一般为单一细菌的感染
- E. 愈合后常形成瘢痕组织,导致患部功能障碍

78. 患者,男性,68 岁。腹泻、便秘交替出现

- 2个月。大便稀并带有血性黏液。首选的检查是
- 内镜检查
 - 直肠指检
 - 癌胚抗原检查
 - 粪便隐血试验
 - X线钡餐检查
79. 患者,男性,70岁,肝炎20年。近2个月来,肝区疼痛,食欲减退、进行性消瘦,肝呈进行性增大、质硬,面部有蜘蛛痣、腹膨隆,临床首先考虑的是
- 原发性肝癌
 - 继发性肝癌
 - 肝硬化
 - 慢性肝炎
 - 结核性腹膜炎
80. 患者男,25岁,在硬膜外麻醉下行左腹股沟斜疝修补术。最恰当的术后饮食护理是
- 术后应禁食48小时
 - 术后6小时无恶心即可进流质饮食
 - 术后应胃肠减压
 - 术后应静脉供给营养3天
 - 术后即进普通饮食
81. 患者,女性,中指刺伤6天,患指肿胀,搏动性疼痛,手下垂时疼痛加剧,伴轻度发热。拟诊为化脓性指头炎。最常见的致病菌是
- 铜绿假单胞菌
 - 大肠埃希菌
 - 变形杆菌
 - 金黄色葡萄球菌
 - 乙型溶血性链球菌
82. 腰椎间盘突出好发于腰3~5及腰5至骶1,是因为该部位
- 血供差
 - 韧带松弛
 - 椎间盘较厚
 - 肌肉松弛
 - 活动度大
83. 患者,男性,35岁,头部受伤昏迷10分钟后清醒,转送途中又昏迷。估计颅内血肿的位置在
- 帽状腱膜下
 - 硬脑膜外
 - 硬脑膜下
 - 脑实质内
 - 蛛网膜下腔
84. 患者,男性,不慎触电后倒地。脱离电源后,轻摇并呼唤患者,不见其反应。判断该患者心搏骤停的快捷方法是
- 听心音
 - 触颈动脉搏动
 - 观察瞳孔反应
 - 观察胸廓起伏
 - 测量血压
85. 患者,男,48岁,因胰腺癌入院拟手术治疗,现空腹血糖7.8 mmol/L。术前给予注射胰岛素,其作用是
- 利于吻合口愈合
 - 促进蛋白质合成
 - 抑制胰腺分泌
 - 抑制胰酶活性
 - 控制血糖
86. PDCA循环中的D代表
- 管理
 - 计划
 - 实施
 - 检查
 - 处理
87. 患者,男性,56岁。无明显原因,反复出现

无痛性肉眼血尿 2 个月余,抗感染治疗效果不明显。所患疾病可能是

- A. 泌尿系结核
- B. 泌尿系结石
- C. 泌尿系肿瘤
- D. 泌尿系感染
- E. 前列腺增生

88. 采血后注射器最恰当的处理方法是

- A. 销毁
- B. 分离针头
- C. 回套针帽
- D. 放入垃圾袋
- E. 植入锐气盒

89. 患者项某,男,53 岁,因急性心脏病发作抢救无效死亡进行尸体护理。下列做法不妥的是

- A. 置尸体去枕平卧
- B. 装上活动义齿
- C. 必要时用绷带托住下颌
- D. 有伤口者要更换敷料
- E. 各孔道用棉花堵塞

90. 慢性肺源性心脏病的心脏形态改变主要是

- A. 左心室肥厚
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 肺动脉狭窄
- D. 主动脉扩大
- E. 右心室扩大

91. 在使用胰岛素的过程中,中老年糖尿病患者更易发生低血糖的主要原因是

- A. 对胰岛素敏感导致血糖降低
- B. 肾糖阈降低导致糖排出过多
- C. 胃肠功能减弱导致碳水化合物摄入减少
- D. 进食不规律导致碳水化合物摄入减少
- E. 肝功能减退导致对胰岛素灭活能力降低

92. 《艾滋病防治条例》规定,艾滋病病毒感染者和艾滋病患者应当将其感染或者发病的事实如实告知

- A. 朋友
- B. 同事
- C. 亲属
- D. 同学
- E. 与其有性关系者

93. 正常情况下,胰液进入十二指肠,在肠激酶的作用下首先激活的是

- A. 糜蛋白酶原
- B. 激肽释放酶原
- C. 前磷脂酶
- D. 前弹力蛋白酶
- E. 胰蛋白酶原

94. 高血压病的治疗药物卡托普利最常见的副作用是

- A. 头痛
- B. 乏力
- C. 心率增快
- D. 心率减慢
- E. 刺激性干咳

95. 患者,女,50 岁。初诊为高血压,目前血压维持在 145/85 mmHg。护士在评估中发现患者喜好下列食物。护士应指出,其中最不利于控制高血压的食物是

- A. 猪肝
- B. 鲫鱼
- C. 瘦肉
- D. 河虾
- E. 竹笋

96. 用糖皮质激素治疗支气管哮喘的主要药理作用是

- A. 降低痰液黏稠度
- B. 抑制气道的炎症反应

- C. 舒张支气管平滑肌
- D. 抑制咳嗽中枢
- E. 兴奋呼吸中枢

97. 慢性肺源性心脏病患者肺动脉高压形成的最主要原因是

- A. 缺氧
- B. 血容量增加
- C. 血液黏稠度增加
- D. 继发性红细胞增多
- E. 肺部毛细血管微小栓子形成

98. 患者,男性,36岁。消化性溃疡病史3年,突然出现剧烈腹痛,腹肌紧张呈板状腹。最可能的原因是

- A. 急性胆囊炎
- B. 肾破裂
- C. 脾破裂
- D. 急性胰腺炎
- E. 胃或十二指肠穿孔

99. 患儿,女性,8岁,因阵发性剑突下钻顶样疼痛伴恶心、呕吐半天入院。查体:剑突下压痛,无腹肌紧张。该患儿最可能诊断为

- A. 肝内外胆管结石
- B. 胆总管结石
- C. 急性胆囊炎
- D. 胆囊结石
- E. 胆道蛔虫症

100. 患者,男性,65岁,排尿困难3年,逐渐加重。近2个月夜间尿液不自主流出。应诊断为

- A. 真性尿失禁
- B. 压力性尿失禁
- C. 充盈性尿失禁
- D. 急迫性尿失禁
- E. 麻痹性尿失禁

101. 胆道疾病中最容易发生休克的是

- A. 急性胆囊炎
- B. 胆总管结石
- C. 胆道蛔虫
- D. 肝内胆管结石
- E. 急性梗阻性化脓性胆管炎

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题,请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(102 ~ 103 题共用题干)

张大爷,65岁。因车祸导致脾破裂,大量失血休克被送至急诊科抢救。

102. 急诊科护士小李在紧急处理中不妥的一项是

- A. 询问外伤原因
- B. 迅速与相关部门联系
- C. 请陪伴者留下
- D. 安排观察病床,等待医师
- E. 记录患者到达的时间

103. 患者急诊手术后入病区,护士为其准备麻醉床时不正确的是

- A. 立即将备用床改为麻醉床
- B. 铺橡胶单和中单
- C. 将盖被三折叠于床尾
- D. 将枕头置于床头,开口背向门
- E. 麻醉护理盘放于床旁桌上

(104 ~ 106 题共用题干)

赵先生,67岁,因心衰已绝对卧床4周,双下肢水肿,体质虚弱。近日骶尾部有不适感,经观察后确诊该患者已发生压疮,为炎性浸润期。

104. 支持其判断的典型表现是

- A. 受压局部皮肤发红、水肿
- B. 患者主诉骶尾部麻木感
- C. 创面湿润,有少量脓性分泌物

- D. 骶尾部皮肤呈紫色,皮下有硬结、水疱
E. 创面周围组织坏死
105. 针对压疮的表现,下列哪项措施不妥
- A. 在无菌操作下抽出水疱内液体
B. 紫外线照射
C. 增加翻身次数(必要时每小时翻身 1 次)
D. 创面涂消毒液,并用纱布包扎
E. 将水疱表皮剪去
106. 该患者的饮食应
- A. 低蛋白、高维生素、高热量
B. 高蛋白、高维生素、低盐
C. 低蛋白、低盐、高热量
D. 低蛋白、高维生素、高脂肪
E. 高蛋白、高维生素、高脂肪

(107 ~ 108 题共用题干)

丁女士,45 岁,近一年来月经过频,经血量大,导致贫血,B 超检查确诊为子宫肌瘤,住院,择期手术。

107. 操作前让患者采取的卧位应该是
- A. 侧卧位
B. 俯卧位
C. 中凹卧位
D. 屈膝仰卧位
E. 截石位
108. 术后发生了便秘,给予灌肠护理,记录单上“0/1E”说明是
- A. 灌肠一次未排便
B. 灌肠前排便一次
C. 灌肠后排便一次
D. 灌肠一次患者不配合
E. 表示灌肠失败

(109 ~ 111 题共用题干)

万女士,30 岁,公司职员,因发热、扁桃体肿大,需肌内注射抗生素。

109. 关于臀大肌注射连线定位法,下列哪项正确的是

- A. 髂前上棘外侧三横指处
B. 髂嵴和尾骨连线的外上 1/3 处
C. 髂前上棘与臀裂连线的外上 1/3 处
D. 髂前上棘与尾骨连线的外下 1/3 处
E. 髂前上棘与尾骨连线的外上 1/3 处

110. 臀大肌注射,患者取侧卧位时正确的姿势是

- A. 下腿伸直,上腿弯曲
B. 上腿伸直,下腿弯曲
C. 两腿伸直
D. 两腿弯曲
E. 双膝向腹部弯曲

111. 为防止局部感染,注射时下列哪项最重要

- A. 不可在硬结、瘢痕处进针
B. 注射器应完整无裂缝
C. 针头应锐利,无钩、无弯曲
D. 严格执行查对制度
E. 注射部位皮肤消毒 2 次,直径 5 cm 以上

(112 ~ 114 题共用题干)

患者,男,67 岁。因冠心病入院,在静脉输液过程中出现胸闷、呼吸困难、咳嗽,咯粉红色泡沫样痰。

112. 该患者发生了下列哪种情况
- A. 发热反应
B. 急性肺水肿
C. 静脉炎
D. 空气栓塞
E. 过敏反应
113. 此时护士应为患者采取的卧位是
- A. 去枕仰卧位
B. 左侧卧位
C. 端坐位,两腿下垂
D. 休克卧位
E. 头低足高位
114. 给氧时,护士应选择的吸氧流量是
- A. 1 ~ 2 L/min
B. 3 ~ 4 L/min

- C. 5 ~ 6 L/min
- D. 6 ~ 8 L/min
- E. 10 ~ 12 L/min

(115 ~ 116 题共用题干)

产妇剖宫产后要求出院,医生同意其出院,但尚未开具出院医嘱。该产妇家属表示先带产妇和孩子回家,明天来医院结账。而护士考虑到住院费用没有结清,有漏账的危险,故没有同意家属的要求。但家属不听护士的劝阻并准备离开,这时护士借口为孩子沐浴把孩子抱走了。产妇知情后大哭。

115. 该护士的行为违反了

- A. 自主原则
- B. 不伤害原则
- C. 公正原则
- D. 行善原则
- E. 公平原则

116. 该家属的行为没有履行

- A. 积极配合医疗护理的义务
- B. 自觉遵守医院规章制度的义务
- C. 自觉维护医院秩序的义务
- D. 保持和恢复健康的义务
- E. 公民的义务

(117 ~ 118 题共用题干)

患者,女,78岁。由于脑血栓导致左侧肢体偏瘫入院,病情稳定,医嘱为二级护理,次日凌晨1点,患者坠床,造成颅内出血,虽然经过全力抢救,终因伤势过重死亡。

117. 造成该事件最主要的原因是

- A. 病房环境过于昏暗
- B. 护士没有升起床档
- C. 护士没有进行健康教育
- D. 没有安排家属陪护
- E. 没有安排专人24小时照顾

118. 根据对患者造成的伤害程度,该事故属于

- A. 医嘱差错
- B. 一级医疗事故

- C. 二级医疗事故
- D. 三级医疗事故
- E. 护理差错

(119 ~ 120 题共用题干)

患者,女,55岁。因急性有机磷农药中毒到急诊科进行抢救,经过洗胃等抢救,现患者病情稳定。

119. 护士在抢救结束后要及时据实补记抢救记录和护理病历,时间为

- A. 2小时内
- B. 3小时内
- C. 6小时内
- D. 8小时内
- E. 9小时内

120. 患者需要复制病历,不能复印的病历标本是

- A. 体温单
- B. 化验单
- C. 门诊病历
- D. 会议记录
- E. 医学影像资料

(121 ~ 122 题共用题干)

患者,男性,确诊患艾滋病病毒感染1年,现阑尾炎术后1天,创面有少量渗血。

121. 对该患者的护理措施正确的是

- A. 禁止陪护和探视
- B. 限制患者和他人接触
- C. 告知患者应履行“防止他人感染”的义务
- D. 患者床头卡贴隔离标识
- E. 在患者床头柜上放置预防艾滋病的提示

122. 护士更换被血液污染的被服时防护重点是

- A. 手部皮肤完好可不带手套
- B. 血液污染面积少时可不带手套
- C. 戴手套操作,脱手套后认真洗手
- D. 未戴手套时,应避免手部污染