

實用

中醫典籍寶庫

第二十冊

綫裝書局

殺車槌法

陶華述

殺車槌法

明 餘杭節菴陶 華述

吾專傷寒。深明奧旨。脈正則道合神機。用藥則隨手取應。的本續論。全備發明。殺車槌法。世之罕有。永爲養生之寶矣。今將祕驗三十七方。就註三十七槌法。二十條煎法。二十條切病并製解法。名殺車槌也。實爲我肺腑不傳之妙。我後子孫。一字不可輕露。莫與俗人言。莫使庸醫見爾。宜謹慎珍藏。毋違我之致囑也。

却病法

一、傷寒發狂奔走。人難制伏。先於病人處。生火一盆。用醋一碗。傾於火上。其煙冲鼻入內。卽安。方可察其陽狂陰燥。親切用藥。無差。若初起頭疼發熱。惡寒方除。已後登高而歌。棄衣而走。踰垣上屋。罵詈叫喊。大渴欲死。脈來有力。乃因邪熱傳裏。陽盛發狂。當用寒藥下之。此爲陽狂。凡見舌卷。囊縮者不治。若病起無頭疼。身微熱。面赤戴陽。煩燥。脈來沉微無力。欲坐臥於泥水中。乃因寒熱而發燥。卽陰證似陽。當用熱藥溫之。此爲陰燥。凡見厥冷下利。讞語者不治。醫者不看脈。以虛陽上膈而燥。誤爲實熱。反與涼藥。使渴盛燥急。則氣消成大害矣。須詳脈來有力無力。此爲良法。

傷寒腹中痛甚。將涼水一盞。與病人飲之。其痛稍可者。屬熱痛。當用涼藥清之。清之不已。而或遶臍硬痛。

大便結實煩渴屬燥屎痛急用寒藥下之若食積痛同治法若小腹硬痛小水自利大便黑身目黃者屬蓄血痛亦用寒劑加行血藥下盡黑物則愈此三者皆痛隨利減之法也

若飲水愈加作痛屬寒痛當用溫藥和之和之不已而或四肢厥冷腹痛嘔吐瀉利急用熱藥救之須詳脈來有力無力此爲良法

傷寒直中陰經真寒證甚重而無脈或吐瀉脫元而無脈將好酒姜汁各半盞與病人服之其脈來者可治當察其陰用藥不拘脈浮沉大小但指下出見者生如用此法脈不至者必死又當問病人有何疼痛處若有痛證要知痛甚者脈必伏宜隨病制宜如無痛證用此法而脈至者此爲吉兆尤當問病人若平素原無正取脈須用覆手取之脈必見也此屬反關脈診法與正取法同若平素正取有脈後因病診之無脈者亦當覆手取之

取之而脈出者陰陽錯亂也宜和合陰陽如覆取正取俱無脈者必死矣此爲良法

一傷寒舌上生胎不拘滑白黃黑俱用井水浸青布片於舌上洗淨後用生姜片子時時浸水刮之其胎自退凡見舌生黑胎芒刺者必死此熱毒入深十有九死是腎水尅心火也若發黃者用生姜時時週身擦之其黃自退若心胸脇下有邪氣結實滿悶硬痛又法用生姜一觔搗渣去汁炒微燥帶潤用絹包於患處款款熨之稍可又將渣和均前汁炒乾再熨許久豁然寬快俱爲良法

一傷寒鼻衄流血不止者將山梔炒黑色爲細末吹入鼻內外將水紙搭於鼻沖其血自止若點滴不

成流者其邪在經未解照後祕方用藥不在此法。

一傷寒熱邪傳裏服瀉藥後嘔炒麩皮一升將絹包於病人腹上款款熨之使藥氣得熱則行大便易通矣。

一傷寒吐血不止用韭汁磨京墨呷下其血見黑必止如無韭汁用鷄子清亦可正謂赤屬火而黑屬水也。

一傷寒直中陰經真寒證或陰毒證身如被杖腹中絞痛嘔逆沉重不知人事四體堅冷如石手指甲唇青藥不得入口六脉沉細或無脉欲絕者將葱縛一握切去根葉取白三寸許搗如餅先用射香半分填於臍中後放葱餅臍上以火熨之連換二三餅稍醒灌入生姜汁煎服回陽救急湯如不醒再灸關元氣海二三十壯使熱氣通其內逼邪出於外以復陽氣如用此法手足溫和汗出即醒者爲有生也如用此法手足不溫汗出不省人事者必死也此爲良法。

一傷寒熱病熱邪傳裏亢極無解用黃連煎水一盞放井中頓冷浸青布搭在胸中徐徐換之待熱勢稍退即除不可久漬夏天用此法冬天不宜用。

一傷寒服藥轉吐出不納者隨用竹管重捺內關後將生姜自然汁半盞熱飲其吐即止大凡服寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑溫和服之如要取汗雖辛甘之劑亦宜熱服如要止汗雖辛甘溫之劑亦宜溫服此爲良法。

一、中風痰厥昏迷卒倒。不省人事欲絕者。先用皂莢末。熬紙燒煙。沖入鼻中。有嚏可治。隨用吐痰法。將皂莢末五分。半夏白礬各三分。爲細末。姜汁調服。探吐後。服導痰湯加減治之。無嚏不可治。此爲良法。

一、治乾霍亂不得吐者。用滾湯一碗。入皂莢末三分。鹽一撮調服。探吐莫與米湯。設若與之卽死。是穀氣反助邪氣也。

一、中寒卒倒昏迷不省者。先用熱酒姜汁各半盞灌入。稍醒後。服加味理中飲爲效。如不飲酒人。止用姜汁灌之。依法調治。此證冬月甚有之。餘月幾希矣。

製藥法

一、用附子去皮臍。先將鹽水姜汁各半盞。用沙鍋煮七沸後。入黃連甘草各半兩。再加童便半盞。再煮七沸。住火良久。撈起。入磁器盛貯。伏地氣一晝夜。取出曬乾。以備後用。庶無毒害。頂圓臍正一兩一枚者佳。此爲良法。

一、用川大黃。須錦紋者佳。剉成飲片。用酒拌均。燥乾。以備後用。不傷陰血。如年壯實熱者生用。不須製之。此爲良法。

一、用麻黃。去節。先滾醋湯。略浸片時。撈起。以備後用。庶免太發。如冬月嚴寒。腠理至密。當生用者。不須製之。此爲良法。

一、用茱萸。將鹽水拌均。炒燥。以備後用。庶無小毒。此爲良法。

解藥法

一用附子後身目紅者乃附毒之過用蘿蔔搗水濾汁二大盞入黃連甘草各半兩犀角三錢煎至八分飲之以解附毒其紅卽除如解遲必血從耳目口鼻出者必死無蘿蔔用蘿蔔子搗水取汁亦可此爲良法如無蘿蔔子用澄清泥漿水亦可也

一用大黃後瀉利不止者用烏梅二箇炒粳米一撮乾姜三錢人參炒白朮各半兩用附子皮一錢半甘草一錢升麻少許燈心一握水二大鍾去滓後入炒陳壁土一匙調服卽止取土氣以助胃氣也此爲良法

一用麻黃後汗出不止者將病人髮披水盆中足露出外用炒糯米半升龍骨牡蠣藥本防風各一兩研爲細末過身撲之隨後祕方用藥免致亡陽而死爲良法

煎藥法

- 一用發汗藥先煎麻黃一二沸後入餘藥同煎
- 一用止汗藥先煎桂枝一二沸後入餘藥同煎
- 一用和解藥先煎柴胡一二沸後入餘藥同煎
- 一用下藥先煎滾水入枳實一二沸後入餘藥同煎
- 一用溫藥先煎乾姜一二沸後入餘藥同煎

- 一、用行血藥先煎桃仁一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用利水藥先煎猪苓一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用止瀉藥先煎炒白朮一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用消渴藥先煎天花粉一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用止痛藥先煎白芍藥一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用發黃藥先煎茵陳一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用發斑藥先煎青黛一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用發狂藥先煎石膏一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用嘔吐藥先煎半夏一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用勞力感寒藥先煎黃耆一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用感冒傷寒藥先煎羌活一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用暑證藥先煎香薷一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用風病藥先煎防風一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用腹如雷鳴藥先煎煨生姜一二沸後入餘藥同煎。
- 一、用濕證藥先煎蒼朮一二沸後入餘藥同煎。

祕用三十七方就註三十七槌法。

升麻發表湯。卽麻黃湯。自有加減法。

治冬月正傷寒。頭痛發熱惡寒。脊強。脉浮緊。無汗。爲表證。此足太陽膀胱經受邪。當發汗。以頭如斧劈身如火熾者。宜用此湯。

麻黃

桂枝

甘草

杏仁

升麻

川芎

防風

白芷

羌活

本經發熱惡寒。頭痛。無汗而喘者。本方加乾葛。去升麻。

本經發熱惡寒。身體痛者。本方加蒼朮。芍藥。去杏仁。

本經惡寒發熱。身痒面赤者。以其不得小汗出故也。本方去白芷。杏仁。加柴胡。芍藥。

本經頭痛發熱惡寒。胸中飽悶者。本方加枳殼。桔梗。

本經感寒深重。服湯不作汗者。宜再服。至二三劑而汗不出者死。

本經汗後不解者。宜再服。量證輕重。用麻黃。升麻。分多寡爲當。

水二鍾。姜三片。葱白二莖。槌法加江西豆豉一撮煎之。熱服取汗。如神。宜厚被覆首。凡中病卽止。不得多

服。多則反加別病矣。

疎邪實表湯 卽桂枝湯自有加減法。

治冬月正傷風頭痛發熱惡寒脊強脉浮緩自汗爲表證此足太陽膀胱經受邪當實表散邪無汗者不可服。

桂枝

赤芍藥

甘草

防風

川芎

羌活

白朮

如汗不止如黃耆喘加柴胡杏仁

胸中飽悶加枳殼桔梗

水二鍾姜三片棗二枚槌法加膠飴二匙煎之溫服羌活沖和湯以代桂枝麻黃青龍各半等湯此太

陽經之神藥也

治春夏秋非時感冒暴寒頭痛發熱惡寒脊強無汗脉浮緊此足太陽膀胱經受邪是表證宜發散不與冬時正傷寒同治法此湯非獨治三時暴寒春可治溫夏可治熱秋可治濕治雜證亦有神也祕之不與庸俗知此奇妙耳本方自有加減法備開于後

羌活壹錢半

防風壹錢

蒼朮壹錢半

黃芩壹錢

川芎壹錢

白芷壹錢

甘草壹錢

生地黃貳錢

細辛伍分不可多

如胸中飽悶加枳殼桔梗去生地黃

夏月本方加石膏。知母。名神朮湯。如服此湯後。不作汗。本方加蘇葉。喘而惡寒。身熱。本方加杏仁。生地黃。汗後不解。宜再服。汗下兼行。加大黃。釜底抽薪之法。其春夏秋感冒。非時傷風。亦有頭痛。惡寒。身熱。脉浮。緩。自汗。宜實表。本方去蒼朮。加白朮。汗不止。加黃耆。即加減冲和湯。再不止。以小柴胡加桂枝。芍藥一錢。如神。

水二鍾。姜三片。棗二枚。煎至一鍾。槌法加葱白。搗汁五匙。入藥再煎。一二沸。如發汗。用熱服。止汗。用溫服。柴葛解肌湯。即葛根湯。本湯自有加減法。

治足陽明胃經受證。目疼。鼻乾。不眠。頭疼。眼眶痛。脉來微洪。宜解肌。屬陽明經病。其正陽明腑病。別有治法。

柴胡

乾葛

甘草

黃芩

芍藥

羌活

白芷

桔梗

本經無汗。惡寒甚者。去黃芩。加麻黃。冬月宜加。春宜少。夏秋去之。加蘇葉。本經有汗而渴者。治法開在如神白虎湯下。

水二鍾。姜三片。棗二枚。槌法加石膏末一錢。煎之。熱服。

柴胡雙解飲。即小柴胡湯。本方自有加減法。

治足少陽膽經受證。耳聾。脇痛。寒熱。嘔而口苦。脉來弦數。屬半表半裏。宜和解。此經膽無出入。有三禁。不

可汗下吐也。止有小柴胡一湯。隨病加減。再無別湯。

柴胡

黃芩

半夏

甘草

人參

陳皮

芍藥

本經證。小便不利者。加茯苓。

本經嘔者。入姜汁。竹茹。脇痛加青皮。

痰多加瓜蒌仁。貝母。寒熱似瘧者加桂枝。

渴者加天花粉。知母。

齒燥無津液加石膏。嗽者加五味。金沸草。壞證加鱉甲。

本經證。心下飽悶。未經下者。非結胸。乃表邪傳至胸中。未入乎腑。證雖滿悶。尙爲在表。只消小柴胡加枳

桔。未效。就以本方對小陷胸加枳桔。一服豁然。其妙如神。祕之不與俗人言之耳。虛煩類傷寒證。本方加

竹葉炒粳米。

本經與陽明合病。本方加葛根。芍藥。如拾芥。

婦人熱入血室。加當歸紅花。

男子熱入血室。加生地黃。

老婦人傷寒。無表證。其熱勝者。本方加大黃。甚者加芒硝。

水一鍾。姜一片。棗二枚。槌法入生艾汁三匙煎之。溫服。

桂枝大黃湯 卽桂枝湯內加大黃。本方自有加減法。

治足太陰脾經受證。腹滿而痛。咽乾而渴。手足溫。脉來沉而有力。此因邪熱從陽經傳入陰經也。

桂枝

赤芍藥

甘草

大黃

枳實

柴胡

本經腹滿。不惡寒而喘者。加大腹皮。去甘草。

水二鍾。姜一片。棗二枚。煎之。臨服。槌法入栝榔。磨水二匙。熱服。

加味理中飲 卽理中湯。本方自有加減法。

治足太陰脾經受證。自利不渴。手足溫。身無熱。脉來沉而無力。此屬臟寒。

乾姜

白朮

人參

甘草

肉桂

陳皮

茯苓

厥陰消渴。氣上衝心。飢不欲食。食卽吐蚘。腹痛。大便實者。本方加大黃蜜少許利之。

本經腹濡滿時減者。依本方去甘草。

本經嘔吐者。入半夏姜汁。

本經踈臥沉重。利不止。少加附子。

利後身體痛者。急溫之。加附子。

自利腹痛者。入木香。磨姜汁調服和之。

水二鍾。姜一片。棗二枚。煎之。臨服。槌法入炒陳壁土一匙調服。取土氣以助胃氣。

茵陳將軍湯。卽茵陳湯。本方自有加減法。

治足太陰脾經。腹滿。身目發黃。小水不利。大便實。發渴或頭汗至頸而還。脈來沉重者。宜用。

大黃

茵陳

山梔

甘草

厚朴

黃芩

枳實

大便自調者。去大黃。厚朴。加大腹皮。利小便。清爲效。水二鍾。姜一片。槌法加燈心一握。煎之。熱服。

導赤散。卽五苓散。本方自有加減法。

治小水不利。小腹滿。或下焦蓄熱。或引飲過多。或小水短赤而渴。脈沉數者。以利小便爲先。惟汗後亡津

液。與陽明汗多者。則以利小便爲戒。

茯苓

豬苓

澤瀉

桂枝

白朮

甘草

滑石

山梔

中濕。身目黃者。加茵陳。水結胸證。加木通。燈心。如小水不利而見頭汗出者。乃陽脫也。得病起無熱。但譫語。煩燥不安。精采不與人相當。此湯治之。

水二鍾。姜一片。燈心二十莖。槌法入鹽二字調服。

六乙順氣湯

以代大承氣。小承氣。調胃承氣。大柴胡。三乙承氣湯。大陷胸等湯之神藥也。舉世無人知此奇妙耳。祕之。莫與俗人言。本方自有加減法備開。

此湯治傷寒熱邪傳裏。大便結實。口燥咽乾。怕熱譫語。揭衣狂妄。揚手擲足。斑黃陽厥。潮熱自汗。胸腹滿硬。邊臍疼痛等證。悉皆治之。效不盡述。

大黃

枳實

黃芩

厚朴

甘草

柴胡

芒硝

芍藥

潮熱自汗。譫語發渴。揚手擲足。揭去衣被。狂妄。斑黃。大便實者。俱屬正陽明胃腑病。依本方。口燥咽乾。大便實者。屬少陰。依本方。

下利純清。心下硬痛而渴者。屬少陰。依本方。

怕熱發渴。譫妄。手足乍冷乍溫。大便實者。陽厥證。屬厥陰。依本方。舌卷。囊縮者。難治。須急下之。

譫語發渴。大便實。邊臍硬痛者。有燥屎。依本方。

熱病目不明。謂胃水已竭。不能照物。病已篤矣。惟宜急下。依本方。目中不了了。即目不明也。

轉屎氣者。謂下泄也。有燥屎焉。當下之。依本方。如更衣者。止後服。不必盡劑。不更衣者。宜再少與。大便通。

者愈。

結胸證。心下硬痛。手不可近。燥渴譫語。大便實者。依本方。去甘草。加甘遂。桔梗。凡傷寒過經。及老弱并血氣兩虛之人。或婦人產後。有下證。或有下後不解。或有表證尚未除。而裏證又急。不得不下者。用此湯去芒硝下之。則吉。蓋恐轉藥。硝性燥急。故有此戒。大凡傷寒邪熱傳裏結實。須看熱氣淺深用藥。今之庸醫。與俗醫。不分當急下。可少與。宜微和胃氣之論。一槩用大黃。芒硝亂投湯劑下之。因茲枉死者多矣。余謂傷寒之邪。傳來非一。治之則殊耳。病有三焦俱傷者。則痞滿燥實堅全。俱宜大承氣湯。厚朴苦溫以去痞。枳實苦寒以泄滿。芒硝鹹寒以潤燥軟堅。大黃苦寒以泄實去熱。病斯愈矣。邪在中焦。則有燥實堅三證。故用調胃承氣湯。以甘草和中。芒硝潤燥。大黃泄實。不用枳朴。恐傷上焦虛無氤氲之元氣。調胃之名。自此然矣。上焦受傷。則痞而實。用小承氣湯。枳實厚朴之能除痞。大黃之泄實去芒硝。不傷下焦血分之真陰。謂不伐其根本也。若夫大柴胡湯。則有表證尚未除。而裏證又急。不得不下者。只得以此湯通表裏而緩治之。猶有老弱及血氣兩虛之人。亦宜用此。故經云。轉藥執緊。有芒硝者。緊也。大承氣最緊。小承氣次之。調胃承氣又次之。大柴胡又次之。其大柴胡加大黃。小柴胡加芒硝。方爲轉藥。蓋爲病輕者設也。仲景又云。瀉滌傷寒熱積。皆用湯液。切禁丸藥。不可不知也。

右先將水二鍾。滾三沸後入藥。煎室八分。槌法。臨時服。入鐵鑄水三匙調服。立效。取鐵性沉重之義。最能墜熱開結有神。此千金不傳之祕。若非吾之子孫承繼。焉肯泄露玄機。故戒耳。

如神白虎湯 卽白虎湯本方自有加減法。
治身熱渴而有汗不解。或經汗過渴不解。脈來微洪。宜用。

石膏

知母

甘草

人參

山梔

麥門冬

五味子

心煩者。加竹茹一團。如大渴。心煩背惡寒者。依本方。去山梔。加天花粉。無渴不可服此藥。爲大忌。水二鍾。棗一枚。姜一片。槌法加淡竹葉十片煎之。熱服。

三黃石膏湯

此湯治陽毒發斑。身黃如塗朱。眼珠如火。狂叫欲走。六脈洪大。燥渴欲死。鼻乾面赤齒黃。過經不解。已成壞證。表裏皆熱。欲發其汗。病熱不退。又復下之。大便遂頻。小便不利。亦有錯治溫證而成此證者。又八九日已經汗下後。脈洪數。身壯熱。拘急沉重。欲治其內。由表未解。欲發其表。則裏證又急。趨起不能措手。待斃而已。殊不知熱在三焦。閉塞經絡。津液榮衛不通。遂成此證。又治汗下後。三焦生熱。脈洪。譫語不休。晝夜喘息。鼻時加衄。身目俱黃。狂叫欲走者。通用此湯治之。有神。人所不識。

石膏

半

黃芩

黃連

黃柏

各錢

山梔

叁拾

麻黃

香豉貳合

水二鍾。姜三片。棗一枚。槌法入細茶一撮煎之。熱服。