


针灸经络穴位图谱



ATLAS OF ACUPUNCTURE MERIDIANS AND ACUPOINTS

王颖 魏肖禹 主编

◆最权威的编写团队

◆最准确的穴位定位

◆三维图示经络循行

◆动态演示针灸刺法



辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

针灸经络 穴位图谱

(赠光盘)

王 颖 魏肖禹 主编

辽宁科学技术出版社
·沈阳·

图文编辑: 王颖 魏肖禹 王琪格 关圣涛 陈金 李瑞根
刘立克 刘美思 林玉 张宏 刘实 张婉春
苏涵 秦国鹏 王阳 李洋 周伟 黄丽莉
王欣 李晓华 张献文 韩伟 齐晓华 张野

图书在版编目 (CIP) 数据

针灸经络穴位图谱 / 王颖, 魏肖禹主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5381-9782-2

I. ①针… II. ①王… ②魏… III. ①经络—图谱 ②穴位—图谱
IV. ①R224.4-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 078880 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳市精华印刷有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 5.5

字 数: 100 千字

出版时间: 2016 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2016 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 寿亚荷

封面设计: 翰鼎文化/达达

版式设计: 袁舒

责任校对: 李霞

书 号: ISBN 978-7-5381-9782-2

定 价: 35.00 元 (赠光盘)

联系电话: 024-23284370

邮购热线: 024-23284502

E-mail: syh24115@126.com

前 言

针灸疗法简单实用、疗效确切，已被认为是目前自然疗法中效果相对明显和副作用较少的方法之一。在对针灸从业人员的调查过程中了解到，针灸、按摩不仅在各大医院有设置，而且也是各种小型医疗场所、美容院、娱乐场所的主要经营项目，还能作为许多出国留学人员在国外的生存技术。学习针灸的人首先要了解经络和腧穴的部位、作用等，而人体常用的 14 条经络和 300 余个腧穴对于初学者来说，要想快速掌握是很难的。为使广大针灸专业读者更快、更准确地学习经络、腧穴知识，我们写了《针灸经络穴位图谱》。

该书主要介绍了针灸常用的人体 14 条经脉的走行，300 余个腧穴的定位、功能主治、刺法操作等。每条经络都介绍了经络循行原文和主治概要，对腧穴的名称用汉语拼音进行了标注，每条经络都配有平面、骨骼、肌肉解剖穴位图。还介绍了足部反射区、手部反射区和耳部反射区，对常用反射区的名称、分布、主治等进行了详细的介绍。书后附有人体常用骨度分寸折量定位法和常见疾病快速选穴处方。全书内容简单明了，穴位清晰、准确。配有光盘，光盘中介绍了常用穴位的取穴和针刺方法。本书适用于针灸学生、初学者和针灸爱好者。

编著者

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 第一章 手太阴肺经经络循行及穴位 | 1 |
| 第二章 手阳明大肠经经络循行及穴位 | 4 |
| 第三章 足阳明胃经经络循行及穴位 | 8 |
| 第四章 足太阴脾经经络循行及穴位 | 14 |
| 第五章 手少阴心经经络循行及穴位 | 18 |
| 第六章 手太阳小肠经经络循行及穴位 | 21 |
| 第七章 足太阳膀胱经经络循行及穴位 | 25 |
| 第八章 足少阴肾经经络循行及穴位 | 33 |
| 第九章 手厥阴心包经经络循行及穴位 | 38 |
| 第十章 手少阳三焦经经络循行及穴位 | 41 |
| 第十一章 足少阳胆经经络循行及穴位 | 45 |
| 第十二章 足厥阴肝经经络循行及穴位 | 51 |
| 第十三章 督脉 | 54 |
| 第十四章 任脉 | 59 |
| 第十五章 经外奇穴 | 64 |
| 第十六章 足部反射区 | 69 |
| 第十七章 手部反射区 | 73 |
| 第十八章 耳部反射区 | 77 |
| 常用骨度分寸折量定位法 | 81 |
| 常见疾病快速选穴 | 83 |

第一章 手太阴肺经经络循行及穴位


原文：肺手太阴之脉，起于中焦，下络大肠，还循胃口，上膈属肺，从肺系横出腋下，下循臑内，行少阴、心主之前，下肘中，循臂内上骨下廉，入寸口，上鱼，循鱼际，出大指之端。其支者，从腕后直出次指内廉，出其端。（出自《灵枢·经脉》，下同）

语译：起于中焦，向下联络大肠，回绕过来沿着胃的上口，通过横膈，属于肺脏，从“肺系”（肺与喉咙相联系的部位）横行出来（中府），向下沿上臂内侧，行于手少阴经和手厥阴经的前面，下行到肘窝中，沿着前臂内侧前缘，进入寸口，经过鱼际，沿着鱼际的边缘，出拇指内侧端（少商）。

手腕后方的支脉：从列缺处分出，一直走向食指内侧端（商阳），与手阳明大肠经相接。

主要病候：咳嗽、气喘、少气不足以息、咳血、伤风、胸部胀满、咽喉肿痛、缺盆部和手臂内侧前缘痛、肩背部寒冷、疼痛等症。

主治概要：本经腧穴主治头面、喉、胸、肺部病证和经脉循行部位的其他病证。



1. 中府 LU1 Zhōngfǔ, 肺募穴

[定位] 在胸部，云门下 1 寸，平第 1 肋间隙，锁骨下窝外侧，前正中线旁开 6 寸。

[主治] 咳嗽、气喘、肺胀满、胸痛、肩背痛。

[配伍] 配尺泽治咳嗽；配肩髎治肩痛。

[刺灸法] 向外斜刺或平刺 0.5~0.8 寸，不可向内深刺，以免伤及肺脏。

2. 云门 LU2 Yúnmén

[定位] 在胸部，锁骨下窝凹陷中，肩胛骨喙突内缘，前正中线旁开 6 寸。

[主治] 咳嗽、气喘、胸痛、肩背痛、胸中烦痛。

[配伍] 配中府、隐白、期门、肺俞、魂门、大陵，治疗胸中痛。

[刺灸法] 向外斜刺 0.5~0.8 寸，不可向内深刺，以免引起气胸，可灸。


3. 天府 LU3 Tiānfǔ

[定位] 在臂内侧面，肱二头肌桡侧缘，腋前纹头下 3 寸处。

[主治] 鼻衄、气喘、癰气、臂痛。

[配伍] 配曲池治疗臂痛。

[刺灸法] 直刺 0.5~1.0 寸。



4. 侠白 LU4 Xiábái

[定位] 在臂内侧面，肱二头肌桡侧缘，腋前纹头下4寸，或肘横纹上5寸处。

[主治] 咳嗽、气喘、干呕、烦满、臑痛。

[配伍] 配曲池、肩髎治肩臂痛。

[刺灸法] 直刺0.5~1.0寸。

5. 尺泽 LU5 Chizé, 合穴

[定位] 在肘横纹中，肱二头肌腱桡侧凹陷处。
 [主治] 咳嗽、气喘、咳血、潮热、胸部胀满、咽喉肿痛、小儿惊风、肘臂挛痛。

[配伍] 配太渊、经渠治咳嗽、气喘；配孔最治咳血、潮热；配曲池治肘臂挛痛。

[刺灸法] 直刺0.8~1.2寸；或三棱针点刺出血。

6. 孔最 LU6 Kǒngzuì, 郄穴

[定位] 在前臂掌面桡侧，当尺泽与太渊连线上，腕横纹上7寸处。

[主治] 咳血、咳嗽、气喘、咽喉肿痛、肘臂挛病、痔疾。

[配伍] 配肺俞、尺泽治咳嗽、气喘；配鱼际治咳血。

[刺灸法] 直刺0.5~1.0寸。

7. 列缺 LU7 Lièquē, 络穴；八脉交会穴，通任脉；四总穴，“头项循列缺”


[定位] 在前臂，腕掌侧远端，横纹上1.5寸，拇指伸肌腱与拇指展肌腱之间，拇指展肌腱沟的凹陷中。

[主治] 伤风、头痛、项强、咳嗽、气喘、咽喉肿痛、口眼喰斜、齿痛。

[配伍] 配合谷治伤风头痛项强；配天容治疗咽喉肿痛；配肺俞治咳嗽气喘。

[刺灸法] 向上斜刺0.3~1.0寸，针感为麻刺感上传。

[附注] 取穴时勿按“简便取穴法”将本穴误定位在手阳明经上。



8. 经渠 LU8 Jingqu, 经穴

[定位] 在前臂掌面桡侧，桡骨茎突与桡动脉之间凹陷处，腕横纹上 1 寸。

[主治] 咳嗽、气喘、胸痛、咽喉肿痛、手腕痛。

[配伍] 配肺俞、尺泽治咳嗽。

[刺灸法] 避开桡动脉，直刺 0.3~0.5 寸。

9. 太渊 LU9 Taiyuān, 输穴；原穴；八会穴之脉会

[定位] 在腕前区，桡骨茎突与舟状骨之间，拇长展肌腱的尺侧凹陷中。

[主治] 咳嗽、气喘、咳血、胸痛、咽喉肿痛、腕臂痛、无脉症。

[配伍] 配尺泽、鱼际、肺俞治咳嗽、咳血、胸痛；配人迎治无脉症。

[刺灸法] 避开桡动脉，直刺 0.3~0.5 寸。

10. 鱼际 LU10 Yújì, 荣穴

[定位] 在手外侧第 1 掌骨桡侧赤白肉际处。

[主治] 咳嗽、咳血、咽喉肿痛、失音、发热。

[配伍] 配孔最、尺泽治咳嗽、咳血；配少商治咽喉肿痛。

[刺灸法] 直刺 0.5~0.8 寸，或三棱针点刺出血。

11. 少商 LU11 Shàoshāng, 井穴

[定位] 在手拇指末节桡侧，距指甲角 0.1 寸。

[主治] 咽喉肿痛、咳嗽、鼻衄、发热、昏迷、癫痫。

[配伍] 配合谷、天容治咽喉肿痛；配中冲治昏迷、发热。

[刺灸法] 浅刺 0.1 寸，或点刺出血。

第二章 手阳明大肠经经络循行及穴位


原文：大肠手阳明之脉，起于大指次指之端，循指上廉，出合谷两骨之间，上入两筋之中，循臂上廉，入肘外廉，上臑外前廉，上肩，出髃骨之前廉，上出于柱骨之会上，下入缺盆，络肺，下膈，属大肠；其支者，从缺盆上颈，贯颊，入下齿中，还出挟口，交人中，左之右，右之左，上挟鼻孔。

语译：起于大指，沿手指向上入小臂，沿肘外侧上肩，向下进入缺盆，与肺部相连。

手腕后方的支脉：从缺盆入颈部，上行入齿，与人中交会，入鼻中。

主要病候：腹痛、肠鸣、泄泻、便秘、咽喉肿痛、齿痛、鼻流清涕或出血以及本经循行部位疼痛、热肿或寒冷等症。

主治概要：本经腧穴主治腹部、咽喉、口鼻部和经脉循行部位的其他病证。



1. 商阳 LI1 Shāngyáng, 井穴

[定位] 在手食指末节桡侧，距指甲角 0.1 寸。

[主治] 耳聋、齿痛、咽喉肿痛、颌肿、青盲、手指麻木、热病、昏迷。

[配伍] 配少商点刺出血治热病、昏迷。

[刺灸法] 浅刺 0.1 寸，或点刺出血。

2. 二间 LI2 Èrjiān, 荣穴

[定位] 微握拳，当手食指本节（第 2 掌指关节）前桡侧凹陷中赤白肉际处。

[主治] 目昏、鼻衄、齿痛、口渴、咽喉肿痛、热病。

[配伍] 配合谷治齿痛。

[刺灸法] 直刺 0.2~0.3 寸。

3. 三间 LI3 Sānjiān, 输穴

[定位] 微握拳，在手食指本节（第 2 掌指关节）后，桡侧凹陷处。

[主治] 咽喉肿痛、牙痛、腹胀、眼痛。

[配伍] 目中漠漠，即寻攒竹、三间；透后溪治手拘挛不开。

[刺灸法] 直刺 0.3~0.5 寸。

4. 合谷 LI4 Hégǔ, 原穴; 四总穴之一, “面口合谷收”


[定位] 在手背，第1、第2掌骨间，当第2掌骨桡侧的中点处。


[主治] 头痛、目赤肿痛、鼻衄、齿痛、牙关紧闭、口眼喎斜、耳聋、咽喉肿痛、热病无汗、多汗、腹痛、便秘、经闭、滞产。

[配伍] 配太阳治头痛；配太冲治目赤肿痛；配迎香治鼻疾；配少商治咽喉肿痛；配三阴交治经闭、滞产；配地仓、颊车治口喎；配太冲治高血压；透后溪治手拘挛不开。

[刺灸法] 直刺0.5~1.0寸。孕妇不宜针。

[附注] 与太冲构成“四关穴”，运行全身气血。





5. 阳溪 LI15 Yángxī, 经穴

[定位] 在腕背横纹桡侧，手拇指向上跷时，当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中。

[主治] 头痛、手腕痛、目赤肿痛、耳聋、耳鸣、齿痛、咽喉肿痛。

[配伍] 配合谷治头痛；配腕骨、阳池治疗腕痛。

[刺灸法] 直刺 0.5~0.8 寸。

6. 偏历 LI6 Piānlì, 络穴

[定位] 屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，腕横纹上3寸处。

[主治] 目赤、耳鸣、鼻衄、喉痛、手臂酸痛、水肿。

[配伍] 配曲池治手臂疼痛。

[刺灸法] 直刺或斜刺0.5~0.8寸。

7. 温溜 LI7 Wēnlù, 郂穴

[定位] 屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，腕横纹上5寸处。

[主治] 头痛、面肿、咽喉肿痛、疔疮、肩背酸痛、肠鸣腹痛。

[配伍] 配合谷治头痛。

[刺灸法] 直刺0.5~1.0寸。

8. 下廉 LI8 Xiàlián

[定位] 在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，肘横纹下4寸处。

[主治] 头痛、眩晕、目痛、肘臂痛、腹胀、腹痛。

[配伍] 配足三里治腹胀、腹痛。

[刺灸法] 直刺0.5~1.0寸。

9. 上廉 LI9 Shànglián

[定位] 在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，肘横纹下3寸处。

[主治] 头痛、肩膊酸痛、半身不遂、手臂麻木、肠鸣腹痛。

[配伍] 配曲池治手臂麻木。

[刺灸法] 直刺0.5~1.0寸。

[附注] 穴下布有前臂背侧皮神经与桡神经深支，治疗颈椎病所致手臂麻木尤效。

10. 手三里 LI10 Shǒusānlǐ

[定位] 在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，肘横纹下2寸处。

[主治] 齿痛颊肿、上肢不遂、腹痛、腹泻。

[配伍] 配曲池治上肢不遂。

[刺灸法] 直刺0.8~1.2寸。

11. 曲池 LI11 Qūchí, 合穴

[定位] 屈肘成直角，在肘横纹外侧纹头与肱骨外上髁连线中点。

[主治] 咽喉肿痛、齿痛、目赤痛、瘰疬、瘾疹、手臂肿痛、腹痛吐泻、高血压、癫痫。

[配伍] 配血海、足三里治瘰疬；配手三里治上肢不遂；配太冲、大椎治高血压；透臑俞治瘰疬。

[刺灸法] 直刺1.0~1.5寸。

12. 肘髎 LI12 Zhǒuliáo

[定位] 在臂外侧，屈肘，曲池上方1寸，当肱骨前缘处。

[主治] 肘臂部疼痛、麻木、挛急。

[配伍] 配曲池治肘臂疾病。

[刺灸法] 直刺0.5~1.0寸。

13. 手五里 LI13 Shǒuwǔlǐ

[定位] 在臂外侧，当曲池与肩髃连线上，曲池上3寸处。

[主治] 肘臂挛痛、痿弱无力、瘰疬。

[配伍] 配曲池治肘臂挛痛。

[刺灸法] 直刺0.5~1.0寸。

14. 臂臑 LI14 Bìndǎo

[定位] 在臂外侧，三角肌止点处，当曲池与肩髃连线上，曲池上7寸处。

[主治] 肩臂痛、颈项拘挛、瘰疬、目疾。

[配伍] 配光明治目疾。

[刺灸法] 直刺或向上斜刺0.8~1.5寸。

15. 肩髃 LI15 Jiānyú, 手阳明经、阳跷脉交会穴

[定位] 在三角肌区，肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨之间的凹陷处。

[主治] 肩臂挛痛不遂、瘾疹、瘰疬。

[配伍] 配肩髎治肩臂疼痛。

[刺灸法] 直刺或向下斜刺0.8~1.5寸。

16. 巨骨 LI16 Jùgǔ, 手阳明经、阳跷脉交会穴

[定位] 在肩上部，当锁骨肩峰端与肩胛冈之间凹陷处。

[主治] 肩臂挛痛不遂、瘰疬、瘿气。

[配伍] 配肩髃、肩髎治肩痛。

[刺灸法] 向外斜刺0.5~1.0寸。

17. 天鼎 LI17 Tiāndǐng

[定位] 在颈部，横平环状软骨，胸锁乳突肌后缘。

[主治] 暴喑气梗、咽喉肿痛、瘰疬、瘿气、臂痛。

[配伍] 配少商治咽喉肿痛；配合谷治瘿气。

[刺灸法] 直刺0.5~0.8寸。

18. 扶突 LI18 Fútū

[定位] 在颈外侧部，喉结旁，当胸锁乳突肌前、后缘之间。

[主治] 咳嗽、气喘、咽喉肿痛、暴喑、瘰疬、瘿气、臂痛麻木。

[配伍] 配合谷治瘿气。

[刺灸法] 直刺0.5~0.8寸。

19. 口禾髎 LI19 Kǒuhéliáo

[定位] 在上唇部，鼻孔外缘直下，平水沟穴。

[主治] 鼻塞、鼽衄、口喎、口噤。

[刺灸法] 直刺或斜刺0.3~0.5寸。

20. 迎香 LI20 Yíngxiāng, 手、足阳明经交会穴

[定位] 在鼻翼外缘中点旁，当鼻唇沟中间。

[主治] 鼻塞、鼽衄、口喎、面痛、胆道蛔虫症。

[刺灸法] 向内上斜刺或平刺0.3~0.5寸，不宜灸。

第三章 足阳明胃经经络循行及穴位

原文：胃足阳明之脉，起于鼻，交頞中，旁约太阳之脉，下循鼻外，入上齿中，还出挟口环唇，下交承浆，却循颐后下廉，出大迎，循頬车，上耳前，过客主人，循发际，至额頰；其支者，从大迎前下人迎，循喉咙，入缺盆，下膈，属胃，络脾；其直者，从缺盆下乳内廉，下挟脐，入气街中；其支者，起于胃口，下循腹里，下至气街中而合，以下髀关，抵伏兔，下膝髌中，下循胫外廉，下足跗，入中指内间；其支者，下廉三寸而别，下入中指外间；其支者，别跗上，入大指间，出其端。

语译：起于鼻翼两侧（迎香），上行到鼻根部，与旁侧足太阳经交会，向下沿着鼻的外侧（承泣），进入上齿龈内，回出环绕口唇，向下交会于颏唇沟承浆（任脉）处，再向后沿着腮部后下方，出于下颌大迎处，沿着下颌角頬车，上行耳前，经过上关（足少阳经），沿着发际，到达前额（神庭）。

面部支脉：从大迎前下走人迎，沿着喉咙，进入缺盆部，向下通过横膈，属于胃，联络脾脏。

缺盆部直行支脉：经乳头，向下挟脐旁，进入少腹两侧气冲。

胃下口部支脉：沿着腹里向下到气冲会合，再由此下行至髀关，直抵伏兔部，下至膝盖，沿着胫骨外侧前缘，下经足跗，进入第2足趾外侧端（厉兑）。

胫部支脉：从膝下3寸（足三里）处分出，进入足中趾外侧端。

足跗部支脉：从跗上（冲阳）分出，进入足大趾内侧端（隐白），与足太阴脾经相接。

主要病候：肠鸣腹胀、水肿、胃痛、呕吐或消谷善饥、口渴、咽喉肿痛、鼻衄、胸及膝盖等本经循行部位疼痛、热病、发狂等症。

主治概要：本经腧穴主治胃肠病和头面、目、鼻、口齿部病证和神志病，以及经脉循行部位的其他病证。

1. 承泣 ST1 Chéngqì, 足阳明经、阳跷、任脉交会穴

[定位] 在面部，瞳孔直下，当眼球与眶下缘之间。

[主治] 目赤肿痛、流泪、夜盲、眼睑瞤动、口喎。

[配伍] 配太阳治目赤肿痛，配阳白治口喎。

[刺灸法] 患者闭目，以左手拇指向上轻推眼球，紧靠眶缘缓慢向上斜刺0.5~1.5寸，不提插、不捻转、不留针，出针时按压针孔1~2分钟，以防刺破血管引起血肿。

[附注] 眼眶内穴位刺法均为患者闭目，以押手拇指将眼球轻推向对侧，紧靠眶内缘缓慢向中心方向斜刺0.5~1.5寸，不提插、不捻转、不留针，出针时按压针孔1~2分钟，以防刺破血管引起血肿。


2. 四白 ST2 Sìbái

[定位] 在面部，瞳孔直下，当眶下孔凹陷处。

[主治] 目赤痛痒、目翳、眼睑瞤动、口喎、头痛、眩晕。

[配伍] 配阳白、地仓、颊车、合谷治口喎；配攒竹治眼睑瞤动。

[刺灸法] 向上斜刺0.3~0.5寸，不可深刺；或向其他穴位透刺。



3. 巨髎 ST3 Jùliáo, 足阳明胃经、阳跷脉交会穴

[定位] 在面部，端坐正视，瞳孔直下，平鼻翼下缘处，当鼻唇沟外侧。

[主治] 口喎、眼睑瞤动、鼻衄、齿痛、唇颊肿。

[配伍] 配谷治齿痛；配地仓、颊车治口喎。

[刺灸法] 斜刺或直刺 0.3~0.5 寸；直刺 2 寸治疗上牙痛、三叉神经痛。

4. 地仓 ST4 Dicāng, 手足阳明经、阳跷脉交会穴

[定位] 在面部，口角外侧 4 分，上直对瞳孔。

[主治] 口喎、流涎、眼睑瞤动。

[配伍] 配颊车、合谷治口喎、流涎；透颊车治口喎。

[刺灸法] 斜刺或平刺 0.5~0.8 寸。


5. 大迎 ST5 Dàiyíng

[定位] 在下颌角前方，咬肌附着部前缘，当面动脉搏动处。

[主治] 口喎、口噤、颊肿、齿痛。

[配伍] 配颊车治齿痛。

[刺灸法] 避开动脉，斜刺或平刺 0.3~0.5 寸。



6. 颊车 ST6 Jiáché

[定位] 在面部颊部，下颌角前上方约 1 横指（中指），当咀嚼时咬肌隆起，按之中央凹陷处。

[主治] 口喎、齿痛、颊肿、口噤不语。

[配伍] 配地仓治口喎。

[刺灸法] 其下有面神经，直刺 0.3~0.5 寸，平刺 0.5~1.0 寸。

7. 下关 ST7 Xiàguān, 足阳明、足少阳经交会穴

[定位] 在面部耳前方，当颧弓与下颌切迹所形成的凹陷中，闭口取穴。

[主治] 齿痛、口噤、耳聋、耳鸣、聤耳、口眼喎斜。

[配伍] 配翳风治耳疾；配合谷治牙痛、口噤不开。

[刺灸法] 直刺 0.5~1.0 寸。

8. 头维 ST8 Tóuwéi, 足阳明、足少阳经与阳维脉交会穴

[定位] 在头侧部，当额角入发际 0.5 寸，头正中线旁开 4.5 寸。

[主治] 头痛、目眩、流泪、眼睑瞤动。

[配伍] 配内庭治头痛；配太冲治目眩。

[刺灸法] 平刺 0.5~1.0 寸，不可灸。

9. 人迎 ST9 Rénying, 足阳明、足少阳经交会穴

[定位] 在颈部，喉结旁，当胸锁乳突肌的前缘，颈总动脉搏动处。

[主治] 咽喉肿痛、气喘、瘰疬、瘿气、高血压。

[配伍] 配大椎、太冲治高血压。

[刺灸法] 避开颈总动脉，直刺 0.3~0.8 寸，不可灸。

[附注] 穴下有甲状腺上动脉；当颈内、外动脉分歧处，有颈前浅静脉，外为颈内静脉；布有颈皮神经，面神经颈支，深层颈动脉球，最深层为交感神经干，外侧有舌下神经降支及迷走神经。


10. 水突 ST10 Shuǐtū

[定位] 在颈部，横平环状软骨胸锁乳突肌的前缘。

[主治] 咽喉肿痛、咳嗽、气喘、瘿气。

[配伍] 配天突治咳嗽、气喘。

[刺灸法] 直刺 0.3~0.8 寸。

**11. 气舍 ST11 Qishé**

[定位] 在颈部，当锁骨内侧端的上缘，胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间。

[主治] 咽喉肿病、气喘、呃逆、癰瘤、瘰疬、颈项强。

[配伍] 配水突治癰瘤。

[刺灸法] 直刺 0.3~0.5 寸，深部为颈总动脉。

[附注] 本经气舍至乳根诸穴，深部有大动脉及肺、肝等重要脏器，不可深刺。

12. 缺盆 ST12 Quēpén

[定位] 在锁骨上窝中央，距前正中线 4 寸。

[主治] 咳嗽、气喘、咽喉肿痛、缺盆中痛、瘰疬。

[配伍] 配肺俞治咳嗽。

[刺灸法] 直刺或斜刺 0.3~0.5 寸。

13. 气户 ST13 Qièhù

[定位] 在胸部，当锁骨中点下缘，距前正中线 4 寸。

[主治] 咳嗽、气喘、呃逆、胸胁支满、胸痛。

[配伍] 配肺俞治咳喘。

[刺灸法] 斜刺或平刺 0.5~0.8 寸。

14. 库房 ST14 Kùfáng

[定位] 在胸部，当第 1 肋间隙，距前正中线 4 寸。

[主治] 咳嗽、气喘、咳唾脓血、胸胁胀痛。

[配伍] 配屋翳治胸胁胀痛。

[刺灸法] 斜刺或平刺 0.5~0.8 寸。

15. 屋翳 ST15 Wūyì

[定位] 在胸部，当第 2 肋间隙，距前正中线 4 寸。

[主治] 咳嗽、气喘、咳唾脓血、胸胁胀痛、乳痈。

[配伍] 配天宗治乳痈。

[刺灸法] 斜刺或平刺 0.5~0.8 寸。

16. 膀胱 ST16 Yǐngchuāng

[定位] 在胸部，当第 3 肋间隙，距前正中线 4 寸。

[主治] 咳嗽、气喘、胸胁胀痛、乳痈。

[配伍] 配屋翳治乳痈。

[刺灸法] 斜刺或平刺 0.5~0.8 寸。

17. 乳中 ST17 Rǔzhōng

[定位] 在胸部，男性平卧当第4肋间隙，乳头中央，距前正中线4寸。

[附注] 本穴不针不灸，只作胸腹部腧穴的定位标志。

18. 乳根 ST18 Rǔgēn

[定位] 在胸部，当乳头直下，乳房根部，当第5肋间隙，距前正中线4寸。

[主治] 咳嗽、气喘、呃逆、胸痛、乳痛、乳汁少。

[配伍] 配少泽、膻中治乳痛；配少泽、足三里治乳少。

[刺灸法] 斜刺或平刺0.5~0.8寸。

19. 不容 ST19 Bùróng

[定位] 在上腹部，当脐中上6寸，距前正中线2寸。

[主治] 呕吐、胃病、食欲不振、腹胀。

[配伍] 配中脘治胃病。

[刺灸法] 直刺0.5~0.8寸。

20. 承满 ST20 Chéngmǎn

[定位] 在上腹部，当脐中上5寸，距前正中线2寸。

[主治] 胃痛、吐血、食欲不振、腹胀。

[配伍] 配足三里治胃痛。

[刺灸法] 直刺0.8~1.0寸。

21. 梁门 ST21 Liángmén

[定位] 在上腹部，当脐中上4寸，距前正中线2寸。

[主治] 胃痛、呕吐、食欲不振、腹胀、泄泻。

[配伍] 配梁丘、中脘、足三里治胃痛，配足三里治消化不良。

[刺灸法] 直刺0.8~1.2寸。

22. 关门 ST22 Guānmén

[定位] 在上腹部，当脐中上3寸，距前正中线2寸。

[主治] 腹胀、腹痛、肠鸣泄泻、水肿。

[配伍] 配足三里、水分治肠鸣腹泻。

[刺灸法] 直刺0.8~1.2寸。

23. 太乙 ST23 Tàiyǐ

[定位] 在上腹部，当脐中上2寸，距前正中线2寸。

[主治] 胃病、心烦、癫痫。

[配伍] 配中脘治胃痛。

[刺灸法] 直刺0.8~1.2寸。

24. 滑肉门 ST24 Huáròumén

[定位] 在上腹部，当脐中上1寸，距前正中线2寸。

[主治] 胃痛、呕吐、癫痫。

[配伍] 配足三里治胃痛。

[刺灸法] 直刺0.8~1.2寸。

25. 天枢 ST25 Tiānshū, 大肠募穴

[定位] 在腹中部，平脐中，距脐中2寸。

[主治] 腹胀肠鸣、绕脐痛、便秘、泄泻、痢疾、月经不调。

[配伍] 配足三里治腹胀肠鸣；配气海治绕脐痛；配上巨虚、下巨虚治便秘、泄泻；配大横、丰隆、阴陵泉治肥胖。

[刺灸法] 直刺1.0~1.5寸。

26. 外陵 ST26 Wàilíng

[定位] 在下腹部，当脐中下1寸，距前正中线2寸。

[主治] 腹痛、疝气、痛经。

[配伍] 配子宫、三阴交治痛经。

[刺灸法] 直刺1.0~1.5寸。

27. 大巨 ST27 Dàjù

[定位] 在下腹部，当脐中下2寸，距前正中线2寸。

[主治] 小腹胀满、小便不利、痛经、不孕、疝气、遗精、早泄。

[配伍] 配三阴交、中极治痛经、不孕。

[刺灸法] 直刺1.0~1.5寸。

28. 水道 ST28 Shuǐdào

[定位] 在下腹部，当脐中下3寸，距前正中线2寸。

[主治] 小腹胀满、小便不利、痛经、不孕、疝气。

[配伍] 配中极、次髎治小便不利。

[刺灸法] 直刺1.0~1.5寸。

29. 归来 ST29 Guīlái

[定位] 在下腹部，当脐中下4寸，距前正中线2寸。

[主治] 腹痛、疝气、月经不调、白带、阴挺。

[配伍] 配大敦治疝气；配三阴交、中极治月经不调。

[刺灸法] 直刺1.0~1.5寸。

30. 气冲 ST30 Qìchōng

[定位] 在腹股沟稍上方，当脐中下5寸，距前正中线2寸。

[主治] 肠鸣腹痛、疝气、月经不调、不孕、阳痿、阴肿。

[配伍] 配气海治肠鸣腹痛。

[刺灸法] 直刺0.5~1.0寸。

31. 脾关 ST31 Bìguān

[定位] 在股前区，股直肌近端，缝匠肌与阔筋膜张肌3条肌肉之间的凹陷处。

[主治] 腰痛膝冷、痿痹、腹痛。

[配伍] 配伏兔治痿痹。

[刺灸法] 直刺1~2寸。

32. 伏兔 ST32 Fútù

[定位] 在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上6寸。

[主治] 腰痛膝冷、下肢麻痹、疝气。

[配伍] 配髀关、阳陵泉治下肢痿痹。

[刺灸法] 直刺1~2寸。

33. 阴市 ST33 Yīnshì

[定位] 在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上3寸。

[主治] 腿膝痿痹、疝气、腹胀腹痛。

[配伍] 配足三里、阳陵泉治腿膝痿痹。

[刺灸法] 直刺1.0~1.5寸。