MENSTRUATION
UND INNERE MEDIZIN

VON

FRIEDRICH-HORST SCHULZ

UNTER MITARBEIT VON

H. ANGBLOCH

VERGEGENWÄRTIGT VON GEORGT HIERME · LEIPZIG

MENSTRUATION UND INNERE MEDIZIN

VON

DOZENT DR. MED. HABIL.
FRIEDRICH-HORST SCHULZ

OBERARZT
DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄTSKLINIK LEIPZIG

UNTER MITARBEIT VON

DR. MED. H. KNOBLOCH

WISS. ASSISTENT
DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄTSKLINIK LEIPZIG

MIT 122 ABBILDUNGEN UND 24 TABELLEN

19 54

VEB GEORG THIEME • LEIPZIG

Alle Rechte vorbehalten
Copyright 1954 by VEB Georg Thieme, Leipzig
Veröffentlicht unter der Lizenz-Nr. 211/G-Nr. 490/1/53
des Amtes für Literatur und Verlagswesen der Deutschen Demokratischen Republik
Auftragsnummer des Verlages Nr. 52

Printed in Germany
Druck: (H 1) VEB Druckerei der Werktätigen, Halle (Saale)

Unserem Lehrer
Prof. Dr. med. MAX BÜRGER
Direktor der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig
in Dankbarkeit und Verehrung

Vorwort

Diese Monographie verfolgt den Zweck, die mannigfachen Beziehungen zwischen menstruellem Zyklus und inneren Krankheiten aufzuzeigen. Bei den täglichen Visiten auf den Frauenstationen unserer Klinik ergaben sich regelmäßig Fragestellungen, die auf eine menstruelle Beeinflussung der Symptomatik und des Ablaufs innerer Krankheiten hinwiesen. Herr Professor Dr. Bürger, der Direktor der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig, regte vor Jahren die Bearbeitung dieser gegenseitigen Beziehungen an. Wir möchten ihm an dieser Stelle für seine richtungweisenden Anregungen unseren ergebensten Dank aussprechen.

Es war uns von vornherein klar, daß diese Zusammenstellung nur in Zusammenarbeit eines Internisten mit einem Gynäkologen entstehen konnte, da ja letzten Endes eine genaue Besprechung des aufgezeigten Gebietes Fachkenntnisse von beiden medizinischen Fachgebieten verlangt. Wir danken Herrn Dozent Oberarzt Dr. Kyank von der Universitäts-Frauenklinik Leipzig für seine stete Hilfsbereitschaft und Beratung.

Als Grundlage dieser Monographie wurden neben zahlreichen im Schrifttum bisher niedergelegten Ergebnissen vorwiegend eigene klinische Beobachtungen herangezogen, die an dem großen Krankenmaterial der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig zahlreichst zu verzeichnen waren. Das Inhaltsverzeichnis des Buches gibt unsere Bemühungen wieder, das große Gebiet der gegenseitigen Wechselbeziehungen einigermaßen übersichtlich darzustellen und sie damit sowohl dem klinisch tätigen, als auch dem praktischen Arzt übersichtlich nahezubringen.

Wir wissen, daß diese Mitteilungen noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können, zumal uns ein Teil des Schrifttums nur in Referatform zur Verfügung stand. Es wird deshalb die Bitte ausgesprochen, uns mit helfender Kritik und mit Überlassung von Krankenbeobachtungen und weiteren Untersuchungsergebnissen bei der Vervollständigung der Fragestellung „Menstruation und innere Medizin“ zu helfen. Die bisher mitgeteilten Befunde erscheinen aber bereits ausreichend, um die Wichtigkeit dieser Beziehungen zum Nutzen des Arztes und vor allem zum Wohle unserer Patientinnen zu erkennen.

Alle Abbildungen und Tafeln wurden von Herrn W. Gieseke, Leipzig, gezeichnet, dem wir für die hervorragende Ausführung unseren besten Dank aussprechen. Die Fotografien wurden von Herrn Frenkel angefertigt. Wir danken besonders Fr. Krause für die mühevollen Anfertigung des Manuskriptes und vielen Mitarbeitern unserer Klinik, die uns mit Einzelbeobachtungen unterstützten.

Dem VEB Georg Thieme, Leipzig, gebührt unser Dank für die großzügige und schöne Zusammenarbeit bei der Drucklegung des Buches.

Leipzig, Dezember 1953

F. H. Schulz
H. Knobloch

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	VII
I. Teil	1
Menstruation und Menstrualblut	1
A. Physiologie und Pathologie der Menstruation	1
1. Die Ovarialfunktion bis zur Pubertät	1
2. Die Menarche	2
3. Der normale Zyklus	4
4. Der gestörte Zyklus	7
B. Die Zusammensetzung des Menstrualblutes	9
II. Teil	11
Der Einfluß der Adrenarche, Menarche, der Menstruation und des Klimakteriums auf die einzelnen Organsysteme und ihre Funktionszentren	11
A. Die menstruellen Veränderungen des Blutes und seiner Bestandteile	11
1. Zelluläre Bestandteile	11
a) Erythrozytenzahl, Hämoglobin, Hämatokrit	11
b) Leukozyten	16
c) Thrombozyten	19
d) Knochenmark	21
2. Das Plasma und seine Bestandteile.	21
a) Bluteiweiße	21
b) Fette, Cholesterin	25
c) Kohlenhydrate	25
d) Ketonkörper	27
e) Kalium, Calcium, Natrium	28
f) Arsen	32
g) Brom	32
h) Eisen	32
i) Kupfer	33
k) Magnesium	34
3. Gerinnungs- und Blutstillungszeiten	34
a) Reaktionszeiten	34
b) Prothrombinzeiten	35
c) Retraktionsvermögen	35
d) Blutungszeiten	35
e) Transfusionsversuche	36
4. Weitere Blutuntersuchungen	36
a) Blutkörperchensenkung	36
b) Resistenzbestimmung	38
c) Menotoxine	38
d) Vitamine	39
e) Fibrinolytisches Ferment	40
f) Weitere zyklische Veränderungen des Fermentsystems	41

	Seite
B. Die menstruellen Veränderungen der Herzfunktion und der Blutgefäße . . .	42
1. Herzfunktion	42
a) Schlagfolge	42
b) Blutdruck	43
c) Elektrokardiogramm	43
d) Schlagvolumen	52
2. Gefäße	55
a) Spannungs- und Füllungszustand	55
b) Gefäßdurchlässigkeit	56
c) Vasomotorische Reaktionsbereitschaft	58
d) Akrale Hautdurchblutung	58
3. Retikuloendotheliales System (RES)	59
a) Farbstoffspeicherung	59
C. Die menstruellen Veränderungen am Respirationssystem	60
1. Obere Luftwege	60
2. Lungen	61
a) Atemfrequenz	61
b) Vitalkapazität	62
D. Der Einfluß des menstruellen Zyklus auf die innersekretorischen Drüsen . . .	62
1. Schilddrüse	62
a) Größenveränderungen	62
b) Grundumsatz	64
c) Jodspiegel	68
2. Nebenschilddrüsen	68
a) Calcium (II A 2 e)	68
3. Pankreas	69
4. Nebennieren	70
a) Nebennierenrinde	70
b) Nebennierenmark	73
5. Thymus	73
6. Hypophyse	74
E. Stoffwechsel, Ernährung und Menstruation	75
1. Appetitveränderungen	75
2. N-Stoffwechsel	75
3. S-Stoffwechsel	76
4. Kreatin-Stoffwechsel	77
5. Spezifisch-dynamische Wirkung	77
6. Wärmeregulation	78
F. Wasserhaushalt, Nieren und Harnwege im menstruellen Zyklus	81
1. Wasserhaushalt	81
2. Blase, Harnleiter, Nierenbecken	82
3. Nierenfunktion	83
a) Urinmenge, Konzentrationsvermögen, Harnfarbe	83
b) Oberflächenspannung	84

Inhaltsverzeichnis

	XI Seite
G. Verdauungstrakt und menstrueller Zyklus	84
1. Mundhöhle	84
a) Schleimhaut	84
b) Speichelproduktion	87
2. Magen	87
a) Magenmotilität.	88
b) Magensaftproduktion	88
3. Darmfunktion	89
4. Leber	90
H. Muskulatur und Menstruation	91
1. Muskelkraft	91
2. Rheobase, Chronaxie, galvanische Erregbarkeit	94
3. Muskelinnendruck	94
I. Neurologische und psychische Veränderungen im menstruellen Zyklus	94
1. Veränderungen an den Sinnesorganen	94
2. Liquorveränderungen	96
3. Vegetatives Nervensystem	97
4. Prämenstruelle Dystonie	98
5. Psychische Veränderungen	99
K. Schleimhäute, Haut und Menstruation.	100
1. Schleimhäute und Haut	100
a) Herpes labialis	100
b) Andere Hautveränderungen	101
2. Fingernägel und Haare	108
L. Skelett und Sexualhormone	109
M. Vikariierende bzw. komplementäre Menstruation	109
N. Zusammenfassung	110
III. Teil	113
Die normale Adrenarchie, Menarche, Menstruation und das Klimakterium und ihre Einwirkungen auf innere Krankheiten	113
A. Geschlecht und Krankheit	113
1. Sexualquotient und Geschlechtswendigkeit	113
a) Infektionskrankheiten	114
b) Herz- und Kreislauferkrankungen	114
c) Erkrankungen der Atmungsorgane	114
d) Erkrankungen des Verdauungsapparates	115
e) Krankheiten der Nieren und Harnwege	115
f) Endokrine Krankheiten	115
g) Krankheiten des Blutes	116
B. Krankheiten des Blutes	117
1. Perniziöse Anämie	117
2. Hämolytischer Ikterus	117
3. Chronische Leukämien	118
4. Akute Leukämien.	119

	Seite
C. Hämorrhagische Diathesen	119
1. Plasmatische hämorrhagische Diathesen	119
2. Vaskuläre hämorrhagische Diathese	120
3. Zelluläre hämorrhagische Diathese	120
D. Krankheiten des Herzens und der Blutgefäße	122
1. Klappenfehler und Myokardschaden	122
2. Hochdruckkrankheit	124
3. Gefäßkrankheiten	126
4. Thrombose und Embolie	128
E. Erkrankungen der Atmungsorgane	129
F. Krankheiten der Verdauungswege	131
1. Gastritis, Ulcus ventriculi et duodeni, Ulkusblutung	131
2. Darmerkrankungen	133
G. Krankheiten der Leber und Gallenwege	134
H. Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion	136
1. Schilddrüsenüberfunktion	136
2. Myxödem	138
3. Tetanie	139
4. Diabetes	142
5. Endokrine Fettsucht	147
a) Pubertätsfettsucht	150
b) Postpartuale Fettsucht	151
c) Menopausische Fettsucht	151
d) Morbus Cushing	154
e) Hirsutismus	154
f) Hypogenitale Fettsuchtstypen	155
I. Krankheiten der Nieren und Geschlechtsorgane	158
K. Infektionskrankheiten	159
1. Bakterizidie des Blutes	159
2. Bakteriämie	161
3. Scharlach und Diphtherie	162
4. Grippe	164
5. Weitere Infektionskrankheiten	164
6. Tuberkulose	166
L. Erkrankungen des Bewegungsapparates	168
1. Periarthritis destruens	168
2. Andere Gelenk- und Knochenkrankungen	174
M. Erkrankungen des Zentralnervensystems	175
1. Epilepsie	175
2. Multiple Sklerose	177
3. Andere Erkrankungen des Zentralnervensystems	177

N. Fehldiagnosen, die sich aus den Wechselbeziehungen zwischen menstruellem Zyklus und innerer Medizin ergeben können	178
O. Innere Krankheiten und ihre Einwirkungen auf die Menstruation	178
P. Das Klimakterium und seine Beziehungen zu inneren Krankheiten	186
1. Krebs und Klimakterium	186
2. Menstrueller Krankheitsrhythmus im Klimakterium	187
IV. Teil	189
Die Beeinflussung des Zyklus durch Arzneimittel und die interne Therapie mit weiblichen Sexualhormonen	189
A. Der Einfluß von Arzneimitteln auf die Menstruation	189
B. Die Therapie mit weiblichen Sexualhormonen in der inneren Medizin	190
1. Erkrankungen der Gefäße	194
2. Erkrankungen des Magen-Darm-Kanals	196
3. Blutkrankheiten	197
4. Endokrine Störungen	198
a) Hyperthyreosen	198
b) Erkrankungen der Hypophyse	198
c) Diabetes mellitus	199
d) Fett- und Magersucht	200
e) Endokrin bedingte Ödeme	200
5. Erkrankungen des Respirations-Traktus	201
6. Erkrankungen der Gelenke und Knochen	201
7. Gutartige und bösartige Neubildungen	202
a) Prostatahypertrophie	202
b) Prostatakarzinom	204
c) Mammakarzinom	205
d) Hormontherapie anderer maligner Tumoren	206
8. Gefahren der Therapie mit weiblichen Sexualhormonen	207
Namenverzeichnis	209
Sachverzeichnis	215

I. Teil

Menstruation und Menstrualblut

A. Physiologie und Pathologie der Menstruation

Wenn die Beziehungen zwischen Menstruation und innerer Medizin aufgezeigt werden sollen, so erscheint eine kurze Beschreibung der physiologischen und wichtigsten pathologischen Menstruationsvorgänge eingangs unbedingt erforderlich. Es soll aber nur so weit geschehen, als es den Bedürfnissen des Internisten entspricht. Wir halten uns im wesentlichen an die Monographien von Schröder¹, der unser klinischer Lehrer war, sowie von Runge², Tietze³, Wenner⁴ und Zondek⁵.

1. DIE OVARIALFUNKTION BIS ZUR PUBERTÄT

Am kindlichen Ovar finden sich in den Rindenpartien des Ovars in einer Anzahl bis zu 400000 die sog. Primordialfollikel, die nach dem 1. Lebensjahr durch Keim- und Plasmazerfall ständig an Zahl abnehmen. Die Neubildung von Eizellen im extrauterinen Leben wird neuerdings angenommen, ist aber noch nicht sicher bewiesen. In tieferen Schichten des Ovars findet man die wachsenden Follikel, die in den ersten 10 Lebensjahren in die oberflächlichen Partien des Ovars vordringen. Von den ungefähr 400000 wachsenden Follikeln reifen aber zur Zeit der Geschlechtsreife nur etwa 300—400 aus.

Schon vom 3.—4. Lebensjahr an werden geringe Mengen von östrogenen Hormonen gebildet, die zusammen mit den androgenen Hormonen, deren Bildung in der Nebennierenrinde erfolgt, im Harn ausgeschieden werden. Es kann nach Zondek heute als feststehend gelten, daß die Granulosazellen des wachsenden Follikels und wahrscheinlich auch ein Teil der Thecazellen das Östrogen und die Corpora-lutea-Zellen das Progesteron produzieren.

In der folgenden Kurve, die wir nach einer Zeichnung der Monographie von Hoffmann⁶ angefertigt haben, ist die mittlere Tagesausscheidung der östrogenen und androgenen Hormone bei Mädchen bis zur Pubertät zu erkennen.

¹ Schröder: in Veit-Stöckel, Handbuch der Gynäkologie, München 1928.

² Runge: Blutung und Fluor. Dresden und Leipzig 1952.

³ Tietze: in Seitz-Amreich, Biologie und Pathologie des Weibes, Berlin und Wien 1944.

⁴ Wenner: Grundriß der gynäkologischen Endokrinologie. Basel 1952.

⁵ Zondek: Die Krankheiten der endokrinen Drüsen. Basel 1953.

⁶ Hoffmann: Die Sexualhormontherapie in der Gynäkologie. Leipzig 1953.

In der Zeit zwischen dem 8.—9. und 13. Lebensjahr, der sog. Adrenarchie nach Albright¹, kommt es zu einer Zunahme der wachsenden Follikel, die eine Größe von durchschnittlich 5 mm erreichen. Das bedingt, wie Abb. 1 zeigt, ein

Abb. 1. Mittlere Tagesausscheidung der östrogenen und androgenen Hormone bei Mädchen (nach Hoffmann)

Geschlecht im umgekehrten Sinn ungefähr 1—2 Jahre später einsetzt, kann das 10fache der im 8.—10. Lebensjahr ausgeschiedenen Mengen betragen. Hoffmann spricht davon, daß die sexuelle Differenzierung mehr ein quantitatives als qualitatives Problem ist.

2. DIE MENARCHE

Unter Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale und einer Zunahme des Wachstums der Genitalorgane spielen sich auch zur Zeit der Pubertät an anderen innersekretorischen Organen wichtige Veränderungen ab. Wir werden in den entsprechenden Abschnitten dieses Buches auf die einzelnen Wachstumskurven noch einzugehen haben. In der folgenden Abbildung, die die Altersgewichtszunahme von Ovarien, Hoden, Nebennieren, Schilddrüse und Hypophyse (nach Rössle und Roulet³) zeigt, erkennt man, daß vor allem die Hypophyse zur Zeit der Adrenarchie einen steilen Gewichtsanstieg zeigt. Man erkennt diesen Gewichtsanstieg auch an der schnellen Zunahme der Größe des Sellaprofiles während der Pubertät (Bergerhoff und Höbner⁴).

Wir können uns auf Grund der Wägekuren von Rössle und Roulet (nach Bürger⁵) der Meinung Hoffmanns nicht vollständig anschließen, daß die Schild-

¹ Albright: Ann. int. Med. 27, 861 (1949).

² Hoffmann: Die Sexualhormontherapie in der Gynäkologie. Leipzig 1953.

³ Rössle und Roulet: Maß und Zahl in der Pathologie. Berlin 1932.

⁴ Bergerhoff und Höbner: Fshr. Röntgenstr. 78, 190 (1952).

⁵ Bürger: Altern u. Krankheit. Leipzig 1954.

starkes Ansteigen der Urinausscheidung an östrogenem Hormon. In die gleiche Lebensphase fällt auch eine ausgesprochene Differenzierung der Nebennierenrinde, die sich in einer ansteigenden 17-Ketosteroidausscheidung äußert. Nach dem 12. Lebensjahr erkennt man auch die ersten zyklisch verlaufenden Ausscheidungsschwankungen, wie sie auch ähnlich nach dem Aufhören des Regelzyklus auftreten können.

Es ist bekannt, daß außer in der Nebennierenrinde auch im Ovar physiologischerweise männliche Hormone produziert werden. Nach Hoffmann² steigt auch die Ausscheidung dieser androgenen Hormone an, ohne daß es dabei zu zyklischen Veränderungen kommt. Die Zunahme der östrogenen Hormonausscheidung, die beim männlichen

drüse ein ähnlich gleichmäßiges Wachstum wie die Nebenniere zeigt. Man weiß heute, daß es vor allem die Hypophyse, d. h. der Hypophysenvorderlappen, ist, der durch seine funktionelle Höchstleistung zur Zeit der Menarche auch wachstumsmäßig einen deutlichen Schub in der Adrenarche erfährt.

Die Lebenskurve der Ausscheidung von östrogenen und androgenen Hormonen zeigt für die letzteren einen Pubertäts- und wie später noch zu erörtern ist, auch einen ausgeprägten Klimakteriumsgipfel.

Abb. 2. Altersgewichtskurven von Ovarien, Hoden, Nebennieren, Schilddrüse und Hypophyse auf der Grundlage der Zahlen von Rössle und Roulet gez. (Hypophyse in Zentigramm, übrige Organe in Gramm) (nach Bürger)

In Mitteldeutschland kommt es nach den Untersuchungen von Warnatz¹ im Alter von 13,66 Jahren bei einer Streuung von $\pm 1,47$ Jahren mit dem Auftreten der ersten Blutung zur Menarche. Segelken² hat 1937 für einige europäische Länder das mittlere Menarchealter errechnet.

In seiner Tabelle erkennt man, daß 1. für einzelne Länder deutliche Unterschiede bestehen und 2. das mittlere Menarchealter in immer frühere Altersstufen vorrückt. Man hat diese Akzeleration durch verbesserte hygienische Bedingungen, erhöhte sportliche Betätigung u. a. zu erklären versucht (Näheres s. bei Hoffmann).

Über das Menarchealter in Finnland hat Simell³ bei 3075 Frauen und Mäd-

Abb. 3. Lebenskurve der Ausscheidung von östrogenen (in M. E.) und androgenen Hormonen (in R. E.). (Mittelwerte der Tagesausscheidung bei 360 Frauen) (nach Pedersen-Bjergaard und Tonessu⁴)

¹ Warnatz: Inaug.-Diss. Leipzig 1949.

² Segelken: Inaug.-Diss. Göttingen 1937.

³ Simell: Acta paed. Scand. 41, Suppl. 84, 1952.

⁴ Pedersen-Bjergaard und Tonessu: Acta endocrin. 1, 38, (1948).

chen, die zwischen den Jahren 1923 und 1933 geboren wurden, genaue Erhebungen angestellt. 1882 betrug das mittlere Menarchealter 16,62 Jahre, 1950 dagegen $14,25 \pm 0,05$ Jahre. Die Kriegsjahre 1939—1944 scheinen nach ihren Untersuchungen keinen retardierenden Einfluß gehabt zu haben. Bei Töchtern Geistes-schaffender trat die Menarche zeitiger (14,03 Jahre) als bei körperlich Arbeitenden (14,39 Jahre) auf. Bei den Mädchen, die in der Stadt wohnen, trat die erste Regelblutung ebenfalls zeitiger auf, als bei Mädchen, die in ländlichen Bezirken beheimatet waren.

Tabelle 1

Mittleres Menarchealter in verschiedenen europäischen Ländern (nach Segelken¹)

	Vor 1900	Nach 1900
Dänemark, Holland	16,5 Jahre	13—14 Jahre
Deutschland	16,0 „	14—15 „
England	15,0 „	14 „
Frankreich	14,6 „	14 „
Italien	14,8 „	13—14 „
Spanien	14,2 „	12 „

Neuerdings berichtet Seckel², daß auf dem amerikanischen Kontinent die Sexualentwicklung sich um etwa 2 Jahre früher einzustellen pflegt als in anderen Erdteilen. Bei Mädchen über 7 Jahren sollte deshalb die Diagnose einer Pubertas praecox nicht voreilig gestellt werden. Besonders wichtig erscheint seine Mitteilung, daß es vor allem zu einer vorzeitigen Entwicklung isolierter Sexualmerkmale kommen kann. Es werden vor allem Fälle von ein- oder beidseitiger Entwicklung der Brüste, vorzeitiger Entwicklung der Achsel- und Schambehaarung beschrieben.

Im Gefolge dieser beschleunigten Sexualentwicklung ist es in den Vereinigten Staaten nach den Angaben von Vigman³ zu einer Zunahme der Promiskuität und der unehelichen Geburten gekommen. Der Streit, ob diese verfrüht eintretende Pubertät als Folge von Hypophysen- und Keimdrüsenveränderungen anzusehen ist oder nur soziale Faktoren diese Entwicklung begünstigen, ist eigentlich kein Streit. Wir wissen, daß die Umwelt maßgeblich den Menschen gerade während seiner Entwicklungsjahre beeinflussen kann. Daß das junge Mädchen von heute zunehmend keine Kindheit mehr hat und z. B. dieselben Romane, Magazine, Filme und Radioprogramme wie die Erwachsenen erlebt, ist wohl in vielen Ländern eine feststehende Tatsache.

Nach Kaufmann⁴ kommt es bei Spätmenstruierenden häufiger zu funktionellen Ovarialstörungen, die, wie wir später sehen werden, auch Beziehungen zu inneren Krankheiten zeigen.

3. DER NORMALE ZYKLUS

Über die anatomischen Veränderungen an den Genitalorganen einer geschlechtsreifen Frau im zyklischen Menstruationsgeschehen soll hier nicht näher berichtet werden. Die schematische Darstellung von Schröder⁵ hat wohl heute in der ge-

¹ Segelken: Inaug.-Diss. Göttingen 1937.

² Seckel: Ann. paediatr. (Basel) 176, 361 (1951).

³ Vigman: Internat. J. Sexolog. 6, 89, (1952).

⁴ Kaufmann: Klin. Wschr. 29, 72 (1951).

⁵ Schröder: in Veit-Stoeckel: Handbuch der Gynäkologie, München 1928.

santen Welt Eingang gefunden. Sie zeigt wohl am besten die regelmäßig wiederkehrenden Veränderungen an der Uterusschleimhaut.

Die grundlegenden Forschungen Schröders gelten nach wie vor als Basis in der Erklärung des gesamten menstruellen Geschehens. Hinzugekommen sind neuerdings Untersuchungen über das Verhalten der Gefäße im Endometrium. In den sogen. Spiralarterien, die die Funktionalis versorgen, treten in den letzten Tagen vor Eintritt der Menstruation Zirkulationsstörungen auf. Sie sind die Folge einer geringen Abnahme der Schleimhautdicke im Prämenstruum und ermöglichen so eine bessere Schleimhautabstoßung (Engle¹, Kaiser² u. a.).

Abb. 4. Menstruationswandlungen im Eierstock und an der Gebärmutterwand (nach Schröder)

Näheres über diese rhythmischen Vorgänge muß bei Schröder, Runge, Zondek, Tietze u. a. nachgelesen werden.

Nach Hoffmann wird „der Ablauf des Zyklus im Sinne einer gegenseitigen Beeinflussung der Hypophysenvorderlappen- und der Ovarialfunktion durch neurohormonale Regulationsmechanismen gesteuert“.

Wir übernehmen von Hoffmann, daß „es immer dann zu einer erhöhten Bildung von Follikelreifungshormon in der Hypophyse kommt, wenn die Bildung von Follikelhormon einen Tiefpunkt erreicht hat. Dies ist vor allem der Fall, wenn im Beginn eines neuen Zyklus die Reifung des Follikels beginnt, oder wenn die Follikelreifung im natürlichen Klimakterium erlischt. Dementsprechend wird im Beginn eines jeden Zyklus im erhöhten Maße Follikelreifungshormon aus dem Vorderlappen ausgeschüttet, wie es aus der zunehmenden Ausscheidung von Follikelreifungshormon im Harn der Frau in der ersten Zyklushälfte erkennbar ist. Hierdurch erfolgt eine schnelle Reifung des Follikels. Sie ist nach experimentellen Untersuchungen über die Wirkung des reinen Follikelreifungshormons auf die Follikelreifung von hypophysektomierten Tieren gleichzeitig an die Mitwirkung kleiner Mengen von Luteinisierungshormon gebunden. Mit der zunehmenden Reifung der Follikel und der hiermit in Zusammenhang stehenden erhöhten Bildung von Follikelhormon im Ovar der Frau wird nun einerseits die Bildung von Follikelreifungshormon im Hypophysenvorderlappen gehemmt, und andererseits wird die Bildung von Luteinisierungshormon gesteigert, so daß der inzwischen zur Reifung gelangte Follikel springt und das Corpus luteum des

¹ Engle: Amer. J. Physiol. 88, 101 (1944).

² Kaiser: Anat. Rec. (Am.) 99, 353 (1947).

Zyklus sich bilden kann. Für die Auslösung der Ovulation ist es weiterhin von Bedeutung, daß das gegenseitige Mengenverhältnis von Follikelreifungshormon und von Luteinisierungshormon eine bestimmte optimale Relation erreicht hat. Im Zusammenhang mit der während der Corpus luteum-Phase zunehmenden Bildung von Corpus luteum-Hormon wird die Bildung von Luteinisierungshormon wieder abgebremst, und das Corpus luteum des Zyklus geht, wenn das Ei nicht befruchtet ist, zugrunde. Im Falle einer Befruchtung übernimmt dagegen die Placenta durch den von ihr gebildeten gonadotropen Wirkstoff die bisherige Funktion des Hypophysenvorderlappens und hält das Corpus luteum am Überleben, während der Hypophysenvorderlappen seine rhythmisch verlaufende Abgabe von Follikelreifungshormon und von Luteinisierungshormon einstellt.“

Neben diesen wechselseitigen Beziehungen zwischen Ovar und gonadotroper Vorderlappenfunktion soll auch ein weiterer wichtiger Regulationsmechanismus zwischen den beiden Keimdrüsenhormonen selbst bestehen. Er ist vor allem für die Entstehung der Corpus luteum-Phase an der Uterusschleimhaut von Bedeutung. Außerdem wird angenommen, daß diese gegenseitigen hormonellen Beziehungen unter Zwischenschaltung von nervösen Impulsen, die an das Zwischenhirn gebunden sind, verlaufen.

Einen Einblick in diese eben geschilderten hormonalen Vorgänge gibt die nachstehende schematische Abbildung von Hoffmann¹.

Abb. 5. Hormonelle Korrelationen in Zyklus und Klimakterium (nach Hoffmann)

Die Länge des normalen Menstruationszyklus schwankt ganz erheblich. Aus der folgenden Abbildung 6 von Goldzieher, Henkin und Hamblen, die wir dem Hoffmannschen Buch entnommen haben, erkennt man diese beträchtlichen Schwankungen.

Bickenbach und Hosemann² haben feststellen können, daß es mit zunehmendem Alter zu einer Verkürzung des Zyklus kommt. Ebenso kommt es am häufigsten nach dem Eintritt der Pubertät und im Präklimakterium zu Temporanomalien.

In diesen Lebensabschnitten der Frau treten bekanntlich auch anovulatorische Zyklen auf, bei denen es nicht zur Bildung eines Corpus luteum kommt.

¹ Hoffmann: Die Sexualhormontherapie in der Gynäkologie. Leipzig 1953.

² Bickenbach und Hosemann: Zbl. Gynäk. 7, 272 (1944).

Wir möchten mit Schröder und Runge feststellen, daß folgende Symptome bei einer genitalen Blutung für eine menstruelle Uterusblutung sprechen :

1. Die Blutung muß zyklisch sein.
2. Die Blutung muß spontan nach einer gewissen Zeit zum Stillstand kommen.
3. Menstruationsblut muß ungerinnbar sein.
4. Menstruationsblut darf nicht makroskopisch erkennbare Schleimhautfetzen enthalten.
5. Während der Menstruation kommt es bei der Mehrzahl der Frauen zum Auftreten von typischen objektiven Begleiterscheinungen. Dieses Unwohlsein umfaßt nach Runge¹: Kopfschmerzen, Obstipation, Magen-Darm-Spasmen, Abgeschlagenheit, Kreuzschmerzen und Steigerung der nervösen Erregbarkeit (siehe entsprechendes Kapitel).
6. Der Stoffwechsel der gesunden geschlechtsreifen und nichtschwangeren Frau ist auf die regelmäßige Wiederkehr der Menstruationsblutung eingestellt (Runge).

Abb. 6. Schwankungen der Zykluslänge bei 524 gesunden Frauen (nach Goldzieher, Henkin und Hamblen²)

4. DER GESTÖRTE ZYKLUS

Es ist im Rahmen dieser Zusammenstellung notwendig, kurz die wichtigsten Regelstörungen anzuführen. Nach Schröder wurden folgende Begriffsprägungen geschaffen, um die vielseitigen Regelstörungen in bestimmte Gruppen einordnen zu können:

1. Die Amenorrhoe
2. Die zu starke und zu lange dauernde Regelblutung
3. Tempoanomalien
 - a) Die zu häufige Regelblutung
 - b) Die zu seltene Regelblutung
4. Die zusätzliche Blutung
5. Die azyklische Blutung oder Dauerblutung.

Es ist nicht unsere Aufgabe, auf diese Krankheitsgruppen näher einzugehen. Das ist bereits von berufener Seite oft getan worden. Wir werden uns mit diesen Gruppen zu beschäftigen haben, wenn wir die Regelstörungen bei inneren Krankheiten besprechen.

¹ Runge: Blutung und Fluor. Dresden und Leipzig 1952.

² Goldzieher, Henkin und Hamblen: Am. J. Obst. u. Gyn. 54, 668 (1947).