



高级卫生专业技术资格考试

新媒体复合版

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

神经内科

副主任、主任医师资格考试

冲刺模拟卷



上海科学技术出版社

10套模拟试卷/1000道试题
紧扣考试大纲/题型全面丰富
两种版本互动/随时随地复习
自动批阅判分/汇总错题重做



神经内科副主任、主任医师 资格考试冲刺模拟卷

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

神经内科副主任、主任医师资格考试冲刺模拟卷 /
高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编. —上
海: 上海科学技术出版社, 2018.1
考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试
ISBN 978-7-5478-3847-1

I. ①神… II. ①高… III. ①神经系统疾病—诊疗—
资格考试—习题集 IV. ①R741-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 303409 号




- 错题重做、自动收藏, 好题时时温故
- 习题评论、纵情吐槽, 考友共同进步
- 紧扣考纲、题型全面, 题量充足丰富

使用方法: 扫描二维码→下载APP→手机号注册账号→电子图书→输入授权码
咨询电话: 010-86464504

授权码粘贴处

神经内科副主任、主任医师资格考试冲刺模拟卷
高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编



上海世纪出版(集团)有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235 www.sstp.cn)

印刷

开本 850×1168 1/8 印张 13.25

字数 250 千字

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-3847-1/R·1525

定价: 58.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题, 请向工厂联系调换

前 言

为了进一步深化卫生专业职称改革,2000 年人事部、卫生部下发了《关于加强卫生专业技术职务聘请工作的通知》。通知要求,卫生专业的副高级技术资格通过考试与评审相结合的方式获得;正高级技术资格通过评审委员会答辩后获得。根据通知精神和考试工作需要,副高级技术资格考试在全国各省、自治区、直辖市职称改革领导小组的领导下设立了多个考区。目前,很多地区正高级技术资格的评审工作也逐渐采用考评综合的方法。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘请相应技术职称的必要依据。

考试是为了加强临床医务人员对学科知识的系统了解和掌握,是提高医疗质量的一种手段。我国每年有 20 万以上需要晋升副高级和正高级职称的卫生专业人员,这些高级技术人员是我国医学发展的中坚力量,身兼承上启下的重任。本书不仅可以帮助广大考生通过考试,还可以使考生的专业知识更加扎实与牢固,以面对更加艰巨的任务。

为了帮助考生做好考前复习,我们仔细分析考试的命题规律和考试特点,严格按照考试大纲的要求,编写了本套“考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试”系列。每套冲刺模拟试卷包含 10 套习题,包括单选题、多选题、共用题干题和案例分析题 4 种题型。内容紧扣考试大纲,题型全面,题量丰富,具有很高的考试指导价值。

大纲将专业知识的要求分为 3 个层次,分别是“了解”“熟悉”“掌握”。安排题型难易程度,好比一棵树,掌握内容是主干部分,熟悉内容是分枝,而了解内容则是树叶。本套书以主干为主、分枝为其次、树叶为辅的要求编排,针对性强,突出重点。可以检验过往的复习成果,起到查漏补缺的作用。

为了方便考生复习迎考,本套冲刺模拟试卷包括纸质版和配套的手机 APP 应用版,做到随时随地互动复习,反复演练。配有同步练习题,自动批阅评分,并汇总错题强化训练,掌握做题技巧及命题规律,使广大考生轻松通过考试。

由于编写时间及水平有限,书中难免有疏漏与不足之处,希望广大考生与学者批评与指正。

考试命题研究委员会
2017 年 8 月

目 录

冲刺模拟卷一	(1)
冲刺模拟卷二	(11)
冲刺模拟卷三	(21)
冲刺模拟卷四	(31)
冲刺模拟卷五	(41)
冲刺模拟卷六	(51)
冲刺模拟卷七	(61)
冲刺模拟卷八	(71)
冲刺模拟卷九	(81)
冲刺模拟卷十	(91)
参考答案	(101)



冲刺模拟卷一


一、单选题：以下每道考题有 5 个备选答案,请选择 1 个最佳答案

- 1. 以下不属于脑干功能检查的是
 - A. 玩偶头试验
 - B. 睫脊反射
 - C. 眼心反射
 - D. 眼前庭反射
 - E. 颈伸展反射
- 2. 男性,72 岁。家人发现其记忆力减退 1 年,表现为近记忆力减退明显,而远记忆力相对保留,语言、视空间、执行、计算及理解判断力均测试正常,该患者诊断为
 - A. 轻度痴呆
 - B. 中度痴呆
 - C. 重度痴呆
 - D. 遗忘型轻度认知障碍
 - E. 非遗忘型轻度认知障碍
- 3. 关于 Romberg 征的叙述,下列哪项正确
 - A. 亦称闭目难立征
 - B. 测试时嘱患者两臂向前伸直,双足并拢直立,然后闭目,如出现身体摇晃或倾斜则为阴性
 - C. 仅闭目不稳则属正常现象
 - D. 闭目睁目皆不稳提示视神经病变
 - E. 不属于共济失调检查方法
- 4. 原发性三叉神经痛的治疗原则是
 - A. 三叉神经周围支切断术
 - B. 首选手术治疗
 - C. 首选神经阻滞治疗
 - D. 以止痛治疗为目的
 - E. 首选经皮选择性射频热凝治疗
- 5. 男性,41 岁。四肢末端乏力 5 天就诊。四肢近端肌力 5 级,双上肢远端肌力 3 级,双下肢远端肌力 1 级,四肢肌张力下降,腱反射消失,病理征(一),无尿潴留。病变位于
 - A. 高颈髓段
 - B. 脊髓颈膨大
 - C. 脊髓胸髓段
 - D. 脊髓腰膨大
 - E. 周围神经
- 6. 进行性脊肌萎缩的首发症状最常见为
 - A. 单手或双手小肌肉萎缩、无力
 - B. 下肢肌肉萎缩、无力
 - C. 肌张力降低

- D. 腱反射亢进
- E. 大小便失禁
- 7. 女性,37 岁。在登山时头部突起爆裂样枕部疼痛,难以忍受,伴喷射性呕吐。2 小时后项背部和下肢疼痛,颈部不敢活动,四肢活动无明显受限。据上最可能的诊断是
 - A. 蛛网膜下腔出血
 - B. 脑栓塞
 - C. 脑血栓形成
 - D. 脑炎
 - E. 脊髓出血
- 8. 有关 Creutzfeldt – Jakob(CJD),叙述错误的是
 - A. 家族性者占绝大多数
 - B. 脑电图初期为非特异性慢波,以后可出现周期性同步放电
 - C. 脑活检可发现灰质海绵状变性、神经细胞脱失、胶质细胞增生和 PrP^{sc}
 - D. 脑脊液内 14 – 3 – 3 蛋白免疫酶测定阳性
 - E. 进展迅速,起病数周或数月内发展为痴呆、无动性缄默症或去皮质强直
- 9. 男性,60 岁。长期大量饮酒 20 余年,出现记忆力减退、偶有幻视半年,突发四肢弛缓性瘫痪,咀嚼、吞咽及言语障碍,查体可见眼球震颤及眼球凝视障碍。首选哪项检查
 - A. 头颅 CT 检查
 - B. 头颅 MRI 检查
 - C. BAEP
 - D. 腰椎穿刺
 - E. 脑电图
- 10. 帕金森病最主要临床特征是
 - A. 震颤,肌张力增高,面具脸
 - B. 震颤,肌张力增高,搓丸样动作
 - C. 肌张力增高、运动减少,慌张步态
 - D. 震颤,运动减少,写字过小征
 - E. 震颤,肌张力增高,运动迟缓
- 11. 8 岁智力低下的男孩,发作时出现强烈的点头,屈体样动作,此姿势持续 5~8 秒,常摔伤头部,伴颜面青紫、瞳孔散大。该患儿的发作类型是
 - A. 肌阵挛发作
 - B. 强直性发作
 - C. 复杂部分性发作
 - D. 全面性强直-阵挛发作
 - E. 发作性睡病
- 12. 对癫痫发作患者的急救首要处置是
 - A. 迅速给药,控制发作
 - B. 按压人中
 - C. CT 发现病因
 - D. 保持呼吸道通畅,防止窒息
 - E. 详细询问病史
- 13. 继发性低颅压性头痛最常见原因是

- A. 脑室分流术后
B. 硬膜或腰椎穿刺后
C. 头颈部外伤后 CSF 外漏
D. 低血压
E. 脑膜脑炎
14. 患者 1 周前“上呼吸道感染”，因突然眩晕、恶心、呕吐伴耳鸣 2 小时就诊，改变头位后眩晕加重。查体：患者听力下降，水平性眼震。其原因最可能是
- A. 中枢性眩晕
B. 血管源性晕厥
C. 周围性眩晕
D. 非系统性眩晕
E. 头晕
15. 痴呆的可逆性病因不包括
- A. 正常压力性脑积水
B. Pick 病
C. 中枢神经系统感染
D. 中毒
E. 甲状腺功能低下
16. Friedreich 型共济失调的病理改变部位主要在
- A. 小脑
B. 脊髓的侧索和后索
C. 大脑
D. 脑干
E. 小脑，脑干
17. 女性，25 岁。3 个月来四肢无力，于休息后减轻，活动后加重，新斯的明试验(+)（肌无力明显改善）。应给予
- A. 钾盐
B. 维生素 B 族
C. 抗胆碱酯酶药物
D. 血管扩张药
E. 左旋多巴
18. 低血钾型周期性瘫痪的严重病例应给予
- A. 10%氯化钾 10 ml，静脉注射
B. 10%氯化钾 10 ml 加 50%葡萄糖 500 ml，静脉注射
C. 10%氯化钾 30 ml 加 0.9%葡萄糖 500 ml，静脉滴注
D. 10%氯化钾 10 ml 加 5%葡萄糖 500 ml 加正规胰岛素 6U，静脉滴注
E. 10%氯化钾 10 ml，每天 3 次口服
19. 下列哪项不是 Lambert - Eaton 综合征所具有的临床表现
- A. 多在 50~70 岁发病
B. 眼外肌可受累
C. 咽喉肌较少受累
D. 肢体近端肌和躯干肌症状明显，常见膝、踝反射消失

- E. 常发生口干、少汗、便秘、阳痿和自主神经症状
20. 患者，既往有高血压病史，突发神志不清伴恶心、呕吐，头部 CT 检查证实为脑出血，查体发现重刺激有反应，偶有肢体无意识动作，腱反射减弱，瞳孔对光反射消失，血压较病前下降。其意识障碍程度属于
- A. 闭锁综合征
B. 深昏迷
C. 中昏迷
D. 去皮质综合征
E. 浅昏迷
21. 重症抑郁发作睡眠障碍的主要特点是
- A. 入睡困难
B. 易惊醒
C. 多梦
D. 早醒
E. 睡眠时间减少
22. 治疗糖尿病多发神经病变疼痛的首选药物是
- A. 大剂量维生素 B₁₂
B. 神经节苷脂
C. 卡马西平
D. 三磷酸腺苷
E. 维生素 B₆
23. 如图箭头所示绿色范围感觉为上肢哪根神经
- A. 腋神经
B. 桡神经
C. 尺神经
D. 正中神经
E. 肌皮神经
24. 女性，42 岁。风心病病史 10 年，心慌气短 1 个月，查心电图：P 波消失，代之以大小不等，形状各异的 f 波，频率为 500 次/min，心室律绝对不规则，心率 130 次/min，脉率 110 次/min。应考虑为
- A. 室早二联律
B. 心房扑动
C. 室上性心动过速
D. 心房纤颤
E. 窦性心律不齐
25. 男性，28 岁。反复发作头痛，每年春秋季节发作，每次发作持续 3 个月，表现为眼眶周围剧烈的刺痛伴有流泪，查体无异常体征，CT 检查正常。其最可能的诊断是
- A. 丛集性头痛
B. 紧张性头痛
C. 神经官能症
D. 脑瘤可能
E. 花粉过敏





二、多选题：以下每道考题有 5 个备选答案,每题至少有 2 个正确答案

26. 目前,神经干细胞移植可以用来治疗

- A. 帕金森病
- B. 亨廷顿病
- C. 阿尔茨海默病
- D. 癫痫
- E. 多发硬化

27. 坐骨神经痛可有

- A. 坐骨神经压痛(+)
- B. 小腿外侧痛觉减退
- C. 足背外侧痛觉减退
- D. 膝反射减退或消失
- E. 踝反射减退或消失

28. 关于脊髓,叙述正确的有

- A. 脊髓前角内含运动神经元,后角内为感觉神经元,侧角内为交感神经元
- B. 脊髓白质内有上、下行传导束
- C. 脊髓内有内脏、腺体的初级反射中枢
- D. 脊髓前角损害出现分离性感觉障碍
- E. 脊髓侧角损害出现自主神经功能障碍

29. 男性,52 岁。爬山时突发眩晕、呕吐、行走不稳,很快昏迷,呼吸不规则;CT 检查显示为小脑出血,血肿 20 ml。首选治疗及采取的措施是

- A. 大剂量止血药
- B. 呼吸兴奋剂
- C. 应用呼吸机
- D. 20%甘露醇 250~500 ml 静脉滴注
- E. 立即手术治疗

30. 对单纯疱疹病毒性脑炎患者进行头颅 CT 扫描可出现

- A. 完全正常
- B. 肯定有异常发现
- C. 局灶性低密度区
- D. 低密度病灶区出现点状高密度影
- E. 病变区不会有高密度影

31. 多发性硬化不常见的症状包括

- A. 失语
- B. 癫痫发作
- C. 精神异常
- D. 视力下降
- E. 肢体麻木

32. 原发性震颤的药物治疗包括

- A. 扑痫酮
- B. 普萘洛尔
- C. 阿罗洛尔

D. 氯硝西洋

E. 硫必利

33. 癫痫、癫痫综合征的国际分类中包括下列哪几项

- A. 全身性癫痫
- B. 与部位有关(局灶性、部分性)癫痫
- C. 不能确定为局灶性或全身性癫痫的综合征痫样发作
- D. 特殊的综合征
- E. 痫样发作

34. 腰椎穿刺后,低颅压性头痛可有

- A. 恶心、呕吐
- B. 颈僵硬
- C. 眩晕、耳鸣、视物模糊
- D. 脑脊液蛋白质含量增高
- E. 脑脊液白细胞增多

35. 诊断前庭神经元炎必须具备的条件有

- A. 发病前 1~2 周常有上呼吸道感染症状
- B. 多为单侧
- C. 不伴耳鸣、耳聋等耳蜗症状
- D. 眩晕
- E. 不伴脑干症状及体征

36. 单纯型纹状体黑质变性主要表现为

- A. 肌强直
- B. 运动迟缓
- C. 步态障碍
- D. 共济失调
- E. 自主神经功能障碍

37. 非编码区扩增脊髓小脑共济失调(SCA)的亚型不包括

- A. SCA3
- B. SCA5
- C. SCA10
- D. SCA17
- E. SCA31

38. 重症肌无力需要与以下何种疾病鉴别

- A. 延髓麻痹
- B. Lambert-Eaton 综合征
- C. 眼肌型肌营养不良症
- D. 肉毒杆菌中毒
- E. 多发性肌炎

39. 多发性肌炎可包括以下哪些特点

- A. 急性或亚急性起病,女性多于男性
- B. 对称性的四肢近端肌、颈肌、咽肌无力
- C. 有明显的肌肉疼痛和压痛

- D. 血清肌酸激酶显著增高,肌电图呈现肌源性肌电损害
E. 部分病例可以合并有恶性肿瘤
40. 关于 Lambert-Eaton 综合征,下面哪几项是正确的
A. 自身抗体的靶器官为突触前膜的 Ca^{2+} 通道和 ACh 囊泡释放区
B. 老年男性发病居多
C. 脑神经较少影响
D. 多数有自主神经受累的症状,如口干、少汗、便秘、阳痿等
E. 血清 AChR 抗体阳性
41. 下列治疗肝性脑病的措施中,不妥的有
A. 补充大量蛋白质饮食
B. 大剂量利尿药
C. 口服抑制肠菌的抗生素
D. 碱性液灌肠
E. 快速放腹腔积液
42. 动眼神经检查包括
A. 眼裂大小
B. 瞳孔大小
C. 眼球向上、下、内、外运动
D. 角膜反射
E. 瞳孔对光反射、调节反射
43. 关于 DWI 的应用,叙述正确的有
A. 是超早期脑梗死的诊断方法
B. 有助于缺血半暗带的检出
C. 是颅内肿瘤的辅助诊断手段
D. 可用于脑白质病的研究
E. 可用于评估病变内的组织代谢情况
44. 某根性坐骨神经痛患者病情进行性加重,为确定病因,应进行的必要辅助检查是
A. 脊柱 X 线平片
B. 患肢肌电图及神经传导速度检查
C. 脊髓 MRI 检查
D. 躯体感觉诱发电位
E. 腰椎穿刺
45. 阵发性室性心动过速的心电图改变是
A. 频率 140~200 次/分钟
B. 代偿间期不完全
C. 连续 3 个以上的室性异位搏动
D. 常见室性融合波或心室夺获
E. 逆行 P'波可出现在 QRS 波群之前

三、共用题干题: 以下每道考题有 2~6 个提问,每个提问有 5 个备选答案,请选择 1 个最佳答案
(46~48 题共用题干)

女性,24 岁。病史:2 周前出现双下肢无力,次日双上肢亦感沉重,伴双眼睑闭合不全、1 周

后不能行走,双上肢不能抬举;今上午声音嘶哑,胸闷、气促,无排尿障碍。查体:神清,构音障碍,呼吸困难,双侧周围性面瘫,双上肢肌力 3 级,双下肢肌力 1 级,四肢肌张力减低,各腱反射(一),双侧 Babinski 征(一)。

46. 诊断考虑为
A. 重症肌无力
B. 急性脊髓炎
C. 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病
D. 脑桥肿瘤
E. 周期性麻痹

47. 最重要的辅助检查
A. 肌电图
B. 头颅 CT 检查
C. 脑脊液检查
D. 血液生化检查
E. 头颅正侧位片

48. 治疗上最重要的是
A. 大剂量激素的使用
B. 大剂量维生素治疗
C. 抗生素使用
D. 补钾
E. 血浆置换

(49~50 题共用题干)

男,58 岁。发生运动性失语及右侧肢体无力 2 次,每次持续约 15 分钟。查体:颈动脉听诊未闻及杂音。颈动脉超声:右侧颈内动脉狭窄 60%,左侧颈内动脉狭窄 30%。

49. 本病最可能的诊断是
A. 偏头痛
B. 癫痫
C. 短暂性脑缺血发作(TIA)
D. 脑卒中
E. 颅内肿瘤
50. 本病正确的处置是
A. 建议行左侧颈内动脉支架置入术
B. 建议行左侧颈内动脉剥脱术
C. 建议行右侧颈内动脉剥脱术
D. 建议抗血小板及危险因素控制,暂不行手术治疗
E. 在未发生明确卒中前,不进行抗血小板治疗

(51~53 题共用题干)

女性,25 岁。反复头痛 7 年。每次发作前约 1 小时心烦,眼前有异彩和暗点持续约半小时,之后有搏动样头痛,伴恶心和呕吐、畏光,休息睡眠后多可缓解。有家族史,查体无异常体征,头颅 CT 检查未见异常。

51. 最可能的诊断是
A. 三叉神经痛



- B. 丛集性头痛
- C. 紧张型头痛
- D. 偏头痛
- E. 青光眼

52. 若患者近 1 个月头痛频繁发作,每周发作 3~4 次,且口服奈普生头痛仍不能很好缓解,为终止头痛急性发作则应选用下列哪种药物

- A. 布洛芬
- B. 哌替啶
- C. 麦角胺
- D. 吗啡
- E. 丙戊酸

53. 为预防头痛发作可选用

- A. 氟桂利嗪
- B. 舒马曲普坦
- C. 麦角胺
- D. 阿司匹林
- E. 地西泮

(54~56 题共用题干)

男性,40 岁。因“双下肢进行性瘫痪,伴排尿障碍 1 天”来诊。发病前有低热不适,数小时内症状迅速出现。查体:剑突以下深、浅感觉障碍,双下肢松弛性瘫痪;尿潴留。

54. 本病最可能的诊断是

- A. 脊髓出血
- B. 急性硬膜外脓肿
- C. 急性脊髓炎
- D. 脊髓肿瘤
- E. 急性多发性神经根神经炎

55. 本病病变定位于

- A. 脊髓高位颈段
- B. 脊髓颈膨大
- C. 脊髓上胸段($T_1 \sim T_6$)
- D. 脊髓下胸段($T_8 \sim T_{12}$)
- E. 脊髓圆锥

56. 双下肢运动障碍的原因是

- A. 下运动神经元损害
- B. 脊髓总体反射
- C. 脊髓休克
- D. 布朗-塞卡尔综合征(Brown - Sequard syndrome)
- E. 脊髓前角综合征

(57~58 题共用题干)

男孩,15 岁。因不明原因的肝功能异常入院。实验室检查:ALT180 U/L,AST60 U/L。肝 B 型超声:肝不大,表面高低不平,实质内回声弥漫性不均匀,可见散在分布结节状高回声。

57. 本病最可能显示的诊断是

- A. 血吸虫病
- B. 肝豆状核变性
- C. 病毒性肝炎
- D. 肝肿瘤
- E. 肝囊肿

58. 为明确诊断,首选检查是

- A. 24 小时尿铜检测
- B. 血清铜蓝蛋白检测
- C. ATP7B 基因检测
- D. 肝 B 型超声
- E. 肝 MRI

(59~60 题共用题干)

男孩,6 岁。因“逐渐出现言语减少、词义失认,伴多动和注意力障碍 6 个月”来诊。发病来睡眠中强直-阵挛发作 1 次。既往体健,家族史无异常。

59. 患者脑电图检查最可能的特征性表现是

- A. 双侧性慢棘慢波综合(1.0~2.5 Hz)
- B. 睡眠中持续颞区为著的癫痫样放电
- C. 不对称、不规则高波幅慢波和多灶性尖慢/棘慢复合波
- D. 双侧 3 Hz 棘慢复合波
- E. 无特异性改变

60. 本病最可能的诊断是

- A. 颞叶癫痫
- B. 额叶癫痫
- C. 儿童良性癫痫伴中央颞部棘波
- D. Landau - Kleffner 综合征(LKS)
- E. Lennox - Gastaut 综合征(LGS)

四、案例分析题:每个案例至少有 3 个提问,每个提问有多个备选答案,其中正确答案有 1 个或几个

(61~63 题共用题干)

男性,24 岁。四肢乏力 7 天。患者 7 天前起出现双下肢乏力,5 天前开始出现步行困难,双上肢不能上抬,今天病情进一步加重,不能步行,双手不能持物,无大小便障碍。起病 10 天前曾有腹泻史。查体:双上肢肌力 2 级,双下肢肌力 1 级,腱反射消失,病理反射未引出,全身深浅感觉正常。

61. 该患者需考虑的鉴别诊断是

- A. 急性脊髓炎
- B. 脊髓压迫症
- C. 周期性瘫痪
- D. 急性吉兰-巴雷综合征
- E. 急性脊髓灰质炎

62. 需进行下列哪些检查

- A. 腰穿脑脊液检查

- B. 肌酶学检查
C. 脊髓 MRI 检查
D. 神经、肌电图检查
E. 血清电解质检测
63. 该患者应选用的治疗包括
A. 皮质类固醇激素
B. 20%甘露醇静脉滴注,2~4 次/日
C. 选用适当抗生素
D. 处理排尿障碍及防治尿路感染
E. 防治褥疮
- (64~71 题共用题干)
- 病历摘要: 男性,37 岁。因鼻塞,右侧头面部疼痛、肿胀 1 周,视物重影,右眼眶疼痛,眼球红肿,发热 1 天入院。查体发现: 体温 38℃,神志清楚,检查合作,右眼球突出,固定,活动受限,眼睑下垂,瞳孔散大,对光反射消失,右眼底视乳头水肿,左眼及眼底正常,右面部肿胀,右面部痛觉减退,角膜反射消失。右鼻孔流涕带血。
64. 该患者神经系统损害的主要定位诊断是
A. 脑膜
B. 大脑半球
C. 右眶尖
D. 右眶内
E. 右眶上裂
F. 右海绵窦
G. 脑干
H. 小脑
65. 该患者入院后,体温达 39.5℃,头痛加重。明确诊断需进一步作哪些检查
A. 血常规
B. 血细菌培养+药敏试验
C. 颅底 MRI 检查
D. 血气分析
E. 脑脊液检查
F. 心电图
G. 脑电图
H. 胸片
66. 下列哪些诊断可能性最大[提示: 病情进展,出现右眼视力下降,仅有光感。鼻腔内镜见鼻腔灰白色渗出物。血象示 WBC $10 \times 10^9/L$,血培养(-)。MRI 示右侧上颌窦 T₂异常高信号,液平面;右海绵窦肿胀,T₂异常高信号,右眼眶内水肿球后视神经影增粗]
A. 急性化脓性脑膜炎
B. 急性病毒性脑膜炎
C. 脑膜癌病
D. 急性海绵窦炎
E. 恶性淋巴瘤
F. 鼻脑毛霉病

- G. 鼻咽癌
H. 韦格氏肉芽肿
67. 目前最重要的处理措施是
A. 大剂量广谱抗生素
B. 脑脊液培养+药敏试验
C. 鼻窦清创术
D. 血培养+药敏试验
E. 鼻腔分泌物直接镜检
F. 组织病理检查
G. 大剂量皮质激素
H. 两性霉素 B
I. 加大脱水药降颅内压
68. 病情变化可能因为[提示: 因为经鼻窦清创,右眼球摘除术,发现鼻窦内大量黑色碎烂易出血的坏死组织,眼球内脓性分泌物,术后第 2 天体温下降。但 3 天后出现左眼视力下降,左眼球红肿,突出,内收受限,外展不能。脑膜刺激征(+). 腰穿结果: 脑脊液压力 230 mmH₂O,淡黄,细菌涂片(-),细胞数 50 个/mm³,红细胞(+),潘氏试验(+),蛋白 1.2 g/L,糖 1.2 mmol/L,氯化物 102 mmol/L]
A. 继发败血症
B. 炎症波及左侧海绵窦
C. 并发化脓性脑膜炎
D. 炎症累及左眼眶
E. 并发真菌性脑膜炎
F. 并发结核性脑膜炎
G. 肿瘤侵犯左海绵窦
H. 肿瘤颅底脑膜转移
69. 偏瘫最可能因为[提示: 又 1 周后,出现左侧鼻唇沟变浅,左侧肢体偏瘫,肌力 2 级,肌张力低,左侧 Babinski 征(+),头颅 CT: 右额顶大片低密度病灶]
A. 并发动脉粥样硬化性脑梗死
B. 并发脑大动脉炎性脑梗死
C. 并发心源性脑栓塞
D. 肿瘤脑卒中
E. 肿瘤直接侵犯脑实质
F. 结核性脑膜脑炎
G. 脑脓肿
H. 脑出血
70. 鼻窦清创术后病理检查未发现肿瘤,该患者临床考虑为鼻脑毛霉菌病,最有效的药物是
A. 头孢呋辛
B. 头孢派酮
C. 青霉素
D. 氟康唑
E. 5-FC
F. 两性霉素 B





- G. 氯霉素
H. 亚胺培南-西司他丁钠(泰能)

71. 有关鼻脑毛霉菌感染的临床特点是(提示:该患者经两性霉素 B 治疗 1 个月后,体温正常,头痛消失,脑脊液结果正常,患肢肌力恢复达 4 级,能独立行走)
- A. 病死率极高
B. 毛霉菌为条件致病菌
C. 多见于免疫功能低下者
D. 鼻腔感染易出现黑色坏死及血性分泌物
E. 两性霉素 B 治疗有效
F. 易侵犯颅内大血管引起脑梗死
G. 面部感染时局部清创最重要
H. 活组织或脑脊液直接镜检有诊断意义

(72~75 题共用题干)

- 男性,62 岁。活动中突发头痛、左侧肢体乏力伴呕吐 3 小时。既往有高血压病史 15 年。查体:神清,左侧肢体肌力 0 级,肌张力低,左侧偏身感觉减退。

72. 该患者最可能的诊断是
- A. 脑栓塞
B. 脑血栓形成
C. 蛛网膜下腔出血
D. 脑出血
E. TIA
73. 该患者特别注意需要除外的诊断是
- A. 脑栓塞
B. 脑血栓形成
C. 蛛网膜下腔出血
D. 脑炎
E. TIA

74. 该患者应当进行的检查是
- A. 脑脊液检查
B. TCD 检查
C. 头颅 CT 检查
D. 心电图
E. 肌电图

75. 患者入院当晚上出现神志障碍,并逐渐加重,第 3 天晚上突然出现呼吸深快,深昏迷,右侧瞳孔大于左侧,对光反射消失,正确的处理为
- A. 复查 CT
B. 腰穿脑脊液检查
C. DSA 检查
D. 甘露醇快速静脉滴注
E. 气管切开

(76~83 题共用题干)

病历摘要:女性,21 岁。前天下午出现发热,咳嗽,咽痛,失眠,自服安眠药后能入睡,昨天

清晨出现睁眼费力,未在意。下午声音低沉,言语含糊不清,四肢活动困难。2 个月前有类似病史。无明确毒物接触史。无类似家族史。入院检查:神志清楚,对答切题,声音低沉,双眼睑下垂,双侧瞳孔等大,对光反射存在,压眶见面无表情,张口与伸舌困难,咽反射消失,四肢软瘫,痛刺激下肌力 2 级,腱反射低,双侧 Babinski 征(-),颈软,双侧 Kernig 征(-)。

76. 初步诊断应考虑

- A. Lambert-Eaton 综合征
B. 肉毒杆菌中毒
C. 肌营养不良症
D. 多发性肌炎
E. Guillain-Barré 综合征
F. 周期性瘫痪
G. 急性播散性脑脊髓炎
H. 重症肌无力

77. 现为明确诊断,需进一步作哪些检查

- A. 腰椎穿刺
B. 急查血液生化
C. 胸腺 CT 检查
D. 疲劳试验
E. 新斯的明试验
F. 重复神经电刺激和单纤维肌电图
G. 血心、肝功能检查
H. 乙酰胆碱受体抗体

78. 经上述有关检查诊断为重症肌无力,其肌电图的特点可能有

- A. 纤颤电位
B. 束颤电位
C. Jitter 传导阻滞
D. 3 Hz 重复电刺激出现衰减,15 Hz 重复电刺激变化不大
E. 3 Hz 重复电刺激变化不大,15 Hz 重复电刺激波幅增高达 250%
F. 平均波幅显著增高
G. 平均时限显著延长
H. 肌强直放电

79. 重症肌无力与 Lambert-Eaton syndrome 鉴别要点是

- A. 病变部位在突触后膜
B. 女性居多
C. 多伴有自身免疫病
D. 晨轻暮重现象
E. 病态疲劳现象
F. 低频、高频电刺激波幅均降低
G. 低频电刺激波幅降低、高频电刺激波幅均增高
H. AChR-Ab 增高

80. 根据 Osserman 分型,该患者属于下列哪种类型

- A. 眼肌型

- B. 轻度全身型
C. 中度全身型
D. 急性重症型
E. 迟发重症型
F. 肌萎缩型
G. 胆碱能危象
H. 反拗性危象
81. 可能出现了(提示:按重症肌无力治疗,1周后患者症状加重,体温 37℃,心率 110 次/分。出现呼吸衰竭,面色紫绀,双肺呼吸音弱,未闻及干、湿性啰音。胸片未见异常。心电图示窦性心动过速,血象正常,腾喜龙试验无反应。动脉血: pH 7.15, PaO₂ 50 mmHg, PaCO₂ 85 mmHg)
- A. 胆碱能危象
B. 反拗性危象
C. 肌无力危象
D. 肺栓塞
E. 心衰
F. 肺部感染
G. 窒息
H. 脑疝
82. 抢救该患者的主要措施是
- A. 口服吡啶斯的明
B. 大剂量肾上腺皮质激素
C. 大剂量免疫抑制剂
D. 胸腺切除
E. 血浆置换
F. 气管插管机械通气
G. 大剂量免疫球蛋白
H. 控制呼吸道感染
83. 有关 Lambert - Eaton 综合征的正确说法是
- A. 主要表现为四肢近端肌无力
B. 男性多见
C. 多伴发恶性肿瘤
D. 下肢近端无力,活动后疲劳为主,短暂用力后肌力增强
E. 脑神经支配区很少受累
F. 多伴有植物神经症状
G. 新斯的明试验阳性
H. 血清 AChR 抗体(一)
I. 盐酸胍治疗症状改善
J. 低频电刺激波幅增高,高频电刺激波幅明显下降
- (84~86 题共用题干)
- 男,32 岁。因“全身强直阵挛发作 20 min”送至抢救室。
84. 其治疗的原则包括

- A. 尽快终止发作
B. 保护脑神经元
C. 改善循环
D. 查找病因,去除促发因素
E. 降压处理
F. 鼻饲抗癫痫药
85. 该病正确的处理有
- A. 监测生命体征、血氧及心功能等
B. 保持呼吸道通畅
C. 给氧
D. 建立静脉输液通道
E. 静脉给药,抗惊厥治疗
F. 对症治疗,维持生命体征和内环境稳定
86. 应尽快完善的检查包括
- A. 血细胞计数
B. 尿常规
C. 肝功能
D. 血糖
E. 血钙
F. 血气分析
- (87~89 题共用题干)
- 男性,56 岁。1 年前右上肢略感酸困乏力,做精细动作时感右手稍笨,写字变慢,但字迹尚清楚。近 6 个月右手偶有不自主抖动,静止时明显;行走时右下肢沉重、拖步。左侧肢体无异常。无认知障碍。目前考虑诊断为帕金森病早期。患者自觉症状对日常生活影响不大,仍未接受药物治疗。
87. 患者还可能合并存在的症状有
- A. 嗅觉障碍
B. 便秘
C. 睡眠障碍
D. 精神症状
E. 抑郁
F. 摆臂幅度减小
G. 冻结现象
H. 异动症
88. 本病首选的治疗有
- A. 单胺氧化酶 B 型(MAO - B)抑制药
B. 多巴胺受体(DR)激动药
C. 金刚烷胺
D. 复方左旋多巴
E. 儿茶酚-氧位-甲基转移酶(COMT)抑制药
F. 复方左旋多巴+COMT 抑制药
G. 手术治疗



89. 关于该患者的治疗,叙述正确的有
- A. 新诊断的患者应尽可能不用药物治疗,以延缓运动并发症的发生
 - B. 一旦诊断应立即开始对症治疗
 - C. 选用药物时既应考虑到药物的疗效,也应注意其不良反应
 - D. 药物应从小剂量开始,逐渐加量,直至症状完全得到控制为止
 - E. 用药期间,应严密监测肝、肾功能变化
 - F. 治疗初期应先选择单药治疗,疗效不佳时可适当增加剂量或换用其他类型的药物
 - G. 治疗初期经药物治疗无效者可选择手术治疗
- (90~97 题共用题干)
- 病历摘要: 女性,49 岁。双眼向右注视时视物成双 1 年半,右眼胀痛 1 个月,右眼睑下垂 20 天,伴右眼及右侧剧烈疼痛,恶心呕吐。以右动眼神经麻痹收住院。有高血压病史 13 年。体查: T 36.5℃,P 78 次/分,R 18 次/分,BP 135/100 mmHg。右眼睑下垂,右瞳孔直径 3.0 mm,左侧直径 2.5 mm,对光反射正常,右眼外展位,向上、内运动不能,向右注视有水平复视。腰穿 CSF: 清亮,压力 140 mmH₂O,白细胞 6 个/mm³,蛋白质 0.5 g/L,余正常。
90. 定位诊断是
- A. 右动眼神经
 - B. 右侧大脑脚
 - C. 左侧大脑脚
 - D. 右脑桥
 - E. 右眶尖
 - F. 右眶上裂
 - G. 右侧海绵窦
 - H. 左侧半球
91. 头颅 CT 检查提示右鞍旁及右侧前床突高密度影,初步诊断为
- A. 脑肿瘤
 - B. 脑出血
 - C. 脑动脉瘤
 - D. 重症肌无力
 - E. 痛性眼肌麻痹
 - F. 脑干脑炎
 - G. 脑干梗塞
 - H. 眶周炎
92. 需进一步做哪些检查
- A. 复查头颅 CTA
 - B. 脑彩超
 - C. 脑血管 DSA 检查
 - D. 头颅 MRA+增强
 - E. 视觉诱发电位
 - F. 脑 ECT 检查
 - G. 脑室造影
 - H. 脑脊液检查
93. 典型的海绵窦侧壁综合征应有以下表现(提示: 查 DSA 发现右颈内动脉 2-3-4 段呈 C 形

- 扩大,不规则形状动脉瘤,正位片见颈内动脉 2-3-4 段形态消失,大脑前动脉不显影,头颅 MRI 示右颈内动脉海绵窦段动脉瘤并血栓形成)
- A. 第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ对脑神经损害
 - B. 第Ⅳ、Ⅴ对脑神经损害
 - C. 第Ⅲ、Ⅳ对脑神经损害
 - D. 第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ对脑神经损害
 - E. 第Ⅰ、Ⅱ对脑神经损害
 - F. 第Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ对脑神经损害
 - G. 第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ对脑神经损害
 - H. 第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ对脑神经损害
94. 颅内动脉瘤能产生哪些临床症状
- A. 颅内出血
 - B. 动眼神经瘫
 - C. 一侧头痛、抽搐
 - D. 眼球突出
 - E. 视野缺损
 - F. 三叉神经瘫
 - G. 颅内杂音
 - H. 尿崩症和体温障碍
95. Glasgow Coma Scale 是[提示: 1 周后患者头痛加重,意识障碍,痛刺激时能睁眼,对话含糊不清,肢体痛刺激时能拨开医生的手,脑膜刺激征(+),体温升高]
- A. 11 分
 - B. 12 分
 - C. 13 分
 - D. 14 分
 - E. 10 分
 - F. 9 分
 - G. 8 分
 - H. 7 分
96. 病情加重最可能的原因是
- A. 动脉瘤破裂大出血
 - B. 动脉瘤破裂少量渗血
 - C. 脑血管痉挛
 - D. 继发颅内感染
 - E. 继发脑梗死
 - F. 水电酸碱失衡
 - G. 肾功能不全
 - H. 海绵窦血栓形成
97. 本病最好的治疗方法是
- A. 高流量吸氧
 - B. 外科手术动脉瘤夹闭术
 - C. DSA 动脉瘤栓塞术

- D. 继续观察
- E. 颈内动脉栓塞术
- F. 尼莫地平(尼膜同)静脉滴注
- G. 加大止血药
- H. 加强脱水

(98~105 题共用题干)

病历摘要：女性，24 岁。3 周前出现情绪改变，言语结结巴巴，易激惹，反应迟钝。2 周前出现左侧肢体麻木，针刺样疼痛感，有时出现颈部触电样感，伴肢体乏力，下肢重于上肢，行走欠稳，尿潴留。查体：神志清楚，反应迟钝，欣快感，双眼粗大水平震颤，构音欠清，吟诗样语言。咽反射迟钝。左侧肢体轻瘫，左上肢 5 级，左下肢 4 级，左侧肢体共济失调，痛觉减退，Romberg 征(+)。

98. 该患者应作哪些主要检查

- A. 腰椎穿刺
- B. 诱发电位
- C. 头颅 CT 检查
- D. 头颅 MRI 检查
- E. 脑组织活检
- F. 肌电图
- G. 胸部 X 线检查
- H. 心电图

99. 本病主要诊断是(提示：VEP 各波潜伏期延长。头颅 MRI 示双侧大脑放射冠，脑干，小脑多个斑块状 T₁ 低信号，T₂ 呈高信号影)

- A. 神经白塞病
- B. 多发性硬化
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 病毒性脑炎
- E. 急性播散性脑脊髓炎
- F. 肝豆状核变性
- G. 遗传性共济失调
- H. 神经梅毒
- I. 脑白质营养不良

100. 有关多发性硬化的脑脊液检查的表述，哪些是错误的

- A. 多发性硬化脑脊液单核细胞轻度增多
- B. 多发性硬化脑脊液 IgG 指数增高
- C. 多发性硬化脑脊液出现特异性 IgG 寡克隆带
- D. IgG 鞘内合成的定量指标是指：CSF 与血清 IgG 比值/CSF 与血清白蛋白比值
- E. IgG 鞘内合成的定量指标是指：CSF 与血清 IgG 比值/CSF 与血清球蛋白比值
- F. 多发性硬化的 IgG 指数大于 0.7
- G. 多发性硬化的 IgG 指数小于 0.7
- H. IgG 鞘内合成的定性指标是 IgG 寡克隆带

101. 按 Poser 提出的诊断标准，该患者属于下列哪型多发性硬化

- A. 临床确诊多发性硬化
- B. 实验室检查支持确诊多发性硬化

- C. 临床可能多发性硬化
- D. 实验室检查支持可能多发性硬化
- E. 原发进展型多发性硬化
- F. 继发进展型多发性硬化
- G. 进展复发型多发性硬化
- H. 缓解复发型多发性硬化

102. 多发性硬化的 Charcot 三主征包括

- A. 意向性震颤
- B. Lhermitte 束征
- C. 一个半综合征
- D. 吟诗样语言
- E. Arnold - Chiari 畸形
- F. 眼球震颤
- G. 肢体共济失调
- H. Romberg 征

103. 多发性硬化的病理改变可有

- A. 局灶性脱髓鞘斑
- B. 脑室周围脱髓鞘斑
- C. 神经胶质增生
- D. 炎症反应
- E. 新旧病灶共存
- F. 半卵圆区中心脱髓鞘斑
- G. 小静脉周围炎
- H. 轴突崩解

104. 针对多发性硬化治疗下列哪项是错误的

- A. 主要使用皮质激素
- B. INF - α
- C. INF - β
- D. 免疫抑制剂
- E. 免疫球蛋白
- F. 血浆置换
- G. 对症治疗
- H. 中药及理疗

105. 同心圆硬化的临床特点是

- A. 多见于老年男性
- B. 多急性起病
- C. 多以精神症状为首发
- D. 有锥体束征
- E. 有眼外肌麻痹
- F. MRI 示脑白质呈洋葱头样改变或树木年轮样黑白相间病灶
- G. 类固醇激素可能有效
- H. 多数病程短、预后差






冲刺模拟卷二

一、单选题：以下每道考题有 5 个备选答案,请选择 1 个最佳答案

1. 跨阈步态见于
 - A. 小脑病变
 - B. 腓骨肌萎缩症
 - C. 多发性硬化
 - D. 脑性瘫痪
 - E. 亚急性脊髓联合变性
2. 男性,56 岁。近 2 个月来左侧面部麻木,疑有三叉神经病变,检查时最不可能出现的体征为
 - A. 面部感觉障碍
 - B. 角膜反射迟钝
 - C. 张口歪斜
 - D. 角膜溃疡
 - E. 咽反射消失
3. 关于肌张力增高的叙述,哪项是正确的
 - A. 触诊时肌肉松软
 - B. 触摸肌肉时有坚实感,作被动检查时阻力增加
 - C. 指鼻试验不能完成
 - D. 轮替动作不协调
 - E. 有舞蹈样运动
4. 女性,30 岁。右大腿外侧麻木 2 年。检查:下肢肌力 5 级,无肌肉萎缩,肌张力正常,膝腱反射和跟腱反射正常,无病理反射,右大腿外侧有大片状痛觉减退区,约 15 厘米×20 厘米。最可能的诊断为
 - A. 股神经炎
 - B. 股外侧皮神经炎
 - C. 坐骨神经炎
 - D. 闭孔神经炎
 - E. 增生性腰椎病
5. 下列哪项不符合髓外硬脊膜内肿瘤的临床表现
 - A. 根性痛常是首发症状
 - B. 脊髓损害常自一侧开始
 - C. 感觉障碍呈上行性进展
 - D. 尿便障碍较早出现
 - E. 椎管梗阻程度较重
6. 蛛网膜下隙出血的患者应用尼莫地平的主要目的是
 - A. 预防抽搐发作
 - B. 防止再出血
 - C. 降低血压
 - D. 防止脑血管痉挛
 - E. 减轻心肌损伤
7. 男性,40 岁。曾患风湿性心内膜炎,近日发热,白细胞增高,皮肤黏膜有出血点,住院治疗,医嘱绝对卧床休息。今晨患者自行起床,突感头痛,呕吐,左下肢麻木,倒地死亡。该患者最可能的死因是
 - A. 心肌梗死
 - B. 脑出血
 - C. 肺动脉栓塞
 - D. 肺炎
 - E. 脑动脉栓塞
8. 下列对结核性脑膜炎临床表现,描述错误的是
 - A. 多起病隐匿,慢性病程,也可急性或亚急性起病
 - B. 可缺乏结核接触史
 - C. 有脑膜刺激症状和颅内压增高表现
 - D. 可致脑神经损害,以动眼、外展、面和视神经最易受累
 - E. 老年人患者头痛、呕吐、颅内压增高症状更突出
9. 男性,26 岁。平时体健,咳嗽、发热 7 天后出现高热、乱语和癫痫发作,24 小时后昏迷,去脑强直发作,四肢无自主活动。检查:BP 130/85 mmHg,四肢瘫,双侧 Hoffmann 征(+),Babinski 征(-),但 Kernig 征和 Brudzinski 征均(+).最可能的诊断是
 - A. 脑囊虫病
 - B. 感染中毒性休克
 - C. 结核性脑膜炎
 - D. 急性播散性脑脊髓炎
 - E. 急性蛛网膜下腔出血
10. 下列药物可能引起继发性帕金森综合征,除了
 - A. 氯丙嗪
 - B. 桂利嗪
 - C. 甲氧氯普胺
 - D. 多潘立酮
 - E. 利血平
11. 头痛伴癫痫发作最可能患的疾病是
 - A. 青光眼
 - B. 脑出血
 - C. 高血压
 - D. 三叉神经痛
 - E. 脑囊虫
12. 女性,30 岁。表现为突然发生的左侧手指首先抽搐,逐渐向手腕、前臂、肩部及左侧半身扩展,下列哪项是最可能的诊断
 - A. 杰克逊癫痫发作
 - B. Lennox-Gastaut 综合征
 - C. 复杂部分性发作
 - D. 全身性强直-阵挛发作

- E. 失神发作
13. 关于紧张性头痛,不正确的是
- A. 女性多见
- B. 随年龄的增长,患病率增加
- C. 疼痛多位于一侧枕颈部
- D. 疼痛部位肌肉可有触痛或压痛点
- E. 病程数月甚至数年
14. 女性,68岁。头痛,头晕,胸闷。查体:BP 200/110 mmHg,无意识障碍及肢体活动障碍。该患者最可能的诊断为
- A. 脑出血
- B. 高血压
- C. 脑炎
- D. 冠心病
- E. 心肌病
15. 路易体痴呆患者的精神障碍以下哪项最多见
- A. 幻觉
- B. 妄想
- C. 抑郁
- D. 焦虑
- E. 谵妄
16. 脊髓小脑性共济失调的突出临床表现是
- A. 遗传早现
- B. 共济失调
- C. 眼震
- D. 痉挛步态
- E. 痴呆
17. 女性,20岁。1个月前发现每晚视物成双,清晨醒来消失,半个月来每日下午起视物有双影,5天来下午睁眼困难,不发热。检查:双瞳孔2 mm,对光反应正常,双眼上睑下垂,左眼球上视、外展和下视无力,右眼上下视、内收及外展均无力,向各方向注视均有复视,其余神经系统未见异常。最可能的诊断是
- A. 双眶上裂综合征
- B. 动脉瘤
- C. 海绵窦血栓形成
- D. 重症肌无力
- E. 肌营养不良
18. 男性,29岁。突发四肢乏力不适1天,下肢明显。发病前有饮酒史,既往发作过2次,每次发作腰穿脑脊液检查常规及生化无异常发现。查体:四肢肌力减低,肌张力下降,腱反射消失,感觉正常。最可能的诊断是
- A. 吉兰-巴雷综合征
- B. 脊髓肿瘤
- C. 急性脊髓炎
- D. 周期性瘫痪

- E. 颈椎病
19. 关于 Lambert-Eaton 综合征的临床表现,下列哪项正确
- A. 女性患者居多
- B. 不出现自主神经症状
- C. 肌无力以躯干肌为主
- D. 眼外肌常最先受累
- E. 患肌短暂用力后肌力增强
20. 患者,车祸外伤,昏迷1小时。来院后首选的检查手段为
- A. 血常规检查
- B. 颅脑 MRI 检查
- C. 头颅 X 线检查
- D. 颅脑 CT 检查
- E. 脑电图检查
21. 广泛性焦虑障碍的主要临床表现是
- A. 对自己躯体的健康过分担心
- B. 与现实不符的过分紧张和担心
- C. 面临现实危险时的恐惧反应
- D. 濒死感,失控感
- E. 对一些无意义想法的反复出现的不安
22. 男性,56岁。因“意识障碍2天”来诊。有慢性肺源性心脏病病史6年。实验室检查:血 pH 7.30,PaO₂ 40 mmHg,PaCO₂ 110 mmHg,BE 6 mmol/L,BUN 6 mmol/L,血钠138 mmol/L,血钾 3.8 mmol/L,血浆渗透压 280 mmol/L。该患者意识障碍的原因为
- A. 肾衰竭
- B. 低钠血症
- C. 低钾血症
- D. 低渗血症
- E. 肺性脑病
23. 如图箭头所示为哪支脑神经



A. IV



- B. VI
C. V
D. II
E. III

24. 患者,1年中突发心悸2次,此次发作20分钟,心电图示:R-R规则,频率180次/分钟,QRS时间0.09秒。最可能诊断
A. 阵发性室上性心动过速
B. 心房颤动
C. 阵发性室性心动过速
D. 非阵发性交界性心动过速
E. 窦性心动过速
25. 男性,76岁。有三叉神经痛病史9年,近1个月频繁发生剧痛发作,卡马西平和苯妥英钠治疗无效,应为患者选择下列哪项治疗方法
A. 维生素B₆
B. 三叉神经微血管减压术
C. 三叉神经感觉根部分切除术
D. 经皮半月神经节射频电凝治疗
E. 氯丙嗪

二、多选题:以下每道考题有5个备选答案,每题至少有2个正确答案

26. 脑立体定向手术治疗癫痫的机制有
A. 手术毁损痫灶
B. 破坏癫痫传导途径
C. 刺激特定结构,增加皮质抑制
D. 毁损特定结构,减少大脑半球皮质的兴奋性
E. 重建特定结构
27. 可引起呼吸肌麻痹的疾病有
A. 吉兰-巴雷综合征(Guillain-Barré syndrome)
B. 高位颈髓肿瘤
C. 急性脊髓炎
D. 肋间神经痛
E. 多发性神经病
28. 脊髓空洞症的临床表现包括
A. 分离性感觉障碍
B. 自发疼痛
C. 肌肉萎缩
D. 腱反射活跃
E. 脑脊液糖、氯低,蛋白高
29. 关于年轻人颅内出血(ICH)最主要的危险因素,叙述错误的有
A. 高血压、抗凝治疗、脑淀粉样血管病
B. 高血压、脑血管畸形、物质滥用
C. 创伤、脑淀粉样血管病、脑血管畸形

- D. 抗凝治疗、创伤、惊厥
E. 脑血管炎、物质滥用、再灌注损伤
30. 对新型隐球菌脑膜炎的描述,正确的是
A. 多是在机体免疫力低下时发生该病
B. 本病的发病率较高
C. 病情重、大多预后不良
D. 该病不会单独发生,肯定合并于免疫功能缺陷性疾病
E. 用两性霉素治疗后可出现低钾、心律失常、氮质血症、白细胞减少等不良反应
31. 脑桥中央髓鞘溶解症可并发于哪些疾病
A. 半数病例系酒精中毒
B. 肝功能衰竭、肝移植后
C. 淋巴瘤及癌症晚期
D. 营养不良、败血症
E. 急性出血性胰腺炎、严重烧伤
32. 下列哪些为常见的帕金森病非运动症状
A. 便秘
B. 性功能减退
C. 流涎
D. 抑郁
E. 睡眠障碍
33. 肌阵挛性发作的特点是
A. 短暂快速的某一肌群收缩
B. 发作时间短、间隔时间长
C. 晨醒或入睡时频繁
D. EEG上为多棘慢波
E. 多为遗传性疾病
34. 有关典型偏头痛的临床表现,下列哪些说法是错误的
A. 发作前多出现先兆,以视觉先兆多见
B. 双侧头痛可排除偏头痛
C. 最常见的先兆为躯体感觉先兆
D. 头痛发生在先兆后,通常间隔1小时以上
E. 头颈部活动可使头痛减轻
35. 良性发作性位置性眩晕(BPPV)的特点包括
A. 位置诱发性
B. 短暂性
C. 互换性
D. 多变性
E. 疲劳性
36. 动神经元病的病因和发病机制包括
A. 谷氨酸兴奋毒性
B. 氧化应激
C. 病毒感染

- D. 线粒体功能障碍
E. 自身免疫机制
37. 关于共济失调的治疗,叙述正确的有
A. 共济失调伴维生素 E 缺乏症(AVED)的治疗为口服维生素 E 600~2 400 mg/d
B. 乙酰唑胺可用于治疗脊髓小脑共济失调(SCA)6 和发作性共济失调
C. 口服辅酶 Q 10 300~3 000 mg/d 可稳定共济失调伴辅酶 Q 10 缺乏患者的病情
D. 遗传性共济失调只能对症治疗
E. 发病前诊断 SCA 及早期治疗能延迟发病时间
38. 根据肌肉病理形态,可将肌肉疾病分为
A. 肌营养不良组织综合征
B. 肌病组织综合征
C. 肌炎组织综合征
D. 神经原性组织综合征
E. 间质损害导致的骨骼肌病变
39. 低钾型周期性瘫痪的诊断包括以下几项
A. 周期性发作的短时期肢体近端迟缓性瘫痪
B. 无意识障碍或感觉障碍
C. 发作时血钾 <3.5 mmol/L,以及心电图的低钾改变,间歇期正常
D. 部分患者有家族史
E. 肌肉疲劳试验阳性
40. 神经系统副肿瘤综合征包括
A. 小脑变性
B. 边缘叶脑炎
C. 脑脊髓炎
D. 副肿瘤性斜视眼阵挛-肌阵挛(POM)
E. 亚急性感觉神经元病
41. 在 SLE 应用激素冲击疗法中,下列哪些符合适应证
A. 急性肾衰竭
B. NP 狼疮的癫痫发作
C. NP 狼疮的明显精神症状
D. 严重溶血性贫血
E. 严重血小板减少性紫癜
42. 判断昏迷患者有无偏瘫的方法有
A. 压迫眶上切迹
B. 观察对针刺反应
C. 观察仰卧时下肢和足的位置
D. 提起上肢自然下落
E. 面部疼痛表情可判定有无面瘫
43. 关于肌电图检查中瞬目反射各波的意义,叙述正确的有
A. 瞬目反射由同侧 R_1 和 R_2 以及对侧 R_2 (R_2') 组成
B. R_1 称为早电位(或早成分),参与单突触反射
C. R_2 称为晚电位,参与多突触反射

- D. 刺激的对侧只能记录到 R_2 电位而不出现 R_1
E. 刺激的对侧只能记录到 R_1 电位而不出现 R_2
44. 男性,65 岁。10 小时前醒来发现右侧偏瘫,运动性失语,血压正常、脑 CT 未见异常。正确的治疗是
A. 止血剂
B. 低分子右旋酐酞
C. 尿激酶溶栓
D. 脑代谢活化剂
E. 高压氧
45. 关于中枢神经系统疾病脑脊液检查特点的描述,错误的是
A. 化脓性脑膜炎脑脊液外观混浊,葡萄糖明显减少
B. 细菌性脑膜炎脑脊液中性粒细胞增加
C. 脑室出血脑脊液外观混浊,以红细胞增加为主
D. 流行性乙型脑炎脑脊液外观清晰氯化物明显减少
E. 结核性脑膜炎脑脊液外观清晰,葡萄糖与血糖相近

三、共用题干题: 以下每道考题有 2~6 个提问,每个提问有 5 个备选答案,请选择 1 个最佳答案(46~49 题共用题干)

男性,40 岁。发热 1 月余,面部、颈部皮疹 20 余天。近 1 周患者感四肢无力,蹲下时起立困难,双臂上举不能过肩,并诉四肢肌肉按压痛,检查血 CK、LDH 明显升高。

46. 本患者考虑最可能的诊断为
A. 重症肌无力
B. 周期性瘫痪
C. 臂丛神经炎
D. 多发性肌炎
E. 皮炎
47. 本病的目前治疗首选
A. 皮质类固醇
B. 胆碱酯酶抑制剂
C. 钙剂
D. 补钾
E. 免疫抑制剂
48. 关于本患者,应高度警惕潜在的何种疾病的可能性
A. 肺部感染
B. 冠心病
C. 高血压病
D. 恶性肿瘤
E. 肾炎
49. 如激素治疗无效,可试用何种治疗
A. 功能训练
B. 补充营养
C. 钙剂