

中医骨伤科

副主任、主任医师资格考试

冲刺模拟卷

免费赠送
手机APP应用版



上海科学技术出版社

10套模拟试卷/1000道试题
紧扣考试大纲/题型全面丰富
两种版本互动/随时随地复习
自动批阅判分/汇总错题重做

高级卫生专业技术资格考试

中医骨伤科副主任、主任医师 资格考试冲刺模拟卷

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中医骨伤科副主任、主任医师资格考试冲刺模拟卷 /
高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编. —上
海: 上海科学技术出版社, 2019. 2
(考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试)
ISBN 978-7-5478-4355-0

I. ①中... II. ①高... III. ①中医伤科学—资格考试—
习题集 IV. ①R274-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 028943 号

授权码粘贴处

中医骨伤科副主任、主任医师资格考试冲刺模拟卷
高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

上海世纪出版(集团)有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235 www.stp.cn)

印刷

开本 850×1168 1/8 印张 11
字数 220千字
2019年2月第1版 2019年2月第1次印刷
ISBN 978-7-5478-4355-0/R·1794
定价: 58.00元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题, 请向工厂联系调换

前 言

为了进一步深化卫生专业职称改革,2000年人事部、卫生部下发了《关于加强卫生专业技术职务聘任工作的通知》。通知要求,卫生专业的副高级技术资格通过考试与评审相结合的方式获得,正高级技术资格通过评审委员会答辩后获得。根据通知精神和考试工作需要,副高级技术资格考试在全国各省、自治区、直辖市职称改革领导小组的领导下设立了多个考区。目前,很多地区正高级技术资格的评审工作也逐渐采用考评综合的方法。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘请相应技术职称的必要依据。

考试是为了加强临床医务人员对学科知识的系统了解和掌握,是提高医疗质量的一种手段。我国每年有20万以上需要晋升副高级和正高级职称的卫生专业人员,这些高级技术人员是我国医学发展的中坚力量,身兼承上启下的重任。本书不仅可以帮助广大考生通过考试,还可以使考生的专业知识更加扎实与牢固,以面对更加艰巨的任务。

为了帮助考生做好考前复习,我们仔细分析考试的命题规律和考试特点,严格按照考试大纲的要求,编写了本套“考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试”系列。每套冲刺模拟试卷包含10套习题,包括单选题、多选题、共用题干题和案例分析题4种题型。内容紧扣考试大纲,题型全面,题量丰富,具有很高的考试指导价值。

大纲将专业知识的要求分为3个层次,分别是“了解”“熟悉”“掌握”。安排题型难易程度,好比一棵树,掌握内容是主干部分,熟悉内容是分枝,而了解内容则是树叶。本套书以主干为主、分枝为其次、树叶为辅的要求编排,针对性强,突出重点。可以检验过往的复习成果,起到查漏补缺的作用。

为了方便考生复习迎考,本套冲刺模拟试卷包括纸质版和配套的手机APP应用版,做到随时随地互动复习,反复演练。配有同步练习题,自动批阅评分,并汇总错题强化训练,掌握做题技巧及命题规律,使广大考生轻松通过考试。

由于编写时间及水平有限,书中难免有疏漏与不足之处,希望广大考生与学者批评与指正。

考试命题研究委员会
2018年12月

目 录

冲刺模拟卷一	(1)
冲刺模拟卷二	(11)
冲刺模拟卷三	(19)
冲刺模拟卷四	(27)
冲刺模拟卷五	(35)
冲刺模拟卷六	(43)
冲刺模拟卷七	(51)
冲刺模拟卷八	(59)
冲刺模拟卷九	(67)
冲刺模拟卷十	(75)
参考答案	(83)

冲刺模拟卷一

一、单选题：以下每道考题有 5 个备选答案，请选择 1 个最佳答案

- 1973 年长沙马王堆汉墓发掘一批这个时期的医学佚书，下列哪项载有痈、骨疽、肿瘤等病名
A. 《伤寒杂病论》
B. 《仙授理伤续断秘方·仙正散》
C. 《五十二病方》
D. 《千金要方》
E. 《外台秘要》
- 肘部损伤不常见的并发症是
A. 骨化性肌炎
B. 神经损伤
C. 血管损伤
D. 感染
E. 骨生长畸形
- 根据损伤的发展过程，损伤初期一般指伤后
A. 24 小时内
B. 1 周内
C. 1~2 周内
D. 3 周内
E. 3~6 周
- 活组织穿刺为干酪样物质，为何病变
A. 巨细胞瘤
B. 单纯性骨囊肿
C. 化脓性疾患
D. 结核性病变
E. 骨肉瘤
- 手法复位相对不适合应用于
A. 关节内骨折不能解剖复位者
B. 有软组织嵌入骨折断端者
C. 骨折后两周仍有畸形者
D. 急诊疑有血管损伤者
E. 程度较轻的开放性骨折者
- 有一患者长时间步行引起第二跖骨骨折，问病因是何种外力
A. 直接暴力
B. 间接暴力
C. 肌肉强烈收缩
D. 持续劳损
E. 拼力岔气
- 男性，36 岁。骑自行车摔倒，右肩着地，右肩疼痛，右上肢不能抬举。来院就诊时，左手托右肘，下颌右偏。其诊断首先考虑
A. 锁骨骨折
B. 肩关节脱位
C. 肱骨外科颈骨折
D. 肱骨干骨折
E. 肩胛骨骨折
- 颞颌关节脱位中，习惯性脱位好发于
A. 青少年
B. 青壮年
C. 婴幼儿
D. 年老或多病者
E. 儿童
- 桡神经损伤可出现的症状是
A. 爪形手
B. 腕下垂
C. 小指感觉障碍
D. 第四、五指屈曲不全
E. 拇指不能对掌
- 牵引治疗颈椎病的作用不正确的是
A. 有利于水肿充血消退
B. 减轻椎间盘内的压力
C. 扩大椎间隙和椎间孔
D. 利于骨赘的吸收
E. 牵开被嵌顿的关节滑膜
- 肩关节周围炎病程日久肩臂部肌肉出现萎缩，较明显的是
A. 大圆肌
B. 小圆肌
C. 胸大肌
D. 三角肌
E. 胸小肌
- 骨化性肌炎易发生的部位是
A. 腕关节
B. 肘关节
C. 膝关节
D. 距小腿关节(踝关节)
E. 肩关节
- 对腕管综合征诊断有意义的体格检查方法是
A. 前臂伸肌群抗阻力试验
B. 压头试验
C. 屈腕试验



- D. 握拳尺偏试验
E. 搭肩试验
14. 腱鞘炎较少出现的症状是
A. 关节主动活动障碍
B. 有弹响
C. 疼痛
D. 局部有小结节
E. 皮肤红、肿、热
15. 腰椎间盘突出症患者的趾跖屈肌力减弱或消失,提示受压的神经根最可能是
A. S₁
B. L₅
C. L₄
D. L₃
E. L₂
16. 髓外旋运动的肌肉是
A. 臀大肌
B. 臀中肌
C. 臀小肌
D. 髂腰肌
E. 梨状肌
17. 半月板损伤病程日久可出现肌肉萎缩,最明显的是
A. 股四头肌
B. 股二头肌
C. 缝匠肌
D. 阔筋膜张肌
E. 股薄肌
18. 不属于踝内翻损伤多见的原因是
A. 外踝较内踝长
B. 内侧副韧带较外侧副韧带坚厚
C. 外踝内面关节面比较倾斜
D. 胫前肌较第三腓骨肌坚强
E. 距骨前宽后窄的形态
19. 中医学对骨关节病的认识不确切的是
A. 湿热阻络,关节凝涩而成痹
B. 风寒湿三气,合而为痹
C. 正气为邪所阻,气血凝滞而成痹
D. 肝肾不足,筋骨不坚,关节不利
E. 劳损经脉,瘀血积聚,为肿为痛
20. 锁骨骨折的好发部位是
A. 外 1/3 段
B. 中外 1/3 交界处
C. 中 1/3 段
D. 中内 1/3 交界处
E. 内 1/3 段
21. 关于伸直型桡骨下端骨折的叙述正确的是
A. 腕掌屈位着地所致
B. 合并尺骨茎突骨折少见
C. 可出现餐叉状畸形
D. 也可出现锅铲状畸形
E. 掌倾角加大
22. 下列骨折中,不属于完全骨折的是
A. 横断骨折
B. 嵌插骨折
C. 青枝骨折
D. 压缩骨折
E. 斜形骨折
23. 有关踝关节的解剖错误的是
A. 内外后踝构成踝穴
B. 内外踝的骨骺在一个平面
C. 踝背伸时踝穴增宽 1.5~2.0 mm
D. 外侧韧带不如内侧韧带坚强
E. 踝关节有 70°的伸屈活动范围
24. 陈旧性脱位手法复位的步骤,首先应用的方法是
A. 麻醉
B. 复位
C. 牵引
D. 松解
E. 按摩
25. 桡神经损伤可出现在
A. 肱骨髁上骨折
B. 肱骨中上 1/3 骨折
C. 肱骨干骨折
D. 肱骨中下 1/3 骨折
E. 肱骨髁间粉碎性骨折

二、多选题: 以下每道考题有 5 个备选答案,每题至少有 2 个正确答案

26. 在原始社会,人们已经能够制作一些较精细的工具,如
A. 曲针
B. 金属刀
C. 骨针
D. 石镰
E. 砭刀
27. 伤筋可能出现的并发症有
A. 撕脱性骨折



- B. 损伤性骨折
C. 骨性关节炎
D. 关节内游离体
E. 关节僵硬
28. 瘀血停积之证,下列脉象与之相顺的是
A. 洪大
B. 细脉
C. 芤脉
D. 涩脉
E. 实脉
29. 下列属于热熨法的有
A. 坎离砂
B. 活络油膏
C. 熨药
D. 活血酒
E. 伤油膏
30. 属于损伤中期的治法为
A. 行气消瘀法
B. 和营止痛法
C. 接骨续筋法
D. 补益肝肾法
E. 温经通络法
31. 严重创伤后易发生气性坏疽的部位是
A. 上肢
B. 下肢
C. 胸部
D. 腰背部
E. 臀部
32. 关节脱位手术复位的适应证是
A. 脱位并发骨折、韧带和肌腱撕裂
B. 关节僵硬
C. 骨化性肌炎
D. 脱位并发严重血管、经损伤者
E. 开放性脱位者
33. 伤肢长于健侧时多见于
A. 肩关节前脱位
B. 髋关节前脱位
C. 骨折过度牵引
D. 肘关节后脱位
E. 肘关节前脱位
34. 常见的手外伤原因有
A. 切、割、锯伤
B. 撕脱伤
C. 绞伤
D. 压、砸、挤伤
E. 动物咬伤
35. 由于桡神经损伤而引起的手的功能障碍表现为
A. 腕下垂
B. 第四、五指屈曲不全
C. 第一、二指不能屈曲
D. 拇指不能对掌
E. 拇指不能外展和背伸
36. 造成筋膜间隔血循环障碍恶性循环的两个主要环节是
A. 缺血
B. 肌肉挛缩
C. 水肿
D. 神经功能异常
E. 肌红蛋白尿
37. 心跳复苏成功的标准是
A. 血压维持在 8 kPa 以上
B. 口唇、甲床颜色好转
C. 对光反射重现
D. 瞳孔逐渐缩小
E. 呼吸逐渐恢复
38. 神经根型颈椎病的症状包括
A. 颈肩部疼痛和手指麻木感
B. 颈肩部活动受限
C. 颈部肌肉紧张
D. 吃饭时有呕吐现象
E. 肱二头肌肌腱反射减退
39. 颈椎病受压并可引起临床症状的组织有
A. 颈神经根
B. 颈部脊髓
C. 椎动脉
D. 交感神经
E. 食管
40. 肩关节周围炎的分期为
A. 急性瘀血期
B. 急性疼痛期
C. 粘连僵硬期
D. 粘连肿胀期
E. 瘀血粘连期
41. 肘部扭挫伤的压痛点多在
A. 前外方

- B. 内后方
 - C. 前内方
 - D. 内侧副韧带附着部
 - E. 外侧副韧带附着部
42. 腕管综合征临床常用的体格检查方法有
- A. 旋颈诱发试验
 - B. 压头试验
 - C. 神经根牵拉试验
 - D. 叩击试验
 - E. 屈腕试验
43. 腰椎椎管狭窄症的临床表现有
- A. 长期反复的腰腿疼痛麻木
 - B. 间歇性跛行
 - C. 直腿抬高试验阳性
 - D. 脊柱侧弯
 - E. 腰过伸试验阳性
44. 髋关节的活动范围大,能做
- A. 屈伸
 - B. 内收
 - C. 外展
 - D. 内旋、外旋
 - E. 环转
45. 破伤风患者应尽量避免的外界刺激是
- A. 风
 - B. 光
 - C. 声
 - D. 震动
 - E. 口腔清洁

三、共用题干题: 以下每道考题有 2~6 个提问,每个提问有 5 个备选答案,请选择 1 个最佳答案

(46~48 题共用题干)

男性,30 岁。今上午从 2 m 高处跳下后,当即倒地,不能站立,右小腿后侧下方处剧烈疼痛,局部肿胀,踝关节跖屈无力,小腿三头肌腹较左侧上移。

46. 本症应首选考虑的诊断是
- A. 胫骨骨折
 - B. 腓骨骨折
 - C. 踝部骨折
 - D. 踝部扭伤
 - E. 跟腱断裂
47. 应首选考虑的治疗方法是
- A. 手法整复

- B. 药物治疗
 - C. 手术治疗
 - D. 功能锻炼
 - E. 石膏固定
48. 跟腱断裂术后应石膏固定
- A. 2 周
 - B. 3~4 周
 - C. 4~6 周
 - D. 6~8 周
 - E. 3 个月

(49~50 题共用题干)

男性,60 岁。右髌、膝关节疼痛 2 年,加重 3 个月。现感疼痛明显加重,休息后亦无明显缓解。晨起髌关节有僵硬感,一般活动 15 分钟后僵硬感消失。体格检查:右膝关节无异常体征。右髌关节屈曲位,右“4”字试验阳性。髌关节前方及内收肌处压痛。髌关节内旋时疼痛加重。X 线片示髌关节关节间隙显著狭窄,股骨头变扁,股骨头颈处大量骨赘增生。股骨头及髌臼顶部可见多个囊性变区。右膝关节未见明显异常。

49. 该患者最可能的诊断是
- A. 右膝关节骨性关节炎
 - B. 右股骨头无菌性坏死
 - C. 右髌关节骨性关节炎
 - D. 右髌臼骨肿瘤
 - E. 右股骨头缺血性坏死
50. 该患者的治疗首选
- A. 髌关节截骨术
 - B. 人工股骨头置换术
 - C. 全髌关节置换术
 - D. 关节清理术
 - E. 钻孔减压术

(51~53 题共用题干)

男性,29 岁。有肺结核史 5 年,近 2 个月来腰背部痛伴低热、盗汗。查体: T_{11~12} 棘突压痛、叩击痛。

51. 对该患者最简便有效的诊断方法是
- A. 查血常规、红细胞沉降率(血沉)
 - B. MRI
 - C. 核素骨扫描
 - D. 摄胸腰椎正、侧位片
 - E. B 超
52. 最有助于诊断的检查是
- A. Dugas 征
 - B. Thomas 征
 - C. Trendelenburg 征
 - D. 直腿抬高试验



- E. 拾物试验
53. 确定为早期胸椎结核后,下列哪项措施不妥
- 中药及抗结核治疗
 - 卧硬板床
 - 立即手术,病灶清除
 - 全身支持疗法
 - 进一步检查其他部位有无结核,并做相应治疗
- (54~56 题共用题干)

女性,49 岁。双髋关节疼痛 2 年余,加重 2 个月。跛行,双髋关节活动受限。患者有因皮肤病曾长期服用激素病史。

54. 对该患者首先应做的检查是
- 腰椎正、侧位片
 - 双侧髋关节正位片
 - 髋关节穿刺
 - 髋关节穿刺+培养
 - 髋关节穿刺+活检
55. 该患者的初步诊断是
- 双髋类风湿性关节炎
 - 创伤性滑膜炎
 - 髋关节骨性关节炎
 - 双侧股骨头缺血性坏死
 - 髋关节结核
56. 为进一步明确诊断,下列哪项检查最有实用价值
- 髋关节 B 超
 - 髋关节 MRI 检查
 - 髋关节核素骨扫描
 - 髋关节血管造影
 - 髋关节穿刺+活检
- (57~58 题共用题干)

男孩,12 岁。因“四肢关节疼痛、活动障碍 1 年”来诊。查体:四肢关节显著增粗,膝关节屈曲畸形,手指短粗,活动受限,扁平足,四肢肌肉中度萎缩。X 线片:四肢骺板消失,部分骨化,骨端增粗。

57. 最可能的诊断是
- 类风湿关节炎
 - 慢性化脓性骨髓炎
 - 硬化性骨髓炎
 - 右股骨远端恶性肿瘤
 - 大骨节病
58. 治疗的重点在于
- 预防为主
 - 手术治疗
 - 中药内服

- 针灸
 - 物理治疗
- (59~60 题共用题干)

男性,58 岁。双膝关节疼痛 1 个月,疼痛剧烈,痛如刀割或针刺,痛有定处,常在夜间加剧,关节活动不利,舌质紫暗有瘀点,脉细涩。

59. 此病例证属
- 瘀血阻络
 - 肝肾亏虚
 - 气阴两虚
 - 外感寒湿
 - 中气下陷
60. 此病例治法为
- 祛风通络,除湿止痛
 - 培补肝肾,益气活血
 - 活血化瘀,散寒止痛
 - 祛风通络,理气止痛
 - 补益肝肾,佐以通络

四、案例分析题:每个案例至少有 3 个提问,每个提问有多个备选答案,其中正确答案有 1 个或几个

(61~64 题共用题干)

男孩,8 岁。因“从 2 m 高树上跌落 1 小时”来诊。患者跌落时右手掌着地,当时感右肘部疼痛难忍,继之出现肘部肿胀及功能障碍。

61. 损伤外因所属外力是
- 直接暴力
 - 间接暴力
 - 肌肉强烈收缩力
 - 扭转暴力
 - 持续劳损
 - 牵引力
62. 按损伤发生过程及力的性质,损伤类型属于
- 急性损伤
 - 慢性损伤
 - 外伤性损伤
 - 病理性损伤
 - 擦伤
 - 亚急性损伤
63. 明确诊断需做的检查有
- 询问受伤时的姿势
 - 是否出现畸形
 - 触诊是否有压痛部位
 - 检查是否有环形压痛

- E. X线片
- F. CT

64. 急诊处理的原则是
- A. 检查是否颅脑损伤
 - B. 检查患肢的血液循环情况
 - C. 患处行临时固定后摄 X 线片
 - D. 切开复位内固定
 - E. 及时手法复位固定
 - F. 首先清创

(65~68 题共用题干)

男性,68 岁。因“左肩关节外伤 1 小时”来诊。X 线片:左肩关节脱位并肱骨大结节骨折。

65. 正确的急诊处理是
- A. 静脉补液
 - B. 适当的麻醉
 - C. 悬吊制动
 - D. 手法复位治疗
 - E. 血常规检查
 - F. 心电图
 - G. 切开复位治疗
66. 肩关节易脱位的原因有
- A. 肩关节活动范围大
 - B. 肩关节为球窝关节
 - C. 关节囊韧带松弛、薄弱
 - D. 肩关节表浅,容易遭受外力打击
 - E. 关节囊韧带松弛、薄弱
 - F. 关节囊前方缺乏韧带和肌肉覆盖
 - G. 肩关节表浅,外伤后盂唇易与关节盂分离
67. 肩关节脱位复位不成功的原因是
- A. 关节囊嵌入
 - B. 肱二头肌腱嵌入
 - C. 肱三头肌嵌入
 - D. 肩袖嵌入
 - E. 关节粘连
 - F. 关节肿胀
68. 肩关节前脱位关节复位成功后正确的处理是
- A. 将患肩制动于内收、内旋位
 - B. 将患肩制动于外展、外旋位
 - C. 检查神经、血管体征
 - D. 无须 X 线片复查
 - E. X 线片复查
 - F. MRI 复查
 - G. 静脉补液

(69~71 题共用题干)

男性,53 岁。因“前上臂刀伤,流血、疼痛、活动不利 1 小时”来诊。查体:伤口位于前上臂桡侧。X 线片:未见骨折。

69. 正确的处理措施是
- A. 局部加压包扎
 - B. 急诊清创探查修复术
 - C. 用肥皂水刷洗创口周围皮肤,再用生理盐水洗净创口周围,最后再冲洗创口
 - D. 如无特殊情况,创口应力争一期闭合
 - E. 即使无血管、神经损伤,也需要石膏固定前臂
 - F. 应用破伤风抗毒血清
 - G. 术后可酌情选择抗生素预防感染
70. 探查切口可见桡骨小头软骨损伤。最有可能损伤的组织有
- A. 肱桡肌
 - B. 肱二头肌肌腱
 - C. 桡神经
 - D. 桡动脉
 - E. 正中神经
 - F. 尺神经
 - G. 掌长肌
71. 可能出现的并发症有
- A. 垂腕畸形
 - B. 猿手畸形
 - C. 爪形手畸形
 - D. 前臂外侧皮肤感觉障碍
 - E. 前臂骨筋膜间室综合征
 - F. 掌侧皮肤感觉障碍
 - G. 掌背侧皮肤感觉障碍

(72~74 题共用题干)

女性,56 岁。因“颈肩疼痛伴右下肢酸沉无力 2 个月”来诊。查体:患者颈肩部未见明显畸形,C_{4~6}棘突旁压痛(+),椎间孔挤压试验(±),双侧霍夫曼征(+);双膝腱反射活跃,右下肢肌张力增高。

72. 为明确诊断,应首先进行的检查项目包括
- A. 肩关节正位 X 线片
 - B. 颈椎正、侧位 X 线片
 - C. 血常规
 - D. 心电图
 - E. 肌电图
 - F. 颈部 MRI
73. 该病的鉴别诊断包括
- A. 梅尼埃病
 - B. 脊髓空洞症
 - C. 多发性硬化



- D. 肩周炎
E. 颈椎结核
F. 颈椎椎管内肿瘤
74. 首选手术治疗的情况是
- A. 肌力进行性减退
B. 影像学检查发现突出,但硬膜受压不明显
C. 保守治疗 6 周,症状减轻
D. 保守治疗 6 周,症状无明显改善
E. 保守治疗 6 个月,症状无改善
F. 患者同时伴有严重心脑血管疾病

(75~79 题共用题干)

女性,65 岁。因“双手及膝关节变形、僵硬、屈伸不利,肌肉萎缩”来诊。患者 15 年前出现双手部分关节疼痛;4 个月后又出现肿胀及活动受限,并逐渐累及双手其他关节,呈对称性;1 年后双膝关节出现疼痛、肿胀、活动受限,右侧肘关节后方发现皮下结节。此后症状反复发作,劳累后加重,休息及服非甾体消炎镇痛药后减轻。查体:双手呈鳍形手,诸关节骨端肥大,双膝关节轻度肿胀,股四头肌萎缩,膝关节骨端增大,呈内翻畸形,舌质淡,苔白,脉细弱。X 线片:双侧腕关节、掌指、指间关节间隙接近消失,双膝关节间隙狭窄明显,呈内翻畸形。

75. 可能的诊断是
- A. 神经性关节炎
B. 血友病性关节炎
C. 类风湿关节炎
D. 风湿性关节炎
E. 疔痹病
F. 痛风性关节炎
76. 目前还需要做的检查包括
- A. CT 平扫
B. 关节液检查
C. 动态红细胞沉降率
D. 类风湿因子检查
E. 血常规
F. MRI
77. 中医治疗的方法是
- A. 祛风散寒除湿,温经通络镇痛
B. 活血化瘀,消肿镇痛
C. 补益肝肾,通络镇痛
D. 补肾祛寒,通经活络
E. 清热通络,疏风胜湿
F. 活血化瘀,疏风散寒
78. 中医治疗的首选方剂是
- A. 真武汤加减
B. 独活寄生汤加减
C. 蠲痹汤加减

- D. 补肾祛寒治尪汤
E. 血府逐瘀汤加减
F. 身痛逐瘀汤加减

79. 若对该患者膝关节采用手术治疗,适合的术式是

- A. 膝关节镜
B. 人工全膝关节置换术
C. 人工膝关节表面置换术
D. 截骨术
E. 关节融合术
F. 软骨成形术

(80~84 题共用题干)

男性,40 岁。因“腰背酸痛 2 年”来诊。患者双下肢痿软无力,行动不能自主,伴有午后潮热,颧红,夜间盗汗,口燥咽干,食欲减退,偶有咳痰、咯血。查体:舌红,苔少,脉细数。

80. 目前还需要完善的检查包括

- A. X 线片
B. 血常规
C. 结核菌素试验
D. 动态红细胞沉降率
E. CT
F. MRI

81. 可能的诊断是

- A. 脊柱结核
B. 强直性脊柱炎
C. 膝关节结核
D. 龟背痰
E. 骨结核
F. 颈椎病

82. 该病当前的证型为

- A. 阴虚内热
B. 阳虚痰凝
C. 肝肾阴虚
D. 邪毒内蕴
E. 痰凝血瘀
F. 湿热蕴结
G. 气滞血瘀
H. 瘀血阻络

83. 该病当前的治疗原则是

- A. 托毒透脓
B. 补益肝肾
C. 祛瘀化痰
D. 养阴清热
E. 补肾温经,散寒化痰

- F. 活血化瘀
- G. 清热祛湿

84. 该病当前的首选治疗方剂为

- A. 阳和汤
- B. 六味地黄丸合透脓散加减
- C. 神功内托散
- D. 大补阴丸
- E. 六味地黄丸
- F. 左归丸
- G. 右归丸
- H. 桃红四物汤
- I. 清瘟败毒散

(85~87 题共用题干)

男性,65岁。因“车祸致第6肋(左)骨折”急诊入院。查体:患者意识清,左侧胸廓略有塌陷,胸部皮肤无创口,血压75/40 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),呼吸窘迫,面色发绀,语颤减低,第6肋平腋中线处明显压痛(+),胸廓挤压征(+),左胸部呼吸运动减弱。

85. 初步诊断为

- A. 左第6肋骨骨折
- B. 开放性气胸
- C. 血胸
- D. 张力性气胸
- E. 创伤性休克
- F. 闭合性气胸
- G. 外伤性膈疝
- H. 胸椎骨折

86. 宜选用的整复方法是

- A. 俯卧位整复法
- B. 侧卧位整复法
- C. 立位整复法
- D. 攀索叠砖法
- E. 坐位整复法
- F. 仰卧位整复法
- G. 半卧位整复法
- H. 半仰卧位整复法

87. 提示患者肋骨骨折后期,胸部隐隐作痛。可选方剂有

- A. 三棱和伤汤
- B. 黎洞丸
- C. 金铃子散
- D. 柴胡疏肝汤
- E. 八珍汤
- F. 十全大补汤
- G. 血府逐瘀汤

H. 半夏瓜蒌厚朴汤

(88~91 题共用题干)

女性,32岁。因“拇指背伸无力”来诊。患者3个月前摔伤致左桡骨远端骨折,经手法复位夹板外固定后骨折愈合。

88. 主要考虑的诊断为

- A. 桡神经损伤
- B. 拇长伸肌腱断裂
- C. 拇长屈肌挛缩
- D. 腕管综合征
- E. 拇长展肌腱断裂
- F. 拇长屈肌腱断裂

89. 可选择的治疗方式是

- A. 肌腱探查修复
- B. 保护性被动活动
- C. 行石膏外固定2周
- D. 超声治疗
- E. 肌腱移位术
- F. 电磁疗

90. 提示患者伴随有大鱼际肌萎缩,掌侧皮肤感觉障碍。可能的原因为

- A. 桡神经损伤
- B. 拇长伸肌腱断裂
- C. 拇长屈肌挛缩
- D. 腕管综合征
- E. 拇长展肌腱断裂
- F. 拇长屈肌腱断裂

91. 提示患者伴随有大鱼际肌萎缩,掌侧皮肤感觉障碍。可选择的治疗方式是

- A. 肌腱探查修复
- B. 保护性被动活动
- C. 行石膏外固定2周
- D. 神经松解术
- E. 神经、肌腱移位术
- F. 电磁疗

(92~94 题共用题干)

女性,77岁。因“摔倒后腰部疼痛,不能直立行走3个月,加重7天”来诊。患者摔倒次日出现便秘、腹胀。自行口服泻药缓解,未做正规治疗。7天前因弯腰不当导致症状加重,腰背部刺痛,大声说话、咳嗽、深呼吸时疼痛加重,翻身时疼痛剧烈,尿便可,食欲、睡眠差。查体:腰椎后凸畸形,第1、第4腰椎椎体棘突压痛和叩击痛明显。舌质暗,苔薄白,脉沉弦细。腰椎正侧位直接数字化X线摄影(DR):第1、第4腰椎椎体变扁,椎体高度减低,上缘不同程度凹陷;腰椎生理曲度变直,所示腰椎椎体骨质疏松。其他未见异常。

92. 最可能的诊断是

- A. 腰椎间盘突出症
- B. 骨质疏松症

- C. 腰椎退行性关节炎
 - D. 骨髓瘤
 - E. 强直性脊柱炎
 - F. 类风湿关节炎
93. 应进行的进一步检查有
- A. 血清钙
 - B. 碱性磷酸酶
 - C. 骨密度测定
 - D. CT 平扫
 - E. 血清磷
 - F. 骨髓穿刺术
94. 该病的防护措施包括
- A. 获得理想的骨峰值
 - B. 晒太阳
 - C. 预防骨量丢失
 - D. 适当运动
 - E. 防止跌倒
 - F. 加强营养



冲刺模拟卷二

一、单选题：以下每道考题有 5 个备选答案，请选择 1 个最佳答案

- “肾气热，则腰脊不举，骨枯而髓减，发为骨痿”出自
 - 《灵枢·经脉》
 - 《千金要方·骨极》
 - 《伤寒论》
 - 《肘后方》
 - 《素问·痿论篇》
- 筋伤的病因主要是
 - 直接暴力、间接暴力
 - 年龄、体质
 - 局部解剖结构、职业
 - 外力伤害、慢性劳损
 - 风寒湿邪、职业因素
- 骨组织钙需达多少，方能在 X 线片上表现出来
 - 5%~10%
 - 10%~20%
 - 20%~40%
 - 30%~50%
 - 40%~60%
- 骨折这一病名出自
 - 《外台秘要》
 - 《仙授理伤续断秘方》
 - 《世医得效方》
 - 《千金要方》
 - 《黄帝内经》
- 桡骨下端的掌倾角正常应为
 - 5°~10°
 - 10°~25°
 - 15°~20°
 - 25°~30°
 - 30°~35°
- 在肱骨干骨折，牵引时若牵引力过大，将容易出现
 - 血管痉挛
 - 骨断端分离移位
 - 神经损伤
 - 断端内软组织嵌入
 - 肌肉痉挛
- 首次记载髌关节脱臼分为前后脱臼两类的是
 - 巢元方《诸病源候论》
 - 蔺道人《仙授理伤续断秘方》
 - 宋慈《洗冤集录》
 - 危亦林《世医得效方》
 - 王肯堂《证治准绳》
- 骨折的内因不包括
 - 年龄
 - 全身健康状况
 - 骨的解剖部位
 - 骨的长度
 - 骨骼健康状况
- 掌侧屈腕肌是
 - 指伸屈肌、掌长肌、桡侧腕屈肌
 - 指浅屈肌、掌长肌、尺侧腕屈肌
 - 桡侧腕屈肌、尺侧腕屈肌、掌长肌
 - 足跖长屈肌、掌长肌、桡侧腕屈肌
 - 足跖长肌腱、掌长肌、指深屈肌
- 桥脑损伤的瞳孔变化特点是
 - 双侧极度散大
 - 双侧极度缩小
 - 单侧极度散大
 - 单侧极度缩小
 - 无变化
- 对胸段脊髓损伤水平的定位具有重要意义的是
 - 肋间肌麻痹与否
 - 下肢有无瘫痪
 - 感觉平面改变
 - 腱反射如何
 - 提睾反射是否消失
- 伤筋初期的治疗原则是
 - 活血和营，舒筋活络
 - 活血祛瘀，理气止痛
 - 温经止痛，滑利关节
 - 温经散寒，祛风止痛
 - 补益肝肾，宣痹通络
- 颈椎退变的组织不包括
 - 椎间盘
 - 椎体
 - 关节突
 - 关节囊韧带
 - 神经

14. 冈上肌腱炎疼痛弧出现在肩关节外展
- 0~30°
 - 30°~60°
 - 60°~90°
 - 60°~120°
 - 120°以上
15. 肩关节周围炎可出现的阳性体征是
- 直尺试验阳性
 - 搭肩试验阳性
 - 耸肩征阳性
 - “疼痛弧”征阳性
 - 臂丛牵拉试验阳性
16. Mills 征是检查
- 肱骨内上髁炎
 - 肱骨外上髁炎
 - 桡骨小头半脱位
 - 桡侧副韧带断裂
 - 上尺桡关节损伤
17. 腰椎管狭窄症典型的临床症状是
- 腰痛
 - 腿痛
 - 间歇性跛行
 - 感觉减退
 - 腰部活动功能障碍
18. 急性腰扭伤的不常见原因是
- 动作失调
 - 姿势不良
 - 搬物过重
 - 重心失衡
 - 准备不足
19. 关于髋部扭挫伤的描述,正确的是
- 直接暴力扭伤多见
 - 间接暴力扭伤多见
 - 扭伤后须严格固定
 - Thomas 征阴性
 - 扭伤后出现弹性固定
20. 研磨性外力引起的半月板损伤多见
- 内侧半月板
 - 外侧半月板
 - 半月板中央
 - 半月板边缘
 - 全部半月板

21. 运动中的篮球运动员出现半月板损伤,其致伤外力多为
- 撕裂性外力
 - 爆裂性外力
 - 研磨性外力
 - 牵张性外力
 - 碰撞
22. 跟腱损伤后石膏固定的位置应采用
- 踝关节内翻位
 - 踝关节外翻位
 - 踝关节跖屈位
 - 踝关节背伸位
 - 踝关节功能位
23. 目前不提倡的骨关节病手术方式为
- 人工关节置换术
 - 关节神经支切除术
 - 截骨术
 - 关节清除术
 - 关节融合术
24. 有“筋之府”之称的关节是
- 肩关节
 - 肘关节
 - 髋关节
 - 膝关节
 - 踝关节
25. 梨状肌是
- 股骨外旋肌
 - 股骨外展肌
 - 股骨内收肌
 - 屈髋肌
 - 伸髋肌

二、多选题: 以下每道考题有 5 个备选答案,每题至少有 2 个正确答案

26. 伤科学是研究下列何种损伤疾患的科学
- 皮肉
 - 筋骨
 - 气血
 - 脏腑
 - 经络
27. 《仙授理伤续断秘方》首次描述的是
- 髋关节脱位
 - 将髋关节脱位分前后脱位两类
 - 颞颌关节脱位



- D. 颞颌关节脱位的口内复位法
E. 颞颌关节脱位的口外复位法
28. 损伤按部位不同可分为
- 皮肉伤
 - 筋骨伤
 - 脏腑伤
 - 内伤
 - 外伤
29. 筋是指人体哪些组织
- 肌肉肌腱
 - 浅深筋膜
 - 韧带腱鞘
 - 关节囊及软骨
 - 黏膜及皮肤
30. 骨病的局部一般症状有
- 疼痛
 - 肿胀
 - 障碍
 - 畸形
 - 肌萎缩
31. 创伤感染的局部症状有
- 红
 - 热
 - 肿
 - 麻木
 - 痛
32. 小夹板应有的物理特性是
- 弹性
 - 韧性
 - 可塑性
 - X线易穿透性
 - 方便实用性
33. 皮牵引的注意事项,正确的是
- 注意血循环
 - 重量 $<5\text{ kg}$
 - 时间在4~6周以内
 - 胶布的过敏问题
 - 胶布的松脱
34. 以下为不稳定骨折的有
- 斜形骨折
 - 螺旋骨折
 - 多段骨折
 - 粉碎骨折
 - 横断骨折
35. 股骨干骨折畸形愈合行手法折骨的适应证是
- 成角大于 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$
 - 旋转大于 30°
 - 重叠在2~3 cm以上
 - 骨折在3个月以内,愈合未坚固
 - 患者体质较好
36. 肩锁关节脱位的临床表现包括
- 被动活动时患侧锁骨外侧端活动范围增加,肩关节功能障碍
 - 肩峰显著突出,形成典型的“方肩”畸形
 - 三角肌下有空虚感,在正常位置不能扪及肱骨头
 - 肩锁关节处可摸到一凹陷沟,局部按压有明显弹跳征,如按琴键
 - 搭肩试验(Dugas征)及直尺试验阳性
37. 陈旧性脱位,手法复位的禁忌证有
- 60岁以上的老年患者
 - 关节脱位超过3~6个月
 - 关节周围已形成骨化性肌炎
 - 脱位合并骨折,骨块已在畸形位置愈合
 - 脱位的关节僵硬
38. Salter-Harris I型骨骺损伤的特点
- 单纯的骨骺分离
 - 骨折线不累及骺板的生发层
 - 常由剪力和牵拉致伤
 - 主要见于年幼儿童
 - 预后良好
39. 手外伤清创时应注意
- 争取在6~9小时内进行
 - 争取在24小时内进行
 - 骨折与脱位均尽可能当时予以复位固定
 - 尽量保留充分皮肤
 - 最好不用止血带
40. 关于手的功能位,正确的说法有
- 腕背伸 30°
 - 掌指关节屈曲 45°
 - 近侧指间关节屈曲 45°
 - 远侧指间关节屈曲 $25^{\circ}\sim 30^{\circ}$
 - 远侧指间关节屈曲 45°
41. 心跳呼吸骤停主要诊断指标是
- 双侧瞳孔散大,对光反射消失
 - 心音消失
 - 手术切口无出血

- D. 突然神志丧失或抽搐
 - E. 心电图呈一直线
42. 严重创伤后易发生气性坏疽的部位是
- A. 上肢
 - B. 下肢
 - C. 胸部
 - D. 腰背部
 - E. 臀部
43. 肩关节的自主运动包括
- A. 上举
 - B. 外展
 - C. 内旋
 - D. 外旋
 - E. 屈曲
44. 旋后肌综合征的特征有
- A. 垂指但不垂腕
 - B. 垂指且垂腕
 - C. 肌肉瘫痪且感觉异常
 - D. 肌肉瘫痪但感觉正常
 - E. 腕部活动时可出现捻发音
45. 肱骨外上髁炎的临床表现主要有
- A. 肘外侧疼痛
 - B. 肘外侧压痛
 - C. 热敷肘部疼痛减轻
 - D. 屈腕试验阳性
 - E. 前臂伸肌群抗阻力试验阳性

三、共用题干题：以下每道考题有 2~6 个提问，每个提问有 5 个备选答案，请选择 1 个最佳答案

(45~51 题共用题干)

女性，28 岁。从高处跌落 1 小时急送医院后查体：神清、腹痛，右股骨畸形疼痛。

46. 医师应首先进行哪方面检查
- A. 右股部有无反常活动
 - B. 右股部有无骨擦音或骨擦感
 - C. 生命体征的检查
 - D. 诊断性腹腔穿刺
 - E. 检查胫前后动脉的搏动情况
47. 若患者的一般情况尚可，应对该患者进行哪些处理
- A. 急症行剖腹探查术
 - B. 密切观察患者腹部情况及全身情况变化
 - C. 行急症下肢手术治疗
 - D. 密切观察病情的同时对右下肢进行简单的外固定

- E. 探查胫前动脉是否损伤，以便修复
48. 若患者最后诊断是右股骨下 1/3 螺旋形骨折，右侧坐骨支及耻骨支骨折，伴轻度移位，若采用牵引治疗，应用以下哪种牵引最为合理
- A. 跟骨牵引
 - B. 胫骨结节牵引
 - C. 股骨髁上牵引
 - D. 下肢皮牵引
 - E. 颅骨牵引
49. 3 天后患者腹部情况完全改善，生命体征稳定，但右胫前动脉搏动减弱，此时应采取哪种治疗方法
- A. 外固定支架固定
 - B. 手法复位+石膏托外固定
 - C. 右股骨切开复位内固定+血管探查
 - D. 右股骨行垂直悬吊牵引
 - E. 探查血管后石膏管型外固定
50. 术后舌红，苔黄，应采用的中药辨证治疗原则是
- A. 舒筋活络
 - B. 攻下逐瘀
 - C. 温经通络
 - D. 活血化瘀
 - E. 接骨续筋
51. 术后应采用以下哪个方剂治疗
- A. 桃核承气汤
 - B. 清心汤
 - C. 舒筋活血汤
 - D. 和营止痛汤
 - E. 大活络丹

(52~54 题共用题干)

男性，27 岁。2 小时前弯腰工作时，边墙倒塌，砸伤右侧腰臀部致右膝跪地，当即觉右臀部疼痛，右下肢不能站立、活动。检体：右侧臀部皮肤擦伤，轻度肿胀，右臀部膨隆，患肢呈屈曲、内收、内旋畸形，右大转子上移，患肢较健侧短缩，伤侧膝部靠在对侧大腿上。患肢末端血运、感觉及足趾活动良好。X 线片示右髋关节脱位，股骨头向后上方移位。

52. 最可能的诊断是
- A. 右股骨颈骨折
 - B. 右股骨转子间骨折
 - C. 右髋关节后脱位
 - D. 右髋关节前脱位
 - E. 右髋关节中心性脱位
53. 该病例应该采用的整复手法是
- A. 反回旋法
 - B. 回旋法
 - C. 膝顶拔伸法