



考试掌中宝

高级卫生专业技术资格考试

新媒体复合版

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

# 副主任、主任护师 资格考试

## 冲刺模拟卷

(第2版)



上海科学技术出版社

20套模拟试卷/2000道试题  
紧扣考试大纲/题型全面丰富  
两种版本互动/做到随时随地  
自动批改判分/汇总错题重做



# 副主任、主任护师 资格考试冲刺模拟卷

(第2版)

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据


副主任、主任护师资格考试冲刺模拟卷 / 高级卫生  
专业技术资格考试命题研究委员会组编. —2版. —上  
海: 上海科学技术出版社, 2019.1

(考试掌中宝. 高级卫生专业技术资格考试)

ISBN 978-7-5478-4296-6

I. ①副… II. ①高… III. ①护理学-资格考试-习  
题集 IV. ①R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 002657 号



- 错题重做、自动收藏, 好题时时温故
- 习题评论、纵情吐槽, 考友共同进步
- 紧扣考纲、题型全面, 题量充足丰富

使用方法: 扫描二维码—手机号注册账号并输入授权码—根据页面提示下载APP并在相应  
模块中使用

授权码粘贴处

副主任、主任护师资格考试冲刺模拟卷(第2版)  
高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

上海世纪出版(集团)有限公司 出版、发行  
上海科学技术出版社  
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235 www.stpp.cn)

印刷

开本 850×1168 1/8 印张 25.75

字数 510 千字

2015年8月第1版

2019年1月第2版 2019年1月第3次印刷

ISBN 978-7-5478-4296-6/R·1761

定价: 68.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题, 请向工厂联系调换

## 再版前言

为了进一步深化卫生专业职称改革,2000年人事部、卫生部下发了《关于加强卫生专业技术职务聘任工作的通知》。通知要求,卫生专业的副高级技术资格通过考试与评审相结合的方式获得,正高级技术资格通过评审委员会答辩后获得。根据通知精神和考试工作需要,副高级技术资格考试在全国各省、自治区、直辖市职称改革领导小组的领导下设立了多个考区。目前,很多地区正高级技术资格的评审工作也逐渐采用考评综合的方法。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘请相应技术职称的必要依据。

考试是为了加强临床医务人员对学科知识的系统了解和掌握,是提高医疗质量的一种手段。我国每年有20万以上需要晋升副高级和正高级职称的卫生专业人员,这些高级技术人员是我国医学发展的中坚力量,身兼承上启下的重任。本书不仅可以帮助广大考生通过考试,还可以使考生的专业知识更加扎实与牢固,以面对更加艰巨的任务。

为了帮助考生做好考前复习,我们仔细分析考试的命题规律和考试特点,严格按照考试大纲的要求,编写了本套“考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试”系列。每套冲刺模拟卷包含20套习题,包括单选题、多选题、共用题干题和案例分析题4种题型。根据近年来的考试变化,本书对第1版进行了修订,对各题型试题比例进行了调整,由1600题增加至2000题,尤其增加了案例分析题的题量和难度,安排更加合理,更加贴近考试。本书内容紧扣考试大纲,题型全面,题量丰富,具有很高的考试指导价值。

大纲将专业知识的要求分为3个层次,分别是“了解”“熟悉”“掌握”。安排题型难易程度,好比一棵树,掌握内容是主干部分,熟悉内容是分枝,而了解内容则是树叶。本套书以主干为主、分枝为其次、树叶为辅的要求编排,针对性强,突出重点。可以检验过往的复习成果,起到查漏补缺的作用。

为了方便考生复习迎考,本套冲刺模拟卷包括纸质版和配套的手机APP应用版,做到随时随地互动复习,反复演练。配有同步练习题,自动批阅评分,并汇总错题强化训练,掌握做题技巧及命题规律,使广大考生轻松通过考试。

由于编写时间及水平有限,书中难免有疏漏与不足之处,希望广大考生与学者批评与指正。

考试命题研究委员会  
2018年12月

## 目 录

冲刺模拟卷一 .....	( 1 )
冲刺模拟卷二 .....	( 11 )
冲刺模拟卷三 .....	( 21 )
冲刺模拟卷四 .....	( 31 )
冲刺模拟卷五 .....	( 41 )
冲刺模拟卷六 .....	( 51 )
冲刺模拟卷七 .....	( 61 )
冲刺模拟卷八 .....	( 71 )
冲刺模拟卷九 .....	( 81 )
冲刺模拟卷十 .....	( 91 )
冲刺模拟卷十一 .....	( 101 )
冲刺模拟卷十二 .....	( 111 )
冲刺模拟卷十三 .....	( 121 )
冲刺模拟卷十四 .....	( 131 )
冲刺模拟卷十五 .....	( 141 )
冲刺模拟卷十六 .....	( 151 )
冲刺模拟卷十七 .....	( 161 )
冲刺模拟卷十八 .....	( 169 )
冲刺模拟卷十九 .....	( 179 )
冲刺模拟卷二十 .....	( 189 )
参考答案 .....	( 199 )

## 冲刺模拟卷一

一、单选题：以下每道考题的备选答案中，请选择 1 个最佳答案

- 对医患关系中基本的道德规范描述最正确的是  
A. 医患双方尊重彼此的权利和履行相互的义务  
B. 医护人员尊重患者的权利  
C. 患者尊重医护人员的权利  
D. 医护人员尽职尽责为患者服务  
E. 患者尊重医护人员的人格与劳动
- 王先生,70岁,高血压史30年,于家中如厕时突感头晕,随即倒地而被送入院,诊断为脑出血。护理体检:昏迷,左侧偏瘫,血压为25.3/14.6 kPa(190/110 mmHg)。护士保持王先生安静卧床,护理动作轻柔。其目的是  
A. 防止颅内压升高  
B. 改善脑缺氧  
C. 减轻脑水肿  
D. 保持呼吸道通畅  
E. 避免外伤
- 患者王先生患急性胰腺炎,今日上午8:20开始补液1000 ml,50滴/分,请计算液体何时输完(每ml按15滴计算)  
A. 上午11时  
B. 中午12时20分  
C. 下午1时20分  
D. 下午2时  
E. 下午2时20分
- 病情与呼吸异常不符的一项是  
A. 高热:呼吸浅而快  
B. 脑水肿:呼吸深而慢  
C. 巴比妥中毒:呼吸浅而快  
D. 酸中毒:呼吸深而大  
E. 胸膜炎:呼吸浅而快
- 下列基础代谢率值属轻度甲亢的是  
A. +10%  
B. +15%  
C. +25%  
D. +40%  
E. +50%
- 诊断心律失常最重要、最常用的无创检查技术是  
A. 运动试验  
B. 事件记录器  
C. 食管心电图  
D. 动态心电图  
E. 心电图
- 8个月小儿,面黄来诊,自幼母乳喂养,未加辅食,初诊为营养性巨幼红细胞贫血,下述哪项处理最重要  
A. 增加辅助食品  
B. 使用维生素B<sub>12</sub>、叶酸  
C. 口服铁剂  
D. 口服维生素C  
E. 输血
- 属于原位菌群三度失调表现的是  
A. 假膜性肠炎  
B. 肠功能紊乱  
C. 慢性腹泻  
D. 慢性咽喉炎  
E. 慢性口腔炎
- 患者,男,60岁,10年前发现乙型肝炎,2年前发现肝硬化,此次住院行胃底食管静脉曲张离断术,今日为术后第一天,8点钟发现胃管抽出暗红色血液。请问此患者以后可能出现  
A. 肠系膜血栓  
B. 肝性脑病  
C. 胃穿孔  
D. 腹腔感染  
E. 腹腔积液
- 下列哪种关系模式的特点是“告诉患者做什么”  
A. 合作分工型  
B. 共同参与型  
C. 主动-被动型  
D. 指导-合作型  
E. 教育-服从型
- 患者,男,40岁,留置左侧胸腔闭式引流管时使用利多卡因100 mg局部麻醉,5分钟后出现呼吸困难、惊厥等症状。以下措施错误的是  
A. 保护患者,防止意外损伤  
B. 吸氧  
C. 半卧位  
D. 补液  
E. 静脉注射地西泮
- 胃肠道手术留置胃管时,拔胃管的指征是  
A. 肠鸣音恢复  
B. 引流胃液转清  
C. 术后48~72小时  
D. 肛门排气后  
E. 无腹胀、呕吐



13. 最易引起再生障碍性贫血的药物是
- 保泰松
  - 磺胺类
  - 阿司匹林类
  - 氯霉素
  - 环磷酰胺
14. 心脏停搏及早发现的可靠依据是
- 呼之不应
  - 呼吸停止
  - 颈动脉和股动脉搏动感消失
  - 测不到血压
  - 看不到心尖搏动
15. 男婴,1岁,突发腹痛、呕吐、便血,并可触及腹部包块,应首先考虑
- 粘连性肠梗阻
  - 肠套叠
  - 肠扭转
  - 幽门梗阻
  - 肠系膜血栓形成
16. I类环境的空气消毒只可采用
- 层流通风
  - 臭氧发生器协同开窗通风
  - 紫外线灯管和臭氧发生器协同作用
  - 静电吸附式空气消毒器消毒
  - 循环风紫外线空气消毒器消毒
17. 下列哪项为产后异常的临床表现
- 产后12小时体温37.8℃
  - 产后3天下腹部阵痛,有时需要服用止痛药
  - 产后4天仍为血性恶露
  - 经阴道分娩的产妇,产后半个月宫底在耻骨上一横指
  - 产后4天,双乳房出现肿、胀、痛
18. 关于倾倒综合征的表现,下列错误的是
- 发生于饮食后10~20分钟
  - 上腹胀痛,心悸,出汗,恶心,呕吐
  - 重者可有肠鸣、腹泻
  - 平卧几分钟可缓解
  - 严重者可引起休克
19. 医德评价的标准不包含
- 有利
  - 自主
  - 公正
  - 互助
  - 奉献
20. 赵先生,50岁,因肝硬化食管静脉曲张、腹水入院治疗。放腹水后出现精神错乱、昏睡,伴有扑翼样震颤、脑电图异常等肝昏迷表现。目前给患者安排哪种饮食为宜
- 给予低蛋白饮食
  - 保证总热量和糖类摄入
  - 补充大量维生素A
  - 给予富含粗纤维的饮食
  - 限制含钾食物的摄入
21. 属于深反射检查的是
- 角膜反射
  - 腹壁反射
  - 膝腱反射
  - 凯尔尼格征
  - 提睾反射
22. 大咯血出现窒息的患者,应立即采取
- 头低足高位
  - 半卧位
  - 平卧位
  - 坐位
  - 健侧卧位
23. 患者,男,30岁,右下腹突发性绞痛,左肾区酸胀,伴尿频、尿急、尿道和龟头疼痛,诊断为输尿管结石。关于保守排石的陈述正确的是
- 每日饮水量3000ml左右
  - 不可使用抗生素
  - 为减轻疼痛,减少运动
  - 疼痛时服用止痛剂
  - 进食高蛋白质、低纤维素饮食
24. 关于出院护理,错误的一项是
- 办理出院手续
  - 通知患者和家属
  - 协助患者整理用物
  - 介绍出院后注意事项
  - 停止给药
25. 某女患者因发热、腰痛、尿频、尿急、尿痛就医,确诊为急性肾盂肾炎,尿化验的特点是
- 颗粒管型(++)
  - 大量红细胞
  - 蜡样管型
  - 尿蛋白(++)
  - 尿白细胞,5个/HP
- 二、多选题: 以下每道考题有5个备选答案,每题至少有2个正确答案
26. 下列各种提法中,不正确的是
- 同情感是医务人员起码的医德情感



- B. 事业感不属于医德情感的范畴  
C. 责任感是事业感的升华  
D. 医德情感是医德良心的深化  
E. 责任感是最高层次的医德情感
27. 腹部闭合性损伤中,考虑有内脏损伤的情况有  
A. 早期出现休克  
B. 持续性剧烈疼痛  
C. 出现腹膜刺激征  
D. 肝浊音界消失  
E. 呕血、便血
28. 不属于试验膳食的是  
A. 高蛋白饮食  
B. 胆囊造影饮食  
C. 隐血试验饮食  
D. 糖尿病饮食  
E. 低脂肪饮食
29. 输血时血液内不得加入下列哪些药液  
A. 含钙剂的溶液  
B. 酸性溶液  
C. 碱性溶液  
D. 4%枸橼酸钠溶液  
E. 高渗或低渗溶液
30. 人体实验的内在矛盾表现为  
A. 医学发展与社会责任  
B. 成功与失败  
C. 主动与被动  
D. 自愿与无奈  
E. 利与弊
31. 胎盘早剥的病因包括  
A. 贫血  
B. 前置胎盘  
C. 脐带过短  
D. 慢性肾脏疾病  
E. 严重的妊娠高血压
32. 输液微粒污染的危害有  
A. 堵塞血管,局部血供不足  
B. 巨噬细胞减少,肺内肉芽肿形成  
C. 刺激组织产生炎性反应或形成肿块  
D. 红细胞凝集,形成血栓  
E. 血小板增多
33. 干燥血浆在应用时稀释液可选用  
A. 复方氯化钠溶液  
B. 注射用水  
C. 等渗盐水  
D. 1%枸橼酸钠  
E. 0.1%枸橼酸钠
34. 贫血常见的临床表现为  
A. 心率增快  
B. 皮肤、黏膜、指甲发绀  
C. 头昏、乏力、耳鸣  
D. 杵状指(趾)  
E. 活动后气急
35. 脑炎与脑膜脑炎,脑脊液可见  
A. 压力增高  
B. 中性粒细胞为主  
C. 淋巴细胞为主  
D. 蛋白质轻中度增高  
E. 糖和氯化物一般正常
36. 医德规范  
A. 是医德实践中医德关系的客观反映  
B. 是医德评价的最高标准  
C. 是医德体系的主体结构  
D. 是指导医务人员医德行为的准则  
E. 是医德教育和医德修养的具体内容
37. 俯卧位的适用范围是  
A. 会阴部检查  
B. 直肠镜检查  
C. 脊椎手术后  
D. 腰背部检查  
E. 配合胰胆管造影检查
38. 佝偻病骨样组织堆积造成的畸形有  
A. 方颅  
B. 颅骨软化  
C. 肋骨串珠  
D. 手镯征、脚镯征  
E. “O”“X”形腿
39. 医德教育的方法包括  
A. 说理认知法  
B. 知行结合法  
C. 示范感染法  
D. 影视形象法  
E. 讨论启迪法
40. 关于宫颈糜烂治疗原则,正确的是  
A. 物理疗法有冰冻、激光疗法

- B. 可用电灼术、电熨术
  - C. 硝酸银局部腐蚀
  - D. II度宫颈糜烂可做子宫切除
  - E. 久治不愈的宫颈糜烂可做宫颈锥形切除
41. 属清洁手术,但仍需预防性使用抗生素的有
- A. 远端有感染灶
  - B. 心脏瓣膜病或已植入人工心脏瓣膜
  - C. 有易患感染的伴随疾病、营养不良、接受激素治疗全身情况差者
  - D. 年龄>65岁
  - E. 为预防感染,所有手术都应预防性使用抗生素
42. 关于流产的护理措施,叙述正确的有
- A. 先兆流产孕妇应卧床休息
  - B. 应密切观察孕妇阴道流血量
  - C. 出现凝血功能障碍时要立即引产
  - D. 流产后应观察血常规及阴道流血情况
  - E. 流产术后2周可恢复性生活
43. 口腔烧伤的护理措施包括
- A. 用湿棉签拭去脱落的黏膜组织
  - B. 能进流食者可用吸管吸入
  - C. 应禁食水,必须给予静脉营养
  - D. 进食后清洁口腔
  - E. 用0.9%氯化钠溶液或硼酸水漱口
44. 放射性<sup>131</sup>I治疗的禁忌证为
- A. 妊娠、哺乳期妇女
  - B. 高功能结节者
  - C. 外周血白细胞 $<3 \times 10^9/L$
  - D. 中性粒细胞 $<1.5 \times 10^9/L$
  - E. 中度甲状腺功能亢进症,年龄在25岁以上者
45. 患者,男,59岁,因急性重症胆管炎致缺血性急性肾小管坏死,尿量20 ml/h。关于少尿的机制,叙述正确的有
- A. 肾血流动力学异常
  - B. 肾小管上皮脱落,管腔中管型形成
  - C. 管腔中的液体反漏
  - D. 健存肾单位减少
  - E. 肾小管上皮细胞代谢障碍

三、共用题干题:以下每道考题有2~6个提问,每个提问有5个备选答案,请选择1个最佳答案

(46~49题共用题干)

患儿,男,8个月,早产儿,未加辅食,体检时发现睑结膜苍白。血常规:Hb 80 g/L,RBC  $2.5 \times 10^{12}/L$ 。确诊:小细胞性贫血。

46. 患儿体内可能缺乏

- A. 维生素A
  - B. 维生素B<sub>12</sub>
  - C. 维生素C
  - D. 叶酸
  - E. 铁
47. 该患儿的贫血程度是
- A. 生理性贫血
  - B. 轻度贫血
  - C. 中度贫血
  - D. 重度贫血
  - E. 极重度贫血
48. 患儿口服药物时,正确的护理指导是
- A. 两餐之间服用
  - B. 大剂量口服
  - C. 用牛乳送服
  - D. 餐中服用
  - E. 空腹时服用
49. 该患儿药物治疗的时间应持续到
- A. 面色苍白消失1周左右
  - B. 肝、脾恢复正常后2周左右
  - C. 网织红细胞增高2个月左右
  - D. 血红蛋白正常后2个月左右
  - E. 红细胞正常后1个月左右
- (50~52题共用题干)
- 患者,25岁,子痫,G<sub>1</sub>P<sub>1</sub>,产后2天,外阴水肿仍未消退。
50. 应实施的局部治疗措施是
- A. 坐浴
  - B. 会阴冷敷
  - C. 会阴热敷
  - D. 阴道灌洗
  - E. 刺破水肿加用抗生素
51. 操作时不需要准备的用具是
- A. 纱布垫
  - B. 治疗用液体
  - C. 治疗碗
  - D. 一次性垫单
  - E. 橡皮管
52. 治疗时使用的溶液是
- A. 50%硫酸镁
  - B. 75%乙醇
  - C. 1%乳酸液
  - D. 1:5000高锰酸钾



- E. 4%碳酸氢钠  
(53~55 题共用题干)

某医院正在筹备建设的过程中,医院筹备委员会要求主管护理的委员会成员进行一系列工作。

53. 属于组织设计步骤中的
- A. 确立组织目标
  - B. 划分业务关系
  - C. 确定职责和权限
  - D. 提出组织结构的基本框架
  - E. 设计组织的运作方式
54. 在“设计组织的运行方式”阶段的主要任务不包括
- A. 联系方式的设计
  - B. 管理范围的设计
  - C. 岗位职责设计
  - D. 工作程序的设计
  - E. 各类运行制度的设计
55. 在最终设计的结果中,用以说明组织内部的某一特定职位的责任、义务、权利及工作关系的书面文件,称为
- A. 组织职位图
  - B. 职位工作内容
  - C. 职位工作关系
  - D. 职位说明书
  - E. 组织职位素质要求
- (56~58 题共用题干)

患儿,4岁,患室间隔缺损,病情较重,平时需用地高辛维持心功能。现患儿因上呼吸道感染后诱发急性心力衰竭,按医嘱用西地兰,患儿出现恶心、呕吐、视力模糊。

56. 上述临床表现的原因是
- A. 上呼吸道感染加重
  - B. 胃肠感染
  - C. 急性心力衰竭加重
  - D. 强心甙中毒的反应
  - E. 室间隔缺损的表现
57. 要确定上述判断,还应做的检查是
- A. 粪便检查
  - B. 心脏 B 超
  - C. X 线检查
  - D. 心电图检查
  - E. 心导管检查
58. 此时应采取的措施是
- A. 调慢输液速度
  - B. 给患儿吸入乙醇湿化的氧气
  - C. 禁食以减轻胃肠道负担

- D. 暂停使用强心苷并通知医生
  - E. 密切观察患儿心率变化
- (59~60 题共用题干)

患儿,女,3个月,足月顺产,未按时预防接种,纳差1个月,咳嗽、精神差2周。查体:体温38.9℃,精神萎靡,气促,表情淡漠,前囟略饱满,心音低钝,双侧呼吸音粗,可闻及少量湿啰音,腹部软,肝肋下1cm,脾肋下2cm,布鲁津斯基征可疑阳性。胸片示两肺散在小斑点及小片融合阴影。

59. 最可能的情况是
- A. 原发性肺结核
  - B. 化脓性脑膜炎
  - C. 支原体肺炎
  - D. 腺病毒肺炎
  - E. 结核性脑膜炎
60. 确诊的检查方法是
- A. 头颅 CT
  - B. 脑脊液生化+常规
  - C. 脑脊液培养
  - D. 头颅超声
  - E. 结核菌素试验

四、案例分析题:每个案例至少有3个提问,每个提问有6~12个备选答案,其中正确答案有1个或几个

(61~64 题共用题干)

患者,女,52岁,因“血尿、排尿不畅1周”来诊。经检查诊断为膀胱癌,并行膀胱部分切除术。家人因为担心患者无法承受患癌症的事实,要求医务人员不要告诉患者。

61. 关于是否告知患者患病的真相,叙述正确的是
- A. 无论如何都应该告知患者真相,因为患者有知情权
  - B. 医务人员应尊重家属意愿,不告诉患者实情
  - C. 在评估是否告知时,最相关的测试标准是看“告知真相本身是否会导致该患者身心受到伤害”
  - D. 患者有自主能力,应该由患者自己做主
  - E. 应该告诉患者病情,让其参与选择治疗方案,否则对她来说是不公平的
  - F. 应该告诉患者病情,因为对患者讲真话即诚实,而诚实则是维系医患关系的纽带
62. 从伦理学的角度上来说,医务人员隐瞒病情的行为是基于(提示:主管医师及护士同意配合家属,向张女士隐瞒病情)
- A. 自主原则
  - B. 有益原则
  - C. 公平原则
  - D. 隐私保密原则
  - E. 知情同意原则
  - F. 不伤害原则
63. 面对患者的询问,作为她的责任护士,应该(提示:6个月后,患者因血尿、腰酸腿疼再次入

院。通过检查,确诊为膀胱癌复发,并进行了膀胱全切+右腹部尿路造口术。术后患者多次向主管医师及护士询问她的病情、治疗情况,尤其对尿路造口感到不理解,抱怨医师治疗不当,抱怨家人不够关心她)

- A. 向主管医师反映患者的情况
  - B. 编造一个谎言,欺骗患者
  - C. 直接告诉患者病情,以解除其对医师和家人的误解
  - D. 应与家属探讨是否应该告知患者病情或从轻告知
  - E. 继续隐瞒,在告知患者真相前应该征得家属的同意
  - F. 尽量与患者沟通,实施心理护理
  - G. 避免回答,让其问家属
64. 如果家属同意告知患者病情,在告知其病情时应该注意
- A. 患者可能已经猜到自己的病情,所以直接告诉她就行了
  - B. 应选择适当的时机告诉患者
  - C. 可用减缓真相对病患冲击的方式来进行告知
  - D. 先评估患者的心理状况
  - E. 告知过程中密切观察患者的情况
  - F. 对患者进行评估,选择其容易接受的方式进行告知

(65~70 题共用题干)

患者,男,29岁,因“全身淋巴结肿大2个月,低热伴全身不适1月余”来诊。患者未婚,有多个性伴侣,发病以来精神差。查体: T 37.5℃,P 84次/分,R 17次/分,BP 112/76 mmHg;颈部、腋下、腹股沟淋巴结肿大,直径分别为1.0 cm、1.5 cm、1.7 cm,无压痛,可自由活动。HIV 抗体(+),淋巴结活检反应性增生,CD4<sup>+</sup>T 淋巴细胞 352/mm<sup>3</sup>。

65. 患者现处于艾滋病的
- A. 急性感染期
  - B. 慢性感染期
  - C. 无症状感染期
  - D. 窗口期
  - E. 潜伏期
  - F. 持续性全身淋巴结肿大综合征
  - G. 艾滋病期
66. 以下接触中不会传染艾滋病的有(提示:家属得知患者疾病后,表现出恐惧、不愿亲近患者,护理人员耐心、细致地为家属讲解艾滋病的传播途径)
- A. 与艾滋病病毒感染者共用注射器
  - B. 与艾滋病病毒感染者共用餐饮具
  - C. 与艾滋病病毒感染者共用拔牙器具
  - D. 与艾滋病病毒感染者一起游泳
  - E. 使用被艾滋病病毒污染的血液制品
  - F. 同性性行为
  - G. 性乱交行为
  - H. 静脉吸毒行为
  - I. 艾滋病病毒感染者哺育婴幼儿
67. 患者的心理状态处于(提示:入院后患者极少与医护人员交流,入院第3天晚护士查房时发

现其抽屉里有一瓶安眠药)

- A. 怀疑否认期
  - B. 愤怒发泄期
  - C. 合作协议期
  - D. 悲观忧郁期
  - E. 自责羞愧期
  - F. 接受升华期
68. 发生上述情况,主要是因为艾滋病病毒破坏了人体的(提示:入院后第2周干咳、气促,活动后加重;T 37.5~38.2℃;胸部X线片见双肺弥漫性网状结节样间质浸润)
- A. 神经系统
  - B. 呼吸系统
  - C. 消化系统
  - D. 循环系统
  - E. 免疫系统
  - F. 泌尿系统
  - G. 内分泌系统
69. 职业暴露后的正确处理为(提示:实习护士小王在为该患者拔输液针时不慎发生针刺伤)
- A. 患者血液、体液污染眼部等黏膜时,应用大量0.9%氯化钠溶液反复冲洗
  - B. 应用肥皂液和流动清水清洗被污染局部
  - C. 针刺伤后应立即用无菌纱布进行包扎
  - D. 被污染针头刺伤者行ZAT治疗
  - E. 用70%乙醇溶液或10%碘伏对伤口局部进行消毒
  - F. 存在伤口时,应轻柔挤压伤处,尽可能挤出损伤处的血液
70. 上述药物的不良反应不包括(提示:患者现服用抗病毒药物齐多夫定+拉米夫定+艾法韦仑)
- A. 头痛
  - B. 贫血
  - C. 恶心、呕吐
  - D. 肺炎
  - E. 头晕
  - F. 卡波肉瘤
  - G. 皮疹
  - H. 乏力
  - I. 口腔溃疡
- (71~76 题共用题干)

患者,男,50岁,因反复发作性心前区疼痛2年,加剧3小时来急诊就诊。2年前劳累后第一次出现心前区闷痛,持续2~5分钟,休息后或含服硝酸甘油可缓解。此后症状反复发作,3小时前晚饭后散步时突感胸骨下段疼痛,呈持续性,休息和含服硝酸甘油不能缓解,伴全身冷汗,头晕,恶心、呕吐而入院。查体: T 37℃,P 60次/分,R 24次/分,BP 90/60 mmHg,痛苦面容,自动体位,两肺呼吸音清,HR 60次/分,律齐。

71. 该患者来诊时,应立刻做的处理有
- A. 绝对卧床休息



- B. 半卧位  
C. 建立静脉通道  
D. 心电图检查  
E. 心电监护  
F. 遵医嘱肌注哌替啶  
G. 抽血查心肌酶及肌钙蛋白  
H. 吸氧
72. 心电图示：Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联 ST 段弓背向上抬高 0.1~0.3 mV, T 波直立, V<sub>1</sub>~V<sub>5</sub> 导联 ST 段压低 0.05~0.2 mV。经诊断为急性下壁心肌梗死, 临床表现可能有
- A. 50%~81%发病前有乏力, 胸部不适  
B. 疼痛多伴有大汗、烦躁不安及濒死感  
C. 体温可升高至 38℃左右  
D. 疼痛剧烈时常伴恶心、呕吐  
E. 心律失常  
F. 低血压及休克  
G. 白细胞降低  
H. 心力衰竭
73. 心肌梗死可能发生的并发症有
- A. 乳头肌功能失调  
B. 乳头肌断裂  
C. 心脏破裂  
D. 栓塞  
E. 心室壁瘤  
F. 心包炎  
G. 胸膜炎  
H. 主动脉瓣狭窄
74. 经医生及家人同意决定立刻行经皮冠状动脉介入治疗, 该患者应作的术前准备有
- A. 禁食  
B. 备皮  
C. 导尿  
D. 遵医嘱肌注肝素  
E. 遵医嘱予口服阿司匹林及氯吡格雷(波立维)  
F. 清洁灌肠  
G. 胃肠减压  
H. 普鲁卡因皮试
75. 术后应注意的方面有
- A. 心电、血压监护 24 小时  
B. 即刻行 12 导联心电图, 与术前对比  
C. 拔除动脉鞘管后, 按压穿刺部位 15~20 分钟, 以弹力绷带加压包扎沙袋压迫 6~8 小时  
D. 术侧肢体制动 24 小时  
E. 保持大便通畅  
F. 注意观察有无出血现象

- G. 绝对卧床一周  
H. 遵医嘱予抗生素防感染
76. 患者仍需服用阿司匹林, 其治疗作用有
- A. 止痛  
B. 降低心肌耗氧  
C. 抑制血小板聚集  
D. 降低血脂  
E. 预防血压升高  
F. 预防感染  
G. 营养心肌  
H. 预防出血

(77~82 题共用题干)

患儿, 男, 10 个月, 因“低热、频繁呕吐伴腹泻 2 天”来诊。患儿出生后为人工喂养, 2 天前出现低热、频繁呕吐伴腹泻, 为蛋花汤样粪, 10 余次/天, 尿量减少。查体: T 37.8℃; 精神烦躁, 方颅, 前囟、眼窝凹陷, 皮肤弹性差, 四肢稍凉, 臀红。

77. 为明确诊断应进行的必要的检查项目包括
- A. 血常规  
B. 粪常规  
C. 尿常规  
D. 电解质(血钠、血氯、血钾)、二氧化碳结合力  
E. 胸部、腹部 X 线片  
F. 血钙、血磷、碱性磷酸酶  
G. 红细胞沉降率  
H. C 反应蛋白  
I. 免疫球蛋白
78. 血常规正常; 粪常规: 脂肪球(++), 少许黏液; 血钠 135 mmol/L, 初步考虑的诊断是
- A. 急性胃肠炎  
B. 急性上呼吸道感染  
C. 小儿腹泻病伴中度等渗性脱水  
D. 生理性腹泻  
E. 细菌性痢疾  
F. 尿布皮炎  
G. 佝偻病
79. 应立即给予的处理是
- A. 暂禁食 8 小时  
B. 口服止泻剂  
C. 抗生素  
D. 助消化药  
E. 肠黏膜保护剂  
F. 口服补液(ORS)  
G. 静脉补液  
H. 接种轮状病毒疫苗



- I. 加强臀部护理
80. 如需补液, 可选择的液体种类包括
- 10%葡萄糖液
  - 0.9%氯化钠溶液
  - 2:1液(等张含钠液)
  - 2:3:1混合液(1/2张含钠液)
  - 4:3:2混合液(2/3张含钠液)
  - 1:2液(1/3张含钠液)
  - 1:1液(1/2张含钠液)
  - 1:4液(1/5张含钠液)
  - 5%碳酸氢钠溶液
  - 11.2%乳酸钠溶液
81. 患儿补液后出现精神萎靡, 腹胀, 肠鸣音减弱, 心音低钝; 血钾 3.3 mmol/L, 此时应考虑并发症有
- 中毒性肠麻痹
  - 中毒性脑病
  - 病毒性心肌炎
  - 低钾血症
  - 便秘
  - 低钙血症
82. 此时应给予的正确处理包括
- 观察脱水纠正情况
  - 静脉补钾浓度 $<0.3\%$ , 严重低钾时可静脉注射
  - 脱水纠正后, 可改口服补液(ORS)
  - 腹胀者肛管排气
  - 腹泻后用温水清洗臀部, 涂抗生素软膏
  - 补液后出现肺水肿, 给予毛花苷丙和甘露醇
  - 记录24小时出入量, 观察并发症
  - 第2天主要补充继续丢失量和生理需要量
  - 监测血钠、血钾、血钙浓度
  - 腹泻仍未纠正, 更换抗生素
- (83~95题共用题干)
- 患者, 男, 70岁, 因阵发性腹痛、恶心呕吐两天急诊入院。查体: T 38°C, P 100次/分, R 28次/分, BP 15/10 kPa, 痛苦面容, 低声呻吟, 强迫体位。腹部稍膨隆, 可见肠形及蠕动波, 肠鸣音亢进, 可闻及气过水声, 腹肌稍紧张, 右侧腹部触及有压痛包块。X线检查可见右侧肠腔充气并有2~3个液平面。
83. 下列哪些症状与患者的疾病有关
- 呃逆
  - 腹部反跳痛
  - 腹胀
  - 黄疸
  - 排便困难

- 皮肤干燥, 弹性差
  - 水肿
  - 停止排气
84. 下列哪些选项不是处理该患者的主要措施
- 物理降温
  - 禁食
  - 立即行术前准备
  - 胃肠减压
  - 留置导尿
  - 清洁灌肠
  - 补液
  - 胃管注入石蜡油
85. 给患者行胃肠减压的作用是
- 降低胃肠道内压力, 改善局部血液循环
  - 促进部分消化液和胃肠激素的分泌
  - 改善呼吸功能
  - 减少肠腔内的细菌与毒素及其移位
  - 减轻肠麻痹和腹胀
  - 减轻呕吐
86. 根据以上结果, 结合该患者情况, 判断属于下列哪种酸碱平衡失调
- 代谢性酸中毒
  - 代谢性碱中毒
  - 呼吸性酸中毒
  - 呼吸性碱中毒
  - 代偿性呼吸性酸中毒
87. 该患者属于哪一类水电解质平衡失调
- 低渗性脱水、低钾、高钠
  - 高渗性脱水、低钾、高钠
  - 低渗性脱水、高钾、低钠
  - 高渗性脱水、低钾、低钠
  - 等渗性脱水、低钾、高钠
88. 下列的补液原则正确的是
- 补液量等于生理需要量+额外损失量+累积损失量
  - 补钾量应根据尿量、血钾和心电图决定
  - 补液种类首选10%葡萄糖
  - 消化液丢失包括呕吐、胃肠减压及肠腔内积液的估计
  - 输液速度应先慢后快
  - 补钾浓度以0.3%为宜
89. 使用氨苄青霉素应注意下列哪些问题
- 需做青霉素过敏试验
  - 应加入10%葡萄糖内缓慢滴注方能维持血药浓度
  - 迟发过敏反应多表现为皮疹、药热



- D. 停药一周内重新使用可免做过敏试验  
E. 一旦发生过敏性休克,最佳抢救药是盐酸肾上腺素  
F. 肾毒性反应为其最严重的副作用  
G. 出现假阳性可采用脱敏疗法
90. 术后早期病情观察的要点是
- 生命体征的变化
  - 腹部有无胀痛、压痛、反跳痛,以及疼痛的性质、部位
  - 引流管是否固定、通畅及引流液的质和量
  - 皮肤、黏膜的颜色、皮肤的弹性
  - 体重的增减
  - 伤口情况
  - 肠鸣音恢复情况
  - 进食情况
91. 引流瓶内空虚的原因可能是
- 胃管插入过深或过浅
  - 负压装置接合不严
  - 胃管头端开口多于6个
  - 胃管折叠或堵塞
  - 负压瓶容量少于1000 ml
  - 肠麻痹致胃肠分泌抑制
  - 卧位不当
  - 负压管高于床平面
92. 根据患者目前的状况,应给患者采取哪种最佳体位
- 平卧位
  - 头低脚高位
  - 半卧位
  - 截石卧位
  - 俯卧位
93. 完全胃肠外营养支持的中心静脉导管并发症有
- 脓毒症
  - 空气栓塞
  - 高渗性非酮性昏迷
  - 静脉炎、血栓形成
  - 气胸、血胸
  - 高氨血症
  - 心包填塞
  - 肝胆功能异常、淤胆
94. 完全胃肠外营养支持液配制应注意
- 糖与氨基酸均匀配制
  - 抗生素可加入营养液中
  - 配制后液体应保存在4~25℃,于24小时内输注
  - 脂溶性维生素可加入脂肪乳剂中

- 需严格无菌操作,在空气超净台面操作
  - 硫酸镁可加入0.9%盐水中
95. 应采取什么护理措施预防肺部并发症
- 指导、鼓励患者咳嗽、咳痰
  - 注意保暖防受凉
  - 床上被动运动
  - 去枕平卧,头偏向一侧
  - 使用腹带
  - 体位引流
  - 保持室内空气流通
  - 定期叩背
  - 超声雾化吸入
- (96~98题共用题干)

患者,男,32岁,因出差出现咳嗽,咳白黏痰伴喘息1天,查体: T 36.5℃, P 90次/分, R 28次/分, BP 120/80 mmHg。在肺部可闻及广泛哮鸣音。

96. 该患者最可能的诊断是
- 肺炎
  - 支气管扩张
  - 支气管哮喘
  - 肺心病
  - 左心功能不全
97. 下列因素可激发哮喘发作的是
- 运动
  - 感染
  - 阿司匹林
  - 动物毛屑
  - 情绪激动
98. 对此患者护理正确的措施是
- 为减少耗氧,让患者绝对卧床
  - 室内布置力求简单,杜绝已知过敏物
  - 多饮水
  - 密切观察患者呼吸频率,呼吸困难的程序,血气分析结果
  - 限制水的入量

(99~104题共用题干)

患者,女,40岁,多饮、多食、多尿、血糖增高18年,外院诊断为“糖尿病”予胰岛素治疗。平时饮食控制不佳,不经常随访血糖,1周前因气功治疗而停用胰岛素,3天前患者出现极度口渴、恶心、呕吐、伴乏力、气急、心慌来院急诊。查体: T 36.8℃, P 116次/分, R 28次/分, BP 16/10 kPa。神清,消瘦,皮肤黏膜干燥,心肺(-),肝脾未及,神经系统检查无异常发现。实验室检查: WBC  $8.9 \times 10^9/L$ ; 血糖 26 mmol/L, 血酮 1.96 mmol/L, 尿糖(+++);  $CO_2CP$  13 mmol/L, pH 7.29。

99. 患者目前最可能发生的紧急情况是
- 高渗性非酮症糖尿病昏迷

- B. 糖尿病乳酸性酸中毒
  - C. 糖尿病神经性病变原菌
  - D. 糖尿病酮症酸中毒
  - E. 糖尿病血管病变: 大血管病变
  - F. 糖尿病血管病变: 微血管病变
100. 糖尿病酮症酸中毒初期的表现有
- A. 疲乏软弱
  - B. 极度口渴
  - C. 尿量减少
  - D. 尿量增多
  - E. 体温升高
  - F. 血压下降
  - G. 四肢无力
101. 糖尿病酮症酸中毒常见的诱因有
- A. 感染
  - B. 胰岛素剂量不足
  - C. 胰岛素治疗中断
  - D. 饮食不当
  - E. 妊娠
  - F. 精神紧张
  - G. 手术
102. 对该患者的治疗要点有
- A. 补液
  - B. 应用胰岛素
  - C. 补充电解质
  - D. 纠正酸中毒
  - E. 防治诱因
  - F. 处理并发症
103. 糖尿病酮症酸中毒在最初的 1~2 小时, 补液量应该是
- A. 生理盐水 1 000 ml
  - B. 5% 葡萄糖 1 000 ml
  - C. 生理盐水 300 ml
  - D. 5% 葡萄糖 1 500 ml
  - E. 5% 葡萄糖生理盐水 1 000 ml
104. 经治疗后病情得到有效控制, 医嘱出院, 对患者进行保健指导的内容有
- A. 掌握血糖监测技术
  - B. 口服降糖药的应用方法
  - C. 口服降糖药的不良反应
  - D. 饮食治疗的重要性
  - E. 生活要有规律
  - F. 积极参加运动量大的体育锻炼
  - G. 患者要定期复诊

(105~107 题共用题干)

患者, 男, 58 岁, 因“左下肢发凉、麻木、疼痛 6 个月, 渐加重 1 个月”来诊。5 天前左足及踝关节皮肤变为紫黑色, 持续剧痛。动脉硬化病史 10 年。

105. 为明确诊断应立即检测的项目包括
- A. 凝血机制
  - B. 多普勒超声
  - C. 下肢动脉造影
  - D. 下肢 MRI
  - E. 下肢 CT
  - F. 血液流变学
106. 诊断考虑的疾病是
- A. 下肢静脉血栓形成
  - B. 动脉硬化性闭塞症
  - C. 动脉栓塞
  - D. 血栓闭塞性脉管炎
  - E. 下肢静脉曲张
  - F. 血栓性浅静脉炎
107. 该患者疾病的临床分期是
- A. I 期(局部缺血期)
  - B. II 期(营养障碍期)
  - C. III 期(坏死期)
  - D. 坏死期 1 级
  - E. 坏死期 2 级
  - F. 坏死期 3 级



## 冲刺模拟卷二

一、单选题：以下每道考题的备选答案中，请选择 1 个最佳答案

- MMPI 是一种
  - 人格测验
  - 智力测验
  - 特殊能力测验
  - 神经心理学测验
  - 投射测验
- 某医院、某科室的住院患者中，短时间内突然发生许多医院感染病例。这种现象是
  - 医院感染散发
  - 医院感染群发
  - 医院感染流行
  - 医院感染暴发
  - 医院感染罹患
- 由于心脏排血量突然下降而出现的晕厥称为
  - 心脏骤停
  - 脑卒中
  - 病窦综合征
  - 倾倒综合征
  - 阿-斯综合征
- 一中年女性自服乐果农药半杯，下午被家人发现送医院就诊。检查：躁动不合作、出汗、流涎、瞳孔缩小，不宜采用
  - 1:5 000 高锰酸钾洗胃
  - 吸氧
  - 遵医嘱注射阿托品
  - 催吐
  - 口服 50%硫酸镁导泻
- 关于静脉注射，以下哪项描述是错误的
  - 长期给药，应由近心端到远心端选择血管
  - 根据病情，掌握注药的速度
  - 防止刺激性强的药液溢出血管外
  - 不可在静脉瓣处进针
  - 不要在一个部位反复穿刺
- 患者，男，70 岁，因外伤致下肢粉碎性骨折行手术治疗，术后少尿 4 天，24 小时尿量 300 ml。查体：BP 110/75 mmHg，HR 125 次/分。实验室检查：Scr 548  $\mu\text{mol/L}$ ，BUN 38 mmol/L，血钾 6.8 mmol/L。最有效的治疗措施是
  - 透析治疗
  - 补液试验
  - 静脉缓慢注射钙剂
  - 静脉滴注小剂量多巴胺
  - 静脉滴注 5%碳酸氢钠溶液 100~200 ml
- 躯体疾病患者临床常见的症状是
  - 疼痛反应
  - 躯体转移性反应
  - 过度防御反应
  - 感知过敏反应
  - 焦虑性反应
- 羌先生，80 岁，10 日来未曾排便，感腹胀、轻度腹痛，自用开塞露无效，来院就诊。以往有便秘史 20 余年。体格检查：腹部膨隆，见肠型和蠕动波，全腹无明显压痛，左下腹可扪及条块状物，质硬，可推动，无移动性浊音，肠鸣音稍亢进。最可能的诊断是
  - 小肠扭转
  - 乙状结肠扭转
  - 肠粪块阻塞
  - 乙状结肠癌
  - 肠套叠
- 造成原发性心肌损害而导致慢性心力衰竭的最常见的代谢障碍性疾病是
  - 甲状腺功能亢进症
  - 甲状腺功能减退症
  - 单纯性甲状腺肿
  - 糖尿病
  - Cushing 综合征
- 肾癌的高危因素不包括
  - 吸烟
  - 长期接触化学制剂
  - 家族史
  - 染色体畸形
  - 尿路感染史
- 女性，40 岁，饱餐后出现上腹持续性疼痛并向左肩、腰背部放射，伴有恶心、呕吐，诊断为急性胰腺炎。入院后收集的资料中与其疾病关系密切的是
  - 母亲患高血压
  - 平时喜素食
  - 患胆总管结石 5 年
  - 休息时喜欢看电视
  - 吸烟 3 支/天
- 急性肾炎伴急性肾功能衰竭，护理措施最重要的是
  - 预防感染
  - 病室空气清新
  - 无盐、低蛋白质饮食
  - 定期复查肾功能
  - 详细记录出入量，“量出为人”



13. 对甲状腺功能亢进症重度浸润性突眼的护理不应
- 抬高头部
  - 鼓励多食略咸食品
  - 外出时用眼罩
  - 生理盐水纱布局部湿敷
  - 抗生素眼膏涂眼
14. 急性心肌梗死患者病后第1周护理,错误的是
- 日常生活均由护理人员帮助照料
  - 半量清淡流质或半流质饮食
  - 限制亲友探望
  - 鼓励在床上做四肢伸展活动
  - 避免不必要的翻身
15. 患者,男,55岁,每日吸烟1包。胸部X线片:一界限清楚的肿瘤堵塞右支气管中部管腔的95%,未发现肺门、纵隔或远处转移。肺功能:肺活量、FEV<sub>1</sub>为预计值的40%,用支气管扩张药不能改善。最合适的处置是
- 建议右肺叶切除术
  - 建议经支气管镜做姑息性肿瘤部分切除术,以恢复右下叶的通气功能
  - 目前不进行治疗,如出现转移灶,对转移灶进行放射治疗
  - 建议放射治疗
  - 开始进行一个活动训练方案,在8~10周内重复进行肺功能检查
16. 患者,男,46岁,因四肢对称性无力,伴肢体袜套样感觉异常入院检查。患者3周前有上呼吸道感染。对此患者,最有助于诊断的辅助检查是
- 头颅CT
  - 脑血管造影
  - 脑脊液检查
  - 脑电图
  - 体格检查
17. 在心理测验的标准化原则中,标准施测方法是指
- 一律限时测验
  - 一律不限时测验
  - 分测验顺序固定
  - 根据需要可调换分测验顺序
  - 施测方法应灵活
18. 腹膜透析护理,下列哪项错误
- 患者平卧位或侧卧位
  - 严格执行无菌操作
  - 透析液的温度为37℃
  - 保持透析导管畅通
  - 维持引流管的虹吸状态
19. 心脏起搏器安置术后的护理措施及有关的指导中,不正确的是
- 心电监护24小时
  - 右侧卧位4天
  - 限制活动6周
  - 术后第2天协助患者做术侧局部活动
  - 不宜使用挎肩背包
20. 小儿体液特点,下述正确的一项是
- 年龄愈小,体液占体重百分比愈高
  - 年龄愈小,细胞内液量相对愈多
  - 年龄愈小,每天水的交换量相对愈少
  - 血清钠含量高于成人
  - 需水量同成人
21. 患者,男,70岁,不慎摔倒致左股骨转子骨折伴移位,因全身情况不宜手术治疗,故采用骨牵引。对此种患者要重点预防的并发症是
- 股骨头缺血坏死
  - 脂肪栓塞
  - 坠积性肺炎
  - 关节僵硬
  - 骨化性肌炎
22. 新生儿颅内出血不适宜的措施是
- 保持安静,尽力避免惊扰
  - 烦躁不安时可用镇静剂
  - 取平卧位,头偏向一侧,防止窒息
  - 保证热量及营养物的供给
  - 可使用维生素K<sub>1</sub>以控制出血
23. 下列哪一项不是组织结构设计的原则
- 专业化和劳动分工的原则
  - 统一指挥的原则
  - 目标统一的原则
  - 管理宽度原则
  - 最多层次原则
24. 患者,女,29岁,因风湿性心脏病行二尖瓣瓣膜置换术。术后服用华法林,健康教育中最重要的是
- 定期检查凝血功能
  - 适量运动
  - 每日摄入足量蛋白质
  - 预防感染
  - 保持心情愉快
25. 输血过程中出现畏寒、寒战,伴头痛、恶心、呕吐,测体温39.5℃,应采取的护理措施为
- 暂停输血,对症处理
  - 改变体位
  - 给予氧气吸入
  - 给予镇静剂
  - 监测体温变化



二、多选题：以下每道考题有 5 个备选答案，每题至少有 2 个正确答案

26. 属于心理护理原则的有
- 心身整体原则
  - 个体化原则
  - 针对性原则
  - 交往性原则
  - 服务性原则
27. 属于社区护理工作内容的有
- 老年人保健护理服务
  - 慢性病患者的医疗护理服务
  - 急、重症患者的转诊服务
  - 疑难病患者的诊疗护理服务
  - 临终患者的护理服务
28. 尿毒症患者皮肤瘙痒，刺激物是
- 血钾
  - 血钙
  - 血磷
  - 血尿素
  - 血脂
29. 生长与发展的基本生理规律包括下列哪几个方面
- 顺序性
  - 阶段性
  - 不均衡性
  - 差异性
  - 均衡性
30. 心理健康教育的原则主要包括
- 科学性原则
  - 针对性原则
  - 尊重性原则
  - 保密性原则
  - 专业性原则
31. 患儿，9 个月，腹泻 3 天，每天大便 20 余次，蛋花样。入院后给予补液、纠正酸中毒后患儿易出现
- 低钾症状
  - 低钠症状
  - 低钙症状
  - 低氯症状
  - 高磷症状
32. 临床死亡期的特征
- 大小便失禁
  - 反射性反应消失
  - 体温异常
  - 心搏、呼吸停止
  - 神志不清
33. 乳房自我检查的视诊要求有
- 改变体位，双手撑腰、上举、侧身、多角度观察
  - 双臂下垂，观察两侧乳房形状、大小、轮廓是否对称
  - 乳头有无回缩、抬高、分泌物，乳晕处有无湿疹
  - 有无局部隆起、凹陷、橘皮样改变
  - 脱去上衣，面对穿衣镜
34. 子宫复旧护理包括
- 评估恶露情况
  - 每天观察宫底高度、软硬度
  - 及时排空膀胱
  - 产后当天可用热敷，减轻宫缩痛
  - 遵医嘱给予宫缩剂
35. 不属于有效沟通原则的是
- 尽量应用正式沟通
  - 保持信息权威性
  - 根据实际情况，灵活应对
  - 组织结构完整性
  - 上级领导直接发布命令
36. 关于 PDCA 质量管理循环程序，叙述正确的有
- PDCA 的 4 阶段是一个有机的整体，缺一不可
  - 大循环套小循环，互相衔接，互相促进
  - 阶梯式运行，不断上升
  - 检查阶段是 PDCA 循环的关键环节
  - 处理阶段包括提出这一循环中存在的问题，并转入下一循环去解决
37. 床旁交接班主要适用于
- 危重患者
  - 新入院患者
  - 术后患者
  - 病情有特殊变化患者
  - 特殊检查治疗前后患者
38. 以下各项检查值，提示胎儿可能已经成熟的羊水检查项目有
- 淀粉酶 500 U/L
  - 脂肪细胞出现率 25%
  - 卵磷脂/鞘磷脂比值 1.8
  - 肌酐 180  $\mu\text{mol/L}$
  - 胆红素类物质含量 0.05
39. 输液时需评估患者
- 年龄、病情、性别
  - 对输液的认识、接受和配合程度
  - 穿刺部位的皮肤血管状况
  - 意识状态



- E. 肢体的活动程度
40. 以下不属于急诊护士的工作是
- 配合抢救
  - 卫生宣教
  - 健康教育
  - 防疫工作
  - 消毒隔离
41. 胃溃疡癌变的征象有
- 45 岁以上的患者
  - 持续节律性疼痛
  - 不明原因消化不良
  - 粪隐血持续阳性
  - 发热
42. 动脉硬化性闭塞症患者患肢的正确护理包括
- 避免患肢直接暴露于寒冷中
  - 可使用热水袋、电热毯等给患肢保温
  - 鞋袜宜宽松,不宜过紧
  - 避免摩擦患肢,以免造成溃破
  - 按摩患肢
43. 下列疾病中属于空气传播疾病,需实施标准预防及空气隔离的有
- 开放性结核
  - 风疹
  - 轮状病毒感染
  - 麻疹
  - 副流感病毒感染
44. 应用硫酸镁治疗妊娠期高血压疾病时,发生镁中毒的表现有
- 复视
  - 持续头痛
  - 语言不清
  - 呼吸次数减慢
  - 全身肌张力减退
45. 糖尿病并发感染最常发生于
- 皮肤
  - 胆管
  - 泌尿道
  - 消化道
  - 呼吸道

三、共用题干题: 以下每道考题有 2~6 个提问,每个提问有 5 个备选答案,请选择 1 个最佳答案  
(46~47 题共用题干)

某中学生,16 岁,经骨髓穿刺检查诊断为“急性淋巴细胞白血病”,给予常规治疗,症状无缓解。医生告诉家长,此病目前尚无理想的治疗方法,医院正在尝试使用一种疗效不肯定、有一定

风险的药物。其家长表示愿意做这种试验性治疗,但没有履行书面承诺手续。治疗 2 天后,患者病重,抢救无效,死亡。此后,家属否认曾同意这种治疗方案,称是“拿患者做试验”,要追究医生责任,于是造成医疗纠纷。

46. 就本案分析,医生做出选择的伦理依据是
- 研究目的是正确的
  - 符合知情同意的原则
  - 符合受试者利益的原则
  - 治疗期间,医生是积极负责的
  - 以上各点都符合临床医学研究原则,没有错误
47. 患者家属称本案是“拿患者做试验”并告上法庭,但其真实的思想是
- 家长没有书面承诺,说明对该方案有保留意见
  - 抢救不够及时,拖延了时间
  - 家长没签字,医生必须承担患儿死亡的责任
  - 要求减免住院费用
  - 医生所做的试验缺乏临床数据积累

(48~50 题共用题干)

患者,男,72 岁,患大叶性肺炎,高热昏迷 10 天,10 天内给予大量广谱抗生素进行抗感染治疗。近日护士做口腔护理时发现其口腔黏膜破溃,创面上附着白色膜状物,拭去附着物可见创面轻微出血。

48. 最可能的感染菌是
- 大肠埃希菌
  - 酮绿假单胞菌
  - 白念珠菌
  - 溶血性链球菌
  - 金黄色葡萄球菌
49. 该患者最可能发生的是
- 原位菌群一度失调
  - 原位菌群二度失调
  - 移位菌群失调
  - 菌群交替症
  - 无菌群失调
50. 关于该致病菌的叙述不正确的是
- 常导致深部感染
  - 可致肺部和消化道感染
  - 常发生于免疫功能低下的患者
  - 主要引起泌尿道和血液的感染
  - 造成的医院感染有进一步增长的趋势

(51~53 题共用题干)

某医院有病床 400 张,按照卫生部《综合医院组织编制原则试行草案》的标准,则:

51. 工作人员的编设约为
- 500~550 人
  - 550~560 人