HANDBUCH DER ALLGEMEINEN PATHOLOGIE

ZWEITER BAND / FÜNFTER TEIL

**STOFFWECHSEL UND
FEINSTRUKTUR DER ZELLE**

I

**SPRINGER-VERLAG
BERLIN · HEIDELBERG · NEW YORK**

HANDBUCH DER ALLGEMEINEN PATHOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON

H.-W. ALTMANN · F. BÜCHNER · H. COTTIER · G. HOLLE
E. LETTERER · W. MASSHOFF · H. MEESSEN · F. ROULET
G. SEIFERT · G. SIEBERT · A. STUDER

ZWEITER BAND

DIE ZELLE

FÜNFTER TEIL

SPRINGER-VERLAG
BERLIN · HEIDELBERG · NEW YORK
1968

STOFFWECHSEL UND FEINSTRUKTUR DER ZELLE

I

BEARBEITET VON

E. MÖLBERT · W. OEHLERT
B. SCHULTZE · G. SIEBERT

REDIGIERT VON

F. BÜCHNER

MIT 191 ABBILDUNGEN

SPRINGER-VERLAG
BERLIN · HEIDELBERG · NEW YORK
1968

Alle Rechte vorbehalten

Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Springer-Verlages
übersetzt oder in irgendeiner Form vervielfältigt werden

© by Springer-Verlag, Berlin · Heidelberg 1968

Library of Congress Catalog Card Number 56-2297

Printed in Germany

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
daß solche Namen im Sinn der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung
als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften

Titel-Nr. 5662

Vorwort.

Zur Biologie und Pathologie der Zelle wurde im Handbuch der Allgemeinen Pathologie 1955 ein erster Band mit dem Thema „Das Cytoplasma“ veröffentlicht. Die Beiträge dieses Bandes waren im wesentlichen Ende 1953 abgeschlossen. So haben sie noch einmal alles das an Ergebnissen und Fragestellungen in ihrer Darstellung und der herangezogenen Literatur gesammelt, was die klassische Orthologie und Pathologie der Zelle in der Epoche der Lichtmikroskopie erarbeitet hatte. Sie haben damit die Größe dieser Epoche in einem geschichtlichen Wendepunkt der Zellforschung eindrucksvoll bezeugt.

Die Absicht der Herausgeber dieses Handbuches, dem ersten Teilband über die Biologie und Pathologie der Zelle alsbald weitere Bände folgen zu lassen, erwies sich allerdings als unerfüllbar. Die *Biochemie* stand in der Phase, in der sich die Methoden der Isolierung von Zellorganellen aus Gewebshomogenaten mehr und mehr durchsetzten und verfeinerten, und in der sich Zug um Zug die Frage nach den diesen Organellen zugeordneten Stoffen und Prozessen stellte und löste. In der *Autoradiographie* ergab sich die Möglichkeit, Stoffumsetzungen unter dem Lichtmikroskop sichtbar zu machen und ein Grenzgebiet zwischen Biochemie und Morphologie von großer Aussagekraft Schritt für Schritt zu erschließen. In der *Elektronenmikroskopie* eröffnete sich nach Einführung des ultradünnen Schnittes ein Feld moderner Zellforschung, in dem die Feinstrukturen der Zelle in zunehmender Differenziertheit sichtbar gemacht und zu Phänomenen des Stoffwechsels der Zelle in Beziehung gesetzt werden konnten. Schließlich hat die *Cytochemie* in der gleichen Zeit eine wesentliche Differenzierung durch die Möglichkeit spezifischer Stoffanfärbungen in den Zellen erfahren, vor allem auch durch den lichtmikroskopischen und zuletzt auch den elektronenmikroskopischen Nachweis von Enzymen und ihren Beziehungen zu bestimmten Organellen der Feinstruktur. Inzwischen haben sich die Ergebnisse der mit den verschiedenen modernen Methoden gewonnenen Befunde der Zellforschung in zunehmendem Maße geklärt, und immer mehr wurde ihre Konvergenz sichtbar.

Als Bandherausgeber bin ich den Autoren besonders dafür dankbar, daß sie sich jeweils auf die Anwendung der von ihnen geübten Methode beschränkt, deren Fruchtbarkeit und Grenzen aber mit aller wünschenswerten Klarheit sichtbar gemacht und sich darüber hinaus zugleich Zug um Zug mit den Darstellungen ihrer Partner auseinandergesetzt haben. Auch danken wir ihnen dafür, daß sie in diesem Neuland der Forschung ihren Beiträgen jeweils methodische Kapitel eingefügt haben.

Jeder der Beiträge beansprucht, als eigene Individualität wissenschaftlicher Darstellung gewertet zu werden. Aber unverkennbar ist der Beitrag von GÜNTHER SIEBERT über „Die Biochemie der Zellstrukturen“ mit dem von ELISABETH MÖLBERT über „Die Orthologie und Pathologie der Zelle im elektronenmikroskopischen Bild“ und mit dem von BRIGITTE SCHULTZE über „Die Orthologie und Pathologie des Nucleinsäure- und Eiweißstoffwechsels der Zelle im Autoradiogramm“ vielfach verflochten und umgekehrt. Um die Fruchtbarkeit autoradiographischer Methoden für die moderne morphologische Biologie und Pathologie der Zelle noch weiter zu beleuchten, war uns die Darstellung der „Orthologie und

Pathologie des Schwefelstoffwechsels der Zelle im Autoradiogramm“ zusätzlich willkommen, die WOLFGANG OEHLERT zu diesem Band beigesteuert hat.

Die Beschränkung auf Teilprobleme der Orthologie und Pathologie von Stoffwechsel und Feinstruktur der Zelle war bei dem gegenwärtigen Stand der Forschung unvermeidbar. So wurde in dem Beitrag über die Orthologie und Pathologie der Zelle im elektronenmikroskopischen Bild die Darstellung bewußt auf die Mitochondrien, das endoplasmatische Reticulum einschließlich der freien Ribosomen und des Ergastoplasmas und auf das Golgi-Feld konzentriert. Auf eine Darstellung der Biologie und Pathologie der Enzyme im lichtmikroskopischen und elektronenmikroskopischen Bild wurde in diesem Band zugunsten einer späteren Abhandlung noch verzichtet.

Möge der Band vor allem auch dem Dialog der Vertreter der verschiedenen Forschungsrichtungen und dem Wechselgespräch zwischen Biologie und Pathologie, Biochemie und Morphologie förderlich sein.

Freiburg i. Br., Oktober 1967

FRANZ BÜCHNER

Inhaltsverzeichnis.

Biochemie der Zellstrukturen. Von Professor Dr. GÜNTHER SIEBERT, Stuttgart-Hohenheim (früher Mainz). Mit 20 Abbildungen	1
A. Einleitung	1
1. Einführung	1
2. Der Strukturbegriff	2
3. Morphologische und biochemische Methoden	3
4. Isolierung von Zellstrukturen	5
5. Methodenkritik der Isolierungsverfahren	7
B. Zellkerne	11
1. Chemische Zusammensetzung	11
a) Leitsubstanzen und Reinheitsprüfung	12
b) Anorganische Bestandteile	14
c) Niedermolekulare Metabolite	15
d) Lipide	15
e) Proteine	15
f) Nucleinsäuren	18
g) Enzyme	19
2. Der Nucleolus	22
3. Stoffwechselleistungen	23
a) Allgemeines	23
b) Stoffwechselräume und anorganische Substanzen	25
c) Energiegewinnung	26
d) DPN-Haushalt	28
e) Proteinstoffwechsel	29
f) Nucleinsäurestoffwechsel	32
g) Hormoneffekte	35
h) Virusbedingte Stoffwechsel- und Synthesevorgänge in den Zellkernen	36
i) Zellkerne aus experimentell oder spontan pathologisch veränderten Geweben	38
4. Schlußbemerkung	41
C. Mitochondrien	41
1. Chemische Zusammensetzung	42
a) Leitsubstanzen und funktionelle Kriterien	42
b) Anorganische und niedermolekulare Stoffe	43
c) Proteine	44
d) Lipide	45
e) Nucleinsäuren	47
f) Enzyme	48
g) Unterfraktionen	51
2. Stoffwechsel	54
a) Halbe Lebensdauer von Mitochondrienbestandteilen	54
b) Biologische Oxydation	54
c) Oxydative Phosphorylierung	60
d) Atmungskontrolle	64
e) Entkopplung	67
f) Schwellung	69
g) Kompartimentierung	73
h) Ionentransport	74
i) Einflüsse auf die Glykolyse	76
k) Proteinumsatz	77
l) Lipidumsatz	79
m) Porphyrinumsatz	80
n) Nucleinsäureumsatz	80
3. Mitochondrien aus verschiedenen Geweben	81
a) Gehirn	81
b) Herz	83

c) Niere	83
d) Muskel	84
e) Weitere Gewebe	85
4. Mitochondrien aus experimentell veränderten Geweben	86
a) Höhe und Kälte	87
b) Winterschlaf	87
c) Wachstum und Entwicklung	88
d) Ernährung	90
e) Hormone	93
f) Altern	95
g) Autolyse	95
h) Bestrahlung	96
i) Elektrische Reizung	96
k) Tetrachlorkohlenstoff	97
l) Speicherung	97
5. Mitochondrien aus pathologisch veränderten Geweben	98
a) Tumoren	98
b) Andere Krankheiten	99
D. Lysosomen	99
1. Isolierung	99
2. Charakterisierung	101
3. Vorkommen	101
4. Zusammensetzung	102
a) Membranbestandteile	102
b) Enzyme	103
5. Funktion	104
a) Latenz	104
b) Vitamine A und E	105
c) Ernährung und Blutversorgung	106
d) Bestrahlung	106
e) Leberschädigung	107
f) Andere Eingriffe	107
g) Speicherung	108
6. Pathologie	108
E. Microbodies	109
1. Gewinnung und Eigenschaften	109
2. Funktion	112
F. Mikrosomenfraktion	113
1. Chemische Zusammensetzung	114
a) Leitsubstanzen	114
b) Anorganische und niedermolekulare Substanzen	115
c) Protein	115
d) Lipide	117
e) Ribonucleinsäure	119
f) Enzyme	121
g) Unterfraktionen	125
2. Stoffwechsel	126
a) Proteinsynthese an den Ribosomen	127
b) Lipide	135
c) Ribonucleinsäuren	137
d) Elektronentransport und Hydroxylierungen	137
e) Umsatz von Arzneimitteln und verwandten Substanzen	142
3. Mikrosomen aus experimentell und pathologisch veränderten Geweben	153
G. Lösliches Cytoplasma	155
1. Zusammensetzung	155
2. Physikochemische Untersuchungen	162
3. Stoffwechselleistungen	164
H. Verteilung auf mehrere intracelluläre Fraktionen	166
J. Schlußbemerkungen	176
1. Allgemeines	176
2. Spezielles	177
Literatur	179

Die Orthologie und Pathologie der Zelle im elektronenmikroskopischen Bild. Von Professor	
Dr. ELISABETH MÖLBERT, Freiburg (Breisgau). Mit 110 Abbildungen	238
Einleitung	238
Methodenkritik	241
Die Mitochondrien	244
Zur Orthologie der Mitochondrien	244
I. Die Struktur der Mitochondrien	247
1. Die Form	247
2. Die Hüllmembran und die Innenstrukturen	247
3. Die Tubuli	252
4. Die Grundsubstanz	254
5. Mitochondrienfilamente, intramitochondriale Ablagerungen	254
6. Die Mitochondriengranula	260
II. Relation zwischen Stoffwechselintensität und Zahl bzw. Innenstruktur der Mitochondrien	263
III. Die Verknüpfung von Struktur und Funktion der Mitochondrien. Die Enzyme der Mitochondrien	263
IV. Die Mitochondrienneubildung	265
Zur Pathologie der Mitochondrien	270
I. Die qualitativen Veränderungen der Mitochondrien	271
1. Die Schwellung und Cristolyse der Mitochondrien	271
2. Veränderungen von Form und Größe.	288
3. Die sphärische Transformation	294
4. Die lamelläre Transformation und die myelinartige Degeneration	298
5. Die bandartige Umwandlung	309
II. Stoffspeicherungen in den Mitochondrien	316
III. Stoffsynthese in den Mitochondrien.	318
IV. Die Mitochondriengranula	326
V. Der Mitochondrienturnover	329
Das endoplasmatische Reticulum	336
Zur Orthologie des endoplasmatischen Reticulums	336
I. Die Struktur	336
II. Das Vorkommen	344
III. Die strukturellen Komponenten	346
1. Die intracytoplasmatischen Membranen des endoplasmatischen Reticulums	346
2. Die Ribosomen	347
3. Der Innenraum	353
4. Der intramembranöse Raum	353
IV. Zur Funktion des endoplasmatischen Reticulums	353
1. Die Ribosomen	353
2. Das Ergastoplasma und das agranuläre endoplasmatische Reticulum	355
a) Das Ergastoplasma	358
b) Das endoplasmatische Reticulum mit glatten Membranen	365
Zur Pathologie des endoplasmatischen Reticulums	368
I. Die Veränderung und Transformation des endoplasmatischen Reticulums	368
II. Die Vacuolisation	370
III. Die Proliferation des agranulären ER.	377
IV. Die Degeneration des endoplasmatischen Reticulums	381
V. Die Neubildung des endoplasmatischen Reticulums	390
Das Golgi-Feld	403
Die Orthologie	403
I. Die Struktur	406
1. Die Golgi-Membranen	406
2. Die Golgi-Bläschen	407
3. Die Golgi-Körper oder Granula	408
4. Die Ausbildung des Golgi-Feldes.	408
II. Zur Funktion des Golgi-Apparates	411

Zur Entstehung des Golgi-Apparates	424
Die Pathologie des Golgi-Feldes	426
I. Die Hypertrophie	426
II. Die Atrophie	429
III. Die Degeneration	429
Literatur	431
Die Orthologie und Pathologie des Nucleinsäure- und Eiweißstoffwechsels der Zelle im Autoradiogramm. Von Privatdozentin Dr. BRIGITTE SCHULTZE, Köln (jetzt Würzburg). Mit 52 Abbildungen	466
A. Einleitung	466
B. Grundlagen der Autoradiographie	467
I. Arten des radioaktiven Zerfalls und ihre Bedeutung für die Autoradiographie	467
1. α -Strahler	467
2. β -Strahler	468
3. K-Strahler und Isomere	469
II. Der photographische Vorgang	470
1. Schwärzung der photographischen Emulsion	470
2. Eigenschaften der autoradiographischen Emulsionen	470
3. Fading-Effekt	471
III. Autoradiographische Auflösung	472
1. Prinzip der autoradiographischen Abbildung	472
2. Autoradiographisches Auflösungsvermögen	472
3. Einfluß verschiedener Faktoren auf das Auflösungsvermögen	474
4. Hochauflösende Autoradiographie mit Tritium	475
IV. Quantitative Autoradiographie	476
1. Zielsetzung	476
2. Quantitative Analyse durch Silberkornzählung	476
a) Technik der Silberkornzählung	476
b) Silberkornzahl pro Zerfallspartikel	477
3. Quantitative Autoradiographie mit Tritium	479
a) Grundsätzliches zur quantitativen Tritium-Autoradiographie	479
b) β -Selbstabsorption im Material des Schnitts	479
4. Auszählung von Spuren einzelner β -Teilchen. Spuren-Autoradiographie	482
C. Technik der Autoradiographie	482
I. Empfindlichkeit der autoradiographischen Methode. Notwendige Aktivitätsmengen bei in vivo- und in vitro-Untersuchungen	482
II. Vorbereitung des Materials zur Autoradiographie	483
1. Fixationsmittel	483
2. Frage der Löslichkeit markierter Verbindungen bei der Fixation	484
3. Vorbereitung von histologischen Schnitten, Ausstrichen und „squash“-Präparaten	486
4. Chemische und enzymatische Behandlung von Präparaten vor dem autoradiographischen Prozeß	487
a) Zielsetzung	487
b) Spezielle Anwendung für Nucleinsäuren, Proteine und Mucopolysaccharide	488
III. Technik der Anwendung autoradiographischer Emulsionen	490
1. Stripping-Film-Technik	490
2. Technik der Anwendung flüssiger Emulsionen	491
a) Autoradiogramme mit dünner Emulsion (Dipping-Technik)	492
b) Autoradiogramme mit dicker Emulsion	493
3. Autoradiographischer Nachweis einer Doppelmarkierung	493
a) Autoradiogramme mit dünner Emulsion	494
b) Autoradiogramme mit dicker Emulsion	494
c) Doppelschicht-Autoradiogramme	495
IV. Exposition der Autoradiogramme	496
1. Technik der Exposition	496
2. Dauer der Exposition	496
V. Entwicklung und Fixation	497
VI. Färben der Autoradiogramme	498
1. Färben vor Aufbringen der Emulsion	498
2. Färben durch die Emulsion	498

VII. Nulleffekt und Artefakte	499
VIII. Elektronenmikroskopische Autoradiographie	500
1. Grundsätzliches zur Kombination von Autoradiographie und Elektronenmikroskopie	500
2. Technik der elektronenmikroskopischen Autoradiographie	501
a) Vorbereitung der Schnitte	501
b) Feinkörnige Emulsionen	501
c) Verschiedene Techniken zum Aufbringen der Emulsion	501
3. Auflösungsvermögen der elektronenmikroskopischen Autoradiographie	503
IX. Autoradiographie wasserlöslicher Substanzen	504
1. Gefriertrocknungsmethode	505
2. Methode der Exposition von Cryostatsschnitten bei tiefen Temperaturen	505
X. Strahlendosis und Strahlenschäden	506
D. Autoradiographische Untersuchungen der Eiweiß-Synthese der Zelle	507
I. Voraussetzungen zur Deutung der in Eiweiß eingebauten Aminosäure-Aktivität als Maß für die Größe der Umsatzrate des Zelleiweißes	507
1. Vorbemerkungen; Begriff der spezifischen Aktivität der freien Aminosäure	507
2. Beziehung zwischen der in Eiweiß eingebauten Aminosäure-Aktivität und der mengenmäßigen Umsatzrate der Aminosäure	508
3. Zusammenhang zwischen der Umsatzrate einer Aminosäure und der Aminosäure-Zusammensetzung des cellulären Eiweißes; Eiweiß-Umsatz	509
II. Die celluläre Eiweiß-Synthese unter physiologischen Bedingungen	510
1. Orte der Eiweiß-Synthese innerhalb der Zelle	510
a) Cytoplasma	510
b) Kern	510
c) Nucleolus	512
2. Größe der Eiweiß-Synthese verschiedener tierischer Zellarten	512
a) Mittlere Eiweiß-Syntheserate	512
α) Übersicht über die Schwärzungs-Verteilung auf Autoradiogrammen der verschiedenen tierischen Gewebe	512
β) Quantitative autoradiographische und biochemische Untersuchungen zur cellulären Eiweiß-Synthese	521
b) Kerneiweiß-Syntheserate	525
α) Kerneiweiß-Syntheserate innerhalb einer Zellart	525
β) Mittlere Kerneiweiß-Syntheserate in verschiedenen Zellarten	527
c) Cytoplasmatische Eiweiß-Syntheserate	529
3. Ableitung allgemein gültiger Gesetzmäßigkeiten	532
a) Allgemein gültiges Aminosäure-Inkorporations-Schema	532
α) Formulierung	532
β) Beispiele	533
b) Rolle der Kern-Cytoplasma-Volumen-Relation als regulierender Faktor der cellulären Eiweiß-Synthese	533
4. Größe der Eiweiß-Syntheserate während der verschiedenen Teilphasen des Generationscyclus	535
a) Interphase	535
b) Mitose	536
III. Die celluläre Eiweiß-Synthese unter veränderten Bedingungen	537
1. Grundsätzliche Bemerkungen zur Vergleichbarkeit von Ergebnissen mit verschiedenen Tieren	537
2. Eiweiß-Synthese während der Regeneration	539
3. Einfluß von Hormonen, Pharmaka, toxischen und anderen Substanzen	540
4. Einfluß von Nahrung, Alterung und Entzündung. Sensorische Reizung und Schädigung des Gehirns	542
5. Eiweiß-Synthese in Tumorzellen	542
6. Eiweiß-Synthese nach Bestrahlung	543
E. Autoradiographische Untersuchung der RNS-Synthese der Zelle	543
I. Grundsätzliche Bemerkungen zum autoradiographischen Nachweis der RNS-Synthese	543
1. Art der Vorläufer und ihre Eigenschaften	543
2. Verschiedene RNS-Fractionen	545
3. Fixationseffekte	546
4. Ist die Silberkornzahl ein Maß für die RNS-Syntheserate?	546

II. Die celluläre RNS-Synthese unter physiologischen Bedingungen	547
1. Intracelluläre RNS-Synthese	547
a) Ort der RNS-Synthese innerhalb der Zelle	547
b) Wanderung der RNS vom Kern zum Cytoplasma	551
c) Beziehung zwischen Kern-RNS und cytoplasmatischer RNS	551
α) Enucleation oder Kern-Transplantation	551
β) UV-Mikro-Strahl-Technik	552
γ) RNS-Synthese-Hemmer	552
δ) Beziehung zwischen RNS-Synthese und DNS	553
2. Größe der RNS-Synthese während der verschiedenen Teilphasen des Generationscyclus	554
3. Größe der RNS-Synthese in verschiedenen Zellarten des tierischen Organismus	556
4. Vergleich zwischen der Größe der Eiweiß- und der RNS-Synthese in verschiedenen Zellarten des tierischen Organismus	556
III. Die celluläre RNS-Synthese unter pathologischen Bedingungen	561
F. Autoradiographische Untersuchung der DNS-Synthese der Zelle	562
I. Ältere Untersuchungen der DNS-Synthese mit P ³²	562
II. Grundsätzliches zur Verwendung von markiertem Thymidin in DNS-Synthese-Untersuchungen	563
1. Thymidin als spezifischer DNS-Vorläufer	563
a) Einbau markierten Thymidins in den Kern	563
b) Einbau markierten Thymidins in das Cytoplasma	564
2. Stoffwechsel des Thymidins und Fragen des Thymidin-Pools	566
a) Stoffwechsel des Thymidins	566
b) Thymidin-Pool	568
3. Verhalten des markierten Thymidins im Organismus; Verfügbarkeitszeit	568
a) Verhalten des injizierten markierten Thymidins im Organismus	568
b) Verfügbarkeitszeit des markierten Thymidins	571
4. Die Silberkornzahl pro Kern als Ausdruck der DNS-Syntheserate; Anteil des markierten Thymidins an der gesamten DNS-Synthese der Zelle	573
a) Silberkornzahl pro Kern	573
b) Prozentualer Anteil des applizierten markierten Thymidins an der DNS-Synthese	573
5. Zur Stabilität der DNS	575
6. Zum Problem der Wiederverwendung katabolisierter markierter DNS	577
7. Toxizität und Radiotoxizität des markierten Thymidins	580
a) Wachstumshemmung und cytologische Anomalien	581
b) Mutationen	582
c) Tumor-Induktion	583
d) Schlußbemerkungen	583
III. Autoradiographische Untersuchungen der cellulären DNS-Synthese mit markiertem Thymidin	584
1. Untersuchungen der Zellproliferation in tierischem Gewebe unter normalen und pathologischen Bedingungen	584
a) Zellproliferation unter normalen Bedingungen	584
b) Zellproliferation unter pathologischen Bedingungen	588
α) Regenerierendes Gewebe	589
β) Einfluß von Hormonen, Pharmaka etc.	593
γ) Carcinogenese; Proliferation in Tumorgewebe	595
δ) In vitro-Inkubation von Gewebeproben	596
2. Bestimmung der Dauer des Generationscyclus und seiner Teilphasen für verschiedene Zellarten des tierischen Organismus	598
a) Methodisches	599
α) Bestimmung der S-Phasen-Dauer mit Hilfe der Methode markierter Mitosen	599
β) Bestimmung der S-Phasen-Dauer mit Hilfe einer Doppelmarkierung mit H ³ und C ¹⁴ -Thymidin	600
γ) Bestimmung der Dauer der Generationszeit	602
b) Ergebnisse	603
α) Tabellarische Übersicht über veröffentlichte Werte von Generationszeiten und ihrer Teilphasen (bis Mitte 1967)	603
β) Dauer der S-Phase	603
γ) Dauer der Mitose	617

δ) Dauer der G_2 -Phase	617
ε) Zeitintervall zwischen Beginn der S-Phase und Ende der Mitose (= S + G_2 + M)	618
ζ) Bedeutung der G_1 -Phase für die Cyclus-Dauer	618
η) Tumorzellen	618
θ) Änderung der Generationszeit oder ihrer Teilphasen durch ver- schiedene innere und äußere Einflüsse	619
c) Tageszeitliche Schwankungen des Markierungs-Index	620
d) Untersuchungen der Variation der Generationszeit innerhalb einer Zell- population mittels Dauerinfusion von H^3 -Thymidin, „growth fraction“	621
3. Größe der DNS-Syntheserate während der S-Phase	624
a) Im gesamten Kern	624
b) In einzelnen Chromosomen	627
4. Strahleneffekte auf die DNS-Synthese und Strahlenempfindlichkeit der einzelnen Teilphasen des Zellcyclus	627
a) Einfluß auf den Markierungs-Index	628
b) Einfluß auf die DNS-Syntheserate	628
c) Einfluß auf die Dauer des Zellcyclus und seiner Teilphasen	629
d) Relative Strahlenempfindlichkeit der verschiedenen Phasen des Zellcyclus	630
5. Untersuchungen zum Mechanismus der Chromosomen-Verdopplung und der Verteilung der neugebildeten DNS auf die Tochterzellen	632
Literatur	636
Ergänzungen zur Literatur	667
Orthologie und Pathologie des Schwefelstoffwechsels der Zelle im Autoradiogramm. Von Professor Dr. WOLFGANG OEHLERT, Freiburg (Breisgau). Mit 9 Abbildungen	671
Aufnahme, Organverteilung und Ausscheidung von S^{35} -Sulfat	671
Der Einbau von S^{35} -Sulfat in schleimbildende Zellen	672
Der Schwefeleinbau in die Chondroitinschwefelsäure des hyalinen und des Gelenkknorpels	677
Der Schwefeleinbau in die Chondroitinschwefelsäure des Epiphysenknorpels und des Knochens	679
Der Schwefeleinbau im Bindegewebe und den Gefäßen	682
Der Schwefeleinbau in Gewebsmastzellen	683
Der Schwefeleinbau in die Epidermis und das mehrschichtige Plattenepithel der Zunge und des Vormagens	684
Der Schwefeleinbau in den Geweben des weiblichen Genitaltraktes	687
Der Schwefeleinbau während der Embryonalentwicklung	687
Der Schwefeleinbau im ZNS	689
Der Schwefeleinbau in Leber, Niere, Pankreas und innersekretorische Organe	689
Der Schwefeleinbau in Tumoren	691
Der S^{35} -Einbau in verschiedene Zellelemente des Knochenmarks	692
Literatur	693
Namenverzeichnis	697
Sachverzeichnis	770

Biochemie der Zellstrukturen.

Von

GÜNTHER SIEBERT*.

Mit 20 Abbildungen.

A. Einleitung.

1. Einführung.

Die Biochemie befindet sich seit etwa 2 Jahrzehnten in einer Phase starker Expansion. Diese ist in gleicher Weise durch neue geistige Konzeptionen wie durch neuartige methodische Möglichkeiten bedingt. Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Faktoren erklären die sinnfälligen Fortschritte biochemischer Forschung; gleichzeitig führen sie aber auch zu wesentlich engerer Berührung mit anderen biologischen Fächern: Die Entwicklung der Biochemie der Zellstrukturen bietet hierfür ein ausgezeichnetes Beispiel.

Seit einzelne Strukturelemente der Zelle der Isolierung zugänglich sind, können sie auch mit biochemischen Methoden untersucht werden. Die ersten Ansätze zu solchen Experimenten liegen schon etwa 60 Jahre zurück¹, doch stammt der wesentliche Impuls zur biochemischen Untersuchung intracellulärer Strukturen aus den letzten zwei Jahrzehnten². Die Entwicklung brauchbarer Isolierungsverfahren traf zu jener Zeit mit der Erkenntnis zusammen, daß für viele biochemische Probleme eine Separierung der einzelnen Zellstrukturen unabdingbare Voraussetzung für die weitere experimentelle Bearbeitung ist. Die dem Biochemiker geläufigen analytischen und präparativen Methoden haben so durch die Kombination mit der Zellfraktionierung eine enorme Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit erfahren. Die seitdem erzielten Fortschritte der Kenntnis der Strukturelemente der Zelle finden in zahllosen einschlägigen Publikationen ihren Niederschlag, die daher die Verweisung auf zusammenfassende Darstellungen unumgänglich machen^{2, 3}.

Die Zuordnung biochemischer Befunde zu bestimmten Zellstrukturen ist heute ein selbstverständliches Anliegen biochemischer Untersuchungen geworden. Für zahlreiche Probleme des Intermediärstoffwechsels, der Enzymlehre und vieler anderer Gebiete muß eine Beschreibung als unvollständig gelten, wenn nicht wenigstens versucht wird, Angaben zur intracellulären Lokalisation dieser Prozesse zu machen. Es wird eine der Aufgaben dieses Beitrages sein, zu zeigen, in welchem Ausmaß bereits heute Wechselwirkungen zwischen biochemischen Befunden und der Lehre von den Strukturelementen der Zelle zu erkennen sind.

Unverkennbar sind die Fortschritte, die der reinen Biochemie durch die Berücksichtigung lokalisatorischer Fragen zugewachsen sind. Erst die Auftrennung

* Physiologisch-Chemisches Institut der Universität Mainz.

¹ ACKERMANN 1904/05, WARBURG 1910/11.

² LANG und SIEBERT 1954, LANG und SIEBERT 1955.

³ ALLFREY, MIRSKY und STERN 1955, HOGEBOOM, KUFF und SCHNEIDER 1957, CROOK 1959, HAYASHI 1959, ROODYN 1959, ALLFREY 1959, NOVIKOFF 1961a, NOVIKOFF 1961b, PORTER 1961, MIRSKY und OSAWA 1961, DE DUVE, WATTIAUX und BAUDHUIN 1962, KARLSON 1963, SIEBERT und HUMPHREY 1965.

in einzelne Zellfraktionen kann es z. B. ermöglichen, bestimmte Enzymreaktionen nachzuweisen, weil etwa in Gegenwart anderer Zellbestandteile (wie im Gewebsschnitt oder Homogenat) interferierende Prozesse ablaufen, die um das Substrat konkurrieren oder ein Reaktionsprodukt laufend beseitigen und so den Nachweis scheinbar fehlschlagen lassen¹.

Desgleichen gibt es manche Beispiele, daß die Isolierung einer bestimmten Substanz, etwa eines Enzyms, nur gelingt, wenn man mit der Abtrennung derjenigen Zellfraktion aus einem Homogenat beginnt, in der die gesuchte Substanz vorzugsweise angereichert ist. Ein solches Vorgehen ist mit dem weiteren Vorteil verbunden, daß die Trennung von Zellbestandteilen häufig autolytische Prozesse unterbindet; nicht selten nämlich sind Substrat und Enzym für solche Vorgänge in der lebenden Zelle räumlich voneinander getrennt, und man kann auch nach Zellerstörung durch Zellfraktionierung die Komponenten weiterhin separiert halten.

Die Erkenntnis von der Arbeitsteilung innerhalb der Zelle, lange schon vermutet und indirekt erschlossen, ist wohl einer der wichtigsten Fortschritte, den das Studium der intracellulären Lokalisation für die Biochemie erbracht hat. Hierher gehören die Zuordnung der Proteinsynthese zu der sog. Mikrosomenfraktion, die überragende Rolle der Mitochondrien in dem der Energiegewinnung dienenden Stoffwechsel oder auch die Erkennung bestimmter intracellulärer Räume, die durch spezielle Reaktionsabläufe, etwa im Bereich biosynthetischer, reduktiver Prozesse, charakterisiert sind. So läßt sich die Stoffwechsellehre heute in einzelnen ihrer Zweige bereits als dreidimensionale Stoffwechsellehre formulieren, mit allen Konsequenzen hinsichtlich der Kommunikation einzelner Räume untereinander, der notwendigen Transport- und Austausch-Vorgänge und ihrer Beeinflussung durch pathologische, experimentelle oder Umwelt-Einflüsse.

Obwohl die Vielzahl der vorliegenden Befunde dazu einladen könnte, die gesamte Biochemie unter dem Aspekt der intracellulären Lokalisation abzuhandeln, bleibt es fraglich, ob dies z. Zt. sinnvoll ist. In dem vorliegenden Beitrag wird daher versucht werden, einzelne, hinreichend bearbeitete Gebiete zu schildern und dabei auf mehr allgemeine Gesichtspunkte besondere Betonung zu legen.

2. Der Strukturbegriff.

Der Strukturbegriff, für den Morphologen zunächst einmal mit dem Begriff der Anschaulichkeit verbunden, hat in der Biochemie eine im Ursprung durchaus unterschiedliche Bedeutung. Jegliche Ausbildung einer Struktur, ja selbst schon einer „nichtstrukturierten“ Grenzfläche, führt vom homogenen Lösungs-System zu heterogenen Systemen; damit werden Stofftransport und Stoffverteilung in entscheidender Weise modifiziert, indem die physikalischen Phänomene der Diffusion bezüglich Geschwindigkeit, Richtung und endlicher Gleichgewichtslage gegenüber einem löslichen, homogenen System durch neue Faktoren verändert werden. So ermöglicht die Ausbildung von Strukturen z. B. die Einstellung und Erhaltung von Konzentrationsgradienten, wie sie etwa für das intracelluläre Ionenmilieu im Vergleich mit dem extracellulären Bereich charakteristisch sind².

Der hier verwendete Strukturbegriff hat primär nichts mit der Frage zu tun, ob eine solche Struktur „sichtbar“ ist oder nicht. Die Grenze der Sichtbarkeit ist durch die Fortschritte der Elektronenmikroskopie bis an den Größenbereich makromolekularer Substanzen herangerückt worden. Indessen garantiert die Präparationstechnik in der Elektronenmikroskopie nicht notwendigerweise, daß alle Strukturen sichtbar werden, wie auch umgekehrt die Frage möglicher Artefakte

¹ PLAUT und SUNG 1954. ² NETTER 1959.

immer neu zu diskutieren ist. Struktur im physikochemischen Sinne wird dagegen durch ihre Funktion erfaßt, existiert also z. B. immer dann, wenn Grenzflächenphänomene meßbar sind und hängt in ihrem Existenzbeweis nicht unmittelbar von der Möglichkeit ihrer Sichtbarmachung ab. Selbstverständlich stellt sich stets, wenn ein funktioneller Beweis für eine Struktur vorliegt, auch die Frage nach ihrem chemischen Aufbau und ihrem morphologischen Substrat, doch ist dies keine Vorbedingung ihres Existenzbeweises.

Betrachtet man die Ausbildung einer irgendwie gearteten Struktur aus einem unstrukturierten Medium, so muß man die außergewöhnlich geringe statistische Wahrscheinlichkeit in Rechnung stellen, daß dieser Vorgang überhaupt abläuft; thermodynamisch verständlich wird die Entstehung einer solchen Struktur nur unter der Bedingung, daß gleichzeitig Energie aufgewendet wird. In der Tat ist die z. Z. beste Erklärung für Existenz und Ausmaß des Grundumsatzes des Menschen die Meinung, daß der wesentliche Teil dieses Grundumsatzes Energieverbrauch zur Erhaltung der Struktur sei¹. Diese Ableitung führt damit unmittelbar zur Verknüpfung von Struktur- und Stoffwechselfproblemen, einem Bereich, der noch häufig in diesem Beitrag berührt werden wird.

Nicht nur in räumlichem Sinne, sondern gerade auch in funktioneller Hinsicht gestattet der Strukturbegriff, zum Begriff der räumlichen Ordnung überzuleiten. Erst die Existenz von Strukturen ermöglicht es, in die Vielzahl biochemischer Reaktionen einer Zelle eine gewisse, wie sich zeigen wird, höchst wirksame Ordnung zu bringen; etwa dadurch, daß Wirkstoff- und Hemmstoff-Systeme in räumlicher Trennung gehalten werden², daß die Wandelbarkeit mancher Strukturen Regulationseffekte ermöglicht³ oder daß zusammengehörige Reaktionsabläufe durch Strukturbindung in der „richtigen“ Reihenfolge gehalten und durch die unmittelbare Nachbarschaft miteinander reagierender Systeme höhere Reaktionsgeschwindigkeiten erzielt werden, als sie die freie Diffusion in löslichen Systemen ermöglichen würde⁴. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn eine Zellstruktur ein Permeationshindernis darstellt; dessen Überwindung erfordert zusätzliche chemische Prozesse, einschließlich energieumsetzender Reaktionen, und ermöglicht Regulationsmechanismen.

Allerdings bereitet die Anwendung des Strukturbegriffes zumindest in einer Hinsicht erhebliche Schwierigkeiten: Die thermodynamisch-kinetische Behandlung mehrstufiger Reaktionsketten ist schon in freier Lösung schwierig genug, wird aber nahezu unmöglich, wenn — notwendigerweise — Strukturbindung von Enzymen, Permeabilitätsphänomene usw. mit berücksichtigt werden sollen⁴.

Diese bewußt qualitativ gehaltene Erörterung der Bedeutung des Strukturbegriffes für die Biochemie mag zunächst genügen, um die Ansatzpunkte zu zeigen, von denen eine eingehendere Behandlung dieser Probleme auszugehen hat. Sobald der Ordnungsbegriff eingeführt wird, ist eine Beteiligung teleologischer Gesichtspunkte möglich, etwa wenn durch räumliche Trennung von Substrat und Enzym in einer Zelle die Verhinderung intravitale Autolyseprozesse bewirkt wird³. Indessen wird in diesem Beitrag versucht werden, teleologische Überlegungen nicht hervortreten zu lassen.

3. Morphologische und biochemische Methoden.

Wie bereits erwähnt, sind es in der Morphologie vorwiegend Form und Qualität, die der Beobachtung unmittelbar zugänglich sind. Die Biochemie versucht,

¹ LANG und RANKE 1950.

² SIEBERT, VILLALOBOS jr., RO, STEELE, LINDENMAYER, ADAMS und BUSCH 1966.

³ Ciba Foundation 1963. ⁴ CHANCE und WILLIAMS 1956.

die Funktion als hauptsächliches Forschungsanliegen durch kinetische Studien quantitativ zu erfassen. Zusammenhänge zwischen Form und Leistung, d. h. das alte Struktur-Funktions-Problem, zu begreifen, wird jedoch durch manche unvermeidliche Eigentümlichkeiten der beiden Forschungsrichtungen erschwert. So ist das zunächst in der belebten Natur gegebene Beobachtungsobjekt von stets sehr komplexer Natur; an der Herstellung eines gegebenen Zustandes sind immer viele Faktoren gleichzeitig beteiligt. Weder die räumliche Ordnung an sich noch die zeitliche Aufeinanderfolge bestimmter Phänomene berechtigen als solche, unmittelbar auf ursächliche Zusammenhänge zu schließen; dem wird stets eine sehr sorgfältige Abwägung aller einzelnen Beweisstücke vorausgehen müssen.

Wegen der Schwierigkeit, aus einer überaus komplexen Situation Schlüsse zu ziehen, wird man versuchen, möglichst viele Variablen zu eliminieren, um zu übersichtlichen Versuchssystemen zu gelangen. Man nähert sich also im experimentellen Bereich mehr und mehr der Untersuchung von Modellfällen; mit einem gewissen Verlust an Allgemeingültigkeit erhöht sich entsprechend die Schärfe der Aussage. Die Möglichkeit aber, Variable zu eliminieren, ist für morphologische und biochemische Versuchsanordnungen von sehr verschiedenem Ausmaß. So kann man z. B. in der Biochemie einzelne Enzyme aus einem Gewebe isolieren, ihre Eigenschaften nach Reindarstellung studieren und dann erwägen, wie sich die erhobenen Befunde in die komplexen Stoffwechselreaktionen, in denen dieses Enzym eines von vielen Gliedern ist, integrieren lassen. Man wird also aus der Kenntnis einzelner Variablen, etwa der Substratspezifität oder der Gleichgewichtslage, bestrebt sein, das Verhalten dieses Enzyms in einem multivariablen Reaktionssystem zu verstehen. Es leuchtet ein, daß eine so weitgehende Zergliederung eines Phänomens der morphologischen Methodik meist nicht möglich ist.

Der Zug zur Behandlung von Modellfällen tritt besonders deutlich im Bereich biochemischer Untersuchungen an pathologischem Beobachtungsgut hervor: Die imponierende Vielfalt der Erscheinungen kann eine naturwissenschaftliche Bearbeitung bis zur Unmöglichkeit erschweren, etwa auf dem Gebiet der menschlichen Tumoren. Daher beschränkt sich z. B. die biochemische Bearbeitung des Tumorproblems vornehmlich auf Experimentaltumoren an Versuchstieren, hier wiederum speziell auf „reine“ Tumorzellen, etwa in der Ascitesform. So steht der faszinierenden Mannigfaltigkeit pathologischer Beobachtungen am Menschen nur ein relativ geringes Maß an biochemischen Befunden gegenüber. Vergleichbare morphologische und biochemische Daten existieren vorerst im wesentlichen im Bereich der Orthologie. Daher wird sich dieser Beitrag im wesentlichen auf solches Material beschränken müssen und nur gelegentlich die Pathologie der Zellstrukturen streifen können. Größeres Beobachtungsgut liegt indessen für experimentelle Bedingungen vor, die nicht eigentlich krankhaft sind, wie z. B. veränderte Ernährungsbedingungen, Bestrahlung, Kälteexposition, Leberregeneration nach partieller Hepatektomie und vieles andere mehr; so wird eine Berücksichtigung solcher Befunde, die als Modellfall pathologischer Umstände gelten können, weitgehend erfolgen und manche Rückschlüsse auf die eigentliche Pathologie zulassen.

Die Größenordnung des Einzelobjekts, an dem Beobachtungen gemacht werden können, ist wiederum für Morphologie und Biochemie überaus verschieden. Während die elektronenoptische Beobachtung bis herunter zu Längenmaßen von etwa 15 Å Aufschlüsse geben kann, erfordern biochemische Mikromethoden im allgemeinen mehr als das 1000fache an Material. Die Empfindlichkeit chemischer oder physikalischer Meßmethoden reicht also nicht im entferntesten an die Auflösungskraft optischer Geräte heran.