



考试掌中宝

高级卫生专业技术资格考试

新媒体复合版

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

中医内科

副主任、主任医师资格考试

冲刺模拟卷



上海科学技术出版社

10套模拟试卷 / 1000道试题
紧扣考试大纲 / 题型全面丰富
两种版本互动 / 随时随地复习
自动批阅判分 / 汇总错题重做



中医内科副主任、主任医师 资格考试冲刺模拟卷

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

图书在版编目(CIP)数据

中医内科副主任、主任医师资格考试冲刺模拟卷 /
高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编. —上
海：上海科学技术出版社，2018.7

(考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试)

ISBN 978 - 7 - 5478 - 4056 - 6

I. ①中… II. ①高… III. ①中医内科学—资格考试
—习题集 IV. ①R25 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 134317 号



授权码粘贴处

中医内科副主任、主任医师资格考试冲刺模拟卷
高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)
上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co
□□□□□□□有限公司印刷
开本 850×1168 1/8 印张 12.5
字数 250 千字
2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 5478 - 4056 - 6/R · 1641
定价：58.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,请向工厂联系调换

上海科学技术出版社

前　　言

为了进一步深化卫生专业职称改革,2000年人事部、卫生部下发了《关于加强卫生专业技术职务聘任工作的通知》。通知要求,卫生专业的副高级技术资格通过考试与评审相结合的方式获得,正高级技术资格通过评审委员会答辩后获得。根据通知精神和考试工作需要,副高级技术资格考试在全国各省、自治区、直辖市职称改革领导小组的领导下设立了多个考区。目前,很多地区正高级技术资格的评审工作也逐渐采用考评综合的方法。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘任相应技术职称的必要依据。

考试是为了加强临床医务人员对学科知识的系统了解和掌握,是提高医疗质量的一种手段。我国每年有20万以上需要晋升副高级和正高级职称的卫生专业人员,这些高级技术人员是我国医学发展的中坚力量,身兼承上启下的重任。本书不仅可以帮助广大考生通过考试,还可以使考生的专业知识更加扎实与牢固,以面对更加艰巨的任务。

为了帮助考生做好考前复习,我们仔细分析考试的命题规律和考试特点,严格按照考试大纲的要求,编写了本套“考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试”系列。每套冲刺模拟试卷包含10套习题,包括单选题、多选题、共用题干题和案例分析题4种题型。内容紧扣考试大纲,题型全面,题量丰富,具有很高的考试指导价值。

大纲将专业知识的要求分为3个层次,分别是“了解”“熟悉”“掌握”。安排题型难易程度,好比一棵树,掌握内容是主干部分,熟悉内容是分枝,而了解内容则是树叶。本套书以主干为主、分枝为其次、树叶为辅的要求编排,针对性强,突出重点。可以检验过往的复习成果,起到查漏补缺的作用。

为了方便考生复习迎考,本套冲刺模拟试卷包括纸质版和配套的手机APP应用版,做到随时随地互动复习,反复演练。配有同步练习题,自动批阅评分,并汇总错题强化训练,掌握做题技巧及命题规律,使广大考生轻松通过考试。

由于编写时间及水平有限,书中难免有疏漏与不足之处,希望广大考生与学者批评与指正。

考试命题研究委员会
2018年5月

目　　录

冲刺模拟卷一	(1)
冲刺模拟卷二	(11)
冲刺模拟卷三	(21)
冲刺模拟卷四	(29)
冲刺模拟卷五	(39)
冲刺模拟卷六	(49)
冲刺模拟卷七	(59)
冲刺模拟卷八	(69)
冲刺模拟卷九	(79)
冲刺模拟卷十	(87)
参考答案	(95)



冲刺模拟卷一

一、单选题：以下每道考题有 5 个备选答案，请选择 1 个最佳答案

1. 症见心烦不寐，躁扰不宁，口舌生疮，小便短赤，舌红，苔薄黄，脉数，治疗方剂宜选用
 - A. 朱砂安神丸
 - B. 安神定志丸
 - C. 龙胆泻肝汤
 - D. 黄连温胆汤
 - E. 丹栀逍遥散

 2. 痰浊蒙窍型痴呆患者，伴有心烦躁动，言语颠倒，歌笑不休，甚至反喜污秽，舌红，脉滑数，主方当用
 - A. 还少丹
 - B. 洗心汤
 - C. 转呆丹
 - D. 七福饮
 - E. 肾气丸

 3. 二阴煎用于
 - A. 癫病痰气郁结证
 - B. 癫病心脾两虚证
 - C. 狂病痰火扰神证
 - D. 狂病火盛阴伤证
 - E. 狂病痰热瘀结证

 4. 我国关于癲病的记载，最早见于
 - A. 《内经》
 - B. 《庄子》
 - C. 《三国志》
 - D. 《肘后方》
 - E. 《吕氏春秋》

 5. 治疗“刚痉”的代表方是
 - A. 桓蒌桂枝汤
 - B. 桂枝汤
 - C. 葛根汤
 - D. 羌活胜湿汤
 - E. 增液承气汤

 6. 由噎至膈，属
 - A. 病势转愈
 - B. 病势转重
 - C. 阴阳离绝
 - D. 邪正相争

 - E. 危重之候
7. 痰湿蕴肺型咳嗽的主症特点为
 - A. 咳声气促、痰多质黏
 - B. 咳声重浊、痰黄量少
 - C. 咳嗽频剧、痰少而黏
 - D. 咳声重浊、痰多胸闷
 - E. 咳嗽气促、痰黄稠厚

 8. 哮喘反复发作，时发时止，发时喉中哮鸣有声，呼吸急促，不能平卧，止时有如常人，发前多有鼻痒、咽痒、咳嗽，或伴恶风，汗出，舌质淡，苔薄白，脉浮，治宜选
 - A. 华盖散
 - B. 桑杏汤
 - C. 麻黄汤
 - D. 定喘汤
 - E. 桑白皮汤

 9. 下列哪一项不属于《金匱要略》的“五疸”
 - A. 谷疸
 - B. 酒疸
 - C. 黑疸
 - D. 胆黄
 - E. 女劳疸

 10. 治疗“气淋”的代表方是
 - A. 沉香散
 - B. 龙胆泻肝汤
 - C. 石韦散
 - D. 八正散
 - E. 知柏地黄丸

 11. 首创用探吐法治疗小便不通的医家是
 - A. 孙思邈
 - B. 王焘
 - C. 张景岳
 - D. 朱丹溪
 - E. 李用粹

 12. 用槟榔南瓜煎治疗绦虫病，其服药顺序是
 - A. 槟榔、南瓜子、元明粉
 - B. 槟榔、元明粉、南瓜子
 - C. 南瓜子、元明粉、槟榔
 - D. 南瓜子、槟榔、元明粉
 - E. 元明粉、南瓜子、槟榔

 13. 痘证之邪壅经络，若寒邪较甚，项背强急，肢痛拘挛，选用
 - A. 麻黄汤
 - B. 桂枝汤
 - C. 荆防败毒散

- D. 葛根汤
E. 大青龙汤
14. 患者素体阴亏血虚,或在失血、汗、下太过之后,项背强急,四肢抽搐,头目昏眩,自汗,神疲,气短,舌淡红,脉弦细,治疗选方
A. 增液承气汤
B. 四君子汤
C. 四物汤
D. 安宫牛黄丸
E. 十全大补汤
15. 肝郁血虚,脾失健运,两胁作痛,神疲食少,脉弦而虚者,当用
A. 健脾丸
B. 道遥散
C. 一贯煎
D. 越鞠丸
E. 柴胡疏肝散
16. 下列阴和阳的概念中,最确切的是
A. 阴和阳是中国古代的两点论
B. 阴和阳即是矛盾
C. 阴和阳代表对立的事物
D. 阴和阳代表相互对立又相互关联的事物属性
E. 阴和阳说明相互关联着的事物
17. 肾虚腰痛,无明显阴阳偏盛者,可服用
A. 河车大造丸
B. 补髓丹
C. 六味地黄丸
D. 青娥丸
E. 金匮肾气丸
18. 男性,66岁,头摇肢颤,持物不稳,腰膝酸软,失民心烦,头晕耳鸣,善忘,神呆,舌质红,苔薄白,脉细数,证属颤证之
A. 阳气虚衰证
B. 气血亏虚证
C. 痰热风动证
D. 髓海不足证
E. 风阳内动证
19. 女性,48岁,头昏目暗,两目干涩,视物昏花,腰膝酸软,舌淡苔白,脉细,用药宜首选
A. 菊花
B. 枸杞子
C. 羚羊角
D. 珍珠母
E. 女贞子
20. 女性,45岁,2日前因淋雨后受凉,突感头昏而重,如物缠裹,痰多舌淡红,苔白腻,脉弦滑,属于
A. 肝火上炎,肝阳上亢
B. 气血亏虚
C. 痰湿内阻
D. 肾虚精亏
E. 瘀血阻滞
21. 心悸气短,冷汗淋漓,四肢厥冷,呼吸微弱,面色苍白,脉微欲绝,神志模糊昏迷,证属
A. 心气虚
B. 心阳虚
C. 亡阳证
D. 心脉痹阻
E. 心阳暴脱
22. 身热多汗,心胸烦闷,气逆欲呕,体倦口干,舌红少苔,脉象虚数者,治宜选用
A. 导赤散
B. 白虎加人参汤
C. 生脉散
D. 竹叶石膏汤
E. 王氏清暑益气汤
23. 痢疾的三种病理变化不包括
A. 脾虚湿盛
B. 湿热壅滞肠道
C. 肠道传导失司
D. 气血壅滞肠道
E. 寒湿滞留肠道
24. 下列各项中,哪项在支气管哮喘的诊断中最有意义
A. 血气分析
B. 血常规检查
C. 临床症状和体征
D. 呼吸功能检查
E. 胸部X线检查
25. 脑血栓形成患者出现尿失禁是病变损害了
A. 额叶
B. 脾脏体前4/5
C. 扣带回
D. 旁中央小叶
E. 颞叶基底面
- 二、多选题:**以下每道考题有5个备选答案,每题至少有2个正确答案
26. 与痴呆密切相关的脏腑是
A. 心
B. 肾
C. 肝
D. 脾





- E. 肺
27. 治疗心气不足型胸痹心痛的优选方是
 A. 参附汤
 B. 灸甘草汤
 C. 天王补心丹
 D. 养心汤
 E. 保元汤
28. 痫病的发作可见
 A. 突然仆倒
 B. 四肢抽搐
 C. 口吐涎沫
 D. 角弓反张
 E. 两目上视
29. 瘊病证属肝火旺盛者,临床表现多有
 A. 面部烘热
 B. 性情急躁易怒
 C. 舌质红,苔薄黄,脉弦数
 D. 烦热,易出汗
 E. 颈前喉结两旁轻度或中度肿大
30. 黄疸热重于湿证的特点为
 A. 黄疸鲜明
 B. 发热口渴
 C. 腹部胀闷
 D. 大便秘结
 E. 舌苔厚腻微黄
31. 阳黄胆腑郁热证的临床主症有
 A. 身目发黄
 B. 黄色鲜明
 C. 身热不退
 D. 上腹右胁胀闷疼痛
 E. 牵及肩背
32. 脾胃虚寒型胃痛的代表方是
 A. 补中益气汤
 B. 黄芪建中汤
 C. 香砂六君子汤
 D. 归脾汤
 E. 附桂理中汤
33. 属寒湿泄泻特点的是
 A. 泄泻清稀
 B. 泄如水样
 C. 腹痛肠鸣
 D. 恶寒发热
- E. 头身疼痛
34. 积聚与痞满容易混淆,痞满的特点是
 A. 腹部痞塞胀满感
 B. 常有腹痛
 C. 腹部可触及较软的包块
 D. 腹部触诊无包块
 E. 腹部窜痛
35. 痰瘀阻肺型肺胀可选用何方治疗
 A. 小青龙汤
 B. 越婢加半夏汤
 C. 小青龙加石膏汤
 D. 茅劳大枣泻肺汤
 E. 桂枝茯苓丸
36. 肺痈与痰热蕴肺证的共有症状为
 A. 发热
 B. 咳嗽
 C. 胸痛
 D. 时时振寒
 E. 咳痰带血
37. 哮证与喘证的鉴别要点在于
 A. 有无夙根
 B. 呼吸急促
 C. 喉中有无痰鸣声
 D. 痰多而黏
 E. 不能平卧
38. 湿热下注,扰动精室而致遗精,可选用
 A. 程氏萆薢分清饮
 B. 导赤散
 C. 苍白二陈汤
 D. 苍术难名丹
 E. 封髓丹
39. 肥胖辨证论治的证型有
 A. 胃热滞脾
 B. 脾虚不运
 C. 痰湿内盛
 D. 脾肾阳虚
 E. 肺肾气虚
40. 厥证的治法有
 A. 开窍醒神
 B. 利水渗湿
 C. 辟秽醒神
 D. 救逆醒神

- E. 化痰醒神
41. 实证感冒的证型
 A. 风寒证
 B. 风热证
 C. 暑湿证
 D. 秋燥证
 E. 寒湿证
42. 湿性黏滞的具体表现可见
 A. 小便混浊
 B. 大便黏滞不爽
 C. 脚气
 D. 起病缓慢
 E. 病程长, 缠绵难愈
43. 肺炎球菌肺炎合并感染性休克时的治疗措施有
 A. 大剂量青霉素
 B. 补充血容量, 纠正休克
 C. 应用糖皮质激素
 D. 防止心、肺及肾衰竭
 E. 若合并脓胸, 需置管引流
44. 消化性溃疡发生癌变的表现为
 A. 消化不良症状加重
 B. 疼痛失去原有规律性
 C. 大便隐血试验持续阳性
 D. 胃酸分泌增多
 E. 进行性消瘦
45. 于酒宴后出现上腹部剧烈疼痛, 应考虑的诊断是
 A. 胃、十二指肠溃疡病
 B. 急性胰腺炎
 C. 肠梗阻
 D. 急性胆囊炎
 E. 急性病毒性肝炎
- 三、共用题干题: 以下每道考题有 2~6 个提问, 每个提问有 5 个备选答案, 请选择 1 个最佳答案
 (46~48 题共用题干)
- 男性, 61 岁, 去年曾患有“急性广泛前壁心肌梗死”, 近日心悸不安, 胸闷气短, 四肢发凉, 面色苍白, 舌淡苔白, 脉象沉弱。
46. 根据上述患者临床表现、中医辨证特点, 下列治疗方法中, 哪项最为符合
 A. 温阳行水, 健脾补肾
 B. 补血养心, 养心安神
 C. 滋阴补肾, 利水消肿
 D. 温补心阳, 安神定悸
- E. 健脾益气, 利水消肿
47. 假设患者迁延失治, 而症见心悸目眩, 形寒肢冷, 腰痽纳呆, 渴不欲饮, 小便短少, 舌淡, 苔水滑, 脉弦滑, 治疗方剂宜选
 A. 桃红四物汤加味
 B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤加味
 C. 炙甘草汤加减
 D. 归脾汤加减
 E. 苓桂术甘汤加减
48. 若病情未及诊治, 进一步加重出现心悸喘咳, 不能平卧, 小便不利, 下肢浮肿, 畏寒肢冷, 舌淡, 苔水滑, 脉弦滑, 此为
 A. 心脾两虚, 血不养心
 B. 肾阳虚衰不能制水, 水气凌心
 C. 脾气虚弱, 健运失司
 D. 肺气不足, 通调水道失司
 E. 心阳不足, 心失温养
- (49~54 题共用题干)
- 男性, 25 岁。主诉: 食欲不振、困倦乏力 1 个月, 身目发黄 5 日。患者发病的 1 月前因多次淋雨后即感全身困倦乏力, 食欲不振, 时有腹泻, 服中药后病情减轻, 因农活较忙, 未再继续服药。5 日前家人发觉其目睛发黄, 渐至皮肤亦黄, 病情逐渐加重, 故来诊治。现食欲不振, 时有恶心, 口淡不渴, 肢体困倦, 神疲畏寒, 腹胀满, 大便稀溏, 小便量少, 右胁下疼痛不适。检查: 目睛及皮肤均明显发黄, 黄色晦暗, 右胁下有压痛, 舌淡白, 苔白腻, 脉沉迟。
49. 该患者中医诊断是
 A. 感冒
 B. 泄泻
 C. 黄疸
 D. 胁痛
 E. 腹痛
50. 该病证候分型是
 A. 阳黄, 热重于湿
 B. 阳黄, 湿重于热
 C. 阴黄, 寒湿阻遏
 D. 阴黄, 脾虚血亏
 E. 阳黄, 湿热并重
51. 该病的治法是
 A. 温中化湿, 淡渗分利
 B. 除湿化浊, 泄热退黄
 C. 清热利湿, 健脾和胃
 D. 健脾温中, 补养气血
 E. 健脾和胃, 温化寒湿
52. 该病的首选方药是
 A. 附子理中汤
 B. 茵陈五苓散



- C. 茵陈术附汤合胃苓汤加减
D. 黄芪建中汤
E. 良附丸

53. 如见脘腹作胀，胁肋隐痛，肢困纳呆，便溏，脉弦细，宜用何药

- A. 逍遥散
B. 柴胡疏肝散
C. 四物汤
D. 黄芪建中汤
E. 六君子汤

54. 如因黄疸日久，胁下有癥块，出现胁肋刺痛，拒按，宜用

- A. 桃仁红花煎
B. 血府逐瘀汤
C. 鳖甲煎丸
D. 柴胡疏肝散
E. 少腹逐瘀汤

(55~56题共用题干)

患者大便干结，面色无华，心悸气短，健忘，失眠多梦，头晕目眩，口唇色淡，舌淡苔白，脉细涩。

55. 其治法是

- A. 滋阴通便
B. 养血润燥
C. 温阳通便
D. 顺气导滞
E. 散寒通便

56. 其治疗首选方是

- A. 增液汤
B. 六磨汤
C. 润肠丸
D. 黄芪汤
E. 麻子仁丸

(57~60题共用题干)

男性，16岁，全身浮肿时轻时重已2年。2年前诊断为肾病综合征，先后用激素、雷公藤皂苷、消炎活血等药治疗，病情仍反复不愈。现症：全身浮肿，按之没指，皮肤光亮，下肢明显，小便量少，身体困重，胸闷纳呆，苔白腻，脉沉缓。

57. 其诊断为

- A. 风水相搏证
B. 水湿浸渍证
C. 湿毒浸淫证
D. 湿热壅盛证
E. 脾阳衰微证

58. 其治法是

- A. 疏风清热，利水消肿

- B. 运脾化湿，通阳利水
C. 宣肺解毒，利湿消肿
D. 分利湿热
E. 健脾温阳利水

59. 其选方为

- A. 越婢加术汤
B. 五皮饮合胃苓汤
C. 麻黄连翘赤小豆汤
D. 疏凿饮子
E. 实脾饮

60. 若因外感风邪而诱发，肿甚而喘者，可加

- A. 白芥子、杏仁
B. 麻黄、杏仁
C. 桑白皮、连翘
D. 炒苏子、黄芩
E. 百部、地龙

四、案例分析题：每个案例至少有3个提问，每个提问有多个备选答案，其中正确答案有1个或几个

(61~68题共用题干)

男性，36岁，因发热1周来诊。患者素体虚弱，容易感冒，1周前到外地旅游多日后出现反复发热，体温波动在37.9~38.5℃，劳累后发热症状加重，伴有头晕乏力，食少便溏，查体见舌质淡，苔薄白，脉缓。

61. 该患者应该诊断为

- A. 虚劳
B. 气虚外感
C. 内伤发热
D. 眩晕
E. 肺痨

62. 其中医病机是

- A. 中气不足
B. 阴火内生
C. 清阳不升
D. 阳虚外越
E. 风寒侵袭

63. 其中医治法是

- A. 益气健脾，甘温除热
B. 益气健脾，清热泻火
C. 益气健脾，疏风散寒
D. 益气健脾，升清降浊
E. 益气健脾，滋阴潜阳

64. 若患者又出现时冷时热，汗出恶风，宜加用的方药是

- A. 牡蛎散
B. 玉屏风散
C. 银翘散
D. 桂枝汤
E. 三仁汤
65. 这时应该诊断为(提示:该患者经治疗1个月后已无发热头晕,胃纳好转,乏力减轻,但仍有便溏。因工作需要到外地出差多日后又出现发热,即来就诊,体温38.5℃,恶寒,头晕鼻塞,查体见舌质淡,苔薄白,脉缓)
A. 虚劳
B. 气虚外感
C. 内伤发热
D. 眩晕
E. 肺痨
66. 此时中医病机是
A. 中气不足
B. 阴火内生
C. 清阳不升
D. 阳虚外越
E. 风寒侵袭
67. 其中医治法是
A. 益气健脾
B. 清热泻火
C. 疏风散寒
D. 升清降浊
E. 滋阴潜阳
68. 此时宜选用何方药加减治疗
A. 参苏饮
B. 补中益气汤
C. 桂枝汤
D. 玉屏风散
E. 川芎茶调散
- (69~76题共用题干)
- 男性,38岁。主诉:发热时高时低2月余。现病史:患者2月前因参加劳动,过度疲劳,汗出后出现发热,伴有周身酸楚等症,经某医院治疗后周身酸痛消失,但低热一直不退,今前来就诊。现症:发热不退,热势时高时低,乏力气短,懒言自汗,食少便溏,舌质淡,苔白薄,脉细弱。患者平素易感冒。
69. 本病的辨证应考虑为
A. 血虚发热
B. 阴虚发热
C. 气虚发热
D. 阳虚发热
E. 湿阻发热
- F. 气郁发热
70. 气虚发热常见哪些表现
A. 发热常在劳累后发作或加剧
B. 食少便溏
C. 自汗,易于感冒
D. 气短懒言
E. 舌淡,少苔,脉细数
F. 午后或夜间发热
71. 本病可选用补中益气汤进行治疗,其包括下列哪些药物
A. 黄芪
B. 人参
C. 升麻
D. 柴胡
E. 白术
F. 荀苓
G. 芍药
H. 当归
72. 补中益气汤可以治疗以下哪些病证
A. 脱肛,中气下陷
B. 气虚发热
C. 呕吐,胃阴不足
D. 泄泻,脾胃虚弱
E. 虚劳,气虚下陷
F. 腹痛,中脏虚寒
73. 中医学中哪一本医著最早提出了“内伤发热”这一病名
A. 《证治汇补》
B. 《症因脉治》
C. 《内外伤辨惑论》
D. 《脾胃论》
E. 《黄帝内经》
F. 《小儿药证直诀》
74. 内伤发热的辨证要点包括
A. 辨阴阳
B. 辨病位
C. 辨寒热
D. 辨虚实
E. 辨标本缓急
F. 辨轻重
75. 内伤发热临床辨证分型有哪些
A. 肝郁
B. 脾虚
C. 血瘀



D. 湿阻
E. 气虚
F. 血虚
G. 阴虚
H. 阳虚
I. 肾虚

76. 内伤发热与外感发热的辨别要点是

- A. 年龄大小
- B. 性别不同
- C. 发病原因
- D. 病程长短
- E. 起病急缓
- F. 伴随症状

(77~84题共用题干)

男性,36岁,建筑工人。病史:双膝关节反复疼痛6年。今年3月份天气突然转冷,关节疼痛加剧,痛处固定,局部较冷,热敷后疼痛稍减,关节屈伸不利,舌质淡红而润,苔白而薄腻,脉弦紧。

77. 本病考虑何病

- A. 行痹
- B. 痛痹
- C. 着痹
- D. 热痹
- E. 厥痹
- F. 痛证

78. 本病证辨证为痛痹,临床应该抓住哪些要点

- A. 肢体紧痛不移
- B. 关节酸痛,游走不定
- C. 关节屈伸不利
- D. 肢体关节肿胀
- E. 舌质淡红而润,苔白而薄腻
- F. 舌质红,苔白微厚
- G. 脉滑数
- H. 脉弦紧或沉迟

79. 本病属痹病的一种,痹病总的治疗原则是

- A. 驱邪活络
- B. 温经散寒
- C. 祛风通络
- D. 缓急止痛
- E. 通利筋脉
- F. 祛风除湿

80. 痹病的辨证要点是

- A. 辨病邪

B. 辨虚实
C. 辨轻重
D. 辨痰瘀
E. 辨病位
F. 辨病程
G. 辨寒热

81. 目前该患者可选用哪个方药加减治之

- A. 薏苡仁汤
- B. 防风汤
- C. 乌头汤
- D. 白虎桂枝汤
- E. 独活寄生汤
- F. 加减二妙散

82. 乌头汤所含药物有哪些

- A. 川乌
- B. 半夏
- C. 麻黄
- D. 茯苓
- E. 砂仁
- F. 防己
- G. 黄芪
- H. 甘草
- I. 威灵仙

83. 川乌对本病有较好疗效,但其有大毒,临床需炮制后才能用,常用量是

- A. 3 g 以内
- B. 3~6 g
- C. 6~9 g
- D. 9~12 g
- E. 12~15 g
- F. 不超过15 g 都没问题

84. 本病护理要点包括哪些方面

- A. 注意休息
- B. 注意防寒防湿
- C. 调畅情志,保持心情愉快
- D. 多配合各种辅助治疗,如针灸、推拿、药浴
- E. 加强功能锻炼,促进血液循环
- F. 多食用蔬菜水果等富有维生素的食物

(85~92题共用题干)

女性,42岁,近1周来小便短数,欲出未尽,色深黄,伴有尿道涩痛,少腹拘急,口苦。查体见舌质红,苔黄腻,脉数。

85. 该患者应辨为何病证

- A. 石淋

- B. 热淋
C. 气淋
D. 血淋
E. 膏淋
86. 上述诊断与癃闭进行鉴别诊断时,最重要的证候是
 A. 排尿困难
B. 小便量少
C. 尿频而痛
D. 尿量正常
E. 少腹拘急
87. 该患者最可能的病因是
 A. 肾气不足,气化不利
B. 外感时邪,肺气不降
C. 情志不畅,肝失疏泄
D. 脾不健运,湿浊内生
E. 饮食不慎,内生湿热
88. 该患者应采取何治法
 A. 清热利湿通淋
B. 利湿化浊通淋
C. 理气疏导通淋
D. 分清泄浊通淋
E. 活血凉血通淋
89. 该患者应选择何方剂
 A. 小蓟饮子
B. 石韦散
C. 草薢分清饮
D. 八正散
E. 沉香散
90. 近年来发现有较大肾毒性的通淋药是
 A. 车前子
B. 滑石
C. 关木通
D. 川木通
E. 金钱草
91. 该患者应注意何生活调摄
 A. 多饮水
B. 少食盐
C. 防外感
D. 畅情志
E. 禁房事
92. 若该患者未予系统治疗,淋沥不已,时作时止,遇劳则发,腰膝酸软,此时宜选用哪个方药
 A. 肾气丸
- B. 无比山药丸
C. 左归丸
D. 补中益气汤
E. 参苓白术散
- (93~100题共用题干)
 男性,75岁,有慢性支气管炎病史20余年。今日因受凉,复发咳嗽、咳痰、气促,未及时治疗,病情进一步加重。症见:咳逆上气,鼻翼煽动,张口抬肩,喉中痰鸣,口唇发绀,胸闷胀满,心悸,神志恍惚,时有肢体抽搐,白天嗜睡,夜间烦躁不安,舌质暗红,苔黄腻,脉细滑数。
93. 该患者应该考虑为何证
 A. 外寒内饮
B. 痰热郁肺
C. 痰瘀阻肺
D. 痰蒙神窍
E. 肺肾气虚
F. 阳虚水泛
94. 临床辨证治疗该患者,可以选用下列哪些方剂加减化裁
 A. 小青龙汤
B. 茅蒡大枣泻肺汤
C. 桂枝茯苓丸
D. 涤痰汤
E. 安宫牛黄丸
F. 至宝丹
G. 真武汤
95. 记载“肺胀而咳,或左或右不得眠,此痰夹瘀血碍气而病”者,是下列哪一本书
 A. 《灵枢·胀病》
B. 《金匱要略·肺痿肺痈咳嗽上气病》
C. 《金匱要略·痰饮咳嗽病》
D. 《诸病源候论·咳逆短气候》
E. 《丹溪心法·咳嗽》
96. 肺胀的病理因素,主要责之于
 A. 肺肾两虚,气失摄纳
B. 心肾阳虚,水气凌心
C. 痰浊水饮与血瘀互为影响,兼见同病
D. 痰气交阻,伤及肺、脾、肾,本虚标实
E. 阴盛阳微,本虚标实
97. 下列哪些项目属于肺胀危重时的临床表现
 A. 心慌动悸
B. 面唇发绀
C. 肢体浮肿
D. 咳吐脓血
E. 嗜睡昏迷
98. 肺胀后期,病位可及于何脏

姓名

准考证号

单位



- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肾
- E. 命门

99. 肺胀的常用治法有哪些

- A. 降气化痰
- B. 温阳利水
- C. 驱邪宣肺
- D. 补养心肺
- E. 健脾益肾

100. 肺胀在病程中可形成哪些病理产物

- A. 风
- B. 痰
- C. 火
- D. 饮
- E. 瘀



冲刺模拟卷二

一、单选题：以下每道考题有 5 个备选答案，请选择 1 个最佳答案

1. 男性，70 岁，患冠心病 10 年。今突然心痛剧作，面色青灰，冷汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，舌淡，苔白润，脉微欲绝。临床辨证为
 - A. 心阳虚证
 - B. 心脉痹阻证
 - C. 心气虚证
 - D. 亡阳证
 - E. 心阳暴脱证
2. 男性，42 岁，患有精神分裂症多年，近半月来病情加重，出现狂躁妄动，胡言乱语，少寐多梦，打人毁物，不避亲疏，舌淡红，苔白，脉弦，属于
 - A. 狂病
 - B. 癫病
 - C. 痫病
 - D. 惊风
 - E. 肛躁
3. 不寐阴虚火旺者，若阴虚而火不太旺，当选何方
 - A. 黄连阿胶汤
 - B. 交泰丸
 - C. 朱砂安神丸
 - D. 六味地黄丸
 - E. 天王补心丹
4. 女性，58 岁，面浮肢肿，小便不利，心悸怔忡，唇甲青紫，面白神疲，畏寒肢冷，舌淡紫而润，脉沉细无力。临床诊断最可能是
 - A. 心阳虚证
 - B. 肾阳虚证
 - C. 脾肾阳虚证
 - D. 心肾阳虚证
 - E. 心脉痹阻证
5. 黄药子有小毒，长期服用对肝脏损害较大，必须慎用，用量一般不宜超过
 - A. 3 g
 - B. 5 g
 - C. 8 g
 - D. 10 g
 - E. 15 g
6. 治疗肝阴不足的胁痛用
 - A. 补中益气汤
 - B. 小建中汤
7. 茵陈术附汤是黄疸哪个证型的代表方剂
 - A. 湿重于热证
 - B. 胆腑郁热证
 - C. 热重于湿证
 - D. 寒湿困遏证
 - E. 脾虚湿滞证
8. 呃声短促而不得续，口干咽燥，心烦不安，不思饮食，大便干结，舌质红，苔少而干或有裂纹，脉细数，其首选取方为
 - A. 丁香散加减
 - B. 益胃汤
 - C. 丹栀逍遥散或化肝煎加减
 - D. 藿香正气散加减
 - E. 五磨饮子加减
9. 因胃中寒冷引起呃逆的主要表现是
 - A. 呃声短促而不得续
 - B. 呃声低弱无力，气不得续
 - C. 呃逆连声，常因情志不畅而诱发或加重
 - D. 呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴
 - E. 呃声沉缓有力，得热则减，遇寒更甚
10. 下列哪一项不是泄泻的证型
 - A. 寒湿泄泻
 - B. 湿热泄泻
 - C. 食滞胃肠
 - D. 脾胃虚弱
 - E. 胃阳不足
11. 历史上对内科比较重视，并且规定了各科人员之间比例关系的朝代是
 - A. 唐代
 - B. 宋代
 - C. 元代
 - D. 明代
 - E. 清代
12. 千金苇茎汤用于治疗下列哪个病最为适合
 - A. 肺痈
 - B. 肺痿
 - C. 肺胀
 - D. 肺消
 - E. 肺痨
13. 肺胀的常见病因是
 - A. 饮食所伤

- B. 久病肺虚
C. 情志失调
D. 痰热素盛
E. 感受风热
14. 肺痈的病理性质主要为
A. 气滞血瘀的实证
B. 邪盛正虚的本虚标实
C. 津液亏损的虚热证
D. 邪盛之实热证候
E. 肺燥津伤,肺失濡养
15. 水肿瘀水互结证的治法是
A. 利水消肿,祛瘀通络
B. 活血祛瘀,化气行水
C. 攻逐瘀血,温化水饮
D. 活血通络,健脾利湿
E. 活血化瘀,分利水湿
16. 小便不畅,点滴而短少,病势较缓者应诊断为
A. 水肿
B. 淋证
C. 瘰
D. 闭
E. 关格
17. 补血荣筋丸主要用于痹证之
A. 痰瘀痹阻证
B. 风湿热痹
C. 痛痹
D. 着痹
E. 肝肾两虚证
18. 患者积块坚硬,疼痛逐渐加剧,面色萎黄,肌肉瘦削,饮食大减,舌质淡紫,苔暗,脉弦细,宜用治疗选方为
A. 八珍汤
B. 化积丸
C. 脐下逐瘀汤
D. 八珍汤合化积丸
E. 脐下逐瘀汤合八珍汤
19. 男性,52岁,与他人争吵后,突然晕倒,不省人事,口噤握拳,呼吸气粗,四肢厥冷,苔薄白,脉沉伏,治疗应选用
A. 逍遥散
B. 龙胆泻肝汤
C. 五磨饮子
D. 参附汤
E. 生脉散
20. 以下哪项不属《诸病源候论》之五劳
A. 肝
B. 心
C. 胃
D. 肺
E. 肾
21. 治疗“疟母”的代表方是
A. 豹甲煎丸
B. 涤痰汤
C. 温胆汤
D. 桂枝茯苓丸
E. 清金化痰汤
22. 患者发热恶寒,无汗口渴,鼻塞声重,咽痛,咳嗽气急,痰黄黏稠,尿赤便秘,舌苔黄白相间,脉浮数,当诊断为
A. 风寒感冒
B. 风热感冒
C. 暑湿感冒
D. 时行感冒
E. 表寒兼里热
23. 女性,22岁,持续发热5日,面部出现水肿性皮肤损害,伴膝、踝关节肿痛,下肢浮肿,有散在瘀点。ESR 100 mm/h, Hb 78 g/L, 网织红细胞 0.10, Coombs试验(+), 血小板 $42 \times 10^9 / L$, 尿液检查示蛋白(十十), RBC 5~10个/HP。该患者最可能的诊断是
A. 风湿热
B. 慢性肾炎
C. SLE
D. 自身免疫性溶血性疾病
E. 重症肌无力
24. 女性,42岁,间歇性上腹疼痛10年,疼痛多为餐前,进食后可缓解。体格检查:腹平软,剑突偏右有压痛,肝、脾未扪及。钡剂造影见十二指肠壶腹部变形。应首选的诊断是
A. 十二指肠炎
B. 慢性胃炎
C. 十二指肠壶腹后溃疡
D. 十二指肠壶腹部溃疡
E. 非溃疡性消化不良
25. 尿中常见大量红细胞管型的疾病是
A. 肾结核
B. 肾结石
C. 急性肾盂肾炎
D. 慢性肾小球肾炎
E. 急性肾小球肾炎





二、多选题：以下每道考题有 5 个备选答案，每题至少有 2 个正确答案

26. 心悸阴虚火旺证的主要症状是

- A. 心悸易惊
- B. 五心烦热
- C. 舌质紫暗
- D. 思虑烦劳症状加重
- E. 胸闷气短

27. 痰浊头痛可有的症状是

- A. 头痛昏蒙
- B. 胸脘满闷
- C. 舌苔白腻
- D. 恶心呕吐
- E. 脉沉弦

28. 狂证诊断的症状标准中规定了哪些症状

- A. 言语增多, 联想加快
- B. 注意力不集中, 有夸大倾向
- C. 自我感觉良好, 活动增多
- D. 行为轻率, 性欲亢进, 睡眠减少
- E. 兴趣丧失, 行为迟缓, 思维缓慢

29. 癫病的主要治疗原则有

- A. 畅达神机
- B. 理气解郁
- C. 养心安神
- D. 豁痰息风
- E. 移情易性

30. 下列哪些是治疗气滞血瘀型胆胀的代表方

- A. 血府逐瘀汤
- B. 四逆散
- C. 失笑散
- D. 大柴胡汤
- E. 小柴胡汤

31. 黄疸的病因是

- A. 感受外邪
- B. 饮食所伤
- C. 脾胃虚寒
- D. 七情所伤
- E. 积聚日久不消

32. 虚证胁痛采用哪些治法

- A. 滋阴
- B. 活血
- C. 养血
- D. 清利

E. 柔肝

33. 噎膈的主要病因是

- A. 外感时邪
- B. 酒食所伤
- C. 忧思恼怒
- D. 年老久病
- E. 水湿内浸

34. 常用的平呃药物有

- A. 旋覆花
- B. 丁香
- C. 柿蒂
- D. 赭石
- E. 刀豆子

35. 其他脏腑病变涉及肺引发咳嗽, 其病因常为下列哪几项

- A. 嗜烟好酒
- B. 饮食不调
- C. 情志不遂
- D. 过食肥甘辛辣炙煿之品
- E. 脾不健运

36. 咳嗽初起, 以表证、实证居多, 治宜散邪宣肺为主, 而不宜过早使用的治疗方法是

- A. 滋润
- B. 镇咳
- C. 收涩
- D. 苦寒
- E. 补益

37. 哮病的辩证要点是

- A. 辨阴阳
- B. 辨虚实
- C. 辨表里
- D. 分寒热
- E. 分气血

38. 阳痿的辩证中主要根据为

- A. 病因病机
- B. 临床表现
- C. 舌苔脉象
- D. 寒热虚实
- E. 年龄特点

39. 尿浊的主症是

- A. 小便混浊
- B. 白如泔浆
- C. 排尿不痛
- D. 小腹拘急

- E. 腰酸膝软
40. 下列哪几项属于温热致症的症状
- 壮热头痛
 - 角弓反张
 - 呕吐、自汗
 - 肢体酸重
 - 神昏谵语
41. 痰证的病因是
- 湿热浸淫
 - 感受温毒
 - 饮食毒物所伤
 - 久病房劳
 - 跌仆瘀阻
42. 震颤的病位主要在
- 心、肝、肾
 - 肝、脾、肾
 - 心、脑、肾
 - 脑髓
 - 肾、心、脑、肝
43. 肝硬化患者容易出现鼻出血和齿龈出血，其主要原因是
- 门静脉高压
 - 毛细血管脆性增加
 - 肝脏合成凝血因子减少
 - 脾功能亢进
 - 雌激素水平过高
44. 下述哪些症状或体征会出现急性心包炎
- 心包摩擦音
 - 吸气时和平卧时胸骨后疼痛加重
 - 第二心音逆分裂
 - 发热、乏力
 - Ewart 征
45. 金黄色葡萄球菌肺炎在 X 线胸片上有哪些特征
- 脓肿形成倾向大，常伴有脓肿内液平
 - 早期大片絮状、浓密不等阴影
 - 病灶可形成气囊肿，愈后可自行消失
 - 常伴脓胸、气胸
 - 病灶部位易变化
- 三、共用题干题：以下每道考题有 2~6 个提问，每个提问有 5 个备选答案，请选择 1 个最佳答案
 (46~48 题共用题干)
- 男性，18 岁，1 日前运动后吹空调，出现恶寒，发热，无汗，流大量清涕，咳嗽，头痛，四肢酸痛，周身不适，咳吐白稀痰，舌苔薄白润，脉浮紧。
46. 根据患者上述临床表现，中医可辨证为
- 寒湿痹证
 - 风寒感冒
 - 风寒咳嗽
 - 风寒头痛
 - 寒湿感冒
47. 根据患者临床表现及辨证类型，下列哪项为针对本病及本证型的主要治疗原则
- 辛温解表
 - 辛凉解表
 - 清暑解表
 - 益气解表
 - 滋阴解表
48. 如患者兼见身楚倦怠，咳痰无力，舌淡苔白，脉浮无力，则根据中医辨证，应选用下列哪种方剂治疗最为恰当
- 桂枝汤加减
 - 芎芷石膏汤加减
 - 银翘散加减
 - 再造散加减
 - 参苏饮加减
- (49~53 题共用题干)
- 女孩，6 岁，感冒后突发颜面及四肢浮肿，皮肤光亮，恶风发热，舌质红，苔薄黄腻，脉沉数，尿蛋白(十十十)，小便短赤，烦热口渴。
49. 其诊断为
- 湿毒浸淫证
 - 风水相搏证
 - 水湿浸渍证
 - 湿热壅盛证
 - 脾阳衰微证
50. 其治法是
- 宣肺解毒，利湿消肿
 - 疏风清热，宣肺行水
 - 运脾化湿，通阳利水
 - 分利湿热
 - 温阳利水
51. 其选方为
- 越婢加术汤
 - 麻黄连翘赤小豆汤
 - 五皮饮
 - 疏凿饮子
 - 实脾饮
52. 若腹胀不减，大便不通者，可合用

