DER STOFFWECHSEL

II

BEARBEITET VON

K. BETKE · F. BÜCHNER · L. HEILMEYER · K. LANG · D. LÜBBERS
E. OPITZ† · J. PICHOTKA · K. PLÖTNER · W. PRIBILLA
H. SCHAEFER · W. STICH · W. VOLLAND · L. WEISSBECKER

REDIGIERT VON

E. LETTERER

MIT 177 ABBILDUNGEN

SPRINGER-VERLAG
BERLIN · GÖTTINGEN · HEIDELBERG

1957

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten
Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses
Buch oder Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie)
zu vervielfältigen

© by Springer-Verlag oHG, Berlin · Göttingen · Heidelberg 1957

Printed in Germany

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
daß solche Namen im Sinn der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung
als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften

HANDBUCH DER ALLGEMEINEN PATHOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON

F. BÜCHNER

E. LETTERER

F. ROULET

VIERTER BAND

DER STOFFWECHSEL

ZWEITER TEIL

SPRINGER-VERLAG
BERLIN · GÖTTINGEN · HEIDELBERG

1957

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Funktion und Stoffwechsel der Schwermetalle. Von Professor Dr. L. HEILMEYER-Freiburg i. Br. und Professor Dr. L. WEISSBECKER-Freiburg i. Br. Mit 38 Abbildungen	1
I. Einleitung. Von Professor Dr. L. WEISSBECKER	1
II. Das Eisen. Von Professor Dr. L. HEILMEYER	4
1. Bestimmungsmethoden	4
2. Vorkommen und Funktion des Eisens im Organismus	5
Formen des organismischen Eisens	5
a) Das Hämoglobineisen	5
b) Das Myoglobineisen	6
c) Das Eisen der Zellhämine	6
d) Das Depoteisen	7
Formen des Depoteisens S. 9.	
e) Das zirkulierende Plasmaeisen (Serumeisen), das eisenbindende Protein (Transferrin, Siderophilin)	15
3. Physiologie des Eisenstoffwechsels	16
a) Die Eisenresorption	16
b) Die Eisenexkretion und die physiologischen Eisenverluste, der Eisenbedarf	20
c) Die Physiologie des Plasmaeisens	23
Bedeutung des Plasmaeisens und der Eisenbindung im Plasma für den Eisenstoffwechsel	27
Regulation des Eisenstoffwechsels	28
4. Die Pathologie des Eisenstoffwechsels	29
a) Die Eisenstoffwechselstörung beim Infekt	29
b) Die Eisenmangelkrankheit	39
Die experimentelle Eisenmangelkrankheit der Maus	39
Die Eisenmangelkrankheit des Menschen	40
Die einzelnen Bilder der Eisenmangelkrankheit und ihre Pathogenese	41
Die Eisenmangelkrankheit des Säuglings und Kleinkinds	41
Die Eisenmangelkrankheit in den Postpubertätsjahren der Frau (Chlorose)	42
Die essentielle hypochrome Anämie (achylische Chloranämie)	42
Eisenmangel durch anderweitige Ursachen einer Eisenresorptionsstörung	42
Der Eisenmangel durch Blutverluste	43
Der Eisenstoffwechsel bei Lebererkrankungen	43
Leberparenchymerkrankungen	43
Der Eisenstoffwechsel bei hämolytischen und aplastischen Anämien, bei Polycythämien und bei Myodegeneration	45
Das Serumeisen bei Untergang von Muskelgewebe	48
Der Eisenstoffwechsel bei der Hämochromatose (Eisenspeicherungskrankheit)	48
Rückblick	52
Nachtrag von Dr. F. WÖHLER s. S. 768.	
III. Das Kupfer. Von Professor Dr. L. HEILMEYER	53
1. Bestimmungsmethoden	53
2. Vorkommen im Organismus	53
3. Funktion und biologische Bedeutung des Kupfers im Organismus.	55
a) Kupferproteide als Fermente	55
b) Die Bedeutung des Kupfers für die Bildung des Hämoglobins und des Atmungsferments	56
c) Katalytische Wirkung des Kupfers im Organismus für Wachstum und Pigmentbildung	56

	Seite
4. Physiologie und Pathologie des Kupferstoffwechsels	58
a) Bedeutung des Plasmakupfers	58
b) Pathologie des Plasmakupfers	59
c) Verteilung des Kupfers auf Plasma und Blutkörperchen	61
d) Die Kupferstoffwechselstörung beim Morbus Wilson (Hepato-lenticuläre Degeneration)	61
5. Die Kupfermangelkrankheit	62
Schlußbetrachtung	62
Nachtrag von Dr. F. WÖHLER s. S. 777.	
IV. Kobalt, Zink, Mangan und einige andere biologisch wichtige Schwermetalle. Von Professor Dr. L. WEISSBECKER.	63
1. Kobalt	63
2. Zink	67
3. Mangan	70
4. Andere biologisch wichtige Schwermetalle	73
Molybdän	73
Titan	73
Vanadium	73
Literatur	73
Nachtrag zu Zink	87
Die Pathologie des Stoffwechsels der Schwermetalle. Von Professor Dr. med. W. VOLLAND-Köln und Privatdozent Dr. W. PRIBILLA-Köln	88
Eisen	88
I. Eisenablagerungen infolge vermehrter Eisenresorption (Hämochromatose)	96
Experimentelles zum Hämochromatoseproblem	100
II. Eisenstoffwechselstörungen auf Grund gesteigerten Blutzerfalls	107
III. Eisenablagerungen infolge Abbaues von Muskulatur sowie sonstiger Zell- und Gewebseinschmelzungen	128
IV. Eisenablagerungen auf Grund einer intermediären Stoffwechselstörung, speziell bei Infekten und verwandten Abwehrprozessen des Organismus	132
V. Eisenablagerungen auf Grund sonstiger Störungen der Eisenverwertung	138
VI. Eisen- bzw. Kalk-eiseninkrustationen	140
VII. Eisenablagerungen unbekannter Bedeutung (autochthones Gehirn-eisen)	142
VIII. Morphologische Befunde bei der Eisenmangelkrankheit	145
Schlußbemerkungen	146
Kupferstoffwechselstörungen	151
Einleitung	151
I. Kupfer und Melaninbildung	158
II. Kupfer und Lebercirrhosen	162
III. Über die Kupferstoffwechselstörung bei der hepatolenticulären Degeneration	165
IV. Zur Pathologie des Auges in bezug auf Kupferstoffwechselstörungen	168
V. Kupfer und Gallensteine	169
VI. Kupfermangelanämien	169
VII. Kupfermangelbedingte Skeleterkrankungen	172
VIII. Kupfermangel und Zentralnervensystem	172
IX. Sonstige Kupfermangelerscheinungen	173
X. Kupferstoffwechsel bei Infektionskrankheiten	174
XI. Kupferstoffwechsel bei Tumorleiden	174
Schlußbemerkungen	175
Literatur	175
Biochemie und Funktion des Hämoglobins und verwandter Stoffe. Von Dozent Dr. W. STRICH-München	204
Einleitung	204
I. Hämiproteide	205
A. Blutfarbstoffe und Muskelfarbstoffe	206
1. Hämoglobin	206
a) Vorkommen, Darstellung und Eigenschaften	206
b) Chemie	207

	Seite
c) Bestimmungsmethoden	208
d) Stoffwechsel	208
α) Aufbau	209
β) Abbau	210
e) Funktion	211
2. Myoglobin	212
a) Vorkommen, Darstellung und Eigenschaften.	212
b) Chemie	213
c) Bestimmungsmethoden	213
d) Stoffwechsel	214
e) Funktion	215
B. Hämifermente	215
1. Das sauerstoffübertragende Ferment der Atmung	216
a) Vorkommen, Darstellung und Eigenschaften.	216
b) Chemie	216
c) Bestimmungsmethoden	217
d) Stoffwechsel	217
e) Funktion	218
2. Die Cytochrome.	218
a) Cytochrom a	218
b) Cytochrom b	219
c) Cytochrom c	219
α) Vorkommen, Darstellung und Eigenschaften	219
β) Chemie	219
γ) Bestimmungsmethoden	220
δ) Stoffwechsel	220
e) Funktion	221
3. Katalase	221
a) Vorkommen, Darstellung und Eigenschaften.	221
b) Chemie	222
c) Bestimmungsmethoden	222
d) Stoffwechsel	222
e) Funktion	223
4. Peroxydasen	223
a) Vorkommen, Darstellung, Eigenschaften	223
b) Chemie	224
c) Bestimmungsmethoden	224
d) Stoffwechsel	224
e) Funktion	224
5. Weitere Hämifermente	225
II. Hämine	225
1. Hämatin	225
2. Zellhämine	225
Hämifermente und Zellatmung	226
1. Das Zusammenwirken der Faktoren.	226
2. Die Lokalisation der Hämifermente in der Zelle	226
3. Die Histochemie der Zellatmung	227
III. Porphyrine	228
a) Vorkommen, Darstellung und Eigenschaften.	228
b) Chemie	230
c) Bestimmungsmethoden	230
d) Stoffwechsel	231
e) Funktion	233
IV. Gallenfarbstoffe.	233
a) Vorkommen, Darstellung und Eigenschaften.	234
b) Chemie	234
c) Bestimmungsmethoden	236
d) Stoffwechsel	237
e) Funktion	238
Literatur	239

Pathologie des Hämoglobins und verwandter Stoffe. Von Professor Dr. Dr. K. PLÖTNER-Freiburg i. Br. und Dozent Dr. K. BETKE-Freiburg i. Br.	245
I. Pathologie des Hämoglobins	245
Pathologische Blutfarbstofftypen S. 245. — Reaktive Veränderungen des Blutfarbstoffs S. 245.	
A. Pathologische Blutfarbstofftypen	245
1. Systematik und Vorkommen	245
2. Eigenschaften und Methoden der Differenzierung	247
Spektrophotometrie S. 247. — Kristallstruktur S. 247. — Aminosäurezusammensetzung S. 247. — Löslichkeit S. 248. — Elektrophorese S. 248. — Adsorption und Chromatographie S. 249. — Alkalidenaturierung S. 249. — Hitzedenaturierung S. 249. — Serologische Spezifität S. 249. — Eigenschaften der biologischen Funktion S. 250. — Bestimmungsmethoden S. 250. — Genetik S. 250. — Die Anlage für die Produktion von Hb F S. 251. — Klinik S. 253.	
B. Reaktive Veränderungen des Blutfarbstoffs	255
1. Kohlenoxydhämoglobin (CO Hb)	255
Nachweis des CO Hb S. 256.	
2. Hämoglobin (= Methämoglobin, Ferrihämoglobin)	257
Therapie S. 258. — Vergiftungen durch Methämoglobinbildner S. 258. — Familiäre Methämoglobinämie S. 259. — Therapeutische Anwendung von Hämoglobin S. 260.	
3. Grüne Blutfarbstoffe	260
II. Pathologie des Hämoglobinumsatzes	262
A. Störungen der Hb-Synthese	263
1. Verringerte Hb-Synthese durch Baustoff- und Wirkstoffmangel	263
Eisenmangel S. 263. — Globinmangel S. 264. — Spurenelemente S. 264. — Vitaminmangel S. 264. — Endokrine Störungen S. 265. — Chronische Infekte und maligne Tumoren S. 266. — Idiopathische Lungenhämosiderose S. 266. — Bleiintoxikation S. 266. — Aplastische Anämien S. 266.	
2. Gesteigerte Hb-Synthese	267
B. Störungen des Hb-Umsatzes	267
Bestimmung des Hb-Umsatzes	267
Hämolyse und Hb-Abbau	268
1. Regeneratorische hämolytische Anämien	268
2. Toxische hämolytische Anämien	269
3. Megaloblastische hyperchrome Anämien	269
4. Hämatinämien	270
C. Pathologie des Umsatzes der übrigen Hämiproteide	270
1. Paroxysmale Myoglobinurie	270
2. Haffkrankheit	271
3. Crush-Syndrom, Myorenales Syndrom	271
4. Hämifermente	271
D. Die pathologischen Porphyrinurien und die Porphyrien	272
1. Die pathologischen Porphyrinurien	273
Die toxischen Porphyrinurien S. 273. — Sekundäre Porphyrinurien S. 274. — Porphyrinurien bei Blutkrankheiten S. 274.	
2. Die Porphyrien	275
Die kongenitale licht-sensitive Porphyrie, GÜNTHERSCHE Krankheit S. 275. — Die intermittierend akute Porphyrie S. 276. — Die Porphyria cutanea tarda S. 277.	
Literatur	277
Die Biochemie des intermediären Stoffwechsels. Von Professor Dr. Dr. KONRAD LANG-Mainz. Mit 2 Abbildungen	287
Einleitung	287
Die biologische Oxydation	289
Der Kohlenhydratstoffwechsel	298
Allgemeines	298
Spaltung und Aufbau von Glykogen	302
Die Glykolyse	303
Die Endoxydation über den Citronensäurecyclus	307

	Seite
Der Pentosephosphatweg der Glucoseoxydation	311
Fructose	314
Galaktose	315
Glucuronsäure	317
Glucosamin und Chondrosamin	317
Pentosen	318
Der Stoffwechsel des Eiweißes und der Aminosäuren	320
Der Eiweißstoffwechsel	320
Allgemeines über den Stoffwechsel der Aminosäuren	327
Glykokoll und Serin	331
Valin und Leucin	332
Die schwefelhaltigen Aminosäuren und der Schwefelstoffwechsel	333
Glutaminsäure	337
Ornithin, Arginin und Lysin	338
Phenylalanin und Tyrosin	339
Tryptophan	344
Histidin	345
Prolin und Oxyprolin	347
Die Harnstoffbildung	347
Bildung und Stoffwechsel von Kreatin	349
Cholin und Transmethylierung	350
Der Fettstoffwechsel und Lipidstoffwechsel	352
Die β -Oxydation der Fettsäuren	352
Die Stellung der Acetessigsäure im Fettstoffwechsel	355
Das Coenzym A und die Transacetylierung	356
Die ω -Oxydation der Fettsäuren und die Dicarbonsäuren	358
Der Abbau von Fettsäuren mit einem verzweigten Kohlenstoffskelet	359
Die Dehydrierung der Fettsäuren in 9,10-Stellung	360
Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren	360
Glycerin	361
Phosphatide	361
Sterine und Steroide	363
Der Stoffwechsel der Pyrrolfarbstoffe	370
Bildung von Pyrrolfarbstoffen	370
Der Abbau der Pyrrolfarbstoffe	373
Der Stoffwechsel der Erythrocyten	377
Stoffwechsel der Nucleinsäuren	378
Nucleotide und Nucleoside	378
Biosynthese der Pyridinnucleotide und Flavinnucleotide	380
Purine und Pyrimidine	380
Stoffwechselantagonisten	384
Lokalisation der Stoffwechselfprozesse an den Zellstrukturen	386
Literatur	390

Allgemeine Physiologie der Zell- und Gewebsatmung. Von Professor Dr. E. OPITZ † und Dozent Dr. med. D. LÜBBERS-Kiel. Mit 24 Abbildungen	395
Einleitung	395
A. Grundzüge der Zellatmung	396
1. Schematische Darstellung der Zellatmung	396
2. Atmung und Oxydation	399
B. Energiegewinnung beim Nährstoffabbau	404
1. Der Abbau der Nährstoffmoleküle	404
a) Der anaerobe Abbau der Kohlenhydrate	404
α) Die Startreaktionen	404
Startreaktion des Glykogenabbaus S. 404. — Startreaktion des Glucoseabbaus S. 406.	
β) Anaerobe Energiegewinnung und -speicherung	407
Oxydation von Glycerinaldehyd-3-Phosphorsäure S. 407. — Innermolekulare Umlagerung der enol-Brenztraubensäure S. 408.	
γ) Reduktionsreaktion als Endreaktion der Glykolyse	408
b) Der aerobe Abbau der Nährstoffmoleküle	409
α) Der Citronensäurecyclus	410
Startreaktion des Citronensäurecyclus S. 411. — Energieliefernde Reaktionen im Citronensäurecyclus S. 412. — Dehydrierungen im Citronen- säurecyclus S. 412.	

	Seite
β) Der oxydative Abbau der Fettsäuren	414
Startreaktionen S. 414. — Wasserstoffliefernde Reaktionen S. 414. —	
Bildung von Essigsäureresten S. 414.	
γ) Der direkte oxydative Glucoseabbau	416
2. Wasserstoff und Sauerstoff bei der Energiegewinnung	417
a) Der gebundene Wasserstoff	417
α) Die Dehydrogenasen mit den Cofermenten DPN (Codehydrogenase I)	
und TPN (Codehydrogenase II)	417
β) Die Flavoenzyme	418
γ) Die Histochemie der Reduktionsorte	420
b) Die Kette der Atmungsfermente und der molekulare Sauerstoff	421
α) Übersicht	421
β) Historisches	422
γ) Die einzelnen Cytochrome	422
δ) Cytochromoxydase [sauerstoffübertragendes Ferment (WARBURG)].	424
ε) Der Aufbau der Atmungskette	425
ζ) Energiegewinnung in der Atmungskette	427
η) Die Beteiligung der verschiedenen morphologischen Elemente der Zelle	
an der Energiegewinnung	432
θ) Katalase und Peroxydase	434
ι) Histochemischer Nachweis von Oxydasen und Hydroperoxydasen	435
κ) Myoglobin	437
C. Energetik der Zellatmung	440
1. Energieumwandlung	440
a) Allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Energieumwandlung	440
b) Die Entropie als Maß für die nichtumwandelbare Energie	443
c) Die freie Enthalpie als Maß für die freie Umwandelbarkeit von Energie	445
2. Zellarbeit und Struktur	447
3. Die Energiebilanz beim Nährstoffabbau	451
4. Mechanismen der Energiegewinnung und -ausnutzung	455
D. Die Physiologie der Zellatmung	461
1. Die Regulation der Zellatmung	461
2. Gewebsatmung und Enzymaktivität	468
3. Kritischer Sauerstoffdruck und kritische Schichtdicke der Zelle	472
4. Größe und Sauerstoffverbrauch	477
Literatur	481
Der Gesamtorganismus im Sauerstoffmangel. Von Professor Dr. J. PICHOTKA-Frei-	
burg i. Br. Mit 43 Abbildungen	497
Einleitung	497
I. Terminologie und Begriffsbestimmungen	499
1. Hypoxie	499
2. Hypoxydose	503
II. Die perakute Hypoxie	505
III. Die akute Hypoxie	507
1. Höhenkrankheit	508
2. Experimentelle Untersuchungen	509
a) Die Atmung	509
b) Das Säure-Basen-Gleichgewicht	513
c) Der Kreislauf	514
Herzminutenvolumen	514
d) Die Körpertemperatur	517
e) Die Sauerstoffaufnahme	519
f) Die Beziehungen von Körpertemperatur und Sauerstoffaufnahme	531
Die Beziehung von O ₂ -Spannung und O ₂ -Aufnahme bei Berücksichtigung	
des zeitlichen Einstellverlaufs	535
g) Die Sauerstoffschuld im Sauerstoffmangel	539
h) Mechanismus der Sauerstoffmangelwirkung	541
IV. Die chronische Hypoxie und Höhenanpassung	545
a) Die Atmung	545
b) Das Säure-Basengleichgewicht	547
c) Herz und Kreislauf	547

d) Das Blutbild	550
e) Das Blutbild bei völliger Adaptation an große Höhen	550
f) Änderungen des Blutes bei kurzfristiger Hypoxie	556
g) Wesen und Bedeutung der Adaptation	557

Literatur	563
---------------------	-----

Die Pathologie der cellulären und geweblichen Oxydationen. Die Hypoxydosen. Von Professor Dr. F. BÜCHNER-Freiburg i. Br. Mit 50 Abbildungen 569

Die Hypoxydosen 572

1. Hypoxydosen und ihre Auswirkungen am Leberparenchym. 574
 - a) Die vacuolige Veränderung am Leberparenchym nach akuter Hypoxydose 575
 - b) Die Verfettung des Leberparenchyms bei Hypoxydose. 581
 - c) Die Nekrosen des Leberparenchyms nach Hypoxydosen 587
2. Hypoxydotische Schäden des Herzmuskels 596
3. Hypoxydotische Schädigungen des Gehirns 612

Bemerkungen zum Stoffwechsel des Gehirns 612

 - a) Morphologische Veränderungen des Zentralnervensystems bei Hypoxydosen 614
 - b) Die Veränderungen des Gehirns bei Hypoxydose durch Glucosemangel. 627
 - c) Der Krampfanfall als eine funktionelle Manifestierung akuter Hypoxydose 629
4. Hypoxämie und Oligämie 631
5. Mißbildungen durch Hypoxydose. 632
 - a) Bemerkungen zur Biochemie der Entwicklung 632
 - b) Sauerstoffmangel als teratogenetischer Faktor 634
 - c) Andere Hypoxydosen als Mißbildungsursachen 640
6. Hemmung der postnatalen Entwicklung durch Hypoxydose 644
7. Hypoxydose als ein Faktor in der Carcinogenese? 645

Rückblick und Ausblick 649

Literatur 650

Elektrobiologie des Stoffwechsels. Von Professor Dr. H. SCHAEFER-Heidelberg. Mit 20 Abbildungen 669

- I. Struktur und elektrische Phänomene der Zelle 670
 1. Membranstruktur 670
 2. Intracelluläre Strukturen 672
 3. Das Problem der Erregung einer Membran 673
 - a) Die Problematik des Erregungsbegriffs 673
 - b) Die Auslösung der Erregung 675
 - c) Lokale Erregung 678
 - d) Der Beginn der „Erregung“. 681
 - e) Die Fortleitung der Erregung 686
 4. Spitzenpotential und Nachpotential. 686
 5. Zusammenfassung und Problemübersicht 687
- II. Erregbarkeit, Membranbeschaffenheit und Stoffwechsel 689
 1. Bestimmung des Problems. 689
 2. Einflüsse auf das Membranpotential 690
 - a) Ionenkonzentrationen 690
 - b) Ionenpumpe 691
 - c) Intracellulärer Stoffwechsel als Motor der Ionenpumpe 691
 - d) Membranstoffwechsel als Quelle elektromotorischer Vorgänge 692
 - e) Die Anteile des Membranpotentials 693
 - f) Folgerungen für die Zellfunktion 694
 3. Einflüsse auf die Membranstruktur, Membran und Atmung. 694
 4. Auflösung scheinbarer Widersprüche. Membranpotentiale und Nachpotentiale 696
- III. Die Wechselwirkung elektrischer und chemischer Faktoren 700
 1. Die Verhältnisse am Nerven 700
 2. Das Grundproblem einer jeden synaptischen Übertragung 701
 3. Das Endplattenpotential und das Problem der elektrischen und chemischen Wechselwirkung bei synaptischen Überträgerfunktionen. 704

	Seite
4. Andere Überträgermechanismen	706
5. Die Auslösung sog. spontaner Erregungen	708
6. Membranerregung und Zellerregung	711
IV. Pharmakologische Bemerkungen	712
1. Allgemeine Klassifikation pharmakologischer Wirkungen an Membranen	712
2. Spezifität der Wirkungen an verschiedenen Wirkorten	714
3. Abhängigkeit der Wirkung von der Konzentration	715
V. Chemie des erregten Zustandes	717
1. Die Vorgänge in der Membran	717
2. Die Herkunft der Erregungssubstanzen	718
3. Die chemische Elementarreaktion der Erregung	718
VI. Zellschichten als Potentialquellen	721
VII. Elektrische Vorgänge als Antagonisten nichtelektrischer Prozesse	722
VIII. Abnorme elektrische Prozesse an der Zelle	724
1. Störungen der Potentialdifferenz beiderseits der Zellmembran und der Membranstruktur	724
2. Störungen der Fortleitung einer Erregungswelle	726
3. Störungen der Übertragungen elektrischer Veränderungen auf eine spezifische nichtelektrische Leistung der Zelle	728
4. Störungen der Dauer des erregten Zustandes	728
5. Störungen der Nachwirkung nach einer Erregung	729
6. Entartungsreaktionen	730
IX. Ausblick auf allgemeine Probleme	735
1. Antagonistische Innervationen und Regelvorgänge	735
2. Lokale und allgemeine Innervation	739
3. Funktion und Bau der Zelle	740
4. Das Tonusproblem	741
5. Lokale und generalisierte Schäden als Problem	744
6. Spezifische Bahnen und Isolation der Erregung	747
7. Spontane Erregungen und das psychische Problem	751
Literatur	754
Nachträge von Dr. F. WÖHLER-Freiburg i. Br. zum Beitrag HEILMEYER u. WEISSBECKER	
„Funktion und Stoffwechsel der Schwermetalle“ (S. 1—87)	768
Zu: II. Das Eisen (S. 4)	768
Literatur zum Nachtrag „Eisen“	772
Zu: III. Das Kupfer (S. 53)	777
Namenverzeichnis	778
Sachverzeichnis	831

Funktion und Stoffwechsel der Schwermetalle.

Von

L. HELMEYER-Freiburg i. Br. und L. WEISSBECKER-Freiburg i. Br.

Mit 38 Abbildungen.

I. Einleitung.

Von

L. WEISSBECKER.

Schwermetalle sind regelmäßige Bestandteile des Lebenden. Zwar sind fast alle im periodischen System vorkommenden Schwermetalle im Organismus nachgewiesen, über ihre physiologische Bedeutung oder gar ihre Lebensnotwendigkeit für höhere Organismen ist jedoch für viele nur wenig bekannt. Lediglich Eisen, Kupfer, Mangan, Zink und Kobalt sind für den Menschen und die Säugetiere in ihrer Bedeutung erkannt. Bei niedrigeren Organismen finden sich noch einige andere lebensnotwendige Schwermetalle, sicher Vanadium. Von diesen Spurenelementen sind, solange wir noch nichts über ihre Bedeutung wissen, die Schwermetalle als Begleitelemente abzutrennen, die mit der Nahrung aufgenommen und resorbiert werden. Daraus geht hervor, daß der Nachweis eines Schwermetalls im Organismus noch keineswegs für seine funktionelle oder materielle Bedeutung spricht. Selbst die wechselnde Verteilung der Schwermetalle läßt keine weiteren Schlüsse zu. Die Verteilung kann Ausdruck der besonderen Affinität des betreffenden Schwermetalls zum chemischen oder physikochemischen Milieu oder Ausdruck einer unspezifischen physiologischen Speichereigenschaft des jeweiligen Organs, im besonderen des reticuloendothelialen Systems sein. Verteilt sich ein Schwermetall in bestimmter Weise unter normalen Bedingungen auf die einzelnen Organe, so ändert sich der Verteilungsmodus bei Zufuhr großer Mengen — wie im Falle der Vergiftung — im allgemeinen nicht. Diese mehr oder weniger große Organspezifität läßt schließen, daß der größere Teil der Schwermetalle intracellulär liegt, daß also die Vorstellung von der Impermeabilität der Zellgrenzflächen für Kationen hier nicht gilt. Schwermetalle werden von den Zellen, auch von den Erythrocyten, als wahrscheinlich echten Membranträgern sicher und relativ rasch aufgenommen. Die erste Phase — Adsorption an die Zellgrenzfläche — verläuft sehr rasch. Die so ausgelöste Wirkung ist durch Entionisation, z. B. durch Sulphydrilgruppen reversibel. Die zweite Phase — langsames Eindringen in die Zelle — führt dosenabhängig meist zu irreversibler Veränderung. Dieses Eindringen von Kationen in die Zelle ist nur durch zumindest temporäre Umladung der Grenzfläche zu erklären, vielleicht auf dem Wege über elektrisch wenig aktive Schwermetallproteinbildung. Damit ist die Möglichkeit einer Wirkung auf Zellfunktion und Morphe gegeben. Bleibt das Schwermetall extracellulär, also im Plasma oder im Interstitium, so treten meist keine morphologischen faßbaren Wirkungen auf.

Chemisch betrachtet bestehen zwischen den einzelnen lebensnotwendigen Schwermetallen gewisse systematische Beziehungen, aus denen sich aber nicht allzuviel ableiten läßt. Sie gehören im periodischen System alle der vierten Periode, d. h. der ersten großen Periode an. Die Ordnungszahlen folgen einander dicht, ebenso wie die Atomgewichte und die Atomvolumina, vom Nickel abgesehen, dessen Lebensnotwendigkeit allerdings noch nicht bewiesen ist. Das sonstige chemische Verhalten divergiert weitgehend. Auffällig ist aber die relative Häufung von Komplexbildnern wie Eisen, Kobalt und Kupfer. Schwermetalle haben — soweit bis jetzt bekannt — ausschließlich Bedeutung als Funktionselement, d. h. sie sind in die chemischen Abläufe meist als Katalysatoren eingebaut (WARBURG). Beim Eisen wird dabei zwischen dem Hämoglobineisen, das quantitativ gesehen schon nicht mehr zu den eigentlichen Spurenelementen gehört und dem Fermenteisen als echtem Spurenelement unterschieden. Vom Eisen, Kupfer, Kobalt und Zink abgesehen sind für die anderen Schwermetalle nur wenige physiologische Funktionen bekannt. Die meisten dieser Schwermetallwirkungen sind streng spezifisch, d. h. sie sind an eine chemisch meist wohldefinierte Trägergruppe gebunden. Ersatz des einen Schwermetalls durch ein anderes ist hier nur unter Wirkungsabnahme oder Verlust möglich. Das ist verständlich, da die Aktivität des jeweiligen Metalls selbst gegen minimale Veränderungen im physikochemischen Milieu sehr empfindlich ist. Derart streng spezifische und empfindliche Reaktionen sind z. B. im Hämoglobin- und Cytochromsystem für Eisen, in der Carbanhydrase für Zink und im Vitamin B₁₂ für Kobalt gegeben. Daneben gibt es katalytische Schwermetallreaktionen, die nur von der allgemeinen Schwermetallnatur, weniger dagegen von der Spezifität des Metalls abhängig sind. Dabei handelt es sich meist um Steuerungsvorgänge in Fermentsystemen im Sinne einer Aktivierung oder Bremsung (Katalyse und Antikatalyse WARBURG's). Während bei streng spezifischen Schwermetallkatalysen im Biologischen nur eine isolierte und nur bei dem betreffenden Metall vorkommende physikochemische Eigenart ausgenutzt wird, wie z. B. der milieuhängige leichte Elektronenaustausch im System Cytochrom-Cytochromoxydase, kommen bei der Fermentsteuerung unspezifische Schwermetallwirkungen häufiger vor. Diese sind meist Ausdruck der Neigung bestimmter Schwermetallgruppen zu Komplexbildung, wie z. B. Hemmung der Zymohexaseaktivität durch SH-Gruppen, Aktivierung durch Eisen, Kobalt oder Zink. Gleiches gilt für die Steuerung z. B. der Phosphatasenaktivität und vieler anderer Fermentsysteme durch Schwermetallreaktionen mit chemisch zum Teil, noch nicht einwandfrei definierten Gruppen. Vermutet werden bei redoxaktiven Systemen Komplexbildungen mit Sulfhydrylgruppen durch die sog. „thiolopriven“ Substanzen von BACQ¹, darunter viele Schwermetalle. Darüber hinaus ließ sich zeigen, daß Schwermetalle mit enolisierbaren Carbonylgruppen in vivo und in vitro Komplexe bilden (Typ Ascorbinsäure und verschiedene Reduktone) und mit koordinativ 4wertigem Stickstoff. Im letzten Falle ist eine Komplexbildung mit dem Stickstoff der prosthetischen Gruppe des Coferments allein nicht möglich. Nur am gesamten Coferment läßt sich dieser Stickstoff mit dem betreffenden Schwermetall in Reaktion bringen, wie im System Nicotinsäureamid-Codehydrase I (Abhängigkeit vom elektrisch aktiven Phosphat des Nucleotids). Dieser angedeutete Mechanismus, der sich bis jetzt nur auf redoxaktive Systeme bezieht und vor allem eine Hemmung des Wasserstoff- bzw. Elektronenaustausches zur Folge hat, wurde von WEISSBECKER² unter dem Begriff „Aredoxie“ zusammengefaßt.

¹ BACQ 1946. ² WEISSBECKER 1950.

Wenn den physiologisch bedeutsamen Spurenelementen ein Anteil an der Fermentsteuerung zugesprochen wird, so muß eine übermäßige Zufuhr von Schwermetallen zu Fermentstörungen bzw. Funktionsstörungen des Substrates führen, die dann als Vergiftung imponieren. Das gilt in erster Linie für Schwermetalle, die zum Substrat eine größere Affinität haben als das physiologische Element. Am Eiweißmodell ließ sich zeigen, daß sich Eisen durch Kupfer in festgelegten molaren Verhältnissen verdrängen läßt, daß auch zwischen Kupfer und Kobalt eine derartige Beziehung besteht. Dieser Grundversuch, angestellt mit unspezifischem Eiweiß, läßt sich allerdings nicht auf spezifische Substrate übertragen. Blei z. B. kann Hämoglobineisen nicht ersetzen, hemmt aber auf noch unbekannt Weise die Eiseneinlagerung in den Porphyrinring. Für das dem Eisen eng verwandte Kobalt dagegen wird vermutet, daß es das Hämoglobineisen — wenn auch nicht funktionell — ersetzen kann. Ziemlich sicher ist der Ersatz des Katalaseeisens durch Kobalt unter Katalaseaktivierung nachgewiesen. Daraus ergibt sich, daß die gegenseitige Ersetzbarkeit der Schwermetalle eine Funktion der spezifischen Eigenart des jeweiligen Metalls und des Reaktionspartners ist. Allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten lassen sich also nicht aufstellen.

Voraussetzung der Schwermetallwirkung ist das Vorliegen in aktiver und resorbierbarer Form. Enteral gegebene Schwermetalle werden nur resorbiert, wenn sie im Intestinaltrakt in löslicher Form und als Kation ionisiert auftreten. Schwermetalle im anionischen Komplex haben keine Schwermetallwirkung. Die reinen fein verteilten Metalle auch in kolloidaler Form werden immer resorbiert. Die Resorption erfolgt an verschiedenen Stellen. Die physiologischen Schwermetalle wie Eisen, Kupfer, Kobalt, Mangan und Zink werden hauptsächlich von der Duodenalschleimhaut aufgenommen wie auch viele andere Metalle. Quecksilber, Blei, Thallium werden auch von der intakten Haut resorbiert, Kupfer und Zink nur in lipidlöslicher Form durch die Schweiß- und Talgdrüsen. Adstringierende Metalle bilden auf der Schleimhaut und der verletzten Haut Proteinate, die dann resorbiert werden und so zu Vergiftungen Anlaß geben können. Das gilt für die reinen Metalle und ihre Salze. Alle Metalle werden in Staubform von der Lunge aufgenommen, meist in Proteinaten umgewandelt und dann resorbiert, eine häufige Ursache industrieller Schwermetallvergiftung. Daneben kommt pulmonale Resorption bei dampfbildenden Schwermetallen (Quecksilber, Blei) vor. Bei intravenöser Applikation verschwinden die Schwermetalle rasch aus dem Blut und reichern sich zunächst besonders in Lunge und Milz an, bei intramuskulärer Gabe finden sich die größten Mengen meist in Leber und Niere. Die relative Konzentration in Niere oder Leber hängt von der Art des Metalls ab.

Höher in der Leber

Höher in der Niere

Cu—Ag—As III—Th—As V—Pb—Hg—Bi—Au—U.

Bei intramuskulärer Applikation kann elementares injiziertes Metall sehr lange am Ort liegen bleiben und dort nach Jahren noch nachgewiesen werden. Auch können Metallverbindungen am Ort reduziert werden und dort lange liegen bleiben. Über den Transport der Schwermetalle im Organismus ist abgesehen vom Eisen wenig bekannt. Während Eisen in der β 1-Globulinfraktion, die allerdings in der Ammonsulfatfällung Albumincharakter zeigt, enthalten ist, werden die anderen Schwermetalle wahrscheinlich von allen Eiweißkörpern transportiert und finden sich in allen Aussalzfraktionen. Bei Eisen liegt eine streng spezifische Bindung vor, aus der eine Verdrängung durch andere Metalle kaum möglich ist. Die Bindung der anderen transportierten Schwermetalle an Eiweiß ist nur locker. Andere Verhältnisse müssen bei der Depotform in den einzelnen

Speicherorganen vorliegen. Denn hier läßt sich Eisen z. B. aus seiner Depot-eiweißbindung wahrscheinlich in Form des Ferritins durch kleine Mengen Kobalt oder Mangan verdrängen. Die anderen Schwermetalle werden meist als Eiweiß-verbinding deponiert. Blei und einige verwandte Metalle werden als unlösliches Phosphat bevorzugt in den Knochen gespeichert und deshalb nur sehr verzögert wieder abgegeben. Die besondere Affinität des Hg, Pb, Bi zu Schwefel führt zu Ablagerung als Sulfid auch an den Stellen, die als Folge von Fäulnisvorgängen Schwefelwasserstoff ausgesetzt sind, so an der gesamten Schleimhaut des Gastrointestinaltraktes besonders Mund und Colon. Ag und Au können in der Haut deponiert zu sichtbaren Verfärbungen Anlaß geben. Die Form der Deposition ist also in erster Linie von den chemischen Eigenschaften des Metallkations abhängig.

Die Ausscheidung der Schwermetalle erfolgt hauptsächlich durch die Niere und die Galle, seltener durch Speichel und Schweiß. Die Annahme, daß Schwermetalle durch die Colonschleimhaut ausgeschieden werden, blieb nicht unwidersprochen. Der Schwermetallgehalt der Faeces stammt zum größten Teil aus der Galle oder bei oraler Gabe aus den nicht resorbierten Anteilen. Es ist weitgehend unbekannt, in welcher Form die Schwermetalle ausgeschieden werden. Manche erscheinen zweifellos als Sulfid in den Faeces. Sie können dann dem Stuhl eine charakteristische Farbe verleihen. Die Dauer der Ausscheidung hängt von der Applikationsart und Form ab, daneben von den jeweiligen Ablagerungsformen. Ein Teil wird sofort im Urin ausgeschieden. Dabei beträgt die Urinkonzentration meist das 5—10fache des Blutspiegels. Je nach Mobilisation der Depots hält die Ausscheidung lange an. Während Kupfer, Kobalt und Zink rasch wieder ausgeschieden werden, dauert die Ausscheidung von Blei, Quecksilber, Chrom oder Thallium manchmal jahrelang an. Thorium wird praktisch überhaupt nicht mehr ausgeschieden, Eisen nur in geringen Mengen.

II. Das Eisen*.

Von

L. HEILMEYER.

1. Bestimmungsmethoden.

Zur Bestimmung des Eisens in Körperflüssigkeiten werden heute fast ausschließlich colorimetrische oder photometrische Verfahren angewandt. Am meisten gebräuchlich ist die Phenantrolinmethode^{1, 2}, daneben die Dipyridil³ und Rhodanmethode⁴. Eine genaue Beschreibung dieser Verfahren bei¹⁻⁵. Die genannten Methoden können auch für Organanalysen nach vorausgegangener feuchter Veraschung mit Salpetersäure angewandt werden⁶. — Eine exakte quantitative Methode zur Bestimmung des Ferritins in den Organen wurde neuerdings von meinen Mitarbeitern⁷ ausgearbeitet. Das Prinzip der Methode beruht darauf, daß das Ferritin aus frisch homogenisiertem Organewebe durch geeignete Fraktionierungs- und elektrophoretische Trennverfahren von den anderen eisenhaltigen Proteinen abgetrennt wird. Nach Anfärbung der Elektrophoresestreifen mit Amidoschwarz bzw. Durchführung der Berliner Blau-Reaktion kann der Apoferritingehalt und der Ferritineisengehalt photoelektrisch bestimmt werden. Die erhaltenen Werte gestatten den absoluten und den prozentualen Ferritingehalt in den Organen zu berechnen⁷. — Für Stoffwechseluntersuchungen

¹ HEILMEYER und PLÖTNER 1937. ² HEILMEYER, KEIDERLING und STÜWE 1941.

³ HILL 1925. ⁴ MOORE, ARROWSMITH, QUILLIGAN und READ 1937.

⁵ HEMMELE 1951 (Übersicht). ⁶ LEDERER, BALLIÈRE und VAN DAMME 1946.

⁷ KEIDERLING und WÖHLER 1954.

* Siehe Nachtrag Seite 768, welcher die neuen Forschungsergebnisse ab Herbst 1955 bis Sommer 1957 enthält.

hat sich die Anwendung des radioaktiven Eisenisotops Fe^{59} mit einer Halbwertszeit von 46,3 Tagen besonders bewährt¹. Der histochemische Eisennachweis beruht auf der Überführung in Berliner Blau oder TURNBULL-Blau. Bei Bewertung histochemischer Befunde ist zu beachten, daß nur ionisierbares oder in ionisierbare Form überführbares Eisen histochemisch in Erscheinung tritt. Über einen verfeinerten histochemischen Nachweis, der auch das normale Gewebeeisen weitgehend erfassen soll, s. 2 und 3. Durch Hydrolyse mit HCl und gleichzeitiger Kaliumferrocyanidreaktion bei 55° Wärme scheint neben der Hämosiderin- auch die Ferritineisendarstellung in Gewebsschnitten möglich⁴. Fest in ein organisches Molekül eingebautes Eisen, wie es z. B. im Häm in vorkommt, ist nicht faßbar. Quantitative Schlüsse aus histochemischen Eisenbefunden sind nicht ohne weiteres erlaubt.

2. Vorkommen und Funktion des Eisens im Organismus.

Eisen ist wie Kupfer ein lebensnotwendiges Metall, das sämtliche pflanzlichen und tierischen Zellen in kleinen Mengen besitzen. Vorkommen und Verteilung des Eisens im menschlichen Organismus geht aus Abb. 1 hervor, welche nach Organanalysen an 13 Kindern im Alter von 1—4 Jahren entworfen worden ist⁵.

Wie man sieht, ist das eisenreichste Organ das Blut, das in 100 cm^3 50 mg Fe fast ausschließlich als Hämoglobineisen enthält. Blutverlust bedeutet deshalb Eisenverlust. Neben dem Blut sind Milz und Leber die eisenreichsten Organe, was auf ihre besonderen Aufgaben im Eisenstoffwechsel hinweist. Die übrigen Organe enthalten nur relativ geringe Eisenmengen, die zwischen 4—7,5 mg-% liegen.

Abb. 1. Mittlerer Organeisengehalt von 13 Kindern im Alter von 1—4 Jahren in mg Fe bezogen auf 100 g Organgewicht. (Nach SALVADEI.)

Formen des organismischen Eisens.

a) Das Hämoglobineisen.

Die Hauptmasse des Eisens im Säugetierorganismus ist am Aufbau des Blutfarbstoffs beteiligt. Beim Menschen beträgt der Gesamthämoglobinbestand durchschnittlich rund 900 g. Da der Eisengehalt des Hämoglobins 0,34% beträgt, so enthält das gesamte zirkulierende Blut rund 3 g Fe. Dazu kommt noch der Hämoglobineisengehalt des Knochenmarks, der sich in den reifen und halbreifen Zellen der Erythropoese vorfindet. Nach vorsichtiger Schätzung beträgt der Hämoglobingehalt des Knochenmarks etwa $\frac{1}{5}$ von dem des Blutes, was bei einem Gesamtorgangewicht von 2,5 kg 0,5 Liter Blut entsprechen würde. Daraus berechnet sich der Eisengehalt des gesamten Knochenmarks mit rund 250 mg. Das gesamte Hämoglobineisen würde demnach mit 3,25 g einzuschätzen sein. Über den Einbau des Eisens in das Hämoglobinmolekül und über den chemischen

¹ HAHN 1951 (Übersicht).

² POPOFF, W. N. und A. POPOFF 1943.

³ DEJARDIN und LAMBRECHTS 1944.

⁴ WÖHLER 1955.

⁵ SALVADEI 1931.