



2015年  
考试专用

国家执业药师资格考试

药学综合知识与技能

模拟试卷

药考过专家组 编写



电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

药学综合知识与技能模拟试卷 / 药考过专家组主编.

—成都: 电子科技大学出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5647-2948-6

I. ①药… II. ①药… III. ①药理学—药剂师—资格

考试—习题集 IV. ①R9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 070271 号

## 药学综合知识与技能模拟试卷

主 编 药考过专家组

---

出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 谢晓辉

责任编辑: 李燕苓

主 页: [www.uestcp.com.cn](http://www.uestcp.com.cn)

电子邮箱: [uestcp@uestcp.com.cn](mailto:uestcp@uestcp.com.cn)

发 行: 新华书店经销

印 刷: 北京佳顺印务有限公司

成品尺寸: 185mm×260mm 印张: 11 字数: 267 千字

版 次: 2015 年 5 月第一版

印 次: 2015 年 5 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-2948-6

定 价: 30.00 元

---

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

# 前 言

国家执业药师资格考试是我国为保证公众用药安全所采取的一项重要人事考试制度。《国家药品安全“十二五”规划》规定,自 2012 年开始新开办的零售药店必须配备执业药师;到 2015 年,所有零售药店法人或主要管理者都必须具备执业药师资格。据统计,2013 年全国报名参加执业药师资格考试人数已接近 39 万人,考证难度越来越大。

很多考生由于已经工作多年才参加执业药师资格考试,对如何备考茫然不知所措。纵观各类考试,除了认真复习教材中的知识外,最重要的就是做真题、研究真题,执业药师资格考试也不例外。执业药师资格考试历年真题的重要性主要体现在如下几个方面:方向性,真题是考试复习的风向标,考点的比重和考核要点都有很强的延续性,是最佳的研究出题角度和出题思路的参考资料;接近性,真题的难度及出题角度最接近真考,作用是任何模拟题无法取代的;权威性,真题是许多专家精心编纂的,每道题目都经过了深思熟虑、反复论证才会最终出现在考生面前。

为了帮助参加执业药师资格考试的广大考生准确、全面地理解和掌握应试内容,顺利通过考试,我们在全面收集近 10 年的执业药师资格考试真题的基础上,组织了一批具有丰富考试培训、临床教学及命题经验的专家、教授,在深入研究、讨论、分析《国家执业药师资格考试考试大纲》和历年真题的基础上,严格按照国家食品药品监督管理局对执业药师资格考试的指示编写了《国家执业药师资格考试历年真题及全真模拟》系列丛书。

## 本书共有三大特点:

### 1. 真题自测:检测应试水平,把握命题规律。

真题练习一直是考生备考中的重要环节,为此,我们精心挑选了近 10 年的考试真题进行汇编,帮助考生摆脱题海战术、把握真题命脉,在有限的时间内有的放矢,抓住重点和难点。

### 2. 专家点津:研究解题技巧,深理解应用。

为了帮助考生将真题吃透,每道试题都由编委会专家作出了详细的讲解,并针对难点、疑点辅以分析性的说明,指导考生抓住重点,减少复习的盲目性。

### 3. 全真模拟:考点查缺补漏,应试胸有成竹。

专家们精心编写了 2 套全真模拟试卷,试卷的题型、题量、难度以及考点分布与真题相似,考生可通过自测来对复习成果进行验收,及时查漏补缺。

在本书的编写过程中,我们得到了国家食品药品监督管理局、中国药科大学、沈阳药科大学、北京中医药大学等相关专家的大力支持,他们对本书的编写提供了大量的意见和建议,对我们的编写工作助益良多,在此一并表示感谢。

由于时间紧迫,错误与疏漏恐难杜绝,敬请广大考生和相关专家批评指正,意见或建议请发至我们的邮箱:weilaijiaoyuyixue@163.com,我们将及时改正,以便再版时修订。

编者

## 历年真题试卷(一)

## 一、最佳选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有1个最佳答案)

1. 药学服务的效果体现在
  - A. 确认患者存在的或潜在的病症
  - B. 提高药物治疗的安全性、有效性、依从性和经济性
  - C. 有助于研究药物的作用机制
  - D. 协助规范医师的处方行为
  - E. 预测潜在的药品不良反应
2. 青霉素钠注射剂的皮试药液浓度应为
  - A. 100U/ml
  - B. 250U/ml
  - C. 500U/ml
  - D. 750U/ml
  - E. 1 000U/ml
3. 麻醉药品处方至少保存
  - A. 1年
  - B. 2年
  - C. 3年
  - D. 4年
  - E. 5年
4. 一巨幼细胞贫血患儿肌内注射维生素 B<sub>12</sub>, 1次 25~50 $\mu$ g, 应抽取 0.5mg/ml 的药液
  - A. 0.025~0.05ml
  - B. 0.05~0.10ml
  - C. 0.10~0.20ml
  - D. 0.15~0.30ml
  - E. 0.20~0.40ml
5. 血红蛋白的正常值参考范围是
  - A. 男性 80~160g/L, 女性 70~150g/L
  - B. 男性 90~160g/L, 女性 80~150g/L
  - C. 男性 100~150g/L, 女性 90~150g/L
  - D. 男性 110~160g/L, 女性 100~150g/L
  - E. 男性 120~160g/L, 女性 110~150g/L
6. 下列与患者用药依从性无关的是
  - A. 药物的外观、口感和易识别使患者放心
  - B. 医师的关怀、体贴和对患者的责任心
  - C. 药师口头和书面用药指导的耐心
  - D. 护师给药操作和监护使患者安心
  - E. 国家卫生保健体制对群众的关心
7. 激惹性腹泻常见的病因是
  - A. 细菌、真菌、病毒、寄生虫感染
  - B. 变态反应或由肠肿瘤产生过多激素
  - C. 肠道正常细菌的数量或比例失去平衡
  - D. 外界的各种刺激, 如受寒、过食辛辣食物等
  - E. 直肠或结肠溃疡、肿瘤或炎症
8. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗寻常痤疮时, 正确的用法是
  - A. 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏, 晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶
  - B. 睡前应用过氧苯甲酰凝胶, 晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏
  - C. 两药的凝胶或乳膏间隔 2h 交替使用
  - D. 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用
  - E. 前额、颜面部应用维 A 酸凝胶或乳膏, 胸背上部应用过氧苯甲酰凝胶
9. 肾上腺皮质激素的分泌率最高出现在
  - A. 夜间 4 时
  - B. 早晨 6 时
  - C. 上午 8 时
  - D. 上午 10 时
  - E. 夜间 12 时
10. 对合并糖尿病及肾病的高血压患者的降压目标是
  - A. <130/80mmHg
  - B. <140/85mmHg
  - C. <150/90mmHg
  - D. <160/95mmHg
  - E. <170/100mmHg
11. 含钙量高, 口服 1 次的钙制剂的最佳服用时间是
  - A. 空腹
  - B. 睡前
  - C. 餐前
  - D. 餐后
  - E. 餐中
12. 造成 NSAID 胃肠道损害的危险因素不包括
  - A. 有胃出血史、溃疡史
  - B. 同时使用 H<sub>2</sub> 受体拮抗剂
  - C. 同时使用糖皮质激素
  - D. 同时使用抗凝血药
  - E. 大剂量使用 NSAID
13. 对糖尿病患者监测糖化血红蛋白, 其理想指标应为
  - A. <6%
  - B. 6.5%~7.5%
  - C. <7%
  - D. <8%
  - E. <10%
14. 香豆素类灭鼠药中毒的特效解毒剂是
  - A. 乙酰胺
  - B. 维生素 B<sub>6</sub>
  - C. 阿托品
  - D. 维生素 K<sub>1</sub>

- E. 普萘洛尔
15. 应用胆碱酯酶复活剂应注意
- 切勿 2 种或 3 种复活剂同时使用, 以免毒性增加
  - 复活剂对毒蕈碱样作用较强
  - 复活剂不需稀释, 直接注射
  - 中毒已超过 3 日使用复活剂仍然有效
  - 与阿托品联合应用无协同作用
16. 非处方药布洛芬, 不适用于
- 感冒、流感的解热
  - 中度的关节痛
  - 胃酸过多、烧心
  - 头痛、牙痛、肌肉痛
  - 神经痛和痛经
17. 下列影响老年人血药浓度的因素中, 叙述错误的是
- 心肝肾及胃肠道等主要器官功能在不断下降
  - 常规剂量连续给药就有可能引起蓄积性中毒
  - 与血浆蛋白的结合率增加, 使游离型药物减少
  - 对药物的代谢、排泄减慢, 血浆半衰期延长
  - 即使在常规剂量下, 也可能出现血药浓度增高而造成毒性反应
18. 消化性溃疡抗 Hp 的三联疗法正确的是
- 奥美拉唑 + 阿莫西林 + 雷尼替丁
  - 奥美拉唑 + 克拉霉素 + 阿奇霉素
  - 胶体碱式碳酸铋 + 哌仑西平 + 替硝唑
  - 兰索拉唑 + 阿莫西林 + 甲硝唑
  - 胶体碱式碳酸铋 + 硫糖铝 + 甲硝唑
19. 与异烟肼同时服用会增加肝、肾损害的药物是
- 对氨基水杨酸
  - 利福平
  - 吡嗪酰胺
  - 环丙沙星
  - 乙胺丁醇
20. 联合用药使异烟肼失去抗菌作用的中成药是
- 防风通圣丸(麻黄碱)
  - 蛇胆川贝液(苦杏仁苷)
  - 丹参片(丹参酮)
  - 昆布(碘)
  - 神丸(蟾蜍)
21. 浓度为 1ppm 的铅溶液的含量是
- 表示十分之一
  - 表示百分之一
  - 表示千分之一
  - 表示十万分之一
  - 表示百万分之一
22. 痛风时尿沉渣结晶为
- 草酸盐结晶
  - 尿酸盐结晶
  - 磷酸盐结晶
  - 酪氨酸
  - 胆红素结晶
23. 由于与口服降糖药发生相互作用而使降血糖作用减弱的药是
- 磺胺类
  - 水杨酸类
  - 噻嗪类
  - 贝特类
  - 香豆素类
24. 患者良性前列腺增生症的老年患者服用抗过敏药后可致的严重不良反应是
- 急性尿潴留
  - 严重高血压
  - 慢性荨麻疹
  - 急性胰腺炎
  - 血管性肿
25. 痛风患者急性关节炎期常见单个关节出现红肿、热痛, 最常见的部位是
- 趾关节
  - 颈椎关节
  - 胸椎关节
  - 腰椎关节
  - 膝关节
26. 下列症状不是高血压临床表现的是
- 头痛
  - 头晕
  - 口干
  - 心悸
  - 耳鸣
27. 出血是肝素最常见的不良反应, 对明显出血者选用的特异性拮抗药是
- 氟马西尼
  - 鱼精蛋白
  - 地塞米松
  - 烯丙吗啡
  - 酚磺乙胺
28. 由于老年人胃肠道功能变化, 而导致按主动转运方式吸收减少的药品是
- 维生素 B<sub>1</sub>
  - 阿司匹林
  - 对乙酰氨基酚
  - 苯巴比妥
  - 磺胺甲噁唑
29. 灭鼠药磷酸锌、磷酸铝、磷酸钙中毒, 禁用
- 氨茶碱
  - 阿朴吗啡
  - 阿托品
  - 乙酰半胱氨酸
  - 谷胱甘肽
30. 亮菌甲素中加入助剂二甘醇所致的严重不良反应是
- 肝衰竭
  - 肾衰竭
  - 肺衰竭
  - 心脏瓣膜炎
  - 皮肤破损

31. 痛风患者急性关节炎期最常累及的部位是  
 A. 膝关节                      B. 跖趾关节  
 C. 胸关节                      D. 踝关节  
 E. 腰关节
32. 以下有关“病因学 A 类药物不良反应”的叙述中,不正确的是  
 A. 可由药物本身所引起  
 B. 可由药物代谢物所引起  
 C. 死亡率也高  
 D. 又称为剂量相关性不良反应  
 E. 为药物固有的药理作用增强和持续所致
33. 下列关于药物利用研究的叙述中,错误的是  
 A. 可以提示患者药物治疗的预后情况  
 B. 可以提示药物消耗的基本情况  
 C. 可以了解药物临床的实际消耗  
 D. 可以了解药物消耗分布与疾病谱的关系  
 E. 可以预测药品的需求量和需求结构
34. 接受清洁手术者,在术前给予抗菌药物的适宜时间是  
 A. 0.5~2h                      B. 2~3h  
 C. 2~4h                        D. 3~6h  
 E. 4~8h
35. 能够增强靶组织对胰岛素敏感性的药是  
 A. 阿卡波糖                      B. 二甲双胍  
 C. 格列喹酮                      D. 罗格列酮  
 E. 格列齐特
36. 上市后的药品临床再评价阶段属于  
 A. I 期临床试验  
 B. II a 期临床试验  
 C. III 期临床试验  
 D. IV 期临床试验  
 E. II b 期临床试验
37. 保管中最易受潮变质的常用药品是  
 A. 硝苯地平片                      B. 多酶片  
 C. 维拉帕米片                      D. 甲氧氯普胺片  
 E. 艾司唑仑片
38. 反映国内外医学重大新闻、最新进展和科研动态的网站是  
 A. 美国临床药学会网  
 B. 药学之窗网  
 C. 中国医学论坛报网  
 D. 国家临床技术情报网

E. 天然产物药师网

39. 下列不属于二次文献的是  
 A. 《中国药文摘》(CPA)  
 B. 《中国药学杂志》  
 C. 《国际药文摘》(IPA)  
 D. 《医学文摘》(EM)  
 E. 《医学索引》(IM)
40. 下列医疗器械产品中,国家实行第二类管理的是  
 A. 拔罐器  
 B. 助听器  
 C. 一次性使用无菌注射器  
 D. 创可贴  
 E. 弹力绷带

二、配伍选择题(共 80 题,每题 0.5 分。题目分为若干组,每组题目对应同一组备选项,备选项可重复选用,也可不选用。每题只有 1 个最佳答案)

[41~42]

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 羟甲唑啉 | B. 苯丙哌林 |
| C. 克仑特罗 | D. 羧甲司坦 |
| E. 吗啡   |         |

41. 以刺激性干咳或阵咳症状为主者宜选  
 42. 呼吸道有大量痰液并阻塞呼吸道宜选

[43~44]

- |           |        |
|-----------|--------|
| A. 甘露醇    | B. 尿素  |
| C. 硫酸镁    | D. 乳酸钠 |
| E. 门冬氨酸钾镁 |        |

43. 静滴用于脑水肿、降低颅内压,冲洗用于经尿道前列腺切除术的药品是  
 44. 静注可降压和对抗惊厥,外敷则可消除患肢水肿的药品是

[45~47]

- |            |           |
|------------|-----------|
| A. 超剂量用药   | B. 非适应证用药 |
| C. 有目的联合用药 | D. 超适应证用药 |
| E. 过度治疗用药  |           |

45. 高血压患者应用抗高血压药+利尿剂属于  
 46. 感染性腹泻患者应用小檗碱+鞣酸蛋白属于  
 47. 普通感冒患者应用抗病毒药+抗生素属于

[48~50]

- |          |        |
|----------|--------|
| A. 醋酸氯己定 | B. 氨茶碱 |
| C. 硫酸镁   | D. 呋塞米 |
| E. 尿素    |        |

48. 水溶液或醇溶液外用可作为杀菌剂,而制成栓剂可治疗阴道炎的药品是

49. 水溶液口服可导泻,而注射剂可降压和对抗惊厥的药品是

50. 静滴可降低颅内压,外用可抑制真菌生长、治疗甲癣的药品是

[51~54]

- A. 严禁直接口服
- B. 禁用于红肿部位
- C. 使用后不宜马上饮水
- D. 一般应整片吞服
- E. 保持舌下含服至少 5min,仰卧姿势约 20min

51. 含漱剂

52. 缓控释制剂

53. 透皮贴剂

54. 泡腾片剂

[55~58]

- A. 呋塞米
- B. 普伐他汀
- C. 甲氧氯普胺
- D. 格列美脲
- E. 阿司匹林

55. 宜于清晨服用的药品是

56. 宜于餐前服用的药品是

57. 宜于餐后服用的药品是

58. 宜于睡前服用的药品是

[59~61]

- A. 布洛芬
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 阿司匹林
- D. 吲哚美辛
- E. 贝诺酯

59. 解热且具有抑制血小板聚集作用,增加出血危险的是

60. 为两种解热镇痛药结合的化合物,对胃肠刺激性较小的

61. 非甾体抗炎药中镇痛作用较强,对胃肠刺激性最低的是

[62~63]

- A. 色甘酸钠
- B. 碘苷
- C. 维生素 B<sub>2</sub>
- D. 磺胺醋酰钠
- E. 硫酸锌

62. 过敏性结膜炎患者宜选用的滴眼剂是

63. 流行性结膜炎患者宜选用的滴眼剂是

[64~67]

- A. 原因不明的头痛
- B. 三叉神经痛
- C. 紧张和焦虑性头痛
- D. 反复性偏头痛

E. 丙酮与乳酸堆积的头痛

64. 应用卡马西平可治疗

65. 应用地西洋可治疗

66. 应用麦角胺咖啡因可治疗

67. 应用维生素 B<sub>1</sub> 可治疗

[68~69]

A. 收缩压 120~139mmHg,舒张压 80~89mmHg

B. 收缩压 140~159mmHg,舒张压 90~99mmHg

C. 收缩压 160~179mmHg,舒张压 100~109mmHg

D. 收缩压 ≥180mmHg,舒张压 ≥110mmHg

E. 收缩压 ≥140mmHg,舒张压 <90mmHg

68. 2 级高血压(中度)血压水平范围是

69. 单纯收缩期高血压水平范围是

[70~71]

- A. 噻嗪类利尿剂
- B. 醛固酮受体拮抗剂
- C. 血管紧张素转换酶抑制剂
- D. 受体阻断剂
- E. β 受体阻断剂

70. 对高血压合并心力衰竭,一旦出现舒张功能不全,可在常规治疗基础上加用

71. 对高血压合并糖尿病宜选用

[72~73]

- A. 水钠潴留和血容量增加
- B. 交感神经活性增加
- C. 血管张力增加
- D. 血管紧张素增加
- E. Ca<sup>2+</sup> 通透性增加在高血压的发病机制中

72. 属于细胞膜离子转运异常的是

73. 属于肾和肾功能异常的是

[74~76]

- A. 福辛普利
- B. 利血平
- C. 尼索地平
- D. 氢氯噻嗪
- E. 特拉唑嗪

74. 对患高血压病且驾车、高空作业者不宜选用

75. 对患高血压病合并前列腺增生者宜选用

76. 对患高血压病合并痛风者不宜选用

[77~79]

- A. 贝丁酸类
- B. 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂
- C. 烟酸
- D. 胆酸螯合剂 + 贝丁酸类
- E. 鹅去氧胆酸

77. 治疗高胆固醇血症者宜首选  
 78. 治疗高甘油三酯血症者宜首选  
 79. 治疗胆固醇和甘油三酯均高者宜选用

[80~83]

- A. 两性霉素 B                      B. 苯唑西林  
 C. 利巴韦林                         D. 阿奇霉素  
 E. 阿莫西林/克拉维酸钾

80. 治疗流感嗜血杆菌引起的肺炎宜选用  
 81. 治疗支原体肺炎宜选用  
 82. 治疗甲氧西林敏感金葡菌引起的肺炎宜选用  
 83. 治疗病毒性肺炎宜选用

[84~87]

- A. 胰岛素                              B. 格列喹酮  
 C. 二甲双胍                         D. 普伐他汀  
 E. 阿卡波糖

84. 1 型糖尿病患者宜选用  
 85. 2 型肥胖型糖尿病患者宜首选  
 86. 妊娠期糖尿病患者宜首选  
 87. 糖尿病合并肾病患者宜首选

[88~91]

- A. 黑色大便                         B. 口干和视力模糊  
 C. 便秘                                D. 幻觉、定向力障碍  
 E. 疲乏、嗜睡

88. 硫糖铝服后可能导致  
 89. 枸橼酸铋钾服后可能导致  
 90. 哌仑西平服后可能导致  
 91. 雷尼替丁服后可能导致

[92~94]

- A. 2 个月                              B. 4 个月  
 C. 6 个月                              D. 12 个月  
 E. 18~24 个月

92. 对未用抗结核药的初治结核病患者,其短程化疗方案疗程是  
 93. 对初治失败结核病患者,应用利福平、异烟肼加乙胺丁醇的复治疗方案疗程是  
 94. 对不能耐受短程化疗结核病患者,强化期与巩固期相加疗程是

[95~96]

- A. 维 A 酸                             B. 美托洛尔  
 C. 烟酸                                D. 碳酸钙  
 E. 青霉素

95. 妊娠早期妇女禁用的药品是  
 96. 妊娠中晚期妇女禁用的药品是

[97~99]

- A. 氨基糖苷类                        B. 氮芥类  
 C. 甲巯咪唑                         D. 头孢菌素类  
 E. 胰岛素

97. 妊娠早期妇女使用可引起胎儿畸形的药品是  
 98. 妊娠期妇女使用可致胎儿永久性耳聋的药品是  
 99. 妊娠期妇女使用可致胎儿甲状腺功能低下的药品是

[100~101]

- A. 超适应证给药  
 B. 有禁忌证用药  
 C. 盲目联合用药  
 D. 过度治疗用药  
 E. 非适应证用药

100. 脂肪乳用于脂质骨髓炎是  
 101. 二甲双胍用于非 2 型糖尿病减肥是

[102~105]

- A. 颅内压升高与青光眼  
 B. 妊娠高血压  
 C. 急性皮炎  
 D. 经尿道行前列腺切除术  
 E. 导泄

102. 甘露醇注射剂静注用于  
 103. 硫酸镁静注用于  
 104. 口服硫酸镁用于  
 105. 甘露醇冲洗用于

[106~109]

- A. 一级证据                            B. 二级证据  
 C. 三级证据                            D. 四级证据  
 E. 五级证据

106. 按特定病种的特定疗法收集所有质量可靠的随机对照试验经过荟萃分析属于  
 107. 根据专家个人多年临床经验提出的诊断和治疗方案属于  
 108. 单个样品量足够的随机对照试验结果属于  
 109. 设有对照组但未用随机方法分组的研究属于

[110~111]

- A. 地西洋                              B. 丙磺舒  
 C. 氯化钙                              D. 氯化铵  
 E. 氨茶碱

110. 口服可以减少青霉素类和头孢菌素类抗生素排泄的是  
 111. 有利于弱碱性药物(如生物碱等)从尿液中排出

的是

[112~113]

- A. 头孢唑林                      B. 头孢地嗪  
C. 美罗培南                      D. 万古霉素  
E. 头孢呋辛 + 甲硝唑

112. 对乳腺手术预防感染应用抗菌药物应选用

113. 对结肠手术预防感染应用抗菌药物应选用

[114~115]

- A. 布洛芬                          B. 酮康唑  
C. 环孢素                          D. 比沙可啶  
E. 氯化钾

114. 较易导致肾损伤的药品是

115. 较易导致中毒性肝炎、肝衰竭的药品是

[116~117]

- A. 直接成本                      B. 间接成本  
C. 隐性成本                      D. 固定成本  
E. 机会成本

116. 用于药物治疗及其他相关治疗的费用属于

117. 因疾病引起的疼痛和治疗中带来痛苦代价属于

[118~120]

- A. 苦味酸                          B. 乙醚  
C. 亚砷酸及其制剂              D. 盐酸  
E. 氯化钾

118. 易燃液体是

119. 极毒品是

120. 具有腐蚀性的是

三、多项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中有2个或2个以上正确答案。错选或少选均不得分)

121. 提高患者用药依从性的方法包括

- A. 简化治疗方案                  B. 改善服务态度  
C. 加强用药指导                  D. 改进药品包装  
E. 减少合并用药

122. 咀嚼片正确的服法有

- A. 置药片于舌根部,贴近咽喉黏膜  
B. 咀嚼时间一般控制在5min左右  
C. 在口腔内咀嚼的时间宜充分  
D. 咀嚼后可用少量水(温开水)送服  
E. 中和胃酸时,宜在餐后1~2h服用

123. 感冒的主要症状有

- A. 流鼻涕、打喷嚏,同时嗅觉减退  
B. 疲乏、全身不适、有轻度发热或不发热、头痛、

四肢痛

C. 呼吸困难、咳嗽、紫绀及咯血等,肺部可听到湿性啰音

D. 血常规检测白细胞计数正常或偏低

E. 高热不退、谵妄以致昏迷,儿童可见抽搐及脑膜刺激征症状

124. 加速毒物排出体外的是

- A. 导泻                              B. 洗肠  
C. 利尿                              D. 血液净化  
E. 吸氧

125. 羟甲戊二酰辅酶A还原酶抑制剂(他汀类药)主要经细胞色素酶CYVP3A4代谢,不宜与其联合应用的药品有

- A. 环孢素                          B. 酮康唑  
C. 克拉霉素                      D. 氟西汀  
E. 青霉素

126. 对寻常痤疮的临床表现的叙述,正确的有

- A. 好发于前额、颜面、胸背上部 and 肩胛部  
B. 初期为散在性红斑或水疱,水疱壁透明  
C. 多为散在与毛囊一致的黑色丘疹,挤压后可有黄白色脂性栓排出  
D. 炎症较重时,可长久存在,亦可逐渐吸收或溃疡形成窦道  
E. 分泌物干后形成蜜黄色或污黄色痂,愈后无瘢痕

127. 沙眼主要应用滴眼剂治疗,《国家非处方药目录》收录的治疗沙眼的制剂有

- A. 10%磺胺醋酸钠滴眼剂  
B. 0.25%硫酸锌滴眼剂  
C. 0.1%酞丁安滴眼剂  
D. 0.1%利福平滴眼剂  
E. 2.5%林可霉素滴眼剂

128. 医师给一位18岁女性患者开处方维A酸软膏治疗寻常痤疮,药师发药时应交代的注意事项包括

- A. 不应涂敷于皮肤皱褶部位  
B. 用药部位应避免强烈日光照射  
C. 晨起洗漱后应用  
D. 晚间睡前应用  
E. 可与过氧苯甲酰凝胶早晚交替使用

129. 因老人代谢改变,导致某些药物敏感性增强的是

- A. 镇静药                              B.  $\beta$ 受体阻断药

- C. 抗凝药                      D. 利尿药  
E. 助消化药
130. 28岁一男性,自觉前尿道有轻度痒感,排尿微痛,尿道分泌物稀薄、有黏液性或黏脓性,经诊断为非淋菌性尿道炎,可选用的抗菌药物有  
A. 多西环素                      B. 米诺环素  
C. 克林霉素                      D. 阿奇霉素  
E. 左氧氟沙星
131. 应慎用糖皮质激素的病症有  
A. 急性心力衰竭                  B. 糖尿病  
C. 眼单纯性疱疹                  D. 骨关节炎  
E. 骨质疏松
132. 下列关于肾功能不全患者用药原则叙述中,正确的有  
A. 明确诊断,合理选药  
B. 避免或减少使用肾毒性大的药物  
C. 注意药物相互作用,特别应避免与肝毒性的药物合用  
D. 肾功能不全而肝功能异常者可选用双通道(肝肾)排泄的药物  
E. 设计个体化给药方案,必要时进行TDM
133. 肾功能减退时,应避免使用或调整给药方案的有  
A. 万古霉素                      B. 庆大霉素  
C. 阿米卡星                      D. 小檗碱  
E. 替考拉宁
134. 合理用药的基本要素包括  
A. 安全性                          B. 经济性  
C. 有效性                          D. 适当性  
E. 方便性
135. 血液透析的适应证有  
A. 急性肾衰  
B. 慢性肾衰  
C. 急性药物或毒物中毒  
D. 高钙血症  
E. 高尿酸血症
136. 下列属于肾功能受损评价指标的有  
A. 尿蛋白                          B. 尿素氮  
C. 肌酐清除率                      D. 血清肌酐  
E. 肾素
137. 长期应用糖皮质激素可发生  
A. 二重感染  
B. 医源性皮质醇增多症  
C. 撤药综合征  
D. 骨质疏松  
E. 肾病综合征
138. 影响药物临床使用安全的因素包括  
A. 药物因素                          B. 患者因素  
C. 医师因素                          D. 药师因素  
E. 护士因素
139. 下列药物经济学研究方法中,以货币为单位表示结果的有  
A. 最小成本分析  
B. 成本效果分析  
C. 成本效果比值分析  
D. 成本效益分析  
E. 成本效用分析
140. 药品上市前要经过的临床评价阶段有  
A. I期临床试验                      B. II期临床试验  
C. III期临床试验                      D. IV期临床试验  
E. V期临床试验

## 历年真题试卷(二)

## 一、最佳选择题(共 40 题,每题 1 分。每题的备选项中只有 1 个最佳答案)

- 药师在接受护士咨询时,应重点关注的内容是
  - 药品经济学知识
  - 药物制剂的等效性
  - 药品在人体内的药动学参数
  - 注射剂的配制、溶媒、浓度和滴注速度
  - 药品的生产厂商和批号
- 下列有关“单剂量配方系统”的叙述中,正确的是
  - 英文缩写是 TDDS
  - 对所分装的散片无法识别
  - 是一种透明的开放性包装
  - 便于药师、护士及患者自行核对
  - 是按患者 1 日给药的剂量包装的
- 关于色甘酸钠的叙述中,错误的是
  - 适用于孕妇及哺乳期妇女的哮喘发作
  - 将其制成气雾剂可以避免首过效应
  - 其粉雾剂易潮解,应置于干燥处保存
  - 适用于预防过敏性支气管哮喘
  - 口服有时可引起恶心或食欲不振
- 下列白细胞计数中,不正常的是
  - 成人静脉血  $4.3 \times 10^9/L$
  - 成人末梢血  $8.0 \times 10^9/L$
  - 成人静脉血  $3.0 \times 10^9/L$
  - 新生儿  $16.0 \times 10^9/L$
  - 6 个月~2 岁婴幼儿  $6.2 \times 10^9/L$
- 静脉滴注两性霉素 B 50mg,滴注时间应控制在
  - 0.5h 以上
  - 1h 以上
  - 2h 以上
  - 4h 以上
  - 6h 以上
- 服药时应限制饮水的药品是
  - 熊去氧胆酸
  - 苯溴马隆
  - 口服补液盐
  - 阿仑膦酸钠
  - 硫酸铝
- 用药期间禁止饮酒否则可出现面部潮红、头痛、眩晕等“双硫仑反应”的药品是
  - 青霉素钾
  - 克林霉素
  - 庆大霉素
  - 头孢哌酮
  - 依替米星
- 除妊娠及哺乳期妇女外,其他禁用伪麻黄碱的是
  - 甲状腺功能减退者
  - 高尿酸血症者
  - 支气管小哮喘者
  - 良性前列腺增生者
  - 功能性便秘者
- 制剂的吸收速度由慢到快依次为
  - 注射剂、溶液剂、散剂、片剂
  - 片剂、溶液剂、散剂、注射剂
  - 片剂、散剂、溶液剂、注射剂
  - 注射剂、溶液剂、片剂、散剂
  - 散剂、片剂、溶液剂、注射剂
- 口服奥司他韦(达菲)治疗流感宜及早用药,较为有效的用药时间是症状出现的
  - 48h 内
  - 72h 内
  - 96h 内
  - 108h 内
  - 120h 内
- 可根据监测凝血酶原时间调整用药剂量的是
  - 氯吡格雷
  - 噻氯匹定
  - 华法林钠
  - 西洛他唑
  - 阿司匹林
- 患者男,59 岁,因多尿、下肢水肿就诊,体征和实验室检查,体重指数(BMI)28.3,餐前血糖 7.8mmol/L,餐后血糖 13.6mmol/L,糖化血红蛋白(HbA<sub>1c</sub>)7.9%,血清 C 肽 0.2μg/L,甘油三酯 2.8mmol/L,建议服用
  - 格列比嗪
  - 吡格列酮
  - 二甲双胍
  - 格列本脲
  - 格列齐特
- 患者女,58 岁,有 2 型糖尿病史,因头疼、头晕就诊,体征和实验室检查,餐前血糖 7.8mmol/L,餐后血糖 11.2mmol/L,糖化血红蛋白 8.8%,血压 166/96mmHg,蛋白尿 1g/24h,推荐在降糖的基础上,合并选用
  - 美托洛尔
  - 氢氯噻嗪
  - 卡维地洛
  - 赖诺普利
  - 氯吡格雷
- 一个 12 岁患儿突发哮喘就诊,心率 50 次/分,AST 42μ/L,ALT 76μ/L,适宜选用的平喘药是
  - 沙丁胺醇
  - 布地奈德
  - 异丙肾上腺素
  - 特布他林
  - 孟鲁司特

- A. 沙丁胺醇                      B. 氨茶碱  
C. 二丙酸倍氯米松              D. 扎鲁司特  
E. 孟鲁司特
15. 对服用 5-HT 所引起的性功能障碍的抑郁症患者,可更换应用  
A. 氟伏沙明                      B. 帕罗西汀  
C. 文拉法辛                      D. 阿米替林  
E. 托莫西汀
16. 下列有关胆碱酯酶复活剂应用的叙述中,正确的是  
A. 两种以上复活剂同时使用不增加毒性  
B. 复活剂对毒蕈碱样作用较强  
C. 复活剂可与碱性药物并用  
D. 中毒已超过 3 日,使用复活剂无效  
E. 与阿托品合用无协同作用
17. 妊娠期妇女服用抗癫痫药卡马西平可导致缺乏的维生素是  
A. 维生素 E                      B. 维生素 K  
C. 维生素 D                      D. 维生素 C  
E. 维生素 A
18. 使可待因在体内被代谢为吗啡的肝药酶亚型是  
A. CYP2D6                      B. CYP3A4  
C. CYP2C9                      D. CYP2C19  
E. CYP2B6
19. 可影响幼儿软骨发育,导致关节损伤的药物是  
A. 阿米卡星                      B. 阿司匹林  
C. 头孢唑林                      D. 米诺环素  
E. 阿莫西林
20. 运动员参赛时非禁用的药是  
A. 利尿药                      B. 合成类固醇  
C. 钙离子通道阻滞剂              D. 麻醉性镇痛剂  
E.  $\beta$  受体阻断剂
21. 肝病慎用的药是  
A. 谷氨酸                      B. 门冬氨酸钾镁  
C. 氯丙嗪                      D. 甘草酸二铵  
E. 泛酸钙
22. 阿米替林中毒心衰患者选用的药是  
A. 东莨菪碱                      B. 阿托品  
C. 碳酸氢钠                      D. 氟米帕明  
E. 毛茛菪丙
23. 大规模研究试验显示,近年上市的环氧化酶-2 抑制剂中,可增加心血管不良反应风险的药品是  
A. 酮康唑                      B. 洛伐他汀  
C. 罗非昔布                      D. 利血平  
E. 阿昔洛韦
24. 小儿呼吸道感染服用琥乙红霉素颗粒,剂量为 30~50mg/(kg·d),分 3~4 次服用,则体重为 20kg 的儿童一次剂量为  
A. 175~250mg 或 125~225mg  
B. 200~333mg 或 150~250mg  
C. 215~350mg 或 175~270mg  
D. 225~375mg 或 200~300mg  
E. 250~375mg 或 225~325mg
25. 消化性溃疡复发的主要病源性原因是  
A. 服用 NSAID 的同时服用了米索前列醇  
B. 没有下决心戒烟,且吸烟量更大  
C. 幽门螺杆菌的感染没有彻底清除  
D. 过量饮用烈性酒和食用刺激性食物  
E. 恐惧、焦虑情绪紧张导致迷走神经兴奋
26. 可作为退热药的首选,尤其适合老年人和儿童服用的药品是  
A. 阿司匹林                      B. 布洛芬  
C. 酮咯酸                      D. 对乙酰氨基酚  
E. 安乃近
27. 哺乳期妇女禁用的药品是  
A. 环丙沙星                      B. 磷酸铝  
C. 葡萄糖酸钙                      D. 双八面体蒙脱石  
E. 乳酸菌素
28. 对新生儿局部使用过多,可能导致中毒的药品是  
A. 莫匹罗星                      B. 氧化锌  
C. 硼酸                      D. 炉甘石  
E. 甘油
29. 含亚硝酸盐食物中毒的解毒剂是  
A. 氟马西尼                      B. 维生素 K<sub>1</sub>  
C. 维生素 B<sub>6</sub>                      D. 普萘洛尔  
E. 亚甲蓝
30. 苯妥英钠轻度中毒的表现  
A. 昏迷不醒、反射消失  
B. 面肌痉挛、言语不清  
C. 腹泻、口干、心动过速  
D. 瞳孔缩小、视力模糊  
E. 眩晕、手颤、全身乏力
31. 下列可反映肾小球的滤过率,并可作为评价肾损害敏感指标的是

- A. 尿素氮  
B. 尿毒尿酸  
C. 尿胆红素  
D. 尿液隐血  
E. 尿酸体
32. I 期临床试验阶段, 试验样本数为  
A. 小于 10 例  
B. 20 ~ 30 例  
C. 200 ~ 300 例  
D. 1 000 ~ 3 000 例  
E. 大于 2 000 例
33. 易吸湿的药物是  
A. 乙醇  
B. 维生素 D  
C. 鱼肝油乳  
D. 叶酸  
E. 甘油
34. 药物利用研究中, 日处方剂量基本合理, 表明  
A. DUI 接近 1  
B.  $DUI < 0.8$   
C.  $DUI > 1.2$   
D.  $B/A < 1$   
E.  $B/A > 1$
35. 循证医学中, “缺乏证据, 专家报告”, 属于  
A. A 分类  
B. B 分类  
C. C 分类  
D. D 分类  
E. E 分类
36. 药物治疗作用的强弱与维持时间的长短理论上取决于  
A. 药物的表观分布容积  
B. 药物的崩解速度  
C. 药物的血药浓度的高低  
D. 受体部位活性药物的浓度  
E. 药物的吸收速度
37. 一次性使用无菌注射器, 其注射器部分有关“生物性能”的质量要求是  
A. 无菌、无芽孢、无病毒  
B. 无热原、无芽孢、无病毒  
C. 无菌、无热原、无病毒  
D. 无菌、无热原、无溶血反应、无生物活性异物  
E. 无菌、无热原、无溶血反应、无急性全身毒性
38. 卡前列甲酯栓的存放条件是  
A. 遮光, 密闭,  $5^{\circ}\text{C}$  以下  
B. 遮光, 密闭,  $5^{\circ}\text{C}$  以上  
C. 遮光, 密闭,  $-5^{\circ}\text{C}$  以下  
D. 遮光, 密闭, 室温  
E. 遮光, 密闭, 阴凉处
39. 关于血糖仪的选购和使用注意事项, 不正确的是  
A. 应选择经过药品监督管理部门注册批准的产品

- B. 使用前应仔细阅读使用说明书, 在专业人员指导下使用  
C. 更换新批号试条时, 一定要先用制造商提供的校准试条或质控液进行校准后再测血糖  
D. 患者购买和使用时一定要注意标签上的有效期, 并注意按规定温度保存  
E. 血糖试条可以和任何的血糖仪一起使用
40. 药学专业期刊登载的研究论文属于  
A. 一级文献  
B. 二级文献  
C. 三级文献  
D. 常见数据库文献  
E. 药学文摘

二、配伍选择题(共 80 题, 每题 0.5 分。题目分为若干组, 每组题目对应同一组备选项, 备选项可重复选用, 也可不选用。每题只有 1 个最佳答案)

[41 ~ 42]

- A. 右美沙芬  
B. 甲睾酮  
C. 非洛地平  
D. 非诺贝特  
E. 布洛芬

41. 运动员禁用的药品是  
42. 驾驶员驾车时, 慎用的药品是

[43 ~ 46]

- A. 水银中毒  
B. 有机磷中毒  
C. 硫酸铜中毒  
D. 氰化物中毒  
E. 吗啡中毒

43. 二巯丙醇用于解救  
44. 依地酸钠用于解救  
45. 氯磷定用于解救  
46. 烯丙吗啡用于解救

[47 ~ 49]

- A. 肾衰竭  
B. 膀胱梗阻  
C. 低血糖  
D. 低血钾低血压  
E. 粒细胞减少

47. 中成药含氯苯那敏会导致  
48. 中成药含格列本脲会导致  
49. 中成药含氢氯噻嗪会导致

[50 ~ 52]

- A. 敏感化作用  
B. 拮抗作用  
C. 增强疗效  
D. 无关  
E. 降低疗效

50. 甲苯磺丁脲的降糖作用被氢氯噻嗪类降低为  
51. 他巴唑坦抑制剂  $\beta$ -内酰胺酶抑制剂使头孢噻肟免受破坏为  
52. 磷霉素使细菌细胞壁变薄利于阿莫西林进入

菌体

[53~54]

- A. 西咪替丁                      B. 地红霉素  
C. 西酞普兰                      D. 奥卡西平  
E. 度洛西汀

53. 属于肝药酶 CYP3A4 抑制剂的是  
54. 属于肝药酶 CYP2C19 抑制剂的是

[55~58]

- A. 上市后药品的再审查  
B. 上市后药品的再评价  
C. 非预期药物作用  
D. 药物警戒  
E. 药物临床评价

55. 药物使用过程中伴随发生的并非期望的有益或无益的治疗效果为  
56. 根据药理学最新学术水平对老药进行的再评价为是  
57. 新药获得批准后,在上市的头 4~6 年内进行有效性和安全性调查是  
58. 对常见的药品误用与严重的药物滥用信息的收集属于

[59~60]

- A. 阿莫西林 + 克拉维酸钾  
B. 磺胺甲噁唑 + 甲氧苄啶  
C. 阿司匹林 + 甲苯磺丁脲  
D. 硫酸亚铁 + 维生素 C  
E. 氢溴酸山莨菪碱 + 盐酸哌替啶

59. 可保护药品免受酶破坏从而提高疗效的联合用药是  
60. 可由于血浆蛋白结合置换作用而易引起危险的联合用药是

[61~64]

- A. 乳酸症患者                      B. 胰腺炎早期患者  
C. 青光眼患者                      D. 高钾血症患者  
E. 高血压患者

61. 导泻药乳果糖禁用的是  
62. 消化药胰酶禁用的是  
63. 鼻出血药伪麻黄碱慎用的是  
64. 过敏药氯苯那敏慎用的是

[65~67]

- A. 酞丁胺                              B. 双氯芬酸  
C. 益康唑                              D. 羟苄唑  
E. 泼尼松

65. 沙眼宜选择  
66. 流行性结膜炎宜选择  
67. 过敏性结膜炎宜选择

[68~70]

- A. 高尿酸血症                      B. 高血钠  
C. 高钾血症                          D. 高钙血症  
E. 支气管哮喘

68. 氢氯噻嗪的不良反是  
69. 阿米洛利的不良反是  
70. 倍他洛尔的不良反是

[71~74]

- A. 麻醉药品                          B. 处方药  
C. 甲类非处方药                      D. 非处方药  
E. 乙类非处方药

71. 在零售药店必须有医师处方才能销售的是  
72. 在零售药店不允许销售的是  
73. 专有标识为红色椭圆形底阴文色标(红底白字)的是  
74. 经批准可在普通商店和超市销售的是

[75~78]

- A. 胰岛素                              B. 二甲双胍  
C. 格列喹酮                          D. 瑞格列奈  
E. 阿卡波糖

75. 餐时血糖显著升高患者宜选用  
76. 围术期糖尿病患者宜选用  
77. 糖尿病肾病患者宜选用  
78. 单纯餐后血糖升高患者宜选用

[79~80]

- A. 尼尔雌醇                          B. 阿仑膦酸钠  
C. 氢氯噻嗪                          D. 尿促红素  
E. 苯妥英钠

79. 老年骨质疏松患者在维生素 D 加钙制剂的基础上,可联合选用  
80. 绝经后骨质疏松患者在维生素 D 加钙制剂治疗且无 HRT 禁忌证的基础上,可联合选用

[81~84]

- A. 胰酶                                  B. 山莨菪碱  
C. 双歧三联活菌剂                      D. 匹维溴铵  
E. 左氧氟沙星

81. 对肠道菌群失调性腹泻患者宜选用  
82. 对细菌感染的急性腹泻患者宜选用  
83. 对以腹泻为主要症状的肠易激综合征患者宜选用

84. 对消化不良性腹泻患者宜选用

[85 ~ 87]

- A. 黄酮哌酯                      B. 氟他胺  
C. 特拉唑嗪                      D. 非那雄胺  
E. 尼尔雌醇

85. 属于异丙肾上腺素  $\alpha$  受体阻断剂,可改善尿道梗阻症状的药品是

86. 属于  $5\alpha$  还原酶抑制剂,可抑制前列腺生长的药品是

87. 属于雄激素受体阻断剂,使增生的前列腺体积缩小的药品是

[88 ~ 89]

- A. 乙胺丁醇                      B. 氨苄西林  
C. 莫西沙星                      D. 氧氟沙星  
E. 吡嗪酰胺

88. 可以杀伤结核杆菌,最大限度降低传染性的早期杀菌活性药是

89. 可以杀灭组织细胞内停留的结核杆菌,最大限度减少结核病复发的灭菌活性药是

[90 ~ 91]

- A. 高血压的临床表现  
B. 糖尿病的临床表现  
C. 高脂血症的临床表现  
D. 消化性溃疡的临床表现  
E. 支气管哮喘的临床表现

90. 呼吸困难、胸闷、咳嗽、发绀属于

91. 多饮、多尿、多食、体重减轻属于

[92 ~ 95]

- A. 氟康唑                          B. 米诺环素  
C. 阿奇霉素                      D. 左氧氟沙星  
E. 庆大霉素

92. 牙齿黄染及牙釉质发育不全的药物是

93. 动物承重关节发育不良的药物是

94. 耳蜗神经损伤及耳毒性的药物是

95. 因体内肝酶不足,易发生灰婴综合征的药物是

[96 ~ 99]

- A. 血尿酸和肌酐升高  
B. 呼吸窘迫综合征  
C. 肝坏死  
D. 深静脉血栓形成  
E. 骨质疏松症

96. 胺碘酮偶致的不良反应是

97. 环孢素所致严重的不良反应是

98. 肝素长期应用所致严重的不良反应是

99. 对乙酰氨基酚大量应用所致的不良反应是

[100 ~ 102]

- A. 右雷佐生                      B. 奥美拉唑  
C. 雷尼替丁                      D. 维生素  $B_6$   
E. 维生素  $K_1$

100. 用华法林导致的高危出血倾向可选用

101. 氯吡格雷导致的溃疡和出血可选用

102. 多柔比星导致的充血性心力衰竭可选用

[103 ~ 104]

- A. 伊曲康唑                      B. 环磷酰胺  
C. 氢氯噻嗪                      D. 沙丁胺醇  
E. 利福平

103. 可使环孢素血浆浓度升高的药物是

104. 可使环孢素血浆浓度降低的药物是

[105 ~ 107]

- A. 甲硫咪唑                      B. 硫酸镁  
C. 氯丙嗪                          D. 氯喹  
E. 氯化钾

105. 孕妇使用可影响胎儿甲状腺功能,导致死胎的药物是

106. 孕妇使用可引起婴儿视神经损害、智力障碍和惊厥的药物是

107. 孕妇使用可致婴儿视网膜病变的药物是

[108 ~ 109]

- A. 四环素                          B. 红霉素  
C. 青霉素                          D. 氟康唑  
E. 头孢唑林

108. 哺乳期妇女服用后可从乳汁分泌的弱碱性药物是

109. 哺乳期妇女服用后可从乳汁分泌的弱酸性药物是

[110 ~ 113]

- A. 黄斑变性                      B. 心脏毒性  
C. 皮肤反应                      D. 心血管反应  
E. 周围神经炎

110. 用己烯雌酚能引起

111. 国外信息报道罗非昔布的不良反应为

112. 国外信息报道卡马西平的不良反应为

113. 国外信息报道提高维生素  $B_6$  用量的不良反应为

[114 ~ 115]

- A. 庆大霉素                      B. 阿米卡星

- C. 妥布霉素  
E. 链霉素
114. Gentamycin 是
115. Tobramycin 是
- [116 ~ 120]
- A. 硝普钠注射液  
C. 脂肪乳  
E. 巴曲酶注射液
116. 需要避光保存的是
117. 易受湿度影响的是
118. 2 ~ 10℃ 保存的是
119. 避光, 5℃ 以下保存的是
120. 凉暗处保存的是
- 三、多项选择题(共 20 题, 每题 1 分, 每题的备选项中有 2 个或 2 个以上正确答案, 错选或少选均不得分)**
121. 药物警戒的工作内容有
- A. 药品不良反应监测  
B. 上报用药差错  
C. 药品价格监测  
D. 上报治疗失败  
E. 注意已知的不良反应发生率异常上升
122. 药师承接护士用药咨询的主要内容有
- A. 药品的适宜溶剂  
B. 药品的稀释容积  
C. 药品的质量标准  
D. 药品的上市时间  
E. 药品的滴注速度
123. 长期应用可与维生素 K 竞争性结合谷氨酸 - γ 羟化酶, 导致出血的药品有
- A. 利巴韦林  
C. 拉氧头孢  
E. 头孢米诺
- B. 头孢美唑  
D. 人促红素
124. 抗结核病化学治疗的作用包括
- A. 防止结核变异菌株产生耐药性  
B. 早期迅速杀灭结核分枝杆菌  
C. 消灭体内残留菌, 最大限度减少复发  
D. 提高患者的用药依从性  
E. 促进循环免疫复合物形成和自身抗体的形成
125. 儿童用药剂量的根据有
- A. 儿童的年龄  
C. 儿童的身高  
E. 按成人剂量折算
- B. 儿童的体重  
D. 儿童的体表面积

126. 表现为血肌酐检测值增高的疾病有
- A. 急性肾小球肾炎  
B. 肾移植术后排异  
C. 肾病综合征  
D. 类风湿关节炎  
E. 胃十二指肠溃疡
127. 临床称为“大三阳”的乙型肝炎者血清学检查呈阳性的标志物有
- A. 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)  
B. 血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)  
C. 乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)  
D. 乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)  
E. 乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)
128. 服用双膦酸盐时应注意的事项有
- A. 为减少不良反应, 不得合并应用其他双膦酸盐  
B. 应于早晨空腹给药  
C. 服后 10min 内宜平卧  
D. 宜用足量水送服  
E. 可与铁剂合用, 以提高生物利用度
129. 关于婴幼儿期用药特点的叙述, 正确的有
- A. 口服给药时以糖浆剂为宜  
B. 肌内注射给药不影响吸收  
C. 使用吗啡易引起呼吸抑制  
D. 使用氯茶碱无兴奋神经系统作用  
E. 应用中枢镇静药时年龄愈小耐受力愈大
130. 可引起体位性低血压的抗高血压药有
- A. 哌唑嗪  
C. 利血平  
E. 硝普钠
- B. 乌拉地尔  
D. 氯沙坦
131. 对于消化性溃疡合并风湿热的患者会诱发溃疡、出血、穿孔的药物有
- A. 阿司匹林  
C. 泼尼松  
E. 保泰松
- B. 青霉素  
D. 四环素
132. 肺结核的临床表现有
- A. 干咳  
C. 乏力  
E. 午后低热、盗汗
- B. 咯血  
D. 大量脓臭痰
133. 非处方药的特点是
- A. 购买时不需医师处方  
B. 给药途径以口服、外用为主

- C. 只在药店、超市销售  
 D. 不在专业(医药)期刊登广告  
 E. 没有新药专利保护
134. 临床常需要进行治疗药物监测的是  
 A. 苯妥英钠                      B. 阿司匹林  
 C. 万古霉素                      D. 他克莫司  
 E. 甲氨蝶呤
135. 可促进肌肉发达,运动员禁用的多肽激素是  
 A. 人促红素                      B. 人生长激素  
 C. 精蛋白锌胰岛素              D. 利妥昔单抗  
 E. 促性腺激素
136. 阿片类药物中毒拮抗的药物是  
 A. 阿扑吗啡                      B. 尼可刹米  
 C. 纳洛酮                         D. 烯丙吗啡  
 E. 维库溴铵
137. 利用医药品的 B/A 值(B = 销售金额排序, A = 药品 DDDS 排序)对 5 种药品进行药频度分析, 得出下列数值中,可反映出药价偏高,患者接受程度低的有  
 A.  $B/A = 1.0$                       B.  $B/A = 0.6$   
     C.  $B/A = 3.0$                       D.  $B/A = 1.5$   
     E.  $B/A = 0.8$
138. 下列原料药中易风化的药品有  
 A. 硫酸阿托品                      B. 胃蛋白酶  
 C. 硫酸镁                         D. 硫酸钠  
 E. 氯化钠
139. 药历的主要内容应涵盖  
 A. 患者自身资料  
 B. 已知的药物过敏史  
 C. 同时合并应用的药品  
 D. 药物治疗的成本  
 E. 对药物治疗的建设性意见
140. 以下对药品养护工作的说法,正确的是  
 A. 应建立药品养护档案  
 B. 对储存时间长的药品应抽样送检  
 C. 库存养护中如发现质量问题,应暂停发货  
 D. 对药品库应每天上、下午各做一次温度、湿度记录  
 E. 对于发现质量问题药品的相邻批号药品,应进行抽样送检