

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

妇产科

副主任、主任医师资格考试

冲刺模拟卷



上海科学技术出版社

10套模拟试卷/1000道试题
紧扣考试大纲/题型全面丰富
两种版本互动/随时随地复习
自动批阅判分/汇总错题重做



妇产科副主任、主任医师 资格考试冲刺模拟卷

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

妇产科副主任、主任医师资格考试冲刺模拟卷 / 高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编. —上海: 上海科学技术出版社, 2018.1

考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试
ISBN 978-7-5478-3737-5

I. ①妇… II. ①高… III. ①妇产科学—资格考试—习题集 IV. ①R71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 256253 号

激活码粘贴处

妇产科副主任、主任医师资格考试冲刺模拟卷
高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co

印刷

开本 850×1168 1/8 印张 13.25

字数 340 千字

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-3737-5/R·1474

定价: 58.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题, 请向工厂联系调换

前 言

为了进一步深化卫生专业职称改革,2000 年人事部、卫生部下发了《关于加强卫生专业技术职务聘请工作的通知》。通知要求,卫生专业的副高级技术资格通过考试与评审相结合的方式获得;正高级技术资格通过评审委员会答辩后获得。根据通知精神和考试工作需要,副高级技术资格考试在全国各省、自治区、直辖市职称改革领导小组的领导下设立了多个考区。目前,很多地区正高级技术资格的评审工作也逐渐采用考评综合的方法。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘请相应技术职称的必要依据。

考试是为了加强临床医务人员对学科知识的系统了解和掌握,是提高医疗质量的一种手段。我国每年有 20 万以上需要晋升副高级和正高级职称的卫生专业人员,这些高级技术人员是我国医学发展的中坚力量,身兼承上启下的重任。本书不仅可以帮助广大考生通过考试,还可以使考生的专业知识更加扎实与牢固,以面对更加艰巨的任务。

为了帮助考生做好考前复习,我们仔细分析考试的命题规律和考试特点,严格按照考试大纲的要求,编写了本套“考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试”系列。每套冲刺模拟试卷包含 10 套习题,包括单选题、多选题、共用题干题和案例分析题 4 种题型。内容紧扣考试大纲,题型全面,题量丰富,具有很高的考试指导价值。

大纲将专业知识的要求分为 3 个层次,分别是“了解”“熟悉”“掌握”。安排题型难易程度,好比一棵树,掌握内容是主干部分,熟悉内容是分枝,而了解内容则是树叶。本套书按照以主干为主、分枝为其次、树叶为辅的要求编排,针对性强,突出重点。可以检验过往的复习成果,起到查漏补缺的作用。

为了方便考生复习迎考,本套冲刺模拟试卷包括纸质版和配套的手机 APP 应用版,做到随时随地互动复习,反复演练。配有同步练习题,自动批阅评分,并汇总错题强化训练,掌握做题技巧及命题规律,使广大考生轻松通过考试。

由于编写时间及水平有限,书中难免有疏漏与不足之处,希望广大考生与学者批评与指正。

考试命题研究委员会
2017 年 8 月

目 录

冲刺模拟卷一	(1)
冲刺模拟卷二	(11)
冲刺模拟卷三	(21)
冲刺模拟卷四	(31)
冲刺模拟卷五	(41)
冲刺模拟卷六	(51)
冲刺模拟卷七	(61)
冲刺模拟卷八	(71)
冲刺模拟卷九	(81)
冲刺模拟卷十	(91)
参考答案	(101)



冲刺模拟卷一

一、单选题：以下每道考题有 5 个备选答案,请选择 1 个最佳答案

- 雌激素与下列哪项激素共同作用维护血中钙磷平衡
 - 肾上腺皮质激素
 - 降钙素
 - 甲状腺素
 - 甲状旁腺素
 - 雄激素
- 关于妊娠期血液系统的改变,以下哪项是错误的
 - 妊娠 6 周开始,血容量增加,32~34 周达到高峰
 - 妊娠期血液稀释,血红蛋白稍低,白细胞偏高
 - 血小板增加
 - 血沉加快
 - 纤维蛋白原增加
- 初产妇,临产 8 小时,肛查: 头先露,宫口已开全,S+4,此时产力的组成是
 - 子宫收缩力
 - 子宫收缩力+腹肌收缩力
 - 子宫收缩力+膈肌收缩力
 - 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力
 - 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力+肛提肌收缩力
- 心脏病孕妇最危险的时期是
 - 妊娠 35~38 周
 - 妊娠 32~34 周
 - 妊娠 24~27 周
 - 妊娠 28~31 周
 - 产褥期 7 天之后
- 阴道自净作用中,能将糖原分解为乳酸的细菌是
 - 加德纳菌
 - 乳酸杆菌
 - 链球菌
 - 大肠埃希菌
 - 葡萄球菌
- 妊娠期高血压疾病产妇,血压 160/110 mmHg,宫缩乏力产后出血,首选
 - 硫酸镁
 - 酚妥拉明
 - 缩宫(催产素)
 - 麦角新碱
 - 地西洋(安定)
- 较大子宫壁间肌瘤的主要症状为
 - 月经间隔时间长,持续时间短
 - 绝经后出血
 - 月经过多
 - 接触性出血
 - 不规则阴道出血
- 28 岁女性,结婚 4 年不孕,月经规律,量中等,痛经 2 年,需服止痛药物。末次月经近干净时突然发生剧烈性下腹痛就诊。妇科检查: 子宫后位,稍大,活动欠佳,双侧卵巢增大,约 6 cm×4 cm×4 cm 大小,右侧宫骶韧带处可触及 2 个黄豆大小硬结,有触痛。本例应首先考虑
 - 肿物蒂扭转
 - 巧克力囊肿破裂
 - 并发急性盆腔炎
 - 异位妊娠
 - 痛经
- 胎儿电子监护中,下列哪项提示胎儿宫内窘迫
 - 胎动后胎心率加速>15 次/分(bpm),持续时间>15 秒
 - 子宫收缩后胎心率基线增加 15 次/分以上,持续时间>15 秒
 - 胎心率减速与子宫收缩同时出现,宫缩后迅速恢复正常,下降幅度>50 次/分,持续时间短,恢复快
 - 胎心率与宫缩无恒定关系的减速,下降迅速且幅度较大(>70 次/分),持续时间长短不一,恢复迅速
 - 子宫收缩开始后一段时间,出现胎心率减慢,但下降缓慢,下降幅度<50 次/分,持续时间长,恢复慢
- 27 岁初产妇,妊娠 40 周临产,嵌顿性肩先露,手脱出于阴道口外,胎心 136 次/分,宫口开全,缩复环在脐耻之间。本例最恰当的处理是
 - 立即行剖宫产术
 - 立即将手消毒后送回阴道
 - 乙醚深麻醉下行内转胎位术
 - 立即行剖宫产术,并随即切除子宫
 - 内转胎位术后产钳助产
- 24 岁女性,原发性闭经,身高 1.34 m,第二性征未发育,有蹼颈、肘外翻,生殖器呈幼稚型。应诊断为
 - 先天性子宫发育不全
 - 侏儒症
 - Turner 综合征
 - 21-三体综合征
 - 47,XXX 综合征(超雌综合征)
- 26 岁已婚妇女,结婚 3 年未孕,现停经 52 天,阴道少量流血 4 天。今晨突感下腹剧痛,伴明显肛门坠胀感,血压 60/40 mmHg。妇科检查: 宫颈举痛明显,子宫稍大稍软,右附件区有明显触痛。本例的恰当处置应是
 - 立即行刮宫术

- B. 输液输血,观察病情进展
C. 立即行剖腹探查术
D. 输液输血,同时行剖腹探查术
E. 待纠正休克后行剖腹探查术
13. 下列各项检查中哪项不能提示胎儿储备能力良好
A. FHR 基线为静止型
B. 胎动良好
C. NST 试验为反应型
D. OCT 试验为阴性
E. 12 小时胎动 30 次
14. 26 岁初孕妇,停经 6 周时出现阴道断续少量流血来院。妇科检查:子宫大小与停经周数相符,软,宫口未开,见少许新鲜血液自宫口流出。尿妊娠试验阳性。正确的处理应是
A. 引产
B. 药物流产
C. 肌内注射黄体酮
D. 安静卧床
E. 吸宫术
15. 对于输卵管结扎术的适应证,哪项是不恰当的
A. 心脏病患者心功能 II ~ III 级
B. 已婚妇女计划生育要求绝育
C. 有慢性盆腔炎者
D. 第 2 次剖宫产时
E. 滞产后
16. 关于缩宫(催产素)的生物合成及结构,不正确的是
A. 多肽类物质
B. 在下丘脑的视上核合成
C. 储存在神经垂体
D. 缩宫素又称加压素
E. 为水溶性物质
17. 容易继发胸、腹腔积液的卵巢良性肿瘤是
A. 皮样囊肿
B. 浆液性囊腺瘤
C. 纤维瘤
D. 黏液性囊腺瘤
E. 卵泡膜细胞瘤
18. 女性,45 岁,已婚。妇科学查宫颈刮片细胞学检查报告为 CIN III。妇科检查:宫颈中度糜烂,子宫体正常大小,活动度好,两侧附件无异常。下一步的辅助检查应选择
A. 定期随访
B. 阴道镜检查
C. 宫颈锥切术
D. 再次宫颈刮片
E. 阴道镜下宫颈定位活检
19. 女性,23 岁,未婚。发现下腹部包块 1 年,急性下腹痛 10 小时。肛门检查:子宫右侧扪及 8 cm×8 cm×6 cm 大小包块,边界清楚,有明显压痛。该患者的治疗原则应为
A. 继续观察
B. 行剖腹探查术
C. 大量抗生素预防感染
D. 用止痛药物
E. 行后穹窿穿刺术
20. 27 岁,停经 11 周,阴道少量出血 1 周。宫底耻骨上 3 横指,尿妊娠试验阳性。下述哪项检查最有助于鉴别诊断
A. 诊断性刮宫
B. 盆腔 B 超
C. 胸片
D. 头部 CT
E. 血 hCG 定量检查
21. 27 岁初产妇,妊娠 40 周,规律宫缩 24 小时。检查:宫口开大 4 cm,胎头前囟位于耻骨联合后方,胎膜已破,羊水混浊,呈绿色,胎心率 104 次/分。本例最恰当的处置是
A. 等待宫口开全后产钳助娩
B. 等待自然分娩
C. 静脉滴注地诺前列酮
D. 静脉滴注缩宫素
E. 剖宫产术
22. 初产妇,足月临产 18 小时,宫口扩张停滞已 3 小时。消毒下阴道检查:宫口开 6 cm,胎头矢状缝在右斜位上,小囟门在 7 点处,S+1,骶骨平直,坐骨棘较突,坐骨切迹容 2 横指。其滞产的原因是
A. 入口狭窄
B. 中骨盆狭窄
C. 出口狭窄
D. 头盆不称
E. 潜伏期延长
23. 某产妇,产后 2 周出现弛张热,下腹疼痛并且压痛明显,下肢肿胀疼痛,皮肤紧张发白。最可能的诊断是
A. 子宫肌炎
B. 血栓性静脉炎
C. 急性盆腔结缔组织炎
D. 急性盆腔腹膜炎
E. 产后关节炎
24. 24 岁,G₁P₀,孕 39 周,胎膜早破 5 天临产入院。因第二产程延长进行产钳助娩,产后出血 300 ml。产后第 3 天产妇高热,体温 39.3℃,宫底平脐,左宫旁压痛明显,恶露血性,混浊有味。血白细胞 23×10⁹/L,中性粒细胞 90%。以下哪项处理不当
A. 入院后臀下放置无菌垫,保持外阴清洁
B. 助产后仔细检查软产道
C. 为了解产程进展,多次行阴道检查

- D. 预防产后出血
E. 产后使用广谱抗生素

25. 双胎妊娠,足月分娩,产后 1 小时,阴道出血 300 ml,挤压宫底排出血块约 300 ml 后,子宫可被扪及。测血压 110/70 mmHg。首先需要的处理是
A. 输血输液
B. 检查软产道
C. 查血小板、凝血酶原时间,做 3P 试验
D. 阴道填塞纱布条
E. 选用子宫收缩剂

二、多选题: 以下每道考题有 5 个备选答案,每题至少有 2 个正确答案

26. 对于子宫峡部描述恰当的是
A. 在非妊娠期长约 1 cm
B. 是子宫体与子宫颈之间最狭窄的部位
C. 峡部的上端称为组织学内口
D. 峡部的下端称为解剖学内口
E. 临产后子宫下段长 7~10 cm

27. 胎心率晚期减速的特点是
A. 胎心率下降幅度<50 次/分
B. 多在子宫收缩高峰后出现
C. 下降缓慢,恢复亦缓慢
D. 持续时间长
E. 是胎儿缺氧表现

28. 足月妊娠孕妇,终止妊娠前下述哪些检查是必要的
A. 超声波检查,测量双顶径
B. 详细询问病史,确定胎龄
C. 胎盘功能测定
D. X 线骨盆测量
E. 胎儿成熟度检查

29. 子宫胎盘卒中的处理
A. 宫壁上注射子宫收缩药
B. 按摩子宫
C. 经积极处理后,子宫仍不收缩,立即切除子宫
D. 处理过程中出现血液不凝,立即切除子宫
E. 静脉点滴麦角新碱

30. 初产妇,孕 36 周,因上楼时心悸、气促就诊。查体: 心率 88 次/分,呼吸 22 次/分,血压 140/90 mmHg,心界稍向左侧扩大,心尖部及肺动脉瓣区均可闻及 II 级收缩期杂音,左肺底偶闻及啰音,下肢水肿(+),尿蛋白(+). 可能的诊断是
A. 风湿性心脏病,心力衰竭
B. 心脏病待除外
C. 正常妊娠改变
D. 妊娠高血压综合征

- E. 妊娠高血压综合征性心脏病

31. 病毒性肝炎的母婴传播哪些是恰当的
A. 甲型肝炎主要通过粪-口传播,也可通过母婴传播
B. 乙型肝炎主要通过母婴传播
C. 丙型肝炎主要通过输血、血制品、注射等传播,也可通过母婴传播
D. 丁型肝炎主要通过性传播,通过母婴传播少见
E. 戊型肝炎不会通过母婴传播

32. 关于非淋菌性尿道炎,下列说法正确的是
A. 75%乙醇可将衣原体迅速杀死
B. 男女双方的尿道刺激症状都较严重
C. 新生几分娩时引起的感染以结膜炎和肺炎为主
D. 临床中相当多数量的患者症状不明显或无症状
E. 女性患者,一般不引起阴道炎

33. 发现脐带脱垂在立即行剖宫产的准备期间,应注意采取哪些措施
A. 产妇应采取头高臀低位
B. 脐带应消毒后回纳阴道内
C. 产妇应采取头低臀高位
D. 用手将胎先露推至骨盆入口以上
E. 术者的手保持在阴道内

34. 羊水栓塞 DIC 阶段的处理原则是
A. 抗休克
B. 早期抗凝
C. 补充凝血因子
D. 晚期抗纤维蛋白溶解,同时补充凝血因子
E. 晚期抗纤维蛋白溶解

35. 女,28 岁。月经规则,妊娠试验阳性,子宫附件出现肿块,应考虑
A. 输卵管妊娠
B. 附件炎性肿块
C. 黄素囊肿
D. 黄体囊肿
E. 卵巢肿瘤

36. 外阴瘙痒的病因有
A. 特殊感染
B. 药物过敏
C. 糖尿病
D. 维生素 A、B 缺乏
E. 经前期外阴部充血

37. 下面有关子宫内膜癌说法,恰当的是
A. 病变多见于宫底部内膜
B. 高发年龄是 58~61 岁
C. 转移途径主要为血行转移
D. 绝大多数是鳞癌

- E. 晚期患者可用大剂量孕激素治疗
38. 子宫肌瘤发生红色变性的常见症状为
- A. 子宫增大
- B. 可有发热
- C. 常有腹痛
- D. 肌瘤内出血
- E. 阴道大量出血

39. 对于绒毛膜细胞癌的治疗,下列说法中不恰当的是
- A. 临床症状、体征消失,hCG 连续 3 次检查均阴性,应继续巩固 1 个疗程后停药
- B. 虽然还有临床体征,但 β -hCG 已经持续 3 周阴性,可以立即停止化疗
- C. 病变局限于子宫,化疗无效或耐药者,应考虑全子宫、双附件切除术
- D. 严重的化疗反应致造血、肝、肾功能损害,应暂时停药,纠正后再化疗
- E. 巩固化疗,停药后随访 2 年无复发者为临床痊愈

40. 多囊卵巢综合征的内分泌特点包括
- A. 雌激素过多
- B. 促性腺激素比例失调
- C. 雄激素过多
- D. 孕激素过多
- E. 胰岛素过多

41. 治疗子宫内膜异位症的药物有
- A. 达那唑
- B. 尼尔雌醇
- C. 孕三烯酮
- D. GnRH-a
- E. 罗红霉素

42. 子宫脱垂常伴有的是
- A. 阴道前后壁膨出
- B. 张力性尿失禁
- C. 阴道不规则出血
- D. 宫颈延长
- E. 子宫前移

43. 手术流产的并发症有
- A. 体重增加
- B. 人工流产综合反应
- C. 子宫穿孔
- D. 吸宫不全
- E. 色素沉着

44. 哪些适于腹腔镜的应用
- A. 功能性子宫出血的治疗
- B. 子宫内膜异位症的诊断与治疗
- C. 子宫肌瘤剔除术
- D. 单纯卵巢肿物切除或剥离术

- E. 异位妊娠病灶切除或输卵管开窗术
45. 宫颈鳞癌分型有
- A. 外生型
- B. 内生型
- C. 溃疡型
- D. 颈管型
- E. 混合型

三、共用题干题：以下每道考题有 2~6 个提问,每个提问有 5 个备选答案,请选择 1 个最佳答案

(46~48 题共用题干)

女,30 岁。近半年发现外阴部肿块,2 日前出现疼痛。检查:体温 38℃,在大阴唇后有一囊性肿物,约 7 cm×5 cm×4 cm 大小,表面红、肿、热,触痛明显,有波动感。

46. 本例最可能的诊断是
- A. 前庭大腺炎
- B. 外阴囊肿
- C. 前庭大腺囊肿
- D. 外阴肿瘤
- E. 前庭大腺脓肿
47. 本例最恰当的处理是
- A. 观察
- B. 局部用抗生素湿敷
- C. 局部热敷
- D. 切开引流术,并用抗生素控制感染
- E. 抗生素控制感染,暂不考虑行切开引流术

48. 本例不恰当的处理是
- A. 中药活血化瘀治疗
- B. 卧床休息
- C. 选用广谱抗生素
- D. 确定病原体
- E. 囊肿剥除

(49~51 题共用题干)

26 岁初孕妇,现妊娠 40 周,近半月头疼、眼花,今晨出现剧烈头疼并呕吐 2 次来院就诊。

49. 最有价值的病史是
- A. 既往无头疼史
- B. 既往血压正常
- C. 有高血压病家族史
- D. 有病毒性肝炎史
- E. 有多次泌尿系感染史
50. 与慢性肾炎鉴别,最有价值的检查结果是
- A. 尿素氮值升高
- B. 尿素值升高





- C. 尿酸值升高
 - D. 肌酸值升高
 - E. 肌酐值升高
51. 胎心率 176 次/分,此时恰当的处理是
- A. 静脉滴注硫酸镁
 - B. 静脉快速滴注甘露醇
 - C. 对症处理
 - D. 立即行剖宫产术
 - E. 立即行缩宫素滴注引产

(52~54 题共用题干)

女,25 岁。妊娠 24 周时 B 超报告: 胎盘位于子宫前壁下段,部分覆盖宫颈内口。产科检查正常。

52. 根据 B 超及结合临床检查,此时哪种考虑是适宜的
- A. 部分性前置胎盘
 - B. 中央性前置胎盘
 - C. 边缘性前置胎盘
 - D. 正常胎盘位置
 - E. 胎盘前置状态
53. 该孕妇于妊娠 37 周时突然阴道多量出血,不伴腹痛,急诊入院。检查: 血压 90/60 mmHg, 脉搏 100 次/分,宫高 33 cm,胎心率 140 次/分,LOA,头浮,无宫缩,阴道出血估计 200 ml。此时应行何种处理
- A. 人工破膜引产
 - B. 静脉点滴缩宫素引产
 - C. 给予宫缩抑制剂
 - D. 子宫体部剖宫产
 - E. 子宫下段横切剖宫产

54. 下列哪项不是前置胎盘的并发症

- A. 产后出血
- B. 产褥感染
- C. 子宫破裂
- D. 胎儿宫内窘迫
- E. 新生儿窒息

(55~57 题共用题干)

女,27 岁。诉外阴瘙痒、剧痛 3 天,影响走路,自觉头痛、发热、全身乏力。追问病史,10 天前有不洁性交史。查体: 外阴、肛周及大腿根部可见小红色丘疹及小水疱,个别有溃疡。

55. 该患者应做的检查是
- A. 宫颈刮片
 - B. 水疱液培养
 - C. B 超检查
 - D. 阴道脱落细胞检查
 - E. 子宫内膜活检

56. 该患者的诊断可能为

- A. 尖锐湿疣
- B. 淋病
- C. 生殖器疱疹
- D. 梅毒
- E. 艾滋病

57. 治疗该病,目前首选

- A. 冷冻
- B. 青霉素
- C. 阿昔洛韦
- D. 足叶草毒素酊
- E. 目前尚无有效治疗方法

(58~60 题共用题干)

经产妇,孕 36 周,先兆子痫,单胎头位,合并右侧卵巢囊肿。入院时曾有外伤史,宫颈 Bishop 评分 3 分。给予米索前列醇 50 μ g 阴道放置引产,间隔 6 小时,再次阴道放入米索前列醇。产妇自述下腹较痛,宫缩 1~2 分钟一次,持续 50~60 秒,强度(+),阴道出血较多,色鲜红,宫口开大 1 cm。半小时后,产妇突然自述下腹剧痛,随即面色苍白,大汗淋漓,血压 50/30 mmHg,心率 140 次/分,弱,宫口全开,胎心无。

58. 此产妇哪项诊断的可能性最大

- A. 胎盘早剥
- B. 卵巢囊肿扭转
- C. 卵巢囊肿破裂
- D. 子宫破裂
- E. 肝破裂

59. 首选的辅助检查是哪项

- A. CT
- B. 阴道检查
- C. B 超
- D. X 线片
- E. 磁共振

60. 首选的处理是哪项

- A. 抢救休克,同时及时剖腹检查
- B. 抢救休克,同时阴道毁胎
- C. 抢救休克,同时待死胎自然娩出
- D. 抢救休克,同时产钳分娩
- E. 抢救休克,同时吸引器分娩

四、案例分析题: 每个案例至少有 3 个提问,每个提问有多个备选答案,其中正确答案有 1 个或几个

(61~65 题共用题干)

初产妇,40 周妊娠,规律宫缩 17 小时。现宫口开大 3 cm 半小时,胎膜未破,先露头,S-0,宫缩(20~30)秒/(5~6)分,弱,规律。

61. 下列哪项诊断恰当

- A. 潜伏期延长
B. 活跃期延长
C. 活跃期停滞
D. 第二产程延长
E. 滞产
F. 第二产程停滞
62. 此产妇目前子宫收缩情况是
A. 高张性子宫收缩乏力
B. 子宫收缩过强
C. 低张性子宫收缩乏力
D. 子宫痉挛性狭窄环
E. 病理性缩复环
F. 生理性缩复环
63. 此产妇目前应如何处理
A. 缩宫素静滴加强宫缩
B. 人工破膜, 观察宫缩, 必要时缩宫素静滴
C. 剖宫产术
D. 卧床休息, 顺其自然
E. 消除紧张, 鼓励多进食
F. 口服沙丁胺醇
64. 若出现频繁晚期减速, 最佳处理方法是
A. 抑制子宫收缩
B. 继续监测, 明确原因
C. 补充能量, 加强产力
D. 行人工破膜术, 了解羊水性状
E. 行剖宫产术终止妊娠
F. 静脉滴注硫酸镁
65. 不属于正常分娩的临床表现有
A. 生理性缩复环自腹部不易被见到
B. 产妇屏气标志宫口开全
C. 胎膜破裂多在第一产程末
D. 第三产程需 30 分钟
E. 胎头以枕下前囟径通过产道
F. 在潜伏期应每隔 1~2 小时听胎心 1 次
- (66~68 题共用题干)
女, 26 岁。8 个月前行剖宫产术, 现停经 7 周, 要求终止妊娠。
66. 患者终止妊娠的方法可采用
A. 依沙吖啶(利凡诺)羊膜腔注射
B. 水囊引产
C. 负压吸引
D. 缩宫素引产
E. 天花粉羊膜腔引产

- F. 米非司酮药物流产
G. 钳刮术
67. 患者若采用负压吸引术终止妊娠, 手术可能出现的并发症为
A. 子宫穿孔
B. 羊水栓塞
C. 术中出血多
D. 人工流产综合反应
E. 漏吸
F. 感染
68. 患者于负压吸引术后 1 周, 突然阴道流血增多, 伴腹痛、发热。查体: 子宫稍大, 软, 压痛(+), 附件正常。为确诊应行的检查是
A. 血 hCG
B. 宫腔镜
C. B 超
D. 腹部平片
E. 子宫造影
F. 血常规
- (69~76 题共用题干)
女, 47 岁, 体型肥胖。近 3 天白带增加伴外阴瘙痒。妇科检查: 外阴部充血, 阴道黏膜充血, 分泌物呈黄色泡沫状; 宫颈充血, 轻度糜烂; 附件未及包块等异常。
69. 首选的辅助检查是
A. 血常规
B. 尿常规
C. 阴道分泌物涂片细胞学检查
D. 阴道分泌物细菌培养
E. 宫颈分泌物检查见衣原体、支原体
F. 血培养
G. 宫颈诊刮找癌细胞
70. 初步的诊断是
A. 滴虫性阴道炎
B. 淋菌性阴道炎
C. 阿米巴性阴道炎
D. 真菌性阴道炎
E. 老年性阴道炎
71. 已确诊的治疗方法为
A. 制霉菌素片阴道塞药
B. 青霉素肌内注射
C. 甲硝唑口服及阴道塞药
D. 喹碘片口服
E. 己烯雌酚片阴道塞药
F. 其丈夫同服甲硝唑片
72. 滴虫性阴道炎的传播方式及其特征是





- A. 经性交直接传播
B. 男性感染滴虫后常无症状,易成感染源
C. 经公共浴池、浴盆、浴巾传播
D. 经游泳池传播
E. 坐式便器传播
F. 拥抱、握手传播
G. 污染器械、辅料的传播
73. 查滴虫的正确取材及检测方法是
A. 在阴道分泌物中找到滴虫即可确诊
B. 取分泌物前 24~48 小时避免性交、阴道灌药
C. 最简便的方法是生理盐水悬滴法
D. 取分泌物时窥器不涂润滑剂
E. 取分泌物时注意保暖,及时送检
F. 对可疑患者,若多次湿片法未能发现滴虫时,可送培养
74. 阴道毛滴虫的特点是
A. 阴道毛滴虫能在 25~42℃ 条件下生长繁殖
B. 阴道毛滴虫能在 50~60℃ 条件下生长繁殖
C. 适宜于毛滴虫生长的 pH 是<5
D. 适宜于毛滴虫生长的 pH 是>7.5
E. 在 3~5℃ 的低温可生存 21 天
F. 在半干燥环境中生存约 10 小时
G. 在普通肥皂水中能生存 45~120 分钟
75. 阴道镜检滴虫(+)患者治疗失败时应采用的治疗方案是
A. 应用甲硝唑 400 mg,每日 2~3 次,连服 7 天
B. 治疗期间可性交
C. 不能耐受药物或不宜全身用药者,可选择阴道局部用药
D. 单独局部用药的疗效比全身用药好
E. 局部用药的治愈率>50%
F. 滴虫性阴道炎可于月经期后复发,治疗后需随诊至症状消失
G. 复发病例多数为重复感染,内裤及洗涤用的毛巾需煮沸 5~10 分钟
76. 关于用甲硝唑治疗滴虫性阴道炎,下列错误的是
A. 初次治疗选择甲硝唑单次口服
B. 也可选择甲硝唑 400 mg,每日 2~3 次,连服 7 天
C. 口服药物的治愈率为 90%~95%
D. 口服药物的偶见胃肠反应:食欲减退、恶心、呕吐
E. 可见头痛、皮疹、白细胞减少
F. 甲硝唑可通过乳汁排泄,若在哺乳期用药,用药期间不宜哺乳
(77~80 题共用题干)

女,41 岁。因“停经 13 周,阴道不规则出血 10 天”入院。查体:宫底耻骨上 3 横指,未闻及胎心。尿妊娠试验阳性。B 超检查见宫腔内充满弥漫分布的光点和小囊样无回声区图像。胸片正常。

77. 最可能的初步诊断是什么

- A. 侵蚀性葡萄胎
B. 先兆流产
C. 不全流产
D. 绒毛膜癌
E. 良性葡萄胎
F. 稽留流产
78. 需采用何种治疗
A. 化疗
B. 子宫切除术
C. 诊刮术
D. 放疗
E. 观察
F. 子宫双侧附件切除术
79. 诊刮病理检查提示滋养细胞增生,可见绒毛结构。应诊断为
A. 侵蚀性葡萄胎
B. 先兆流产
C. 不全流产
D. 绒毛膜癌
E. 良性葡萄胎
F. 稽留流产
80. 葡萄胎刮宫后 5 个月,妊娠试验由阴性转阳性,肺部有散在棉絮状阴影。最大可能是
A. 侵蚀性葡萄胎
B. 绒毛膜癌
C. 宫内妊娠
D. 子宫肌瘤合并肺结核
E. 宫外孕
F. 葡萄胎

(81~86 题共用题干)

女,32 岁。妊娠 6 个月,门诊化验发现尿糖(+)。既往无糖尿病史。

81. 提示:空腹血糖 5.8 mmol/L。下一步对此患者应进行的检查有
A. 化验肾功能
B. 进行糖筛查试验
C. 做糖耐量试验
D. 再验一次尿糖
E. 再验一次空腹血糖
F. 做胎儿超声检查
82. 提示:糖筛查试验时服 50 g 葡萄糖,1 小时后测血糖 7.9 mmol/L。下一步此患者应进行何检查
A. 化验肾功能
B. 进行糖筛查试验
C. 做糖耐量试验
D. 再验一次尿糖

- E. 再验一次空腹血糖
F. 验糖化血红蛋白
83. 提示：糖耐量试验显示，空腹血糖 5.7 mmol/L，1 小时血糖 11.2 mmol/L，2 小时血糖 9.0 mmol/L，3 小时血糖 6.5 mmol/L。此患者最可能的诊断是
- A. 糖耐量正常
B. 糖耐量异常
C. 1 型糖尿病
D. 2 型糖尿病
E. 妊娠期糖尿病
F. 妊娠期高血压疾病
84. 提示：患者继续妊娠，一直控制饮食。至妊娠 32 周测空腹血糖达 8.8 mmol/L。目前控制血糖最好的药物是
- A. 胰岛素
B. 二甲双胍
C. 苯乙双胍
D. 格列苯脲
E. 消渴丸
F. 阿卡波糖(拜糖平)
85. 提示：妊娠至 36 周时，查体：BP 148/86 mmHg，水肿(++)。B 超示胎儿双顶径 9.5 cm。空腹血糖 9.2 mmol/L。最恰当的处理是
- A. 灌肠，诱发宫缩
B. 立即行剖宫产
C. 回家等待，至孕 37 周再来就诊
D. 住院促胎肺成熟，等治疗后终止妊娠
E. 静脉滴注缩宫素引产
F. 住院观察等待，至预产期再处理
86. 提示：患者行剖宫产术。术前每日用胰岛素共 30 U，术后第一天胰岛素如何应用
- A. 5 U
B. 15 U
C. 20 U
D. 30 U
E. 60 U
F. 停用

(87~89 题共用题干)

女性，38 岁。停经 37 天时阴道出血量增多。B 超提示难免流产。急诊清宫，未见绒毛组织。清宫后仍有少量阴道流血，无腹痛及发热。停经 55 天时阴道出血量明显增多伴头昏，急诊入院。B 超：宫腔内 2.2 cm×15 cm 不规则团块，内有不规则液性暗区，宫颈明显增大，回声欠均匀，前后径 4.2 cm，盆腔有 0.6 cm 液性暗区，估计出血量超过 1 000 ml。两年前剖宫产一女活婴。

87. 可能的诊断是
- A. 绒癌
B. 宫颈妊娠

- C. 胎盘部位滋养细胞肿瘤
D. 上皮样滋养细胞肿瘤
E. 失血性休克
F. 人工流产不全葡萄胎
88. 应给的处理是
- A. 再次清宫
B. 止血药
C. 输血
D. 缩宫素 10 U 静脉滴注、肌内注射
E. 快速补液
F. 多巴胺 20 mg+5%葡萄糖 500 ml 静脉滴注
89. 经抢救后仍有阴道流血，可以采取的措施是
- A. 栓塞后宫腔镜下吸出胎囊，电凝止血
B. MTX 20 mg，每日肌内注射，连用 5 天
C. MTX 50 mg 肌内注射
D. 双侧子宫动脉栓塞术
E. 子宫次全切除术
F. 巴曲酶(立止血)1 000 U 静脉滴注
G. 急诊行全子宫切除术
- (90~93 题共用题干)

65 岁，绝经后阴道不规则出血半年。检查：宫颈呈菜花样，病变累及阴道，但未达下 1/3，宫旁(一)。患者肥胖。

90. 为明确诊断，应做
- A. 阴道脱落细胞检查
B. 宫颈碘试验
C. 阴道镜检查+活检
D. 宫颈活检
E. 宫腔镜检查
91. 已确切的临床分期是
- A. Ia
B. IIa
C. IIb
D. IIIa
E. IIIb
92. 应采取的治疗是
- A. 全子宫切除
B. 扩大全子宫切除
C. 放疗
D. 广泛性子宫切除
E. 广泛性子宫切除+盆腔淋巴结清扫
93. 宫颈活检提示宫颈鳞癌。为明确临床分期，应做的辅助检查包括
- A. 胸片



- B. 淋巴造影
- C. 膀胱镜
- D. 直肠镜
- E. 盆腔 CT
- F. 消化道造影
- G. B 超

(94~97 题共用题干)

女,14 岁。体格及智力发育与同龄人相似,已出现第二性征 3 年,一直无月经来潮。近 1 年常感下腹胀痛,每 1~2 月发作一次,每次持续 3~4 天,可自然缓解。近来偶于腹痛时伴有腰骶部胀痛及肛门坠胀,亦可自然缓解。2 月前无意间发现下腹部有一包块。查体:身高 160 cm,体重 50 kg,乳房发育良好,女性体态。其他系统查体未发现异常。

94. 该患者诊断首先可考虑

- A. 子宫内膜异位症
- B. 盆腔炎
- C. 先天性处女膜闭锁
- D. 卵巢肿瘤
- E. 先天性无阴道
- F. 子宫肌瘤
- G. 原发性闭经
- H. 继发性闭经

95. 为明确诊断,对该患者首先应做何种检查

- A. 腹部 B 超
- B. 胸部 X 线片
- C. 妇科检查
- D. 染色体检查
- E. 血常规检查
- F. 心电图检查
- G. 肿瘤标志物检查
- H. 肝肾功能检查

96. 该患者妇科检查见阴阜、大小阴唇、阴蒂均发育正常,阴道前庭内未见阴道开口,仅于相应位置见直径约 1 cm 的紫蓝色组织向外膨出。直肠-腹部检查:于阴道相应部位可扪及直径约 3 cm 的条索状物,盆腔内可扪及直径约 10 cm 的圆形包块,边界尚清晰,无压痛。双附件区均未扪及异常。该患者的诊断考虑是

- A. 外阴肿瘤
- B. 阴道肿瘤
- C. 子宫内膜异位症
- D. 先天性处女膜闭锁
- E. 先天性无阴道
- F. 两性畸形
- G. 卵巢肿瘤
- H. 子宫肌瘤

97. 对该患者应如何治疗

- A. 腹腔镜探查手术
- B. 剖腹探查术
- C. 宫腔镜手术
- D. 处女膜切开术
- E. 阴道成形术
- F. 外阴肿瘤切除术
- G. 子宫肌瘤剥除术
- H. 卵巢肿瘤剥除术



冲刺模拟卷二

一、单选题：以下每道考题有 5 个备选答案,请选择 1 个最佳答案

1. 下列哪项不是女性生殖器官的邻近器官

A. 直肠
B. 膀胱
C. 输尿管
D. 尿道
E. 肾脏
2. 关于脐带,哪项是错误的

A. 妊娠足月(40 周末),脐带长度一般为 50 cm
B. 脐带有两根脐动脉和一根脐静脉
C. 脐带表面由羊膜包围
D. 脐静脉的氧分压低于脐动脉
E. 脐带杂音的速率与胎心率相同
3. 孕妇,妊娠 38 周,因不规则宫缩入院。检查胎头未衔接。产前骨盆外测量检查:髂棘间径 25 cm,髂嵴间径 28 cm,骶耻外径 17.5 cm,坐骨结节间径 8 cm。还应测量的径线是

A. 粗隆间径
B. 出口后矢状径
C. 坐骨结节间径
D. 骶耻内径
E. 耻骨弓角度
4. 妊娠合并急性病毒性肝炎产妇在产褥期的注意事项应除外哪一项

A. 产妇不宜哺乳
B. 密切观察病情以及肝功能变化,以防演变为慢性肝炎
C. 使用对肝脏损害小的广谱抗生素控制感染
D. 新生儿应在出生后隔离 3 周,避免接触感染
E. 新生儿应接种肝炎疫苗,防止发病
5. 关于滴虫性阴道炎的诊断,以下哪项正确

A. 因滴虫在低温下立即死亡,故取标本时应即送检
B. 见典型白带即可确诊
C. 多次悬滴法观察未发现滴虫时,应送培养,可提高阳性率
D. 在取阴道分泌物前,患者应 1 周内无性交
E. 应常规行男方的检查
6. 患者于流产吸宫手术过程中,突然感觉胸闷、头晕,大汗淋漓。查体:血压 9.3/6.7 kPa (70/50 mmHg),心率 50 次/分。此时应首先给予

A. 加快手术速度,迅速清理子宫
B. 阿托品静脉注射
C. 输血补液
D. 苯巴比妥钠肌内注射
E. 间羟胺(阿拉明)静脉点滴注射
7. 与输卵管癌预后密切相关的是

A. 年龄
B. 有无慢性输卵管炎病史
C. 临床分期
D. 组织学类型
E. 有无腹股沟淋巴结转移
8. 16 岁,女性,原发闭经,身高 140 cm,蹠颈,乳腺未发育,无阴毛、腋毛,外阴少女型,幼稚子宫,双侧附件未触及肿物。最可能的闭经原因为

A. 子宫性闭经
B. 卵巢性闭经
C. 垂体性闭经
D. 下丘脑性闭经
E. 大脑皮质受抑制所致闭经
9. 胎儿生长受限终止妊娠的指征是

A. 治疗后 FGR 好转
B. 治疗中监测羊水量无明显减少
C. 每周 NST 反复呈有反应型
D. 胎儿生物物理评分 4~6 分
E. 胎儿尚未足月,宫内监护情况良好
10. 女,25 岁。G₄P₀,人工流产术后 4 个月,周期性下腹痛但无月经来潮,首先考虑

A. 原发性痛经
B. 子宫内膜异位症
C. 急性盆腔炎
D. 宫腔、宫颈管粘连
E. 卵巢囊肿蒂扭转
11. 女,22 岁。停经 11 周,阴道少量流血 3 天。妇科检查:子宫底位于耻骨联合上 3 横指。B 超示宫腔内雪花状回声。最可能的诊断为

A. 先兆流产
B. 难免流产
C. 葡萄胎
D. 侵蚀性葡萄胎
E. 绒毛膜癌
12. 女,27 岁。停经 12 周,阴道大量流血 3 小时。血压 80/50 mmHg。妇科检查:外阴血染,阴道内大量鲜红血液及血块,宫颈口松,有肉样组织堵塞于宫口,子宫如孕 10 周大小。可能的诊断是

A. 稽留流产
B. 先兆流产
C. 难免流产
D. 不全流产
E. 宫颈息肉

13. 羊水胎粪污染与下列哪些因素有关
- 胎儿肠蠕动减弱
 - 胎儿迷走神经兴奋
 - 胎儿呼吸运动减弱
 - 胎儿交感神经兴奋
 - 胎儿肛门括约肌紧缩
14. 女,31岁。婚后5年未孕,近两年进行性痛经。BBT示双相型,月经(3~4)天/(28~30)天,量中。妇科检查:子宫正常大小,后位,后壁有粘连性结节,触痛;两侧附件未扪及肿块,无压痛。为解决生育问题,首先做下列哪项处理最恰当
- 诊刮
 - 促排卵
 - 子宫输卵管碘油造影术
 - 剖腹探查
 - 试管婴儿
15. 有关围绝经期保健,不正确的是
- 绝经后出血应及时就诊
 - 定期体检
 - 防治围绝经期综合征
 - 重视蛋白质、维生素、微量元素的摄入
 - 如无自觉症状,不必保健
16. 下列哪项不是溴隐亭的适应证
- 子宫内膜异位症
 - 闭经泌乳综合征
 - 高催乳素血症
 - 产后回奶
 - 垂体微腺瘤
17. 子宫肌瘤细胞中含量显著增高的是
- 睾酮
 - 孕酮
 - 泌乳素
 - 雌酮
 - 雌二醇
18. 女性,50岁。一周前妇科学查示,宫颈中度糜烂,子宫正常大小,两侧附件阴性;宫颈刮片细胞学检查报告为巴氏Ⅳ级。进一步做宫颈活检,病理检查为“宫颈原位癌”。其治疗原则为
- 子宫全切术
 - 全子宫加双侧附件切除术
 - 扩大子宫切除术
 - 广泛性子宫全切术+盆腔淋巴结清扫术
 - 放射治疗
19. 女性,50岁,已婚。因外阴白色病变做外阴活检,病理报告为“外阴上皮非典型中度增生”,是指下列哪种情况
- 病变超过表皮2/3层
 - 病变局限于表皮深层下2/3
 - 病变局限于表皮浅层上2/3
 - 病变局限于表皮深层上1/3
 - 病变局限于表皮深层下1/3
20. 28岁已婚女性,继发不孕3年。因月经两个月一次、雄激素升高和B超为多囊卵巢,被诊断为多囊卵巢综合征。患者治疗的近期目标是
- 控制体重
 - 预防代谢综合征
 - 预防子宫内膜癌
 - 治疗不孕不育
 - 预防卵巢癌
21. 25岁初孕妇,妊娠38周,胎头双顶径9.2cm,男型骨盆。预计临产后本例不易发生的项目是
- 持续性枕横位
 - 持续性枕后位
 - 第一产程活跃期停滞
 - 第一产程潜伏期延长
 - 第二产程延长
22. 女,27岁。第一胎,妊娠29周,胎心胎动消失1周入院。经人工破膜及缩宫素点滴娩出一死婴,即开始持续不断地阴道出血。经人工剥离胎盘及使用宫缩剂后仍无效果,出血不止,无凝血块。此例产后出血的原因可能是
- 产后宫缩乏力
 - 软产道损伤
 - 子宫破裂
 - 子宫腔内感染
 - 凝血功能障碍
23. 产妇足月顺产后第4天,母乳喂养,乳房胀痛,无红肿,乳汁排流不畅,体温38.2℃。处理方法是
- 吸奶器吸吮
 - 生麦芽煎服
 - 抗生素治疗
 - 让新生儿多吸吮双乳
 - 少喝水
24. 第一胎,妊娠43周,无临产先兆。检查:宫高33cm,LOA,胎头入盆,胎心率128次/分,两周前尿E₃为18mg/24h,今日为8mg/24h。应考虑为
- 胎儿宫内窘迫
 - 胎头受压
 - 脐带受压
 - 胎儿过度成熟
 - 胎盘功能减退
25. 女,28岁。G₁P₁,停经2个月,不规则阴道流血10天。妇科检查:子宫增大如孕3个月,尿hCG阳性,B超提示葡萄胎。其处理不应包括





- A. 需行清宫术
- B. 每次清宫的刮出物均送病理检查
- C. 子宫全切术
- D. 清宫术后随访 2 年
- E. 葡萄胎刮宫术后 9 周血 hCG 仍高,需排除侵蚀性葡萄胎

二、多选题：以下每道考题有 5 个备选答案,每题至少有 2 个正确答案

26. 关于卵巢的描述,正确的有

- A. 分泌激素
- B. 排卵
- C. 皮质是其功能部分
- D. 位于输卵管的前下方
- E. 协助受精卵着床

27. 有关高危妊娠的描述,下列哪些是正确的

- A. 以往有异常妊娠史或不良分娩史
- B. 年龄大于 16 岁,小于 35 岁
- C. 孕妇有严重并发症,如心脏病、糖尿病
- D. 各种妊娠并发症、胎位异常及骨盆狭窄
- E. 早孕期用过对胎儿有影响的药物或接触放射线

28. 下列哪些是胎儿窘迫的临床表现

- A. 胎心率大于 160 次/分或小于 120 次/分
- B. 胎动每 12 小时少于 4 次
- C. 头位,羊水胎粪污染
- D. 催产素激惹试验(OCT)多次检查均为阴性
- E. 胎心率不规则

29. 阴道后穹隆穿刺可用于诊断

- A. 盆腔肿瘤
- B. 盆腔包裹性积液
- C. 异位妊娠
- D. 子宫内膜异位症
- E. 盆腔脓肿

30. 妊娠中期的阑尾炎需与下列哪些疾病鉴别

- A. 右侧卵巢囊肿蒂扭转
- B. 右侧输卵管妊娠破裂
- C. 右侧输尿管结石
- D. 右侧急性肾盂肾炎
- E. 急性胆囊炎

31. 妊娠期糖尿病对新生儿的影响是

- A. 新生儿死亡率高
- B. 新生儿 ARDS 发生率高
- C. 新生儿低血糖
- D. 新生儿高血糖

E. 新生儿贫血

32. 关于梅毒的传播,下列说法正确的是

- A. 梅毒患者是唯一的传染源
- B. 性接触是最主要的传播途径
- C. 病程越长,传染性越强
- D. 垂直传播是指通过胎盘进入胎儿体内
- E. 新生儿头部擦伤处发生硬下疳是典型的垂直传播

33. 子宫收缩乏力的全身性因素包括

- A. 子宫过度膨胀
- B. 产妇精神紧张
- C. 羊水过多
- D. 产程长或难产
- E. 合并急、慢性全身性疾病

34. 羊水栓塞的高发因素是

- A. 多产妇
- B. 高龄产妇
- C. 过强宫缩
- D. 急产
- E. 初产妇

35. 妇科病史采集过程中应

- A. 避免暗示和主观臆测
- B. 态度和蔼,语言亲切
- C. 对危重患者同样应详细了解病情,以便恰当诊断
- D. 尊重患者隐私,可单独补充询问
- E. 主诉是病史的主要组成部分

36. 61 岁妇女,3 个月前出现白带增多,未治疗。1 周前感到下腹轻度疼痛,白带为脓血样,有恶臭味来就诊。妇科检查:阴道壁明显发红,阴道分泌物呈脓血样;宫颈未见糜烂;子宫体略大,质软,有轻压痛;双侧附件未见异常。诊断是

- A. 子宫体癌
- B. 子宫颈癌
- C. 急性阴道炎
- D. 子宫积脓
- E. 子宫肌瘤

37. 容易伴有腹腔积液形成的卵巢肿瘤是

- A. 成熟囊性畸胎瘤
- B. 无性细胞瘤
- C. 内胚窦瘤
- D. 浆液性囊腺癌
- E. 胃肠道转移癌

38. 外阴上皮内瘤变包括

- A. 鳞状上皮增生
- B. 硬化性苔藓

- C. 鳞状上皮内瘤变
D. Paget 病
E. 非浸润性黑色素瘤
39. 关于胎盘部位滋养细胞肿瘤,下列哪些正确
A. 肿瘤呈实质性
B. 一般局限于子宫
C. 疾病晚期可发生转移
D. 转移部位以脑多见
E. 肿瘤组织内出血坏死灶广泛、多见
40. 围绝经期功能性子宫出血,哪些类型的子宫内膜易发生癌变
A. 增生期改变
B. 腺瘤样增生过长
C. 增生期及分泌期并存的混合型
D. 非典型增生
E. 萎缩型子宫内膜
41. 关于子宫腺肌病,下列哪些是正确的
A. 常发生于未育已婚妇女
B. 进行性痛经
C. 属于子宫内膜异位症的一类
D. 常有经量增多,经期延长
E. 很可能恶变
42. 同生殖器官关系密切的有
A. 第二产程延长
B. 重复宫腔手术
C. 膀胱结石
D. 长期放置子宫托
E. 尿路感染
43. 输卵管绝育的并发症有
A. 感染
B. 出血、血肿
C. 脏器损伤
D. 内分泌紊乱
E. 再孕
44. 子宫内膜异位症的临床特点有
A. 继发性痛经
B. 不孕
C. 性交痛
D. 月经异常
E. 阴道分泌物增多
45. 符合哪些条件可考虑保留对侧卵巢
A. 临床Ⅰa期,肿瘤分化好
B. 患者年轻

- C. 肿瘤为临界恶性或低度恶性
D. 术中剖视对侧卵巢未发现异常
E. 术后有条件严密随访

三、共用题干题: 以下每道考题有 2~6 个提问,每个提问有 5 个备选答案,请选择 1 个最佳答案

(46~48 题共用题干)

女,32 岁。15 岁月经初潮,月经周期规律,5 日/32 日。结婚 4 年,夫妻同居,有正常性生活,至今未怀孕。末次月经 7 月 24 日。

46. 从理论推算,该患者的排卵日应在
A. 8 月 1 日左右
B. 8 月 7 日左右
C. 8 月 12 日左右
D. 8 月 14 日左右
E. 8 月 21 日左右
47. 判断该妇女有无排卵,最简便的检查方法是
A. 尿孕二醇测定
B. 放射免疫法测定血浆中 LH
C. 孕激素试验
D. 基础体温测定
E. 子宫内膜活检
48. 若该患者有排卵,检查结果能反映体内已受孕激素影响的是
A. 阴道上皮表层细胞角化
B. 宫颈黏液出现羊齿植物叶状结晶
C. 基础体温呈单相型
D. 子宫内膜腺上皮细胞出现核下空泡
E. 子宫内膜呈增殖期图像

(49~51 题共用题干)

女,22 岁。G₁P₀,孕 32 周,产前经过顺利,因夫妻同房后腹痛半天、阴道少量出血来院急诊。查体:贫血貌,血压 105/75 mmHg(14/10 kPa),心率 112 次/分;子宫较孕月大,宫高 32 cm,子宫张力大,放松差,并有轻压痛,胎位、胎心不清;血红蛋白 70 g/L,血细胞比容 28%。

49. 此患者最可能的诊断是
A. 急性羊水过多
B. 双胎
C. 前置胎盘
D. 胎盘早剥
E. 早产
50. 最能协助诊断的病史、体检为哪一项
A. 子宫大于孕月大小
B. 夫妻同房史
C. 阴道少量出血
D. 胎位、胎心不清