

# Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie

Vierte Auflage

Drittes und Viertes Ergänzungswerk

# Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie

Vierte Auflage

## Drittes und Viertes Ergänzungswerk

Die Literatur von 1930 bis 1959 umfassend

Herausgegeben vom  
Beilstein-Institut für Literatur der Organischen Chemie  
Frankfurt am Main

Bearbeitet von

**Reiner Luckenbach**

Unter Mitwirkung von

Oskar Weissbach

Erich Bayer · Adolf Fahrmeir · Friedo Giese · Volker Guth · Irmgard Hagel  
Franz-Josef Heinen · Günter Imsiecke · Ursula Jacobshagen · Rotraud Kayser  
Klaus Koulou · Bruno Langhammer · Dieter Liebegott · Lothar Mähler  
Annerose Naumann · Wilma Nickel · Burkhard Polenski · Eleonore Schieber  
Eberhard Schwarz · Ilse Sölken · Josef Sunkel · Achim Trede · Paul Vincke

**Einundzwanzigster Band**

Erster Teil

Springer-Verlag Berlin · Heidelberg · New York 1978

ISBN 3-540-08817-2 Springer-Verlag, Berlin · Heidelberg · New York  
ISBN 0-387-08817-2 Springer-Verlag, New York · Heidelberg · Berlin

Die Wiedergabe von **Gebrauchsnamen**, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. im Beilstein-Handbuch **berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung** nicht zu der Annahme, dass solche Namen **im Sinn der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung** als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch **begründeten Rechte**, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von **Abbildungen**, der **Funksendung**, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.

© by Springer-Verlag, Berlin · Heidelberg 1978  
Library of Congress Catalog Card Number: 22—79  
Printed in Germany

Satz, Druck und Bindearbeiten: Universitätsdruckerei H. Stürtz AG Würzburg

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie

## Mitarbeiter der Redaktion

Helmut Appelt  
Gerhard Bambach  
Klaus Baumberger  
Elise Blazek  
Kurt Bohg  
Reinhard Bollwan  
Jörg Bräutigam  
Ruth Brandt  
Eberhard Breither  
Stephanie Corsepius  
Edgar Deuring  
Ingeborg Deuring  
Reinhard Ecker  
Irene Eigen  
Hellmut Fiedler  
Franz Heinz Flock  
Manfred Frodl  
Ingeborg Geibler  
Libuse Goebels  
Gerhard Grimm  
Karl Grimm  
Friedhelm Gundlach  
Hans Härter  
Alfred Haltmeier  
Erika Henseleit  
Karl-Heinz Herbst  
Ruth Hintz-Kowalski  
Guido Höffer  
Eva Hoffmann  
Horst Hoffmann  
Werner Hoffmann  
Gerhard Hofmann  
Gerhard Jooss  
Klaus Kinsky  
Heinz Klute  
Ernst Heinrich Koetter  
Irene Kowol  
Gisela Lange  
Sok Hun Lim

Gerhard Maleck  
Kurt Michels  
Ingeborg Mischon  
Klaus-Diether Möhle  
Gerhard Mühle  
Heinz-Harald Müller  
Ulrich Müller  
Peter Otto  
Helga Pradella  
Hella Rabien  
Peter Raig  
Walter Reinhard  
Gerhard Richter  
Helmut Rockelmann  
Lutz Rogge  
Günter Roth  
Liselotte Sauer  
Siegfried Schenk  
Max Schick  
Gundula Schindler  
Joachim Schmidt  
Gerhard Schmitt  
Thilo Schmitt  
Peter Schomann  
Wolfgang Schütt  
Jürgen Schunck  
Wolfgang Schurek  
Wolfgang Staehle  
Wolfgang Stender  
Karl-Heinz Störr  
Hans Tarrach  
Elisabeth Tauchert  
Mathilde Urban  
Rüdiger Walentowski  
Hartmut Wehrt  
Hedi Weissmann  
Frank Went  
Ulrich Winckler  
Renate Wittrock

Abkürzungen und Symbole<sup>1)</sup>

A.	Äthanol
Acn.	Aceton
Ae.	Diäthyläther
äthanol.	äthanolisch
alkal.	alkalisch
Anm.	Anmerkung
at	technische Atmosphäre ( $98\,066,5\text{ N}\cdot\text{m}^2 = 0,980665$ bar = 735,559 Torr)
atm	physikalische Atmosphäre
Aufl.	Auflage
B.	Bildungsweise(n), Bildung
Bd.	Band
Bzl.	Benzol
bzw.	beziehungsweise
c	Konzentration einer optisch aktiven Verbindung in g/100 ml Lösung
D.	1) Debye (Dimension des Dipol- moments) 2) Dichte (z.B. $D_4^{20}$ : Dichte bei 20° bezogen auf Wasser von 4°)
d	Tag
$D(R-X)$	Dissoziationsenergie der Ver- bindung RX in die freien Radi- kale R <sup>•</sup> und X <sup>•</sup>
Diss.	Dissertation
DMF	Dimethylformamid
DMSO	Dimethylsulfoxid
E	1) Erstarrungspunkt 2) Ergänzungswerk des Beilstein-Handbuchs
E.	Äthylacetat
Eg.	Essigsäure (Eisessig)
engl. Ausg.	englische Ausgabe
EPR	Elektronen-paramagnetische Resonanz (= ESR)
F	Schmelzpunkt (-bereich)
Gew.-%	Gewichtsprozent
grad	Grad
H	Hauptwerk des Beilstein- Handbuchs
h	Stunde
Hz	Hertz (= s <sup>-1</sup> )
K	Grad Kelvin
konz.	konzentriert
korr.	korrigiert

<sup>1)</sup> Bezüglich weiterer, hier nicht auf-  
geführter Symbole und Abkürzungen für physika-  
lisch chemische Grössen und Einheiten s.

International Union of Pure and Applied Chemistry Manual of Symbols and Terminology  
for Physicochemical Quantities and Units (1969) [London 1970].

Abbreviations and symbols<sup>2)</sup>

ethanol
acetone
diethyl ether
ethyl alcoholic
alkaline
footnote
technical atmosphere
physical (standard) atmosphere
edition
formation
volume
benzene
or, respectively
concentration of an optically active compound in g/100 ml solution
1) Debye (dimension of dipole moment)
2) density (e.g. $D_4^{20}$ : density at 20° related to water at 4°)
day
dissociation energy of the compound RX forming the free radicals R <sup>•</sup> and X <sup>•</sup>
dissertation, thesis
dimethylformamide
dimethyl sulfoxide
1) freezing (solidification) point
2) Beilstein supplementary series
ethyl acetate
acetic acid
english edition
electron paramagnetic resonance (= ESR)
melting point (range)
percent by weight
degree
Beilstein basic series
hour
cycles per second (= s <sup>-1</sup> )
degree Kelvin
concentrated
corrected

<sup>2)</sup> For other symbols and abbrevia-  
tions for physicochemical quantities  
and units not listed here see

Kp	Siedepunkt (-bereich)	boiling point (range)
l	1) Liter	1) litre
	2) Rohrlänge in dm	2) length of cell in dm
$[M]_t^\lambda$	molares optisches Drehungsvermögen für Licht der Wellenlänge $\lambda$ bei der Temperatur $t$	molecular rotation for the wavelength $\lambda$ and the temperature $t$
m	1) Meter	1) metre
	2) Molarität einer Lösung	2) molarity of solution
Me	Methanol	methanol
n	1) bei Dimensionen von Elementarzellen: Anzahl der Moleküle pro Elementarzelle	1) number of formula units in the unit cell
	2) Normalität einer Lösung	2) normality of solution
	3) nano ( $=10^{-9}$ )	3) nano ( $=10^{-9}$ )
	4) Brechungsindex (z. B. $n_{656,1}^{15}$ : Brechungsindex für Licht der Wellenlänge 656,1 nm bei 15°)	4) refractive index (e.g. $n_{656,1}^{15}$ : refractive index for the wavelength 656,1 nm and 15°)
opt.-inakt.	optisch inaktiv	optically inactive
p	Konzentration einer optisch aktiven Verbindung in g/100 g Lösung	concentration of an optically active compound in g/100 g solution
PAe.	Petroläther	petroleum ether
Py.	Pyridin	pyridine
S.	Seite	page
s	Sekunde	second
s.	siehe	see
s. a.	siehe auch	see also
s. o.	siehe oben	see above
sog.	sogenannt	so called
Spl.	Supplement	supplement
... stdg.	... stündig (z. B. 3-stündig)	for ... hours (e.g. for 3 hours)
s. u.	siehe unten	see below
Syst.-Nr.	System-Nummer	system number
THF	Tetrahydrofuran	tetrahydrofuran
Tl.	Teil	part
Torr	Torr (= mm Quecksilber)	torr (= millimetre of mercury)
unkorr.	unkorrigiert	uncorrected
unverd.	unverdünnt	undiluted
verd.	verdünnt	diluted
vgl.	vergleiche	compare (cf.)
W.	Wasser	water
wss.	wässrig	aqueous
z. B.	zum Beispiel	for example (e.g.)
Zers.	Zersetzung	decomposition
zit. bei	zitiert bei	cited in
$\alpha_t^\lambda$	optisches Drehungsvermögen (Erläuterung s. bei $[M]_t^\lambda$ )	angle of rotation (for explanation see $[M]_t^\lambda$ )
$[\alpha]_t^\lambda$	spezifisches optisches Drehungsvermögen (Erläuterung s. bei $[M]_t^\lambda$ )	specific rotation (for explanation see $[M]_t^\lambda$ )
$\epsilon$	1) Dielektrizitätskonstante	1) dielectric constant, relative permittivity
	2) Molarer dekadischer Extinktionskoeffizient	2) molar extinction coefficient
$\lambda_{(\max)}$	Wellenlänge (eines Absorptionsmaximums)	wavelength (of an absorption maximum)
$\mu$	Mikron ( $=10^{-6}$ m)	micron ( $=10^{-6}$ m)
°	Grad Celsius oder Grad (Drehungswinkel)	degree Celsius or degree (angle of rotation)

# Stereochemische Bezeichnungsweisen

## Übersicht

Präfix	Definition in §	Symbol	Definition in §
<i>allo</i>	5c, 6c	<i>c</i>	4a–e
<i>altro</i>	5c, 6c	$c_F$	7a
<i>anti</i>	3a, 9	<i>D</i>	6a, b, c
<i>arabino</i>	5c	$D_g$	6b
$cat_F$	7a	$D_r$	7b
<i>cis</i>	2	$D_s$	6b
<i>endo</i>	8	( <i>e</i> )	3b
<i>ent</i>	10e	( <i>E</i> )	3a
<i>erythro</i>	5a	<i>L</i>	6a, b, c
<i>exo</i>	8	$L_g$	6b
<i>galacto</i>	5c, 6c	$L_r$	7b
<i>gluco</i>	5c, 6c	$L_s$	6b
<i>glycero</i>	6c	<i>r</i>	4c, d, e
<i>gulo</i>	5c, 6c	$r_F$	7a
<i>ido</i>	5c, 6c	( <i>r</i> )	1a
<i>lyxo</i>	5c	( <i>R</i> )	1a
<i>manno</i>	5c, 6c	( $R_a$ )	1b
<i>meso</i>	5b	( $R_p$ )	1b
<i>rac</i>	10e	( $RS$ )	1a
<i>racem.</i>	5b	( <i>s</i> )	1a
<i>rel</i>	1c	( <i>S</i> )	1a
<i>ribo</i>	5c	( $S_a$ )	1b
<i>s-cis</i>	3b	( $S_p$ )	1b
<i>seqcis</i>	3a	<i>t</i>	4a–e
<i>seqtrans</i>	3a	$t_F$	7a
<i>s-trans</i>	3b	( <i>z</i> )	3b
<i>syn</i>	3a, 9	( <i>Z</i> )	3a
<i>talo</i>	5c, 6c	$\alpha$	10a, c, d
<i>threo</i>	5a	$\alpha_F$	10b, c
<i>trans</i>	2	$\beta$	10a, c, d
<i>xylo</i>	5c	$\beta_F$	10b, c
		$\xi$	11a
		( $\xi$ )	11c
		$\Xi$	11b
		( $\Xi$ )	11b
		( $\Xi_a$ )	11c
		( $\Xi_p$ )	11c
		*	12

- § 1. a) Die Symbole  $(R)$  und  $(S)$  bzw.  $(r)$  und  $(s)$  kennzeichnen die absolute Konfiguration an Chiralitätszentren (Asymmetriezentren) bzw. „Pseudoasymmetriezentren“ gemäß der „Sequenzregel“ und ihren Anwendungsvorschriften (Cahn, Ingold, Prelog, *Experienta* 12 [1956] 81; *Ang. Ch.* 78 [1966] 413, 419; *Ang. Ch. internat. Ed.* 5 [1966] 485, 390; Cahn, Ingold, *Soc.* 1951 612; s. a. Cahn, *J. chem. Educ.* 41 [1964] 116, 508).

Zur Kennzeichnung der Konfiguration von Racematen aus Verbindungen mit mehreren Chiralitätszentren dienen die Buchstabenpaare  $(RS)$  und  $(SR)$ , wobei z. B. durch das Symbol  $(1RS,2SR)$  das aus dem  $(1R,2S)$ -Enantiomeren und dem  $(1S,2R)$ -Enantiomeren bestehende Racemat spezifiziert wird (vgl. Cahn, Ingold, Prelog, *Ang. Ch.* 78 435; *Ang. Ch. internat. Ed.* 5 404).

Das Symbol  $(RS)$  kennzeichnet ein Gemisch von annähernd gleichen Teilen des  $(R)$ -Enantiomeren und des  $(S)$ -Enantiomeren.

Beispiele:

- $(R)$ -Propan-1,2-diol [E IV 1 2468]  
 $(1R,3S,4S)$ -3-Chlor-*p*-menthan [E IV 5 152]  
 $(3aR:4S:8R:8aS:9s)$ -9-Hydroxy-2.2.4.8-tetramethyl-decahydro-4.8-methano-azulen [E III 6 425]  
 $(1RS,2SR)$ -2-Amino-1-benzo[1,3]dioxol-5-yl-propan-1-ol [E III/IV 19 4221]  
 $(2RS,4'R,8'R)$ - $\beta$ -Tocopherol [E III/IV 17 1427]

- b) Die Symbole  $(R_a)$  und  $(S_a)$  bzw.  $(R_p)$  und  $(S_p)$  werden in Anlehnung an den Vorschlag von Cahn, Ingold und Prelog (*Ang. Ch.* 78 437; *Ang. Ch. internat. Ed.* 5 406) zur Kennzeichnung der Konfiguration von Elementen der axialen bzw. planaren Chiralität verwendet.

Beispiele:

- $(R_a)$ -1,11-Dimethyl-5,7-dihydro-dibenz[*c,e*]oxepin [E III/IV 17 642]  
 $(R_a:S_a)$ -3.3'.6'.3''-Tetrabrom-2'.5'-bis-[(1*R*)-menthyloxy]-acetoxy-2.4.6.2''.4''.6''-hexamethyl-*p*-terphenyl [E III 6 5820]  
 $(R_p)$ -Cyclohexanhexol-(1*r*.2*c*.3*t*.4*c*.5*t*.6*t*) [E III 6 6925]

- c) Das Symbol *rel* in einem mindestens zwei Chiralitätssymbole [(*R*) bzw. (*S*); s. o.] enthaltenden Namen einer optisch-aktiven Verbindung deutet an, dass die Chiralitätssymbole keine absolute, sondern nur eine relative Konfiguration spezifizieren.

Beispiel:

- (+)(*rel*-1*R*:1'*S*)-(1*rH*.1'*r'H*)-Bicyclohexyl-dicarbonsäure-(2*c*.2'*t'*)  
 [E III 9 4021]

- § 2. Die Präfixe *cis* bzw. *trans* geben an, dass sich die beiden Bezugsliganden auf der gleichen Seite (*cis*) bzw. auf den entgegengesetzten Seiten (*trans*) der Bezugsfläche befinden. Bei Olefinen verläuft die „Bezugsfläche“ durch die beiden doppelt gebundenen Atome und steht senkrecht zu der Ebene, in der die doppelt gebundenen und die vier hiermit einfach verbundenen Atome liegen; bei cyclischen Verbindungen wird die Bezugsfläche durch die Ringatome fixiert.

Beispiele:

- $\beta$ -Brom-*cis*-zimtsäure [E III 9 2732]  
 2-[4-Nitro-*trans*-styryl]-pyridin [E III/IV 20 3879]  
 5-*cis*-Propenyl-benzo[1,3]dioxol [E III/IV 19 273]

3-[*trans*-2-Nitro-vinyl]-pyridin [E III/IV 20 2887]  
*trans*-2-Methyl-cyclohexanol [E IV 6 100]  
*cis*-2-Isopropyl-bicyclohexyl [E IV 5 352]  
 4a,8a-Dibrom-*trans*-decahydro-naphthalin [E IV 5 314]

- § 3. a) Die — bei Bedarf mit einer Stellungsbezeichnung versehenen — Symbole (*E*) bzw. (*Z*) am Anfang eines Namens oder Namensteils kennzeichnen die Konfiguration an vorhandenen Doppelbindungen. Sie zeigen an, dass sich die — jeweils mit Hilfe der Sequenzregel (s. § 1a) ausgewählten — Bezugsliganden an den jeweiligen doppelt gebundenen Atomen auf den entgegengesetzten Seiten (*E*) bzw. auf der gleichen Seite (*Z*) der Bezugsfläche (vgl. § 2) befinden.

Beispiele:

(*E*)-1,2,3-Trichlor-propen [E IV 1 748]  
 (*Z*)-1,3-Dichlor-but-2-en [E IV 1 786]  
 3*endo*-[(*Z*)-2-Cyclohexyl-2-phenyl-vinyl]-tropan [E III/IV 20 3711]  
 Piperonal-(*E*)-oxim [E III/IV 19 1667]

Anstelle von (*E*) bzw. (*Z*) waren früher die Bezeichnungen *seqtrans* bzw. *seqcis*, sowie zur Kennzeichnung von stickstoffhaltigen funktionellen Derivaten der Aldehyde auch die Bezeichnungen *syn* bzw. *anti* in Gebrauch.

Beispiele:

(3*S*)-9,10-Seco-cholestadien-(5(10).7*seqtrans*)-ol-(3) [E III 6 2602]  
 1.1.3-Trimethyl-cyclohexen-(3)-on-(5)-*seqcis*-oxim [E III 7 285]  
 Perillaaldehyd-*anti*-oxim [E III 7 567]

- b) Die — bei Bedarf mit einer Stellungsbezeichnung versehenen — Symbole (*e*) bzw. (*z*) am Anfang eines Namens oder Namentils kennzeichnen die Konfiguration (Konformation) an den vorhandenen nicht frei drehbaren Einfachbindungen zwischen zwei dreibindigen Atomen. Sie zeigen an, dass sich die — jeweils mit Hilfe der Sequenzregel (s. § 1a) ausgewählten — Bezugsliganden an den beiden einfach gebundenen Atomen auf den entgegengesetzten Seiten (*e*) bzw. auf der gleichen Seite (*z*) der durch die einfach gebundenen Atome verlaufenden Bezugsgeraden befinden.

Beispiele:

(*e*)-*N*-Methyl-thioformamid [E IV 4 171]

Mit gleicher Bedeutung werden in der Literatur auch die Bezeichnungen *s-trans* (= *single-trans*) bzw. *s-cis* (= *single-cis*) verwendet.

- § 4. a) Die Symbole *c* bzw. *t* hinter der Stellungsnummer einer C,C-Doppelbindung geben an, dass die jeweiligen Bezugsliganden an den beiden doppelt-gebundenen Kohlenstoff-Atomen *cis*-ständig (*c*) bzw. *trans*-ständig (*t*) sind (vgl. § 2). Als „Bezugsligand“ gilt an jedem der beiden doppelt-gebundenen Atome derjenige äussere — d. h. nicht der Bezugsfläche angehörende — Ligand, der der gleichen Bezifferungseinheit angehört wie das mit ihm verknüpfte doppelt-gebundene Atom. Gehören beide äusseren Liganden eines der doppelt-gebundenen Atome der gleichen Bezifferungseinheit an, so gilt der niedrigerbezifferte als Bezugsligand.

Beispiele:

2-Methyl-oct-3*t*-en-2-ol [E IV 1 2177]  
 Cycloocta-1*c*,3*t*-dien [E IV 5 402]

9,11 $\alpha$ -Epoxy-5 $\alpha$ -ergosta-7,22 $t$ -dien-3 $\beta$ -ol [E III/IV 17 1574]  
 3 $\beta$ -Acetoxy-16 $\beta$ -hydroxy-23,24-dinor-5 $\alpha$ -chol-17(20) $t$ -en-21-säure-lacton  
 [E III/IV 18 470]  
 (3S)-9.10-Seco-ergostatrien-(5*t*.7*c*.10(19)-ol-(3) [E III 6 2832]

- b) Die Symbole *c* bzw. *t* hinter der Stellungsziffer eines Substituenten an einem doppelt-gebundenen endständigen Kohlenstoff-Atom oder vor der eine „offene“ Valenz an einem solchen Atom anzeigenden Endung -yl geben an, dass dieser Substituent bzw. der mit der „offenen“ Valenz verknüpfte Rest cis-ständig (*c*) bzw. trans-ständig (*t*) (vgl. § 2) zum Bezugsliganden (vgl. § 4) ist.

Beispiele:

1*t*,2-Dibrom-propen [E IV 1 760]  
 1*c*,2-Dibrom-3-methyl-buta-1,3-dien [E IV 1 1005]  
 1-But-1-en-*t*-yl-cyclohexen [E IV 5 431]

- c) Die Symbole *c* bzw. *t* hinter der Stellungsziffer 2 eines Substituenten am Äthylen-System geben die cis-Stellung (*c*) bzw. die trans-Stellung (*t*) (vgl. § 2) dieses Substituenten zu dem durch das Symbol *r* gekennzeichneten Bezugsliganden an dem mit 1 bezifferten Kohlenstoff-Atom an.

Beispiele:

1,2*t*-Diphenyl-1*r*-[4-chlor-phenyl]-äthylen [E III 5 2399]

- d) Die mit der Stellungsziffer eines Substituenten (oder den Stellungsziffern einer im Namen durch ein Präfix bezeichneten Brücke eines Ringsystems) kombinierten Symbole *c* bzw. *t* geben an, dass sich der Substituent (oder die mit dem Stamm-Ringsystem verknüpften Brückenatome) auf der gleichen Seite (*c*) bzw. der entgegengesetzten Seite (*t*) der Bezugsfläche befinden wie der Bezugsligand. Dieser Bezugsligand ist durch Hinzufügen des Symbols *r* zu seiner Stellungsziffer kenntlich gemacht.

Bei einer aus mehreren isolierten Ringen oder Ringsystemen bestehenden Verbindung kann jeder Ring bzw. jedes Ringsystem als gesonderte Bezugsfläche für Konfigurationskennzeichen fungieren; die zusammengehörigen Sätze von Konfigurationssymbolen *r*, *c* und *t* sind dann im Namen der Verbindung durch Klammerung voneinander getrennt oder durch Strichelung unterschieden (s. Beispiele 1 und 2 unter Abschnitt e).

Beispiele:

1*r*,2*t*,3*c*,4*t*-Tetrabrom-cyclohexan [E IV 5 76]  
 1*r*-Acetoxy-1,2*c*-dimethyl-cyclopentan [E IV 6 111]  
 [1,2*c*-Dibrom-cyclohex-*r*-yl]-methanol [E IV 6 109]  
 2*c*-Chlor-(4*r*,8*at*)-decahydro-naphthalin [E IV 5 313]  
 (3*at*,7*at*)-Octahydro-4*r*,7-methano-inden [E IV 5 467]

- e) Die mit einem (gegebenenfalls mit hochgestellter Stellungsziffer ausgestatteten) Atomsymbol kombinierten Symbole *r*, *c* oder *t* beziehen sich auf die räumliche Orientierung des indizierten Atoms relativ zur Bezugsfläche.

Beispiele:

- 1-[(4*aR*)-6*t*-Hydroxy-2*c*.5.5.8*a**t*-tetramethyl-(4*a**rH*)-decahydro-naphthyl-(1*t*)]-2-[(4*aR*)-6*t*-hydroxy-2*t*.5.5.8*a**t*-tetramethyl-(4*a**rH*)-decahydro-naphthyl-(1*t*)]-äthan [E III 6 4829]  
 2-[(5*S*)-6,10*c'*-Dimethyl-(5*rC*<sup>6</sup>,5*r'*C<sup>1</sup>)-spiro[4.5]dec-6-en-2*t*-yl]-propan-2-ol [E IV 6 419]  
 (6*R*)-2*ξ*-Isopropyl-6*c*,10*ξ*-dimethyl-(5*rC*<sup>1</sup>)-spiro[4.5]decan [E IV 5 352]  
 (1*rC*<sup>8</sup>,2*tH*,4*tH*)-Tricyclo[3.2.2.0<sup>2,4</sup>]nonan-6*c*,7*c*-dicarbonsäure-anhydrid [E III/IV 17 6079]

- § 5. a) Die Präfixe *erythro* und *threo* zeigen an, dass sich die Bezugsliganden (das sind zwei gleiche oder jeweils die von Wasserstoff verschiedenen Liganden) an zwei einer Kette angehörenden Chiralitätszentren auf der gleichen Seite (*erythro*) bzw. auf den entgegengesetzten Seiten (*threo*) der Fischer-Projektion dieser Kette befinden.

Beispiele:


- threo*-Pentan-2,3-diol [E IV 1 2543]  
*threo*-3-Hydroxy-2-methyl-valeriansäure [E IV 3 849]  
*erythro*- $\alpha$ -[4-Methyl-piperidino]-bibenzyl- $\alpha$ -ol [E III/IV 20 1516]

- b) Das Präfix *meso* gibt an, dass ein mit einer geraden Anzahl von Chiralitätszentren ausgestattetes Molekül eine Symmetrieebene oder ein Symmetriezentrum aufweist. Das Präfix *racem.* kennzeichnet ein Gemisch gleicher Mengen von Enantiomeren, die zwei identische Chiralitätszentren oder zwei identische Sätze von Chiralitätszentren enthalten.

Beispiele:

- meso*-Pentan-2,4-diol [E IV 1 2543]  
*meso*-1,4-Dipiperidino-butan-2,3-diol [E III/IV 20 1235]  
*racem.*-3,5-Dichlor-2,6-cyclo-norbornan [E IV 5 400]  
*racem.*-(1*rH*.1'*r'H*)-Bicyclohexyl-dicarbonsäure-(2*c*.2'*c'*) [E III 9 4020]

- c) Die „Kohlenhydrat-Präfixe“ *ribo*, *arabino*, *xylo* und *lyxo* bzw. *allo*, *altro*, *gluco*, *manno*, *gulo*, *ido*, *galacto* und *talo* kennzeichnen die relative Konfiguration von Molekülen mit drei Chiralitätszentren (deren mittleres ein „Pseudoasymmetriezentrum“ sein kann) bzw. vier Chiralitätszentren, die sich jeweils in einer unverzweigten Kette befinden. In den nachstehend abgebildeten „Leiter-Mustern“ geben die horizontalen Striche die Orientierung der Bezugsliganden an der jeweils als Fischer-Projektion wiedergegebenen Kohlenstoffkette an<sup>1)</sup>.



<sup>1)</sup> Das niedrigstbezahlte Atom befindet sich hierbei am oberen Ende der vertikal dargestellten Kette der Bezifferungseinheit.

Beispiele:

*ribo*-2,3,4-Trimethoxy-pentan-1,5-diol [E IV 1 2834]

*galacto*-Hexan-1,2,3,4,5,6-hexaol [E IV 1 2844]

- § 6. a) Die „Fischer-Symbole“ **D** bzw. **L** im Namen einer Verbindung mit einem Chiralitätszentrum geben an, dass sich der Bezugsligand (d. i. der von Wasserstoff verschiedene, nicht der durch den Namensstamm gekennzeichneten Kette angehörende Ligand) am Chiralitätszentrum in der Fischer-Projektion<sup>1)</sup> auf der rechten Seite (**D**) bzw. auf der linken Seite (**L**) der Kette befindet.

Beispiele:

**D**-Tetradecan-1,2-diol [E IV 1 2631]

**L**-4-Hydroxy-valeriansäure [E III 3 612]

- b) In Kombination mit dem Präfix *erythro* geben die Symbole **D** und **L** an, dass sich die beiden Bezugsliganden auf der rechten Seite (**D**) bzw. auf der linken Seite (**L**) der Fischer-Projektion<sup>1)</sup> befinden. Die mit dem Präfix *threo* kombinierten Symbole **D<sub>g</sub>** und **D<sub>s</sub>** geben an, dass sich der höherbezahlte (**D<sub>g</sub>**) bzw. der niedrigerbezahlte (**D<sub>s</sub>**) Bezugsligand auf der rechten Seite der Fischer-Projektion<sup>1)</sup> befindet; linksseitige Position des jeweiligen Bezugsliganden wird entsprechend durch die Symbole **L<sub>g</sub>** bzw. **L<sub>s</sub>** angezeigt.

In Kombination mit den in § 5c aufgeführten Konfigurationsbestimmenden Präfixen werden die Symbole **D** und **L** ohne Index verwendet; sie beziehen sich, dabei jeweils auf die Orientierung des höchstbezahlten (d. h. des in der Abbildung am weitesten unten erscheinenden) Bezugsliganden (die in § 5c abgebildeten „Leiter-Muster“ repräsentieren jeweils das **D**-Enantiomere).

Beispiele:

**D**-*erythro*-Nonan-1,2,3-triol [E IV 1 2792]

**D<sub>s</sub>**-*threo*-1,4-Dibrom-2,3-dimethyl-butan [E IV 1 375]

**L<sub>g</sub>**-*threo*-Hexadecan-7,10-diol [E IV 1 2636]

**D**-*lyxo*-Pentan-1,2,3,4-tetraol [E IV 1 2811]

**6**-Allyloxy-**D**-*manno*-hexan-1,2,3,4,5-pentaol [E IV 1 2846]

- c) Kombination der Präfixe **D-glycero** oder **L-glycero** mit einem der in § 5c in der zweiten Formelzeile aufgeführten, jeweils mit einem Fischer-Symbol versehenen Kohlenhydrat-Präfixe dienen zur Kennzeichnung der Konfiguration von Molekülen mit fünf in einer Kette angeordneten Chiralitätszentren (deren mittleres auch „Pseudoasymmetriezentrum“ sein kann). Dabei bezieht sich das Kohlenhydrat-Präfix auf die vier niedrigstbezahlten Chiralitätszentren, das Präfix **D-glycero** oder **L-glycero** auf das höchstbezahlte (d. h. in der Abbildung am weitesten unten erscheinende) Chiralitätszentrum.

Beispiel:

**D-glycero-L-gulo**-Heptit [E IV 1 2854]

- § 7. a) Die Symbole **c<sub>F</sub>** bzw. **t<sub>F</sub>** hinter der Stellungsziffer eines Substituenten an einer mehrere Chiralitätszentren aufweisenden Kette geben an, dass sich dieser Substituent und der Bezugssubstituent, der seinerseits durch das Symbol **r<sub>F</sub>** gekennzeichnet wird, auf der gleichen Seite (**c<sub>F</sub>**) bzw. auf den entgegengesetzten Seiten (**t<sub>F</sub>**) der Fischer-

Projektion befinden. Ist eines der endständigen Atome der Kette Chiralitätszentrum, so wird der Stellungsziffer des „catenoiden“ Substituenten (d. h. des Substituenten, der in der Fischer-Projektion als Verlängerung an der Kette erscheint) das Symbol  $cat_F$  beigefügt.

- b) Die Symbole  $D_r$  bzw.  $L_r$  am Anfang eines mit dem Kennzeichen  $r_F$  ausgestatteten Namens geben an, dass sich der Bezugssubstituent auf der rechten Seite ( $D_r$ ) bzw. auf der linken Seite ( $L_r$ ) der in Fischer-Projektion<sup>1)</sup> wiedergegebenen Kette der Bezifferungseinheit befindet.

Beispiele:

Heptan-1,2 $r_F$ ,3 $c_F$ ,4 $t_F$ ,5 $c_F$ ,6 $c_F$ ,7-heptaol [E IV 1 2854]

$L_r$ -1 $c_F$ ,2 $t_F$ ,3 $t_F$ ,4 $c_F$ ,5 $r_F$ -Pentahydroxy-hexan-1 $cat_F$ -sulfonsäure [E IV 1 4275]

- § 8. Die Symbole *endo* bzw. *exo* hinter der Stellungsziffer eines Substituenten eines Bicycloalkans geben an, dass der Substituent der niedriger bezifferten Nachbarbrücke zugewandt (*endo*) bzw. abgewandt (*exo*) ist.

Beispiele:

5*endo*-Brom-norborn-2-en [E IV 5 398]

2*endo*,3*exo*-Dimethyl-norbornan [E IV 5 294]

4*endo*,7,7-Trimethyl-6-oxa-bicyclo[3.2.1]octan-3*exo*,4*exo*-diol  
[E III/IV 17 2044]

- § 9. Die Symbole *syn* bzw. *anti* hinter der Stellungsziffer eines Substituenten an einem Atom der höchstbezifferten Brücke eines Bicycloalkan-Systems oder einer Brücke über ein ortho- oder ortho/perianelliertes Ringsystem geben an, dass der Substituent der Nachbarbrücke zugewandt (*syn*) bzw. abgewandt (*anti*) ist, die das niedrigstbezifferte Ringatom aufweist.

Beispiele:

(3*aR*)-9*syn*-Chlor-1,5,5,8*a*-tetramethyl-(3*a**t*,8*a**t*)-decahydro-1*r*,4-methanoazulen [E IV 5 498]

5*exo*,7*anti*-Dibrom-norborn-2-en [E IV 5 399]

5,8*syn*-Dimethyl-7-oxo-6-oxa-bicyclo[3.2.1]octan-2*endo*-carbonsäure  
[E III/IV 18 5363]

- § 10. a) Die Symbole  $\alpha$  bzw.  $\beta$  hinter der Stellungsziffer eines ringständigen Substituenten im halbrationalen Namen einer Verbindung mit einer dem Cholestan [E III 5 1132] entsprechenden Bezifferung und Projektionsanlage geben an, dass sich der Substituent auf der dem Betrachter abgewandten ( $\alpha$ ) bzw. zugewandten ( $\beta$ ) Seite der Fläche des Ringgerüsts befindet.

Beispiele:

3 $\beta$ -Piperidino-cholest-5-en [E III/IV 20 361]

Phyllocladandioldi-(15 $\alpha$ .16 $\alpha$ ) [E III 6 4770]

3 $\beta$ ,21 $\beta$ -Dihydroxy-lupan-29-säure-21-lacton [E III/IV 18 485]

Onocerandioldi-(3 $\beta$ .21 $\alpha$ ) [E III 6 4829]

- b) Die Symbole  $\alpha_F$  bzw.  $\beta_F$  hinter der Stellungsziffer eines an der Seitenkette befindlichen Substituenten im halbrationalen Namen einer Verbindung, der unter a) erläuterten Art geben an, dass sich der Substi-

tuent auf der rechten ( $\alpha_F$ ) bzw. linken ( $\beta_F$ ) Seite der in Fischer-Projektion dargestellten Seitenkette befindet, wobei sich hier das niedrigstbeifizierte Atom am unteren Ende der Kette befindet.

Beispiele:

16 $\alpha$ ,17-Epoxy-pregn-5-en-3 $\beta$ ,20 $\beta_F$ -diol [E III/IV 17 2137]

22 $\alpha_F$ ,23 $\alpha_F$ -Dibrom-9,11 $\alpha$ -epoxy-5 $\alpha$ -ergost-7-en-3 $\beta$ -ol [E III/IV 17 1519]

- c) Sind die Symbole  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha_F$  oder  $\beta_F$  zusammen mit der Stellungsnummer eines angularen Chiralitätszentrums oder eines Wasserstoff-Atoms — in diesem Fall mit dem Atomsymbol  $H$  versehen ( $\alpha H$ ,  $\beta H$ ,  $\alpha_F H$  bzw.  $\beta_F H$ ) — unmittelbar vor dem Namensstamm einer Verbindung mit halbrationalem Namen angeordnet, so kennzeichnen sie im Sinne von § 10a und 10b entweder die Orientierung einer angularen exocyclischen Bindung, deren Lage durch den Namen nicht festgelegt ist, oder sie zeigen an, dass die Orientierung des betreffenden exocyclischen Liganden oder Wasserstoff-Atoms (das auch substituiert sein kann) in der angegebenen Weise von der mit dem Namensstamm festgelegten Orientierung abweicht.

Beispiele:

5,6 $\beta$ -Epoxy-5 $\beta$ ,9 $\beta$ ,10 $\alpha$ -ergosta-7,22 $t$ -dien-3 $\beta$ -ol [E III/IV 17 1573]

(25 $R$ )-5 $\alpha$ ,20 $\alpha H$ ,22 $\alpha H$ -Furostan-3 $\beta$ ,6 $\alpha$ ,26-triol [E III/IV 17 2348]

4 $\beta H$ ,5 $\alpha$ -Eremophilan [E IV 5 356]

(11 $S$ )-4-Chlor-8 $\beta$ -hydroxy-4 $\beta H$ -eudesman-12-säure-lacton [E III/IV 17 4674]

5 $\alpha$ .20 $\beta_F H$ .24 $\beta_F H$ -Ergosterol-(3 $\beta$ ) [E III 6 2161]

- d) Die Symbole  $\alpha$  bzw.  $\beta$  vor dem halbrationalen Namen eines Kohlenhydrats, eines Glykosids oder eines Glykosyl-Radikals geben an, dass sich der Bezugsligand (d. h. die am höchstbeifizierten chiralen Atom der Kohlenstoff-Kette befindliche Hydroxy-Gruppe) und die mit dem Glykosyl-Rest verbundene Gruppe (bei Pyranosen und Furanosen die Hemiacetal-OH-Gruppe) auf der gleichen ( $\alpha$ ) bzw. der entgegengesetzten ( $\beta$ ) Seite der Bezugsgeraden befinden. Die Bezugsgerade besteht dabei aus derjenigen Kette, die die cyclischen Bindungen am acetalischen Kohlenstoff-Atom sowie alle weiteren C,C-Bindungen in der entsprechend § 5c definierten Orientierung der Fischer-Projektion enthält.

Beispiele:

O<sup>2</sup>-Methyl- $\beta$ -D-glucopyranose [E IV 1 4347]

Methyl- $\alpha$ -D-glucopyranosid [E III/IV 17 2909]

Tetra-O-acetyl- $\alpha$ -D-fructofuranosylchlorid [E III/IV 17 2651]

- e) Das Präfix *ent* vor dem halbrationalen Namen einer Verbindung mit mehreren Chiralitätszentren, deren Konfiguration mit dem Namen festgelegt ist, dient zur Kennzeichnung des Enantiomeren der betreffenden Verbindung. Das Präfix *rac* wird zur Kennzeichnung des einer solchen Verbindung entsprechenden Racemats verwendet.

Beispiele:

*ent*-(13 $S$ )-3 $\beta$ ,8-Dihydroxy-labda-15-säure-8-lacton [E III/IV 18 138]

*rac*-4,10-Dichlor-4 $\beta H$ ,10 $\beta H$ -cadinan [E IV 5 354]

- § 11. a) Das Symbol  $\xi$  tritt an die Stelle von *cis*, *trans*, *c*, *t*,  $c_F$ ,  $t_F$ ,  $cat_F$ , *endo*, *exo*, *syn*, *anti*,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha_F$  oder  $\beta_F$ , wenn die Konfiguration an der betreffenden Doppelbindung bzw. an dem betreffenden Chiralitätszentrum (oder die konfigurative Einheitlichkeit eines Präparats hinsichtlich des betreffenden Strukturelements) ungewiss ist.

Beispiele:

- 1-Nitro- $\xi$ -cycloocten [E IV 5 264]  
 1*t*,2-Dibrom-3-methyl-penta-1,3 $\xi$ -dien [E IV 1 1022]  
 (4*aS*)-2 $\xi$ ,5 $\xi$ -Dichlor-2 $\xi$ ,5 $\xi$ ,9,9-tetramethyl-decahydro-(4*ar*,9*at*)-benzo-  
 cyclohepten [E IV 5 353]  
 D<sub>r</sub>-1 $\xi$ -Phenyl-1 $\xi$ -*p*-tolyl-hexanpentol-(2*r*<sub>F</sub>,3*t*<sub>F</sub>,4*c*<sub>F</sub>,5*c*<sub>F</sub>,6) [E III 6 6904]  
 6 $\xi$ -Methyl-bicyclo[3.2.1]octan [E IV 5 293]  
 4,10-Dichlor-1 $\beta$ ,4 $\xi$ *H*,10 $\xi$ *H*-cadinan [E IV 5 354]  
 (11*S*)-6 $\xi$ ,12-Epoxy-4 $\xi$ *H*,5 $\xi$ -eudesman [E III/IV 17 350]  
 3 $\beta$ ,5-Diacetoxy-9,11 $\alpha$ ; 22 $\xi$ ,23 $\xi$ -diepoxy-5 $\alpha$ -ergost-7-en [E III/IV 19 1091]

- b) Das Symbol  $\mathcal{E}$  tritt an die Stelle von *D* oder *L*, das Symbol ( $\mathcal{E}$ ) an die Stelle von (*R*) oder (*S*) bzw. von (*E*) oder (*Z*), wenn die Konfiguration an dem betreffenden Chiralitätszentrum bzw. an der betreffenden Doppelbindung (oder die konfigurative Einheitlichkeit eines Präparats hinsichtlich des betreffenden Strukturelements) ungewiss ist.

Beispiele:

- N*-{*N*-[*N*-(Toluol-sulfonyl-(4))-glycyl]- $\mathcal{E}$ -seryl}-*L*-glutaminsäure [E III 11 280]  
 (3 $\mathcal{E}$ ,6*R*)-1,3,6-Trimethyl-cyclohexen [E IV 5 288]  
 (1*Z*,3 $\mathcal{E}$ )-1,2-Dibrom-3-methyl-penta-1,3-dien [E IV 1 1022]

- c) Die Symbole ( $\mathcal{E}_a$ ) und ( $\mathcal{E}_p$ ) zeigen unbekannte Konfiguration von Strukturelementen mit axialer bzw. planarer Chiralität (oder ungewisse Einheitlichkeit eines Präparats hinsichtlich dieser Elemente) an; das Symbol ( $\xi$ ) kennzeichnet unbekannte Konfiguration eines Pseudoasymmetriezentrums.

Beispiele:

- ( $\mathcal{E}_a$ ,6 $\mathcal{E}$ )-6-[(1*S*,2*R*)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenyl-äthyl]-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-dibenz[*c,e*]azocinium-jodid [E III/IV 20 3932]  
 (3 $\xi$ )-5-Methyl-spiro[2.5]octan-dicarbonsäure-(1*r*,2*c*) [E III 9 4002]

- § 12. Das Symbol \* am Anfang eines Artikels bedeutet, dass über die Konfiguration oder die konfigurative Einheitlichkeit des beschriebenen Präparats keine Angaben oder hinreichend zuverlässige Indizien vorliegen. Wenn mehrere Präparate in einem solchen Artikel beschrieben sind, ist deren Identität nicht gewährleistet.

## Transliteration von russischen Autorennamen

Russisches Schrift- zeichen	Deutsches Äquivalent (BEILSTEIN)	Englisches Äquivalent (Chemical Abstracts)	Russisches Schrift- zeichen	Deutsches Äquivalent (BEILSTEIN)	Englisches Äquivalent (Chemical Abstracts)
А	а	a	Р	р	r
Б	б	b	С	с	s
В	в	w	Т	т	t
Г	г	g	У	у	u
Д	д	d	Ф	ф	f
Е	е	e	Х	х	kh
Ж	ж	sh	Ц	ц	ts
З	з	s	Ч	ч	ch
И	и	i	Ш	ш	sh
Й	й	i	Щ	щ	shch
К	к	k	Ы	ы	y
Л	л	l	Ь	ь	,
М	м	m	Е	е	e
Н	н	n	Ю	ю	yu
О	о	o	Я	я	ya
П	п	p			