

2018

护士执业资格考试

押题秘笈

阿虎医考命题研究中心 组编

免费赠送

视频课程 75 小时

五套卷子 题题解析



上海科学技术出版社
Shanghai Scientific & Technical Publishers

全国百佳图书出版单位
Top 100 Publishing Houses in China

阿虎医考
AHUYIKAO.COM


2018 护士执业资格考试

押题秘笈

答案与解析



阿虎医考命题研究中心 组编



上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

2018 护士执业资格考试押题秘笈/阿虎医考命题研究中心编. —上海:上海科学技术出版社,2018.1

ISBN 978-7-5478-3733-7

I. ①2… II. ①阿… III. ①护士—资格考试—习题集
IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 256179 号

授权码粘贴处

2018 护士执业资格考试押题秘笈

阿虎医考命题研究中心 组编

上海世纪出版(集团)有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235 www.sstp.cn)

印刷

开本 787×1092 1/16 印张 16.5

字数: 310 千

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-3733-7/R·1470

定价: 28.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换

前言



2018 年护士执业资格考试已迫在眉睫！为了帮助考生顺利地通过 2018 年的护士执业资格考试，我们组编了《2018 护士执业资格考试押题秘笈》，既然是“秘笈”，必有其独特之处，且听我一一道来。

一、分析五年考题，结合最新指南

在组编试卷之前，我们分别对近五年的护士执业资格考试试题进行了归纳和分析，掌握了近五年考试中各章节的出题比例以及题目的难易程度，同时分析了五年考试中各题型的变化趋势，在此基础上对 2018 年的护士执业资格考试进行了预测。同时，我们也结合了最新版的考试指南，对试卷做了进一步的调整。相信这五套试卷会让你在护士执业资格考试中出现熟悉的感觉！

二、五套试卷，题题解析

是的，你没有看错！五套试卷，1 200 道题目，每一道题目都有答案和解析。这 1 200 道题目是我们经过多层工序挑选出来的。为了考生可以更好地掌握这些题目，我们呕心沥血地为每道题写上了详尽的解析。这些解析不仅可以帮助考生答疑解惑，而且解析中会进行相关知识点的讲解和串联，让考生可以更好地掌握相关的考点，相当于又进行了一次复习。

三、免费赠送考试培训在线课程

按照书里刮刮卡的指示进行注册，输入授权码，即可免费获得视频课程约 75 小时。备考的过程很枯燥，我们会尽量把课程做得有趣。复习有趣一点，考试轻松一点。

另外，封底有我们的二维码，是关于护理考试的微信公众号，公众号中会推送护士执业资格考试最新变动资讯，也会定时推送考点的轻松记忆法，相信会带给你不一样的复习体验！

编者

2017 年 10 月

目 录



模拟试卷一

专业实务	1
实践能力	8

模拟试卷二

专业实务	16
实践能力	23

模拟试卷三

专业实务	31
实践能力	37

模拟试卷四

专业实务	46
实践能力	54

模拟试卷五

专业实务	62
实践能力	69





模拟试卷一·专业实务



答案

1. A 2. D 3. B 4. A 5. B 6. C 7. B 8. A 9. D 10. B 11. B 12. B 13. A
14. B 15. C 16. E 17. C 18. D 19. D 20. C 21. B 22. D 23. B 24. D 25. D 26. A
27. C 28. D 29. A 30. B 31. A 32. C 33. B 34. E 35. E 36. A 37. B 38. A 39. B
40. A 41. B 42. A 43. C 44. C 45. A 46. D 47. E 48. A 49. C 50. D 51. E 52. C
53. A 54. C 55. D 56. A 57. B 58. D 59. A 60. E 61. B 62. A 63. C 64. A 65. C
66. A 67. E 68. B 69. B 70. A 71. D 72. B 73. D 74. A 75. B 76. A 77. B 78. A
79. A 80. B 81. D 82. E 83. C 84. C 85. B 86. C 87. B 88. D 89. A 90. D 91. D
92. B 93. D 94. D 95. C 96. B 97. D 98. A 99. C 100. E 101. A 102. C 103. C
104. D 105. D 106. A 107. C 108. E 109. C 110. B 111. C 112. E 113. D 114. B
115. E 116. A 117. A 118. E 119. A 120. C

1. 解析:乙类传染病按甲类传染病管理的是传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感及甲型 H1N1。故本题选 A。

2. 解析:肝对雌激素、抗利尿激素和醛固酮等多种激素具有灭活作用。肝硬化时灭活作用减退致激素水平增高:①雌激素增多可引起蜘蛛痣、肝掌和男性乳房发育等;②抗利尿激素和醛固酮增多可引起体内水钠潴留,导致腹水和水肿。故本题选 D。

3. 解析:毒蕈碱样症状是由于有机磷毒物与体内的胆碱酯酶结合,使乙酰胆碱代谢紊乱,大量积聚,使副交感神经末梢持续兴奋所致。故本题选 B。

4. 解析:大手术后的患者代谢高,适宜高蛋白饮食,而高维生素的食物对于外科手术后减少创口感染和促进创口愈合具有重要意义,因此大手术后患者宜采用高蛋白、高维生素饮食。故本题选 A。

5. 解析:电复律后要严密观察心律、心率、呼吸、血压,每半小时测量并记录 1 次直至平稳,并注意面色、神志、肢体活动情况。故本题选 B。

6. 解析:尿培养标本的采集注意事项:①在应用抗菌药之前或停用抗菌药 5 天之后留取尿标本;②留取尿液时要严格无菌操作;③尿标本必须在 1 小时内做细菌培养,否则需冷藏保存;④勿混入消毒液及患者阴道分泌物。故本题选 C。

7. 解析:足月胎儿的脐带长 30~70 cm,内有一根脐静脉和两根脐动脉。胎儿通过脐带血循环与母体进行营养和代谢物质的交换。故本题选 B。

8. 解析:甲型肝炎无病毒携带状态。患者在发病前 2 周和起病后 1 周,从粪便中排出病毒的数量最多,传染性最强。故本题选 A。

9. 解析:PDCA 管理循环中,P 指计划,D 指实施,C 指检查,A 指处理。处理阶段是 PDCA 循环的关键,因为处理阶段就是解决存在问题、总结经验和吸取教训的阶段。故本题选 D。

10. 解析:阿米巴原虫在低温的环境下易失去活力而难以查到,保温容器可以保持阿米巴原虫的活动状态,方便标本的检验。故本题选 B。

11. 解析:风湿性心瓣膜病是风湿热引起的风湿性心脏炎症过程所致的心瓣膜损害,与 A 组 β 溶血性链球菌反复感染有关。故预防风湿性心瓣膜病最关键的措施是积极防治 A 组 β 溶血性链球菌感染。故本题选 B。

12. 解析:二级护理适用于病情稳定但仍需卧床的部分生活自理的患者。生活基本能自理者应为三级护理。故本题选 B。



13. 解析:铁剂治疗有效者于用药后1周左右网织红细胞数开始上升,10天左右渐达高峰;2周左右血红蛋白开始升高,1~2个月恢复至正常。为进一步补足体内储存铁,在血红蛋白恢复正常后,仍需继续服用铁剂3~6个月,或待血清铁蛋白 $>50\mu\text{g/L}$ 后停药。故本题选A。

14. 解析:劝说性语言是指当患者行为不当时,护士对其采用的一种语言表达方式。如患者在病房内吸烟时对患者晓之以理,动之以情,向患者讲清吸烟的危害及对疾病治疗的影响。故本题选B。

15. 解析:护士在一般情况下不执行口头医嘱,在抢救或手术过程中医生下口头医嘱时,执行护士应先复诵一遍,双方确认无误后方可执行,事后应及时据实补写医嘱;对有疑问的医嘱,必须核对清楚后方可执行。医嘱须每班、每日核对,每周总查对,查对后签全名。故本题选C。

16. 解析:护士使用了专业术语“产”“男婴”,不够贴近生活,应该说“恭喜您生了一个男孩”。故本题选E。

17. 解析:①少尿:婴幼儿 $<200\text{ml/d}$;学龄前期患儿 $<300\text{ml/d}$;学龄期患儿 $<400\text{ml/d}$ 。②无尿: $<50\text{ml/d}$ 。故本题选C。

18. 解析:子宫颈刮片细胞学检查分级:①巴氏Ⅰ级:正常;②巴氏Ⅱ级:炎症;③巴氏Ⅲ级:可疑癌;④巴氏Ⅳ级:高度可疑癌;⑤巴氏Ⅴ级:典型癌细胞。故本题选D。

19. 解析:患者有个人隐私和尊严被保护的权利,不允许未经同意而泄露,故B、E错误。A中护士做法不够热情,过于冷漠,A错误;C做法没有考虑保密对患者母女关系的影响,也不够妥当,排除C。故本题选D。

20. 解析:门诊护士应随时观察候诊患者病情,如患者为高热、剧痛、休克、出血、呼吸困难等,安排提前就诊或送急诊。对年老体弱、危重患者可适当调整就诊顺序。故本题选C。

21. 解析:凡需要入血的使用碘化物造影剂的检查,首次用药时应在碘造影前1~2天做过敏试验,结果为阴性时方可做碘造影检查。选项中只有B需要使用造影剂。故本题选B。

22. 解析:处于忧郁期的患者主要表现为对周围事物的淡漠,语言减少,反应迟钝,对任何东西均不感兴趣。应鼓励家属多陪伴、照顾患者。故本题选D。

23. 解析:颅骨骨折时硬脑膜破裂为开放性骨折,硬脑膜完好则为闭合性骨折。伴有脑脊液漏的颅底骨折说明硬脑膜已破裂,属于开放性骨折。故本题选B。

24. 解析:ac是“饭前”的外文缩写,H指代“皮下注射”。故本题选D。

25. 解析:炎性浸润期:静脉回流受阻,局部静脉淤血,受压部位呈紫红色。皮下产生硬结,常有水疱形成,极易破溃;有痛感。炎性浸润期与本题患者临床表现相符,故本题选D。

26. 解析:无论是患者、患者家属、医护人员均应遵守医院规章制度,以保证医疗秩序正常运行。故未到探视时间,不允许患者家属探望患者,以免影响医院秩序。但在拒绝的同时应做好充分的解释工作,取得理解。故本题选A。

27. 解析:手术时,患者置身于陌生的环境中,话语不多的紧张气氛,手术中金属器械的碰撞声,对切口、出血情况的想象,内脏牵拉疼痛等均可使患者紧张及恐惧。故本题选C。

28. 解析:胃癌手术后早期禁食、胃肠减压,以减少胃内积气、积液;待肠蠕动恢复,肛门排气后可拔除胃管,拔胃管后第1天可饮少量水或米汤,第2天进半量流质饮食,第3天进全量流质,第4天可进半流质饮食。故本题选D。

29. 解析:化脓性脑膜炎应采用敏感的、可通过血脑屏障的、毒性低的抗生素治疗。肺炎链球菌选用青霉素;流感嗜血杆菌应选氨苄西林或头孢三代;脑膜炎双球菌应选青霉素、氨苄



西林或头孢三代。故本题选 A。

30. 解析:患者有权要求有关其病情资料、治疗内容和记录应如同个人隐私,须保守秘密。患者有权要求对其医疗计划,不允许未经同意而泄露,不允许任意将患者姓名、身体状况、私人事务公开,更不能与其他不相关人员讨论别人的病情和治疗,否则就是侵害公民隐私权。故本题选 B。

31. 解析: β_2 肾上腺素受体激动剂为控制哮喘急性发作的首选药物,用药首选定量吸入法。故本题选 A。

32. 解析:进行尸体护理时应:①屏风遮挡,以维护死者隐私;②劝慰家属,请家属暂离病房或共同进行尸体护理;③将尸体仰卧,头下置一软枕,可防止面部瘀血变色;④用棉花堵塞于各个孔道,防止体液外溢;⑤有伤口者更换敷料,有引流管者应拔出后缝合伤口或用蝶形胶布封闭并包扎。故本题选 C。

33. 解析:腹会阴联合直肠癌根治术即 Miles 手术,需要切除肛管及肛门周围约 5 cm 的皮肤,并于左下腹行永久性结肠造口。行肠造瘘口后患者排便方式改变,出现自我形象紊乱的问题。故本题选 B。

34. 解析:体温单底栏应用蓝笔填写,数据以阿拉伯数字记录,免写计量单位。填写的内容包括大便次数、尿量、出入量、体重、血压、其他及页码。故本题选 E。

35. 解析:炎症早期用热,可促进炎性渗出物吸收与消散;炎症后期用热,可促进白细胞释放蛋白溶解酶,使炎症局限。故腕部皮肤脓肿形成时可选用热湿敷。按摩可能使感染扩散,硫酸镁湿敷适用于水肿部位,乙醇擦拭及局部冰敷属于冷疗法,均不适合使用。故本题选 E。

36. 解析:临终关怀是以对症为主的照料,目的在于提高临终患者的生命质量,维护其尊严,让其能够无痛苦、舒适地走完人生的最后旅途。故 A 是本题最佳答案。

37. 解析:门诊护士应随时观察候诊患者病情,如患者为高热、剧痛、休克、出血、呼吸困难等,安排提前就诊或送急诊。对年老体弱、危重患者可适当调整就诊顺序。故本题选 B。

38. 解析:qn 是每晚 1 次的外文缩写,属于长期医嘱。长期备用医嘱简写为 prn,临时备用医嘱简写为 sos,即刻医嘱简写为 st。故本题选 A。

39. 解析:护士对患者进行健康教育和对实习护士和新护士进行专业教育时担任教育者的角色。本题中护士指导患者进行胰岛素注射学习,属于对患者的健康教育。故本题选 B。

40. 解析:乳果糖口服后在小肠不会被分解,可以降低肠道 pH 值,抑制肠道细菌生长,使肠道细菌产氨减少,并可以减少氨的吸收,促进血液中的氨从肠道排出。故本题选 A。

41. 解析:母乳含有较多双歧因子,双歧因子能促进双歧杆菌生长,抑制大肠埃希菌生长。故本题选 B。

42. 解析:患者担心新护士的操作水平不高,这是护患之间存在信任危机,故新护士应向患者解析,说服患者相信自己。B 选项违反了自主原则,C 选项将导致护患关系恶化,D 会加剧信任危机,E 不是首先应该做的,故应排除 B、C、D、E。故本题选 A。

43. 解析:为了预防跌倒,老年人所居住的环境应有足够的采光,夜间室内应有照明,特别在卧室与卫生间之间应有良好的夜间照明设施;室内通道布置无障碍物,方便老人行走;洗澡时间不宜过长,水温不宜过高,提倡坐式淋浴。预防坠床,在条件允许的情况下尽量选用宽大舒适的床具,必要时安装床栏。通风换气可改变室内温度和湿度,增加老年人的舒适感。故本题选 C。

44. 解析:活动义齿应取下用冷水刷洗并浸泡于冷水中待用,待患者漱口后再戴回。不可使用热水或乙醇泡义齿,以免老化变形。故本题选 C。



45. 解析:个案护理是一名当班护士负责一位患者全部护理内容,适用于病情复杂严重、病情变化快、护理服务需求量大,需要 24 小时监护和照顾的患者。故本题选 A。

46. 解析:患者伤口愈合不良,故 C 错误。羊肠线不为患者机体吸收,属于患者体质特殊,在医疗活动中由于患者病情异常或者体质特殊而发生医疗意外的不属于医疗事故,故 A、B、E 错误。故本题选 D。

47. 解析:青春期是从月经初潮至生殖器官发育成熟的时期。月经初潮是青春期的重要标志。故本题选 E。

48. 解析:含保存液的血液 pH 为 7.0~7.25,随着保存时间延长,葡萄糖分解,乳酸增高,pH 值逐渐下降。此外,由于红、白细胞逐渐破坏,细胞内钾离子外溢,使血浆钾离子浓度升高,酸性增强。因此,大量输注库存血可以导致酸中毒和高血钾的发生。故本题选 A。

49. 解析:嗜睡是最轻度的意识障碍。患者持续睡眠,但能被言语或轻度刺激唤醒,醒后能正确、简单而缓慢地回答问题,但反应迟钝,刺激去除后又很快入睡。故本题选 C。

50. 解析:湿热敷的注意事项:①温度 50~60℃;②每 3~5 分钟更换一次敷布,持续 15~20 分钟;③勿用摩擦方法擦干皮肤;④面部热敷者,应间隔 30 分钟方可外出,以防感冒;⑤热敷部位有伤口,须按无菌技术处理伤口。A、B、C、E 虽然是伤口湿热敷应该注意的事项,但不是最重要的,故本题选 D。

51. 解析:某些磺胺类药物经肾脏排出,尿少时易析出结晶损伤肾,故服药后应多饮水以促进药物溶解。故本题选 E。

52. 解析:肛管术后每日早晚及便后采用温水坐浴,既可缓解局部疼痛,减轻肛门括约肌痉挛,又有利于局部炎症的消散、吸收。坐浴溶液可采用 1:5000 高锰酸钾或中药。故本题选 C。

53. 解析:护患交谈中不正确的回应方式有:①过于肯定,不留余地,如“需要多和别人交流,否则病情无法减轻”及“听完病就会减轻”,B、C 错;②过于直率和不恰当的坦诚,如“你必须听”,D 错;③过分回应,E 中让患者自行观看属于过分冷漠,E 错。故本题选 A。

54. 解析:血是循行于脉中而富有营养的红色液态物质,可濡养与化神。化神即血是机体精神活动的主要物质基础。故本题选 C。

55. 解析:新生儿特殊生理状态包括生理性体重下降、生理性黄疸、乳腺肿大、假月经及“马牙”。而生理性贫血不属于特殊生理状态,故本题选 D。

56. 解析:吸气性呼吸困难的表现:吸气显著困难,吸气时间延长,有明显的三凹征,即吸气时胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙出现凹陷,多见于气管阻塞、气管异物、喉头水肿等。故本题选 A。

57. 解析:常用的抗甲状腺药物分为硫脲类和咪唑类两类。硫脲类有甲硫氧嘧啶,咪唑类有甲硫咪唑,其作用均是抑制甲状腺激素的合成。故本题选 B。

58. 解析:疱疹性咽峡炎是一种急性传染性、发热性疾病,主要由柯萨奇 A 组病毒引起,其特点为疱疹性溃疡性黏膜损害。故本题选 D。

59. 解析:五味入五脏,其中苦入心,辛入肺,酸入肝,甘入脾,咸入肾。故本题选 A。

60. 解析:尿培养标本的采集应在应用抗菌药之前或停用抗菌药 5 天之后留取尿标本。故本题选 E。

61. 解析:急性肾衰竭患者血肌酐增高,故应给予优质蛋白摄入,并限制摄入量;分解代谢高,患者常消瘦,故给予高糖饮食。综上只有 B 选项符合,故本题选 B。

62. 解析:根据不同病原菌选用敏感抗生素,如沙门菌属食物中毒可选用喹诺酮类或氯霉



素,副溶血性弧菌食物中毒可选用氯霉素、四环素或喹诺酮类,大肠埃希菌食物中毒可选用阿米卡星。故本题选 A。

63. 解析:不全流产的表现为妊娠产物部分排出体外,阴道出血持续不止,严重时可引起出血性休克,下腹痛减轻。子宫增大小于停经周数,宫颈口已扩张。故本题选 C。

64. 解析:特级护理适用于:①危重,需随时观察,以便及时抢救;②重症监护;③重伤或大面积灼伤;④复杂疑难的大手术后;⑤使用呼吸机辅助呼吸;⑥连续性肾脏替代治疗的患者。故本题选 A。

65. 解析:法洛四联症青紫的严重程度及出现的早晚与肺动脉狭窄程度成正比。故本题选 C。

66. 解析:《献血法》第三条规定:地方各级人民政府领导本行政区域内的献血工作,统一规划并负责组织、协调有关部门共同做好献血工作。故本题选 A。

67. 解析:卧位时由于上身重量不再对腰椎产生压力,因而腰椎承受的负荷最小;站立位时腰椎可依靠周围韧带及脊柱两旁少量的肌肉减轻负荷;坐位时身体重心移至脊柱前方,后部韧带紧张,负荷增大,腰椎负荷比站立位时要大得多,但正直的坐位可较好地保持骨盆前倾及腰椎前凸位置,而使腰椎的负荷降低。综上所述,本题选 E。

68. 解析:根据题意,患者随意运动丧失,对语言及光线刺激无反应可知患者处于昏迷状态,昏迷患者禁止漱口,以免引起误吸。故本题选 B。

69. 解析:帮助患者解决一切困难出发点是好的,但却不妥当,即不能对患者做出不负责任的承诺,因为一旦不能解决患者的某种困难时,就容易因为不恰当的承诺引发护患纠纷。故本题选 B。

70. 解析:急性肾小球肾炎的水肿主要为肾小球滤过率下降导致水钠潴留所引起,多表现为晨起眼睑水肿,可伴有双下肢水肿,严重者可出现全身性水肿、胸水和腹水。故本题选 A。

71. 解析:静脉注射失败的常见原因:①针头刺入静脉过少,松止血带后针头滑出血管,抽吸无回血;②针头斜面未完全刺入静脉,抽吸有回血,推药局部隆起并有痛感;③针头刺入较深,斜面一半穿破对侧血管壁,抽吸有回血,推药局部可无隆起,但有痛感;④针头刺入过深,穿破对侧血管壁,抽吸无回血。只有第二种情况符合患者表现,故本题选 D。

72. 解析:多根多处肋骨骨折,局部胸壁因失去完整肋骨的支撑而软化,可出现反常呼吸运动。故本题选 B。

73. 解析:疾病不仅给患者带来痛苦,同时也会引起患者家属痛苦心理的连锁反应,尤其是对于突发事件导致的危重患者或绝症患者的家属。按照我国医疗保护的惯例,对于心理承受能力较差的患者,医护人员一般是采用“超越式”的沟通方式,首先将患者的病情和预后告诉患者的家属。故应向家属客观介绍患者情况,本题选 D。

74. 解析:阑尾切除术后最常见的并发症是感染,多由大肠埃希菌所致,表现为术后 3 天左右体温升高,切口局部胀痛或跳痛,脓液黏稠或灰白色。故本题选 A。

75. 解析:广泛性焦虑症以泛化且持久的、无明显对象的烦恼、过分担心和紧张不安为特征。除此以外可有运动不安、肌肉紧张、警觉增高。结合本题患者表现可知答案为 B。

76. 解析:低血糖时血糖 ≤ 2.8 mmol/L,可有肌肉颤抖、心慌、心悸、出汗、饥饿感等表现。一旦确定患者发生低血糖,应尽快补充糖分,解除脑细胞缺糖症状。故本题选 A。

77. 解析:Ⅱ型呼吸衰竭血气分析 $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg, $\text{PaCO}_2 > 50$ mmHg,应给予低流量(1~2 L/min)、低氧浓度(25%~29%)吸氧。故本题选 B。

78. 解析:新生儿出生后 24 小时以内及 1 月龄、6 月龄时需要接种乙肝疫苗。故本题



选 A。

79. 解析:目前扩张型心脏病的病因未明,对于继发性扩张型心肌病,持续病毒感染是其重要原因。故本题选 A。

80. 解析:患者有获得全部实情的知情权,即医疗机构及其医务人员应当将患者的病情、医疗措施、医疗风险等如实告知患者,及时解答其咨询。本题中医护人员未告知患者治疗措施的情况,侵犯了患者的知情同意权。故本题选 B。

81. 解析:慎独是指护士在个人独处的时候,仍能自觉地坚持护理道德信念,坚守护理道德规范。本题中护士独处时没能自觉遵守护理操作规程,违反了慎独精神。故本题选 D。

82. 解析:患者手指扣纽扣、系鞋带困难,是生活自理有缺陷,A 排除;患者慌张步态,容易跌倒,故有受伤的危险,B 排除;双手静止性震颤,抖动伴动作缓慢,是躯体活动障碍,C 排除;讲话声音断续,是语言沟通障碍,D 排除。故本题选 E。

83. 解析:记录出入量时,每日排出量主要为尿量,此外还包括排出液如大便、呕吐物、咯出物(咯血、咳痰)、出血量、引流量、创面渗液量等。故本题选 C。

84. 解析:护士的权利包括:①获取工资报酬,享受福利待遇,参加社会保险;②获得与其所从事的护理工作相适应的卫生防护、医疗保健服务;③获得与本人业务能力和学术水平相应的专业技术职务、职称;④护士有获得疾病诊疗、护理相关信息的权利和其他与履行护理职责相关的权利。故本题选 C。

85. 解析:血液碳氧血红蛋白测定对一氧化碳中毒有确诊价值,尽早确定中毒程度,能决定合适的吸氧方案,有利于病情恢复。故应尽快采血检查,本题选 B。

86. 解析:月经是周而复始发生的子宫内膜剥脱性出血,是女性的正常生理现象。女性月经来潮时因有子宫内膜剥落出血,故应加强营养,不做剧烈运动,防止出血加重或出血过多导致贫血。一般月经期无须卧床休息,可正常生活与工作。故本题选 C。

87. 解析:温水擦浴对于 38.5℃ 以上降温效果不明显,A 错误;血液患者禁用乙醇擦浴,C 错误;冰水灌肠常用于中暑患者降温,D 错误;临床上为高热患者降温,首选物理降温,物理降温效果不显著时采用药物降温,E 错误。故本题选 B。

88. 解析:患者昏迷,为避免体温计被咬碎造成损伤,禁测口温;为偏瘫患者测血压,选择健侧测量,患者左半身偏瘫,应选右侧肢体测量血压。综上本题应选 D。

89. 解析:有口腔溃疡者用中药冰硼散或锡类散涂敷溃疡部;有口腔感染病灶者,遵医嘱局部使用抗生素。故本题选 A。

90. 解析:静脉血液标本最好于起床后 1 小时内采集;生化检验应在清晨空腹时采血。故抽查肝功能最佳采血时间是晨起空腹。本题选 D。

91. 解析:测定肝功能应采血清标本,将抽取的血液注入干燥试管。故本题选 D。

92. 解析:细菌性痢疾主要经消化道传播,其病原菌志贺菌属主要通过污染食物、水、生活用品,经口传播;亦可通过苍蝇污染食物而传播,故应采取消化道隔离。本题选 B。

93. 解析:严密、保护性隔离患者应住单人房。接触、呼吸道、肠道、血液-体液和昆虫隔离,同种患者可居一室。而本题选项中只有伤寒是采取消化道隔离的病种,故可将此患者与伤寒患者共住一室。本题选 D。

94. 解析:题干中患者希望了解自己的病情,对不知病情感到焦虑,而家属却怕患者知道病情,对病情的知情上有了冲突,故在安抚患者家属的同时维护患者的知情同意权是尤为需要注意的。故本题选 D。

95. 解析:患者有获得全部实情的知情权,但应当避免对患者产生不利后果。故护士应告



知患者病情,但为防止与患者家属出现护患矛盾,最好先征得家属同意;为避免患者接受不了病情,应选择恰当时机、酌情告知。故本题选 C。

96. 解析:紫外线消毒使用的是 C 波紫外线,其波长范围为 200 ~ 275 nm,杀菌作用最强的波段为 250 ~ 270 nm。故本题选 B。

97. 解析:紫外线灯管消毒时注意事项:①保持灯管清洁:一般每 2 周 1 次用无水乙醇纱布或棉球轻轻擦拭以除去灰尘和污垢;②消毒环境合适;③正确计算并记录消毒时间:紫外线的消毒时间须从灯亮 5 ~ 7 分钟后开始计时,若使用时间超过 1 000 小时,需更换灯管;④加强防护:照射时人应离开房间,必要时戴防护镜、穿防护衣,照射完毕后应开窗通风;⑤定期监测灭菌效果。故本题选 D。

98. 解析:该患者为颅脑手术者,为减轻颅内压,预防脑水肿,一般清醒后采取头高足低位,以利于引流。故本题选 A。

99. 解析:协助颅脑手术患者翻身时患者应健侧或平卧位,翻身时头不可剧动,以免引起脑疝,导致患者突然死亡。A、B、D、E 虽然也是为一般患者翻身的注意事项,但不是最重要的事项。故本题选 C。

100. 解析:协助颅脑手术者患者翻身时患者应健侧或平卧位,A 错误;敷料应干燥或更换并固定妥当后再行翻身,B 错误;翻身后应下腿伸直,上腿弯曲,C 错误;翻身时引流管保持畅通,D 错误;翻身时护士两人站在床的同侧,一人托住患者颈肩部和腰部,另一人托住患者臀部和腘窝部,E 正确。故本题选 E。

101. 解析:题中未提及患者有膀胱炎,B 错误;保持局部通畅是目的的一部分,但不是主要目的,C 错误;留取尿标本无须膀胱冲洗,D 错误;训练膀胱功能应采取间歇性夹闭导尿管方式,E 错误;留置导尿管时膀胱冲洗的主要目的是预防感染,故本题选 A。

102. 解析:一般患者膀胱冲洗液温度为 38 ~ 40 ℃。若为前列腺肥大摘除术后患者,用 4 ℃ 左右的生理盐水灌洗。故本题选 C。

103. 解析:膀胱冲洗液的液面距床面 60 cm,以便产生一定的压力,使液体能够顺利滴入膀胱。故本题选 C。

104. 解析:确认胃管是否在胃内有三种方法:①在胃管末端连接注射器抽吸,能抽出胃液;②置听诊器于患者胃部,快速经胃管向胃内注入 10 ml 空气,听到气过水声;③将胃管末端置于盛水的治疗碗中,无气泡逸出。故 D 做法错误,为本题答案。

105. 解析:下颌靠近胸骨柄可增大咽喉通道的弧度,便于胃管顺利通过会咽部,利于插管。故本题选 D。

106. 解析:插入中若患者呛咳、呼吸困难、发绀等,应立即拔出胃管。若恶心、呕吐,可暂停插管并嘱患者深呼吸。故本题选 A。

107. 解析:鼻饲液或药液应缓慢注入,温度 38 ~ 40 ℃。故本题选 C。

108. 解析:鼻饲液每次量 ≤ 200 ml,鼻饲间隔时间 ≥ 2 小时;长期鼻饲者应每日进行口腔护理 2 次,并定期换胃管,普通胃管每周更换一次,硅胶胃管每月更换一次。更换胃管时应晚间拔管,次晨再从另一侧鼻孔插入。故本题选 E。

109. 解析:拔胃管时,应嘱患者深呼吸,在患者呼气时拔管,到咽喉处快速拔出。故本题选 C。

110. 解析:患者处于半坐位时,在重力作用下,胸腔容量增大,肺活量增加,且半坐位时,回心血量减少,减轻心脏负担,改善呼吸困难。故本题选 B。

111. 解析:患者意识清晰,有改变卧位的能力,但由于呼吸困难,被迫采取半坐位,为强迫



体位。故本题选 C。

112. 解析:乙型肝炎主要经过血液途径传播,因此应进行血液体液隔离。故本题选 E。

113. 解析:被套和衣裤属于耐高温、耐高压、耐潮湿的物品,应选用临床上灭菌效果最可靠的高压蒸汽灭菌。故本题选 D。

114. 解析:弛张热的特点为体温在 39℃ 以上,24 小时内温差达 1℃ 以上,体温最低时仍高于正常水平。见于败血症、风湿热、化脓性疾病等。故本题选 B。

115. 解析:退热期时,散热大于产热,体温恢复正常。由于大量出汗、体液丧失,易出现虚脱和休克现象,表现为血压下降、脉搏细速、四肢湿冷等。故本题选 E。

116. 解析:应给予患者高热量、高蛋白、高维生素、易消化的流质或半流质饮食,鼓励患者少量多餐。故本题选 A。

117. 解析:为患者导尿时,初步消毒的原则是由上至下、由内向外。故本题选 A。

118. 解析:盆腔内器官手术前留置导尿管,引流出尿液,以保持膀胱空虚,可避免术中误伤。故本题选 E。

119. 解析:尿标本留取时间:12 小时尿标本,7 pm 至次晨 7 am; 24 小时尿标本,7 am 至次晨 7 am,留取前排空膀胱。故本题选 A。

120. 解析:爱迪计数检查时,应在尿液中加入 40% 甲醛,用来固定尿液中有机成分、防腐。故本题选 C。

模拟试卷一·实践能力



答案

1. B 2. A 3. A 4. C 5. C 6. A 7. C 8. C 9. A 10. D 11. E 12. C 13. C
14. B 15. A 16. D 17. B 18. C 19. B 20. D 21. C 22. B 23. C 24. A 25. D 26. D
27. D 28. C 29. A 30. E 31. B 32. C 33. C 34. B 35. D 36. C 37. E 38. E 39. C
40. B 41. C 42. E 43. E 44. B 45. A 46. C 47. A 48. B 49. A 50. A 51. D 52. B
53. B 54. A 55. D 56. C 57. D 58. D 59. C 60. B 61. A 62. D 63. A 64. E 65. A
66. E 67. B 68. E 69. D 70. D 71. E 72. A 73. B 74. D 75. B 76. A 77. C 78. D
79. E 80. C 81. C 82. E 83. E 84. E 85. E 86. C 87. E 88. B 89. A 90. D 91. C
92. D 93. A 94. B 95. D 96. E 97. C 98. B 99. B 100. B 101. D 102. C 103. D
104. A 105. D 106. B 107. D 108. D 109. D 110. B 111. B 112. B 113. A 114. E
115. C 116. D 117. B 118. C 119. D 120. C

1. 解析:胎儿娩出后 24 小时内出血量超过 500 ml 者为产后出血。产后出血是我国产妇死亡的首要原因。故本题选 B。

2. 解析:乳腺癌淋巴转移,最初多见于患侧腋窝;血行转移,最常见转移依次为肺、骨、肝。故本题选 A。

3. 解析:肿瘤若压迫颈交感神经,则会引起同侧上眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、面部无汗等颈交感神经综合征(Horner 征)表现。故本题选 A。

4. 解析:一氧化碳中度中毒可出现头晕、心悸、恶心、呕吐、四肢无力、面色潮红、口唇呈樱桃色、昏厥甚至昏迷,其中最典型的特征是面色潮红、口唇呈樱桃红色。故本题选 C。

5. 解析:肝性脑病是晚期肝硬化最严重的并发症,也是最常见的死亡原因。故本题选 C。



6. 解析:对大咯血及意识不清的患者,应在病床旁备好急救器械,一旦患者出现窒息征象,应立即取头低脚高 45° 俯卧位,面向一侧,轻拍背部,迅速排出气道和口咽部的血块。患者已出现窒息征象。故本题选 A。

7. 解析:口服缓泻药和简易通便剂都不作为便秘时首选措施,不能对此两者产生依赖,不能常用。故不能排便不畅就使用开塞露。故本题选 C。

8. 解析:金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、支原体、衣原体均对多种抗生素敏感,通常情况经抗生素治疗有效;抗生素对病毒无效,故腺病毒导致的肺炎一般选用有效的病毒抑制剂,如利巴韦林、阿昔洛韦、奥司他韦、阿糖腺苷等治疗。故本题选 C。

9. 解析:交替脉是一种节律正常而强弱交替出现的脉搏,常见于高血压心脏病、冠状动脉粥样硬化性心脏病等。交替脉是左心衰竭的重要体征。故本题选 A。

10. 解析:老年人的皮肤变化:皮肤失水、皮下脂肪与弹性组织逐渐减少,出现皮肤皱纹,皮肤松弛下垂,色素沉着出现老年斑。皮肤有硬结不是老年人正常的生理变化,故本题选 D。

11. 解析:细脉(丝脉):脉搏弱而小,扪之如细丝。常见于心功能不全、大出血、休克、主动脉搏狭窄等。故本题选 E。

12. 解析:强迫性穷思竭虑表现为患者对生活中的一些事情或自然现象寻根问底,反复思考,明知缺乏现实意义,没有必要,但无法控制。故本题选 C。

13. 解析:急性酒精中毒表现:①兴奋期:感觉头痛、欣快、兴奋。②共济失调期:行动笨拙,言语含糊不清,眼球震颤、步态不稳,出现明显共济失调。③昏迷期:昏睡,瞳孔散大,体温降低;深昏迷,心率快,血压下降,呼吸慢而有鼾音,可出现呼吸、循环麻痹而有生命危险。故本题选 C。

14. 解析:坐位或半坐位时,由于重力的作用:①血液滞留于下肢和盆腔,减少回心血量,减轻肺淤血和心脏负担;②膈肌下降,胸腔扩大,利于气体交换,改善呼吸。对于心衰患者,主要为减少回心血量。故本题选 B。

15. 解析:小儿输液速度宜慢,以每小时不超过 5 ml/kg 为宜,以防心力衰竭。故本题选 A。

16. 解析:糖尿病大血管病变是糖尿病最严重而突出的并发症,主要表现为动脉粥样硬化。患者活动后心慌、气短,伴有心前区疼痛,休息后可缓解,可知患者为稳定性心绞痛,属于冠脉粥样硬化性心脏病。综上可知,D 为正确答案。

17. 解析:1 级高血压:收缩压为 $140\sim 159\text{ mmHg}$,舒张压为 $90\sim 99\text{ mmHg}$ 。血压 $145/93\text{ mmHg}$ 属于 1 级高血压。故本题选 B。

18. 解析:昏迷患者禁忌漱口,以防误吸。但本题中患者神志清醒,没有此禁忌,可以漱口。故本题选 C。

19. 解析:支气管扩张患者咯血时,应轻轻拍击患者健侧背部,嘱患者不要屏气,以免诱发喉头痉挛,使血液引流不畅形成血块,导致窒息。故本题选 B。

20. 解析:慢性阻塞性肺疾病(COPD)早期在劳累时出现呼吸困难,逐渐加重,以致在日常活动甚至休息时也感到气短,是 COPD 的标志性症状。故本题选 D。

21. 解析:一般临床采用测量子宫底高度和腹围,对照末次月经日期,通过 B 型超声波检查,测定双顶径,检查母血中的胎盘泌乳素、雌三醇等生化指标的测定来判定胎儿的大小及成熟度。但近些年来多采用生化方法进行羊水胎儿成熟度测定,此方法最为可靠。故本题选 C。

22. 解析:麻疹黏膜斑(口腔黏膜科氏斑)是麻疹早期具有特征性的体征,一般在出疹前 $1\sim 2$ 天出现。开始时见于第二磨牙相对的颊黏膜上,为直径 $0.5\sim 1.0\text{ mm}$ 的灰白色小点,周



围有红晕,常在1~2天内迅速增多,可累及整个颊黏膜,于出疹后1~2天迅速消失。故本题选B。

23. 解析:青紫型先天性心脏病是先天性心脏病中最严重的一组,常见的有法洛四联症、大动脉错位。故本题选C。

24. 解析:心包缩窄多于急性心包炎后1年内形成,少数可长达数年。最早症状为疲乏及劳力性呼吸困难,主要与心搏量降低有关。故本题选A。

25. 解析:清洁造口及周围皮肤应使用生理盐水或温水,不用乙醇等消毒剂。故本题选D。

26. 解析:乳腺癌患侧上肢功能锻炼:术后24小时内活动手指和腕部;术后1~3天进行上肢肌肉等长收缩;术后4~7天患者可用患侧手洗脸、刷牙、进食等,A、C错误;术后10天抬高患侧上肢、手指爬墙等,B错误。下床时患肢抬高于胸前,扶持时扶健侧,E错误、D正确。故本题选D。

27. 解析:子宫内膜异位症手术为腹部手术,术后取半卧位,有利于减轻切口张力,减轻疼痛,还可使炎症局限,减轻全身中毒症状。故本题选D。

28. 解析:总产程超过24小时称为滞产,一般因子宫收缩乏力引起。故本题选C。

29. 解析:患者在床上翻来覆去直到凌晨1点才睡着属于入睡困难。早醒应是较自身睡眠规律的苏醒时间提前醒来且不能再入睡,B排除。题中没有提及患者多梦,也无对醒后情况的描述,C、D可排除;浅睡眠是睡眠周期中一个正常过程,E排除。故本题选A。

30. 解析:输卵管结扎术,是一种安全、永久性节育措施,适用于:①夫妇双方不愿再生育、自愿接受女性绝育手术且无禁忌证者;②患有严重心脏病、肝脏病等全身性疾病或遗传性疾病不宜生育者。题干中女性已婚未孕,故以后进行生育的可能性很大,将输卵管结扎术作为避孕方法不妥。故本题选E。

31. 解析:坐浴液一般用1:5000的高锰酸钾溶液,温度40~45℃,持续约20分钟;女性患者经期、妊娠后期、产后2周内、阴道出血和盆腔急性炎症不宜坐浴,以免引起和加重感染。高锰酸钾溶液是紫红色的,故本题选B。

32. 解析:洋地黄毒性反应处理:①立即停用洋地黄;②血钾低时应补钾;③纠正心律失常:快速性心律失常选用利多卡因或苯妥英钠,缓慢性心律失常选用阿托品。故本题选C。

33. 解析:正常成人在安静状态下脉率为60~100次/分,脉率超过100次/分为心动过速,低于60次/分为心动过缓。故本题选C。

34. 解析:肺炎链球菌肺炎患者咳铁锈色痰,与肺泡内浆液渗出和红细胞、白细胞渗出有关。故本题选B。

35. 解析:法洛四联症患者缺氧发作时:①立即置于膝胸卧位;②吸氧、保持患儿安静;③皮下注射吗啡0.1~0.2 mg/kg;④静脉应用碳酸氢钠;⑤重者可静脉缓慢注射β受体阻滞剂普萘洛尔减慢心率。故本题选D。

36. 解析:有些女婴生后5~7天阴道可见血性分泌物,持续1~3天,为假月经,一般不必处理。故本题选C。

37. 解析:肺心病并发肺性脑病时应给予持续低流量、低浓度吸氧,氧流量1~2 L/min,浓度在25%~29%。防止高浓度吸氧抑制呼吸,加重缺氧和二氧化碳潴留。故本题选E。

38. 解析:呼吸窘迫呈进行性加重是新生儿肺透明膜病的特点,可出现肌张力低下,呼吸暂停甚至出现呼吸衰竭。故本题选E。

39. 解析:再生障碍性贫血者一般血红蛋白低于60 g/L且明显缺氧者才纠正贫血,D、E



排除;再障的治疗不包括切除脾,A 错误;雄激素为目前治疗非重型再障的常用药,C 正确;B 不够具体,B 排除。故本题选 C。

40. 解析:氯沙坦是血管紧张素 II 受体拮抗剂,A 错误;美托洛尔是 β 受体阻滞剂,C 错误;氢氯噻嗪是利尿剂,D 错误;卡托普利是血管紧张素转换酶抑制剂,E 错误;维拉帕米是钙通道阻滞剂,B 正确。故本题选 B。

41. 解析:胎儿娩出后用 75% 乙醇消毒脐带根部周围,在距脐根 0.5 cm 及 1 cm 处用无菌粗丝线结扎后剪断脐带,挤出残余血液,用 20% 高锰酸钾液消毒脐带断面,注意药液切不可接触新生儿皮肤。故本题选 C。

42. 解析:硬膜外麻醉及全麻的择期手术患者,成人术前应禁食 8~12 小时,禁饮 4 小时,以保证胃排空;小儿术前应禁食(奶)4~8 小时,禁水 2~3 小时。局部麻醉不需要肠道准备。故本题选 E。

43. 解析:C 反应蛋白是组织损伤和炎症的非特异标志物,主要用于评估急性胰腺炎的严重程度。在胰腺坏死时 C 反应蛋白明显升高。故本题选 E。

44. 解析:做血气分析的标本应放置于肝素抗凝注射器中或动脉血气针中密封。故本题选 B。

45. 解析:胃大部切除术后 24 小时内可能并发胃出血,可见胃管不断引流出新鲜血液,出血多时血压降低,可出现休克。故应严密观察胃管引流液与血压变化。故本题选 A。

46. 解析:氟马西尼是苯二氮草类受体特异性拮抗剂,对苯二氮草类药有解毒作用。故本题选 C。

47. 解析:脑出血好发于高血压病患者,常于酗酒、情绪激动或体力活动时发病,可有肢体瘫痪和意识障碍表现,A 正确。脑血栓形成导致脑梗死一般在安静或睡眠中发病,B 排除;酒精中毒无肢体瘫痪表现,C 排除;蛛网膜下腔出血表现为剧烈的头部胀痛或爆裂样疼痛、呕吐、脑膜刺激征阳性,D 排除;题干未有病毒感染的相关描述,E 排除。故本题选 A。

48. 解析:昏迷躁动不安者切忌强制约束,以免患者挣扎导致颅内压增高。故本题选 B。

49. 解析:噎食发生后立即就地抢救,停止进食,清除口咽部食物,保持呼吸道通畅。迅速用手指掏出口咽部食团。若患者牙关紧闭可用筷子或开口器等撬开口腔掏取食物,解开患者领口,尽快使其呼吸道通畅。故本题选 A。

50. 解析:Apgar 评分以心率、呼吸、肌张力、喉反射和皮肤颜色为指标。每项 0~2 分,总分 8~10 分为正常;4~7 分为轻度窒息;0~3 分为重度窒息。故本题选 A。

51. 解析:一般用鼻导管吸氧,氧流量为 1~2 L/min,吸氧持续时间 >15 小时/天,A、B、C 正确。氧疗有效的指标为患者呼吸困难减轻、呼吸频率减慢、发绀减轻、心率减慢、活动耐力增加,E 正确。故本题选 D。

52. 解析:静脉滴注 20% 甘露醇可降低颅内压,防治脑水肿。故本题选 B。

53. 解析:哺乳后安静入睡说明婴幼儿已吃饱;婴儿体重增加说明营养摄取充足;婴幼儿每天排尿 6 次以上,排便数次均能反映母乳充足,以上四项均能反映母乳喂养是否有效。双乳坚硬可能提示乳腺管堵塞,患儿难以吸食到充足母乳,不是喂养有效指标,故本题选 B。

54. 解析:乙脑是人畜共患的自然疫源性疾。人和动物感染乙脑病毒后,均可成为传染源。猪是乙脑主要传染源及中间宿主,蚊虫是乙脑主要传播媒介。故本题选 A。

55. 解析:子宫颈炎的治疗:在排除早期宫颈癌后,针对病原体及时采用足量抗生素治疗。宫颈糜烂者,物理治疗是目前临床最常用的有效治疗方法。故本题选 D。

56. 解析:直肠指诊是诊断直肠、肛管疾病最直接、最主要的方法,尤其是直肠癌。根据患



者表现,考虑有直肠疾病的可能。故本题选 C。

57. 解析:宫颈癌根治术后,通常按医嘱于术后 48~72 小时取出引流管,术后 7~14 天拔除尿管。故本题选 D。

58. 解析:胎儿缺氧先表现为胎动频繁,继而胎动减弱、减少至消失。故本题选 D。

59. 解析:根据患者表现可知患者为心肌梗死,心肌梗死时血清心肌肌钙蛋白及心肌酶升高。故本题选 C。

60. 解析:精神分裂症恢复期患者出院后应多参加社交活动,提高社会适应能力,同时遵照医嘱按时服药,防止复发。故本题选 B。

61. 解析:个人因素中的身体因素包括了暂时性的生理不适,即疼痛、饥饿、疲劳、气急等,这些因素容易使沟通者在沟通时难以集中精力,但当这些生理不适消失后,沟通又能正常进行。故本题选 A。

62. 解析:重度脱水的表现为神情淡漠或昏迷,皮肤有花纹且弹性极差,前囟和眼窝明显凹陷,无泪,尿量极少或无尿。根据患者表现可知患者为重度脱水,答案选 D。

63. 解析:佝偻病早期主要表现为非特异性神经精神症状,如易激惹、烦躁、睡眠不安、夜间啼哭。常伴多汗,致婴儿常摇头擦枕,出现秃顶。故本题选 A。

64. 解析:慢性肾炎患者宜采用优质低蛋白饮食,蛋白摄入量为 $0.6 \sim 0.8 \text{ g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。明显水肿和高血压时,限制钠盐摄入,低盐饮食。无水肿时不用低盐饮食。故本题选 E。

65. 解析:Ⅱ型呼吸衰竭者主要依靠缺氧对外周化学感受器的刺激来维持呼吸,吸入高浓度氧,解除缺氧对呼吸的刺激作用,会使呼吸中枢抑制加重,甚至呼吸停止。故Ⅱ型呼吸衰竭患者应给予低浓度、低流量($1 \sim 2 \text{ L}/\text{min}$)持续给氧。故本题选 A。

66. 解析:高钾血症是急性肾衰竭最严重的并发症之一,也是少尿期的首位死因。主要因肾脏排钾减少、感染、高分解状态、代谢性酸中毒引起。故本题选 E。

67. 解析:猩红热多见于发病后 1~2 天出疹。皮疹从耳后、颈及上胸部,迅速波及躯干及上肢,最后到下肢。皮疹特点为全身皮肤弥漫性发红,其上有点状红色皮疹,高出皮面,扪之粗糙,压之褪色,有痒感,疹间无正常皮肤可见。故本题选 B。

68. 解析:胆道蛔虫病最典型的临床特点是突发剑突下方钻顶样绞痛。故本题选 E。

69. 解析:行羊膜腔穿刺术时,一次放羊水量不超过 1500 ml,放羊水后腹部放置沙袋或加腹带包扎以防血压骤降发生休克。故本题选 D。

70. 解析:脑组织对缺血缺氧非常敏感,心脏骤停发生后,4~6 分钟内开始发生不可逆脑损害,造成脑缺氧和脑水肿。故本题选 D。

71. 解析:患者血压 $70/50 \text{ mmHg}$,脉搏细速,心率加快,是周围循环衰竭的表现,此时血容量不足,应尽快补液。故首要的护理诊断是体液不足,本题选 E。

72. 解析:类风湿关节炎的典型表现为对称性多关节炎,主要侵犯小关节,以腕关节、近端指间关节、掌指关节及跖趾关节最常见。故本题选 A。

73. 解析:慢性支气管炎患者寒冷季节外出时应适当增加衣物,防止受寒。根据自身情况选择参加合适的体育锻炼,如健身操、太极拳、跑步等,可增加耐寒训练,如冷水洗脸、冬泳等。故 B 错误,本题选 B。

74. 解析:急性心肌梗死后的心律失常以室性心律失常最多见,其中心室颤动是急性心肌梗死早期最主要的致死原因。故本题选 D。

75. 解析:我国重症肺炎的标准为:①意识障碍;②呼吸频率 $> 30 \text{ 次}/\text{分}$;③ $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ 、 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$,需行机械通气治疗;④血压 $< 90/60 \text{ mmHg}$;⑤胸片显示双侧或多