Harry Menzig

**Plastische Deckung
großer Lücken des Schlundes
und der Speiseröhre
durch Rundstiellappen**

VEB VERLAG VOLK UND GESUNDHEIT · BERLIN

Dr. Harry Mennig
Dozent für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde an der Universität Jena

Plastische Deckung
großer Lücken des Schlundes
und der Speiseröhre
durch Rundstiellappen

Mit 75, teilweise farbigen Abbildungen

VEB VERLAG VOLK UND GESUNDHEIT BERLIN

1954

**Plastische Deckung großer Lücken des Schlundes
und der Speiseröhre durch Rundstiellappen**

Dr. Harry Mennig

Dozent für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde an der Universität Jena

Plastische Deckung
großer Lücken des Schlundes
und der Speiseröhre
durch Rundstiellappen

Mit 75, teilweise farbigen Abbildungen

VEB VERLAG VOLK UND GESUNDHEIT BERLIN

1954

Aus der Universitätsklinik
für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten Jena
(Direktor: Professor Dr. Johannes Zange)

Erstes Tausend / Alle Rechte vorbehalten
Copyright 1954 by VEB Verlag Volk und Gesundheit Berlin
Printed in Germany / Lizenz-Nr. 210 (445/79/53)
Satz, Druck und Bindearbeit: VEB Berliner Druckhaus Münzstraße
Gesetzt aus Primus

Meinen Eltern zum Gedächtnis

VORWORT

Die vorliegende Arbeit ist organisch im Laufe von sieben Jahren entstanden. Nach den ersten Erfolgen bei der plastischen Deckung großer Lücken des Schlundes und der Speiseröhre mit Rundstiellappen hatten wir die Überzeugung gewonnen, daß sich mit diesem Verfahren auch in ungünstigsten und schwierigsten Fällen funktionell und kosmetisch gute Ergebnisse erzielen lassen. Dies bestätigten uns die gelungenen Plastiken bei einigen weiteren Kranken mit ungewöhnlich großen und ungünstig gelegenen Pharynxdefekten. Um aber auch eine bildlich umfassende Darstellung aller bei der Ausführung solcher Großplastiken auftretenden Möglichkeiten geben zu können, haben wir die Veröffentlichung dieser Monographie erst vorgenommen, als Erfahrungen und Erfolge an neun Kranken vorlagen.

Dadurch ergab sich der Vorteil einer systematischen Beschreibung vom verhältnismäßig einfachen zum schwierigsten Fall; auch konnten wir aus der Fülle der Abbildungen jeden Behandlungsakt und seine Besonderheiten veranschaulichen.

Da in der Literatur sowohl des Fachgebietes als auch der Chirurgie nur vereinzelte kasuistische Beiträge über die plastische Deckung großer Lücken des Schlundes und der Speiseröhre mit Rundstiellappen zu finden sind, glauben wir uns auf Grund unserer Erfahrungen und Erfolge zu einer monographischen Darstellung berechtigt.

Mein Dank gilt zuerst meinem hochverehrten Chef und Lehrer, Herrn Prof. Z a n g e, der die klinische Arbeit stets wohlwollend gefördert und unterstützt hat und bei der schriftlichen Darstellung beratend zur Seite stand.

Dankbare Anerkennung gebührt der med.-techn. Assistentin an unserer Klinik, Fräulein E. v. P i l a r, die mit Hingabe und Sorgfalt die Aufnahmen anfertigte. Auch unserem med.-wissenschaftlichen Zeichner, Herrn K.-H. S e e b e r, der die Zeichnungen besorgte, sei an dieser Stelle gedankt.

Nicht zuletzt erwarb sich der Verlag Dank und Anerkennung für die gute Ausstattung des Buches und die tadellose Wiedergabe der Abbildungen.

Jena, Juli 1953

H. Mennig

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	7
Inhaltsverzeichnis.....	9
Einleitung	11
Plastische Deckung großer Lücken des Schlundes und der Speiseröhre durch Rundstiellappen	13
I. Entstehung der Defekte (Geschichtliches) ..	15
a) bei rein chirurgischer Behandlung.....	15
b) seit Einführung der Röntgenbestrahlung	15
c) bei Erweiterung der Anzeigestellung.....	17
d) unter besonderen Umständen.....	18
II. Bisherige Behandlung und ihre Ergebnisse	18
a) Kutane Plastik (Gluck-Soerensen)	18
b) Andere Formen der Nahplastik (Wessely u. a.)	19
c) Innere Defektplastik (A. Seiffert)	21
d) Nahplastik mit Strangelappen (Ganzer)	21
e) Plastik mit abgewandeltem „Kriechlappen“ (Stenstrom) ...	21
f) Vereinzelte Versuche mit Rundstiellappen	22
III. Prothetische Überbrückungen.....	22
a) Trichterschlauch nach Soerensen	22
b) Kautschuk- und Kunststoffprothesen	22
c) Pelottenverbände	27
d) Nachteile bei der Anwendung	27
IV. Umfang, Gestalt und Sitz der möglichen Lücken	28
V. Grundsätzliches zur Wahl der Methode	30
a) Gegenanzeigen für Nahplastiken	30
b) Anzeigen für Fernplastiken.....	31
VI. Vorteile der Fernplastik durch Rundstiellappen	31
a) Zuverlässige Blutversorgung	32
b) Begrenzte Schrumpfung	32
c) Gute Verpflanzungsfähigkeit	32
d) Beseitigte Infektionsgefahr	32
e) Aseptische Operationsmöglichkeit	32

VII. Allgemeines über Rollappenplastik bei Schlund- und Speiseröhrenlücken	32
a) Anlegen des Rollappens	33
b) Zwischenverpflanzung	33
c) Umstellung der Blutversorgung im Rundstiel	33
d) Innere Deckung der Schlundlücke	34
e) Befestigung der Außendecke	34
f) Vorbereitung der Haut am Entnahmeort	35
g) Zwangsstellung des Kopfes oder Armes	35
h) Schmerzausschaltung	35
i) Wärmeanwendung	36
k) Penicillinanwendung	36
l) Behandlung von Wundflächen	36
VIII. Durchführung der Rundstielplastik im Einzelfalle	37
a) Wahl des Zeitpunktes	37
b) Aufstellung des Operationsplanes	38
c) Vorbereitende, vorbeugende und unterstützende Maßnahmen vor und während der Plastik	39
d) Wahl der Plastikhaut	42
e) Zwischentransport, Ruhigstellung und Verbände	48
f) Die Deckung der Lücke	56
1. Voraussetzungen	56
2. Die Verschußplastik	59
a) Die Innendeckung	59
β) Die Außendeckung	64
3. Rückverpflanzung	71
g) Besonderheiten in Verlauf und Heilungsausgang	72
IX. Unsere Ergebnisse (mit Krankengeschichten)	74
Schlußbetrachtung	99
Schrifttum	100

EINLEITUNG

Oberster Grundsatz aller chirurgischer Krebsbehandlung ist die vollständige Ausrottung der Geschwulst weit im Gesunden, gegebenenfalls sogar ohne Rücksichtnahme auf Funktion und Kosmetik; nur die Erhaltung lebenswichtiger Organe oder Organteile beschränkt dann das ausrottende Vorgehen. Die in solchen Fällen entstehenden Verstümmelungen treffen allerdings den Kranken oft sehr schwer, besonders wenn die Entstellung groß ist und daseinswichtige Funktionen wegfällen oder nur notdürftig überbrückbar sind, so daß sie eine Wiedereinfügung in die menschliche Gemeinschaft und in das Berufsleben erschweren oder gar ganz verhindern.

Die plastische Chirurgie ist hier eine wichtige Helferin. Sie vermag oft weitgehend verlorenegegangene Funktionen und äußere Form wiederherzustellen und gibt dadurch zugleich die Möglichkeit, die Grenzen radikaler chirurgischer Krebsausrottung beträchtlich zu erweitern. Was bei der Beseitigung des Krebses selbst an lebenswichtigen Teilen zerstört wurde, läßt sich in gewissem Umfange plastisch wieder aufbauen, woraus eine Leistungssteigerung bei der Krebsbekämpfung erwächst, auch in den Gesamterfolgen.

Entstehung großer Gewebslücken bei der Krebsausrottung läßt sich auch im Hals-, Mundboden- und Kiefergebiet manchmal nicht vermeiden, will man die Geschwulst nach chirurgischen Grundsätzen im Gesunden ausschneiden und sich damit selbst an schon fortgeschrittene Fälle wagen. Man steht dann nachträglich vor der Notwendigkeit, die Lücken zur Wiederherstellung des Schluckaktes, auch des Sprechaktes, plastisch wieder zu schließen und dies zugleich mit möglichst gutem kosmetischen Ergebnis zu tun.

Ein Überblick über die Entwicklung in der Behandlungsweise der Krebse des Kehlkopfes und des Kehlrachens zeigt, daß unter besonderen Umständen häufiger und dann meist ungewöhnlich große und ungünstig gelegene Pharynx-Oesophagusdefekte entstehen können. Zugleich ergab die Prüfung der Verfahren zur plastischen Deckung von Lücken des Schlundes und der Speiseröhre, daß die Wiederherstellung in solchen Fällen mit den bisher üblichen Plastikmethoden nicht in jeder Hinsicht zufriedenstellend möglich ist.

Prothetische Behelfe sind nicht auf Dauer, sondern nur als Überbrückung bis zur Ausführung der Plastik anwendbar.

Um das traurige Schicksal der Kranken mit großen Schlund- und Speiseröhrenlücken zu kennzeichnen, genügen wohl folgende kurze Hinweise auf ärztliche und soziale Gründe, die den Wiederaufbau des Schluckrohres verlangen:

Erst die wiederhergestellte Funktion des Schluckens zur Nahrungsaufnahme und der Fortfall des Speichelabflusses durch die Schlundlücke macht dem Kranken die Rückkehr in die häusliche Gemeinschaft und in eine geregelte Berufstätigkeit möglich, weil erst dann die bis dahin erforderliche vermehrte Wartung und Pflege entfällt. In manchen Fällen ist die Entlassung aus klinischer Behandlung überhaupt nur nach einer entsprechenden Plastik verantwortbar.

Ebenso wichtig wie die Wiederherstellung des normalen Schluckaktes ist nach Verlust des Kehlkopfes die Verschaffung einer brauchbaren Ersatzstimme (Pharynxsprache), was auch nur durch den plastischen Neuaufbau des Schluckrohres möglich ist. Der Erwerb einer guten Pharynxstimme macht den Kranken erst wieder recht berufsfähig, stärkt dazu sein Selbstvertrauen, macht ihn sicher im gesellschaftlichen Umgang und hebt seine Daseinsfreude beträchtlich.

Daneben spielt aber auch die Herstellung eines möglichst guten äußeren Aussehens eine nicht unwesentliche Rolle. Auf ein zugleich einwandfreies kosmetisches Ergebnis der Plastik ist daher noch zusätzlich Wert zu legen.

Im Jahre 1946 regte mich mein Lehrer, Herr Professor Zange, an, ein Verfahren zur plastischen Deckung großer Lücken des Schlundes und der Speiseröhre auszuarbeiten, das als Methode der Wahl allen Anforderungen gerecht werde und geeignet sei, zuverlässig gerade in schwierigen Fällen den Defekt, wäre er auch noch so groß und ungünstig gelegen, abschlußfest und mit gutem funktionellen und kosmetischen Ergebnis zu decken.

Ich habe mich seitdem mit dieser Frage eingehend beschäftigt und lege das Ergebnis im folgenden vor in dem Glauben, einen nutzbringenden Beitrag zur Wiederherstellungschirurgie geleistet zu haben, der auf seine Art auch der Bekämpfung der bösartigen Geschwülste zu Hilfe kommt.

**Plastische Deckung
großer Lücken des Schlundes
und der Speiseröhre
durch Rundstiellappen**

I. Entstehung der Defekte

(Geschichtliches)

Gluck und Soerensen, die Bahnbrecher der neueren Chirurgie der oberen Luft- und Speisewege, haben mit der Ausarbeitung ihrer klassischen Operationsverfahren und der Aufstellung klarer Operationsanzeigen die Ära wirklich anhaltender operativer Erfolge bei den bösartigen Geschwülsten dieses Gebietes begründet, und ihre Ergebnisse gelten heute noch als vorbildlich.

- a) In dieser Zeit der rein chirurgischen Behandlung der Krebse des Kehlkopfes und Kehlrachens entstanden große Lücken des Schluckrohres immer dann, wenn mit der Totalexstirpation des Kehlkopfes zugleich der Pharynx und Anfangsteil des Oesophagus quer reseziert werden mußte, gelegentlich auch, wenn ein Teil des im übrigen entfernten Schlund- und Speiseröhrenabschnittes erhalten werden konnte. Dagegen kam es bei reiner Totalexstirpation des Kehlkopfes ohne quere Pharynxresektion nur sehr selten zu stellenweisem Offenbleiben oder Wiederöffnen des Pharynx, also zur Bildung einer kleineren oder größeren Pharynxfistel, wenn nämlich die Mitnahme (Teilresektion) eines größeren Stückes des angrenzenden Schlundes notwendig wurde.
- b) Mit der Einführung der Röntgenstrahlen in die Behandlung der bösartigen Geschwülste des Kehlkopfes und Kehlrachens traten zwei Gesichtspunkte zusätzlich in Erscheinung, von denen der eine an dieser Stelle, der andere weiter unten für unsere Betrachtung von Bedeutung ist. Führte die Röntgenbestrahlung nicht zum Erfolge und mußte nach kürzerer oder längerer Zeit die Totalexstirpation des Kehlkopfes vorgenommen werden, kam es viel häufiger als zu Zeiten der primären Operationsbehandlung zum Auftreten von Pharynx fisteln kleineren oder größeren Umfangs, und zwar auch bei einfacher Totalexstirpation des Kehlkopfes, leichter aber noch bei gleichzeitigen Teilresektionen des Pharynx.

Durch die Röntgenintensivbestrahlung wird die Haut geschädigt, das Gewebe darunter ist dann weniger widerstandsfähig gegen Wundinfektionen und neigt eher zu Gewebsnekrosen. Daher kam es nun häufiger zu Nahtdehiscenzen der Pharynxschleimhaut und Fisteln der äußeren Haut, die manchmal die ganze Vorderwand des Pharynx einnahmen und eine breite Öffnung des Schlundes und Halsteiles der Speiseröhre nach außen darstellten. Auch heute, obwohl uns Sulfonamide und Penicillin zur Verfügung stehen, sind wir vor solchen postoperativen Ereignissen bei vorbestrahlten Fällen noch nicht sicher, wie eigene Erfahrungen lehrt.

Welch tiefgreifende Veränderungen die Halsweichteile durch eine Röntgenstarkbestrahlung erleiden, sehen wir, wenn wir nach einer solchen