

傷寒論
三

存四堂

傷寒論注解卷第四

仲景述 王叔和撰次 成無已注解

辨太陽病脉證并治下第七

問曰病有結胃有藏結其狀何如荅曰按之痛寸脉浮關脉沈名曰結胃也何謂藏結荅曰如結胃狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沈緊名曰藏結舌上白胎滑者難治

結胃者邪結在胃藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入裏與陽相結者為結胃結胃以陽受氣於胃中故與陰相通而塞故痛邪結陽分則陰受之則入五藏故與陰分則陽氣不得下通是二者皆心不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心下鞭痛寸脉浮關脉沈知邪結在陽也寸脉浮關脉小細沈緊知邪結在陰也陰結而陽不結雖心下結痛飲食亦自解藏結得熱證多則易治舌上白胎滑者陰得陽則解藏結得熱證多則易治舌上白胎滑者

結胃中亦寒 故云難治 藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌

上胎滑者不可攻也 藏結於法當下无陽證為表无

熱其人反靜為裏无熱經曰舌上如胎者以丹病發

田有熱胃中有寒邪氣以表裏皆寒故不可攻 於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之

因作痞所以成結胃者以下之太早故也 發熱惡寒

也而反下之則表中陽邪入裏結於胃中為結胃无

熱惡寒者發於陰也而反下之表中之陰入裏結於

心下 為痞 結胃者項亦強如柔瘕狀下之則和宜大陷胃

丸方 結胃病項強者為邪結胃中胃膈結滿心下緊

与大陷胃丸 下結泄滿 大陷胃丸方

大黃 半斤 味苦寒 葶藶 半升 熬 味苦寒 芒消 半升 味鹹寒

杏人

半升去皮尖熬黑味甘溫

大黃芒消之苦鹹所以下熱並糜杏人之苦甘所以泄滿甘遂取其直達白蜜取其潤利皆以下泄

滿實物也

右肆味搗篩貳味內杏人芒消合研如脂和散取如彈丸壹枚別搗甘遂末壹錢匕白蜜貳合水貳升煮取壹升溫頓服之壹宿乃下如不下更服取下為效禁如藥法

結胃證其脉浮大者不可下下之則死

結胃為邪結胃中屬上焦

之分得寸脉浮關脉沈者為在裏則可下若脉浮大心下雖結是在表者猶多未全結也下之重虛邪氣復結則難可制故云下之則死結胃證悉具煩躁者亦死具邪結已深也煩躁者正氣散亂也邪氣勝正病者必死太陽病脉浮而動數浮則為

風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗
出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內
拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懷陽氣
內陷心下因鞅則為結胃大陷胃湯主之若不結胃
但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便利身必發黃
也動數皆陽脈也當責邪在表睡而汗出者謂之盜汗為邪氣在半表半裏則不惡寒此頭痛發熱微盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫反下之虛其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見陽脈邪在裏則見陰脈邪氣內陷動數之脈所以變遲而浮脈獨不變者以邪結胃中上焦陽結脈不得而沈也客氣者外邪乘胃中空虛入裏結於胃膈中拒痛者客氣動膈也金匱要略曰短氣不足以息者實也短氣躁煩心中懊懷皆邪熱為實陽氣內陷氣不得通於膈壅於心下為鞅滿而痛成結胃也與大陷胃湯以下結熱若胃中空虛陽氣內陷不結於胃膈下入於胃中者遍身汗出則為熱越不能發黃若但頭汗出身

無汗劑頭而還小便不利者熱不得越必發黃也

大陷胃湯方

大黃

陸兩去皮苦寒

芒消

壹升鹹寒

甘遂

壹錢匕苦寒

大黃謂之將軍以苦蕩滌芒消一名消石以其鹹能更鞭夫間有甘遂以通水也甘遂若夫間之遂其氣可以直達透結陷胃三物為允

右參味以水陸升先煮大黃取貳升去滓內芒消煮壹兩沸內甘遂末溫服壹升得快利止後服

傷寒六七日結胃熱實脉沈而緊心下痛按之石鞭

者大陷胃湯主之

病在表而下之熱入因作結胃此不云下後而云傷寒六七日則是

傳裏之實熱也沈為在裏緊為裏實以心下痛按之實鞭是以為結胃與大陷胃湯以下結熱傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結

腎無大熱者此為水結在腎脇也但頭微汗出者大

陷腎湯主之

傷寒十餘日熱結在裏是可下之證復往來寒熱為正邪分爭未全飲結與大

柴胡湯下之

但結腎無大熱者非熱結也是水飲結

於腎脇謂之水

結腎周身汗出者是水飲外散則愈

若但頭微汗出餘處無汗是水飲不得外泄停畜而不行也與大陷腎湯以逐其水太陽病重

發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所

小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷

腎湯主之

重發汗而復下之則內外重亡津液而邪熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也

日晡潮熱者

屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下至少腹鞭滿而痛不可近者是一腹之中上下邪

氣俱甚也與大陷小結腎病正在心下按之則痛脉

浮滑者小陷腎湯主之

心下鞭痛手不可近者結腎也正在心下按之則痛是熱

氣猶淺謂之小結腎結腎脉沈緊或寸浮開沈今脉浮滑知熱未深結與小陷腎湯以除腎膈上結熱

小陷胃湯方

黃連

壹兩 苦寒

半夏

半升 洗 辛溫

括婁實

大者壹 个 苦寒

苦以泄之辛以散之黃連括婁實
苦寒以泄熱半夏之辛以散結

右參味以水陸升先煮括婁取參升去滓內諸藥
煮取貳升去滓分溫參服

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者
此亦有寒分也反下之若利止必作結胃未止者四
日復下之此作協熱利也太陽病二三日邪在表也
不能卧但欲起心下必結
者以心下結滿卧則氣壅而愈甚故不能卧而但欲
起也心下結滿有水有寒分有氣分今脉微弱知
本有寒分醫見心下結而反下之則太陽表邪乘虛
入裏利止則邪氣留結為結胃利不止至次日復如
前下利不止者是邪熱太陽病下之其脉促不結胃
下攻腸胃為挾熱利也

者此為欲解也脉浮者必結胃也脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急脉細數者頭痛未止脉沈沈緊者必欲嘔脉沈滑者協熱利脉浮滑者必下血此太陽病下之後邪氣傳變其脉促者為陽盛下後脉促為陽勝陰也故不作結胃為欲解下後脉浮為上焦陽邪結而為結胃也經曰結胃者寸脉浮開脉沈下後脉緊則太陽之邪傳於少陰經曰脉緊者屬少陰內經曰邪客於少陰之絡令人脇痛不可內食所以脉緊者必咽痛脉弦則太陽之邪循脇絡於耳所以脉弦者必兩脇拘急受病也其脉循脇絡於耳所以脉弦者必兩脇拘急下後邪氣傳裏則頭痛未止脉細數為邪未傳裏而傷氣也細為氣少數為在表故頭痛未止脉沈沈緊則太陽之邪傳於陽明為裏實也沈為在裏緊為裏實陽明裏實故必欲嘔脉滑則太陽之邪傳於陽明以滑為陰氣有餘知邪氣入裏干於下焦也沈為血勝氣虛是為協熱利浮為氣勝血虛是知必下血經曰不宜下而便攻之諸變不可勝數此之謂也病在陽應以汗解之反以冷水瀝之若灌之其熱被劫

不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服
文蛤散若不差者與五苓散寒實結胃無熱證者與
三物小陷胃湯白散亦可服當病在陽為邪在表也法
濕之灌洗熱被寒水外不得出則反攻其裏彌更益
煩肉上粟起者水寒之氣客於皮膚也意欲飲水者
裏有熱也反不渴者寒在表也與文蛤散以散表中
水寒之氣若不差是水熱相搏欲傳於裏與五苓散
發汗以和之始熱在表因水寒制之不得外泄內攻
於裏結於胃膈心下鞭痛本以水寒伏熱為實故謂
之寒實結胃無熱證者外無熱而熱悉收飲於裏
也與小陷胃湯以下逐之白散下熱故亦可攻

文蛤散方

文蛤五兩味鹹寒

鹹走腎則可以勝水氣

右壹味為散以沸湯和壹錢匕服湯用伍合

白散方

桔梗

參分味辛苦微溫

芭豆

壹分去皮心熬黑研如脂平溫

貝母

三分味辛苦平

辛散而苦油桔梗貝母之辛苦用以下氣芭豆之辛用以散實

右件參味爲末內芭豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥壹杯利過不止進冷粥壹杯身熱皮粟不解欲引衣自覆者若水以撲之洗之益令熱劫不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥參兩如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胃心下痞鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發

汗則讞語脉弦矣日讞語不止當刺期門太陽之脉絡頭下項

頭項強痛者太陽表病也少陽之脉循脊絡脇如結

純在表故頭項不強痛而或眩冒亦未全入裏故

時如結胃心下痞鞭此邪在半表半裏之間也刺大

推第一間肺俞以寫太陽之邪刺肝俞以寫少陽之

邪邪在表則可發汗邪在半表半裏則不可發汗發

汗則亡津液損動胃氣少陽之邪因干於胃土為木

刑必發讞語脉弦至五六日傳經尽邪熱去而讞語

當止若復不止為少陽邪熱婦人中風發熱惡寒經

甚也刺期門以寫肝膽之氣

水適來得之七八日熱除而脉遲身涼胃脇下滿如

結胃狀讞語者此為熱入血室也當刺期門隨其實

而寫之中風發熱惡寒表病也若經水不來表邪傳

空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛而入

於血室熱除脉遲身涼者邪氣內陷而表證罷也胃

脇下滿如結胃狀讞語者熱入血室之熱審看何經氣

肝之募肝主血刺期門者寫血室之熱審看何經氣

實更隨其婦人中風七八日續得寒熱發作有時經
 水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘡狀發
 作有時小柴胡湯主之中風七八日邪氣傳裏之時
本無寒熱而續得寒熱經水
 適斷者此為表邪乘血虛入於血室與血相搏而
 血結不行經水所以斷也血氣與邪分爭致寒熱如
 瘡而發作有時與小柴胡湯以解傳經之邪
 婦人傷寒發熱經水適來晝
 日明了暮則讖語如見鬼狀者此為熱入血室無犯
 胃氣及上二焦必自愈傷寒發熱者寒已成熱也經
水適來則血室虛空邪熱乘
 虛入於血室若晝日讖語如見鬼狀是邪不入府而
 晝日明了暮則讖語如見鬼狀是邪不入府而陽爭也此
 室而陰爭也陽盛讖語則宜下此熱入血室不可與
 下藥犯其胃氣熱入血室而血結寒熱者與小柴胡湯
 散邪發汗此雖熱入血室而血結寒熱者與小柴胡湯
 犯其上焦熱入血室而血結寒熱者與小柴胡湯
 此雖熱入血室而血結寒熱者與小柴胡湯
 自愈者以經行則熱隨血去血下也已則邪熱悉除

而愈矣所為發汗為犯上焦者發汗則動衛氣衛氣
出上焦故也刺期門為犯中焦者刺期門則動榮氣
榮氣出中焦故也脉經曰无犯胃氣傷寒六七日發
及上二焦必自愈也豈謂藥不謂針耶

熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴

胡加桂枝湯主之傷寒六七日邪當傳裏之時支散

裏發熱微惡寒支節煩疼為外證未去傷寒五六日

已發汗而復下之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔

但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝

乾薑湯主之傷寒五六日已經汗下之後則邪當解

頭汗出往來寒熱心煩者即邪氣猶在半表半裏之

間為未解也胃脇滿微結寒熱心煩者邪在半表半

裏之問也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也
若熱消津液令小便不利而渴者其入必嘔汗出而餘
不嘔知非裏熱也傷寒汗出則和今但頭汗出而餘
處无汗者津液不足而陽虛於上也与柴胡桂枝乾

姜湯以解表裏之邪
復津液而助陽也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡

半斤 苦平

桂枝

三兩 去皮 味辛熱

乾薑

二兩 辛熱

枳實

四兩 苦寒

黃芩

三兩 苦寒

牡蠣

二兩 熬 鹹寒

甘草

二兩 炙 味甘平

內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解
傳裏之邪辛甘發散為陽桂枝甘草之辛甘以散
在表之邪鹹以熯之壯陽之鹹以消胃脇之滿辛
以潤之乾姜之辛以固陽虛之汗津液不足而為
渴苦以堅之括萎
之苦以生津液

右柒味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎取參
升溫服壹升日叁服初服微煩復服汗出便愈
傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲

食大便鞭脉細者此為陽微結必有表復有裏也脉
沈亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外
證悉入在裏此為半在裏半在外也脉雖沈緊不得
為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非
少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解傷寒五六
日邪當傳裏之時頭汗出微惡寒者表仍未解也手足冷心下滿口不欲食大便鞭脉細者邪結於裏也
大便鞭為陽結此邪熱雖傳於裏然以外帶表邪則熱結猶淺故曰陽微結脉沈雖為在裏若純陰結則更无頭汗惡寒之表證諸陰脉皆不至頸中而還不上循頭今頭汗出知非少陰也
表半裏之邪服湯已外證罷而不了了者為裏熱未除与湯取其微利則愈故云得屎而解
傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴
胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸

蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為
結胃也大陷胃湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡
不中與之宜半夏瀉心湯傷寒五六日邪在半表半裏之時嘔而發熱邪在半表半裏之證是為柴胡證具以他藥下之柴胡證不罷者不為逆却與柴胡湯則愈若下後邪氣傳裏者邪在半表半裏則陰陽俱有邪至於下後邪氣傳裏亦有陰陽之異若下後陽邪傳裏者則結於胃中為結胃以胃中為陽受氣之分與大陷胃湯以下其結陰邪傳裏者則留於心下為痞以大陷胃湯以下其結分與半夏瀉心湯以通其痞經曰病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之因作痞此之謂也

半夏瀉心湯方

半夏

半升洗

黃芩

苦寒

乾薑

辛熱

人參

已上各三兩甘溫

黃連

苦寒

大棗

十二枚擘甘溫

甘草

三兩炙