

千金方

廿一

備急千金要方卷第二十一

消渴

水腫

朝奉郎守太常卿充祕閣校理鑒聞檢院護軍賜緋魚袋林億等校正

消渴第一

不渴而利

強中

渴利

渴兼他病

淋閉第二

遺尿

失禁

尿血第三

水腫第四

消渴第一

論六首
灸法六首

方五十三首

論曰凡積久飲酒未有不成消渴然則大寒凝海而酒不凍明其酒性酷熱物無以加脯炙鹽鹹此味酒客耽嗜不離其口三觴之後制不由已飲噉無度咀嚼鮓醬不擇酸鹹積年長夜酣興不解遂使三焦猛熱五藏干燥木石猶且焦枯在人何能不渴治之愈否屬在病者若能如方節慎旬月而瘳不自愛惜死不旋踵方書醫藥寔多有効其如不慎者何其

所慎者有三一飲酒二房室三鹹食及麪能慎此者雖不服藥而自可無他不知此者縱有金丹亦不可救深思慎之又曰消渴之人愈與未愈常須思慮有大癰何者消渴之人必於大骨節間發癰疽而卒所以戒之在大癰也當預備癰藥以防之有人病渴利始發於春經一夏服栝樓豉汁得其力渴漸差然小便猶數甚晝夜二十餘行常至三四升極差不減二升也轉久便止漸食肥膩日就羸瘦喉咽腎口焦燥吸吸少氣不得多語心煩熱兩脚酸食乃兼倍於常故不為氣力者然此病皆由虛熱所爲宜治法栝樓汁可長將服以除熱牛乳杏酪善於補此法最有益

治消渴除腸胃熱實方

麥門冬 茶芩 黃連 石膏 萎蕤各八分
人參 龍膽 黃芩各六分
升麻四分

枳實

分

枸杞子

外臺地骨皮用

栝樓根

生薑

屑各分

右十三味末之蜜丸如梧子大以苑根粟米汁服十九日
二若渴則與此飲至足大麻亦得飲方如左

苑根

切一升

粟米

合三

右三味以水六升煮取米熟用下前藥

又方

栝樓根

生薑

各五

生麥門冬

一升

蘆根

切各

苑根

切三升

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治胃腑實熱引飲常渴洩熱止渴苑神湯方

茯神

二兩外臺作苓

栝樓根

生麥門冬

各五兩

生地黃

六兩

萎蕤

四兩

小麥

二升

淡竹葉

切三升

大棗

二十枚

知母

兩四升

右九味㕮咀以水三斗煮小麥竹葉取九升去滓下藥煮
取四升分四服服不問早晚但渴即進非但正治胃渴通
治渴患熱即主之

猪肚丸治消渴方

猪肚

一枚治如食法

黃連

梁米酪五

栝樓根

茯神

各四兩

知母

三兩麥門冬二兩

右七味為末內猪肚中縫塞安甑中蒸之極爛接熱及藥
木臼中擣可丸若強與蜜和之丸如梧子飲服三十丸日
二加至五十丸隨渴即服之

又方

栝樓根 麥門冬 鉑丹

各六分

茯神

一作茯苓甘草各六分

右五味治下篩以漿水服方寸匕日三服

外臺無茯神

又方

黃耆 茯神 桔樓根 甘草 麥門冬 酸酒

乾地黃

兩五

右六味㕮咀以水八升煮取二升半去滓分三服日進一劑服十劑佳

治消渴浮萍丸方

乾浮萍

桔樓根等

右二味末之以人乳汁和丸如梧子空腹飲服二十九日
三三年病者三日愈治虛熱大佳

治消渴日飲一石水者方

桔樓根

三兩

鉉丹

二兩

葛根

三兩

附子

一兩

右四味末之蜜丸如梧子飲服十九日三渴則服之春夏
減附子

治渴黃連丸方

黃連一斤

生地黃一斤

張仲云十付

右二味絞地黃取汁浸黃連出暴之燥復內之令汁盡乾之擣末蜜丸如梧子服二十丸日三食前後無在亦可爲散以酒服方寸匕

栝樓粉治大渴秘方

深掘大栝樓根厚削皮至白處止以寸切之水浸一日一夜易水經五日取出爛擣碎研之以絹袋瀝之如出粉法乾之水服方寸匕日三四亦可作粉粥乳酪中食之不限多少取差止

治渴方

栝樓粉和雞子暴乾更杵爲末水服方寸匕日三丸服亦得

又方

水和括樓散服方寸匕亦可蜜丸服三十九如梧子大

又方

取柒家井索近桶口結燒作灰并花水服之不過三
服必差

又方 取豉漬汁任性多少飲之

又方 濃煮竹根取汁飲之以差止

又方 以青粱米煮取汁飲之以差止

論曰尋夫內消之爲病當由熱中所作也小便多於所飲令人虛極短氣夫內消者食物消作小便也而又不渴正觀十年梓州刺史李文博先服白石英久忽然房道強盛經月餘漸患渴經數日小便大利日夜百行以來百方治之漸以增劇四體羸憊不能起止精神恍惚口舌焦乾而卒此病雖

稀甚可畏也利時脉沉細微弱服枸杞湯即効但不能長愈
服鉅丹散亦即減其間將服除熱宣補丸

枸杞湯方

枸杞枝葉一斤

桔梗根 石膏 黃連

甘草各三兩

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分五服日三夜二劇者

多合渴即飲之

鉅丹散主消渴止小便數兼消中方

鉅丹

胡粉各二分

桔梗根

甘草各十

澤瀉

石膏

赤石脂

白石脂

各五分附後作貝母

右八味治下篩水服方寸匕日三壯人一匕半一年病者
一日愈二年病者二日愈渴甚者夜二服腹痛者減之丸

服亦佳一服十九傷多令人腹痛

張文仲云腹中痛者宜

漿水汁下之備急方云

不宜酒下用麥汁下之古今錄驗方云服此藥了經三兩日

或作羹亦得宜傷淡食之候小便得鹹

爛煮羊肝肚空腹服之或作羹亦得宜傷淡食之候小便得鹹

宜

更即宜服
丸及煎散方出外臺第十一卷中
蕤蓉丸兼煎散將息蕤蓉

蕤神丸方

蕤神 黃耆 桔梗根 麥門冬 人參 甘草

黃連 知母

各三兩

乾地黃 石膏

各六兩

菟絲子

三合

蕤蓉

四兩

右十二味末之以牛膽三合和蜜丸如梧子以芍根湯服三十丸日二服漸加至五十丸集驗名宣補九治腎消渴小便數者

口含酸棗丸治口乾燥內消方

酸棗

一升五合

酢安石榴子

五合乾子

葛根

覆盆子

各三兩

烏梅

五枚

麥門冬

四兩

茯苓

桔梗根

各三兩半

桂心

一六銖

石蜜

四兩半

右十味末之蜜丸含如酸棗許不限晝夜以口中津液爲度盡復更含無忌

消中日夜尿七八升方

鹿角炙令焦末以酒服五分匕日二漸加至方寸匕

又方 潼麻汁服一升佳

又方

葵根如五升盆大兩束砾臺云大斤以水五斗煮取三升宿不食平旦一服三升

論曰強中之病者莖長興盛不交精液自出也消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服猪腎蕷朶湯制腎中石熱也又宜服白鵝通湯方見下解

猪腎蕷朶湯方

猪腎具 大豆升 蕤朶 石膏略三 党參

茯神

一作茯苓 磁石綿

知母 葛根

黃芩

桔梗根

甘草

略二

右十二味㕮咀以水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去
滓下藥煮取三升分三服渴乃飲之下樵熱者夜輒令
劑病勢漸歇即止

增損腎瀝湯治腎氣不足消渴小便多腰痛方

羊腎具

遠志 人參 澤瀉 乾地黃

桂心

當歸

茯苓 龍骨 黃芩

甘草

芎藭芎藭

生薑六兩

五味子合五

大棗三十枚

麥門冬升

右十六味㕮咀以水一斗五升煮羊腎取一斗二升下藥

取三升分三服

治下樵虛熱注脾胃從脾注肺好渴利方

小麥

地骨白皮各一升

竹葉一升

麥門冬

茯苓四兩

甘草三兩

生薑

桔梗根各五兩

桔梗根各五兩

大棗

三十枚

右九味咬咀先以水三斗煮小麥取一斗去滓澄清取八
升去上沫取七升煮藥取三升分三服

治渴利虛熱引飲不止消熱止渴方

竹葉

切二升

地骨皮

生地黃

切一升

石膏

入八兩

菝葜

菝葜一作

萎蕤

知母

生薑

略四升

桔梗根

八兩

右十味咬咀以水一斗二升下大棗三十枚并藥煮取四
升分四服

治面黃手足黃咽中乾燥短氣脉如連珠除熱止渴利補養
地黃丸方

生地黃汁

生桔梗根

二升

牛羊脂

三升

白蜜

四升

黃連

一升

右五味合煎令可丸飲服如梧子大五丸日二加至二十

丸若苦冷而渴渴差即別服溫藥也

治渴小便數方

貝母

六分
作知母

桔樓根

茯苓

各四分

鉑丹

一分

雞肫

臍中

黃皮

一枚十四

右五味治下篩飲服方寸匕日三差後常服甚佳去鉑丹以蜜丸之長服勿絕以麥飲服

治渴利方

生桔樓根三十斤切以水一石煮取一斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以溫酒先食服如雞子大日三服

治渴小便利復非淋方

榆白皮二斤切以水一斗煮取五升一服三合日三

又方 小豆蔻一把擣取汁頓服三升

又方 薔薇根水煎服之佳

中後治尿

睡眠

又方 三年重鵲巢燒末以飲服之

附後治睡
中遺尿

又方 桃膠如彈丸含之咽津

又方

蠟如雞子大以酢一升煮之二沸適寒溫頓服之

論曰凡人生放恣者衆盛壯之時不自慎惜快情縱慾極意房中稍至年長腎氣虛竭百病滋生又年少懼不能房多服石散真氣既盡石氣孤立惟有虛耗唇口乾焦精液自洩或小便赤黃大便乾實或渴而且利日夜一石或渴而不利或不渴而利所食之物皆作小便此皆由房室不節之所致也凡平人夏月喜渴者由心王也心王便汗汗則腎中虛燥故渴而小便少也冬月不汗故小便多而數也此爲平人之證也名爲消渴但小便利而不飲水者腎實也經云腎實則消消者不渴而利是也所以服石之人於小便利者石性歸腎

腎得石則實實則能消水漿故利利多則不得潤養五藏藏
襄則生諸病張仲景云熱結中焦則爲堅熱結下焦則爲弱
血亦令人淋閉不通明知不必悉患小便利信矣內有熱者
則喜渴除熱則止渴兼虛者須除熱補虛則差矣
治不渴而小便大利遂至於死者方

牡蠣五兩以患人尿三升煎取二升分再服神驗
治小便不禁多日便一二斗或如血色方

麥門冬 乾地黃 各一錢 乾薑 四兩 菟梨子

續斷

桂心 各二錢

甘草 一兩

右七味㕮咀以水一斗煮取二升五合分三服去滌消錄驗

脚瘦細數小便

九房散主小便多或不禁方

菟絲子 黃連 蒲黃 各三兩 消石 兩 肉荳蓉 二兩

右五味治下篩并雞肫脭中黃皮三兩同爲散飲服方寸
匕日三如人行十里更服之研金翼有五味子三
兩每服腹空進之

又方

鹿茸

寸

躄躅

韭子

笮

桂心

尺一

附子

大者三枚

澤瀉

兩

右六味治下篩漿服五分匕日三加至一匕

黃耆湯治消中虛勞少氣小便數方

黃耆

芍藥

生薑

桂心

當歸

甘草

笮

麥門冬

乾地黃

黃芩

笮

大棗

枚三十

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三

棘刺丸治男子百病小便過多失精方

棘刺

石龍芮

巴戟天

各二兩

麥門冬

厚朴

菟絲子

萆薢

外臺作草薢

草薢

柏子仁

萎蕤