

影印宋本傷寒論

上海中醫書局發行

傷寒論卷第五

漢 張仲景述

晉 王叔和撰次

宋 林億校正

明 趙開美校刻

沈琳全校

辨陽明病脉證并治第八

辨少陽病脉證并治第九

辨陽明病脉證并治第八

合四十四法。方一十首。一方附。并見

陽明少陽合病法。

陽明病。不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。第

一。三味。前有陽明病二十七證。

陽明病。脉遲。汗出不惡寒。身重短氣。腹滿潮熱。大便鞭。大承氣湯主之。若腹大滿不通者。與小承氣湯。第二。大承氣四味。小承氣三味。

陽明病。潮熱大便微鞭者。可與大承氣湯。若不
大便六七日。恐有燥屎。與小承氣湯。若不轉失
氣。不可攻之。後發熱復鞭者。小承氣湯和之。第

三。用前第二方。下有二病證。

傷寒若吐下不解。至十餘日。潮熱不惡寒。如見
鬼狀。微喘直視。大承氣湯主之。第四。用前第二方。

陽明病。多汗。胃中燥。大便鞭。讞語。小承氣湯主

之。第五。

用前第二方

陽明病。讞語潮熱。脉滑疾者。小承氣湯主之。第

六。

用前第二方

陽明病。讞語潮熱。不能食。胃中有燥屎。宜大承

氣湯下之。第七。

用前第二方。下有陽明病一證。

汗出讞語。有燥屎在胃中。過經乃可下之。宜大

承氣湯。第八。

用前第二方。下有傷寒病一證。

三陽合病。腹滿身重。讞語遺尿。白虎湯主之。第

九。四味。

二陽併病。太陽證罷。潮熱汗出。大便難。讖語者。

宜大承氣湯第十。

用前第一方

陽明病。脈浮緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。惡熱身重。若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊懣。舌上胎者。梔子豉湯主之。第十一。

二味

若渴欲飲水。舌燥者。白虎加人參湯主之。第十

二。五味

若脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主

之。第十三。

五味。下有不。可。與猪苓湯一證。

脈浮遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之。第

十四。三味。下有
二病證。

陽明病。下之外有熱。手足溫。不結胃。心中懊懣。不能食。但頭汗出。梔子豉湯主之。第十五。用前第十

方一

陽明病發潮熱。大便溏。胃滿不去者。與小柴胡湯。第十六。七味

陽明病。脅下滿。不大便而嘔。舌上胎者。與小柴胡湯。第十七。用上
方

陽明中風。脈弦浮大。短氣。腹滿。脅下及心痛。鼻乾。不得汗。嗜臥。身黃。小便難。潮熱而噦。與小柴

胡湯第十八

用上方

脉但浮無餘證者與麻黃湯第十九

四味

陽明病自汗出若發汗小便利津液內竭雖鞭不可攻之須自大便蜜煎導而通之若土瓜根

豬膽汁第二十

一味豬膽方附二味

陽明病脉遲汗出多微惡寒表未解宜桂枝湯

第二十一 五味

陽明病脉浮無汗而喘發汗則愈宜麻黃湯第

二十二

用前方十九方

陽明病但頭汗出小便不利身必發黃茵陳蒿

湯主之第二十三 三味

陽明證喜忘必有畜血大便黑宜抵當湯下之

第二十四 四味

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者宜

大承氣湯第二十五 用前第二方下有一病證

病人煩熱汗出解如瘧狀日晡發熱脈實者宜

大承氣湯脈浮虛者宜桂枝湯第二十六 大承氣湯

用前第二方桂枝湯用前第二十一方

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛本有宿

食宜大承氣湯第二十七 用前第二方

病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。宜大

承氣湯。第二十八。

用前方
二方

食穀欲嘔。屬陽明也。吳茱萸湯主之。第二十九

四味

太陽病發熱。汗出惡寒。不嘔。心下痞。此以醫下
之也。如不下。不惡寒而渴。屬陽明。但以法救之。

宜五苓散。第三十。

五味下有
二病證

跌陽脉浮而濇。小便數。大便鞭。其脾為約。麻子

仁丸主之。第三十一。

六味

太陽病三日發汗不解。蒸蒸熱者。調胃承氣湯

主之第三十二用前第一方

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯第三十三

用前第一方

太陽病若吐下發汗後微煩大便鞭與小承氣

湯和之第三十四用前第二方

得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭

小便利屎定鞭宜大承氣湯第三十五用前第二方

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大

便難宜大承氣湯第三十六用前第二方

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯第三

十七。用前第
二方

發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。第三

十八。用前第
二方

腹滿不減。減不足言。當下之。宜大承氣湯。第三

十九。用前第
二方

陽明少陽合病。必下利。脉滑而數。有宿食也。當

下之。宜大承氣湯。第四十。用前第
二方

病人無表裏證。發熱七八日。脉數可下之。假令

已下。不大便者。有瘀血。宜抵當湯。第四十一。用前

第二十四方。下有二病證。

傷寒七八日。身黃如橘色。小便不利。茵陳蒿湯

主之。第四十二。

用前第二十三方。

傷寒身黃發熱。梔子蘘皮湯主之。第四十三。

三味。

傷寒瘀熱在裏。身必黃。麻黃連軹赤小豆湯主

之。第四十四。

八味。

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何

謂也。荅曰。太陽陽明者。脾約絡云是也。正陽陽明

者。胃家實是也。少陽陽明者。發汗利小便已。胃中

燥煩實。大便難是也。

陽明之為病。胃家實。一作是也。

寒

一作是也。

問曰。何緣得陽明病。荅曰。太陽病。若發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。內實。大便難者。此名陽明也。

問曰。陽明病外證云何。荅曰。身熱。汗自出。不惡寒。反惡熱也。

問曰。病有得之一日。不發熱而惡寒者。何也。荅曰。雖得之一日。惡寒將自罷。即自汗出而惡熱也。

問曰。惡寒何故自罷。荅曰。陽明居中。主土也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒。二日自止。此為陽明病也。

本太陽初得病時發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明也。傷寒發熱無汗。嘔不能食。而反汗出濇濇然者。是轉屬陽明也。

傷寒三日。陽明脉大。

傷寒脉浮而緩。手足自溫者。是為繫在太陰。太陰者。身當發黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日大便鞭者。為陽明病也。

傷寒轉繫陽明者。其人濇然微汗出也。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脉浮而緊。若下之。則腹滿小便難也。

陽明病。若能食。名中風。不能食。名中寒。

陽明病。若中寒者。不能食。小便不利。手足澀然。汗出。此欲作固瘕。必大便初鞭後溏。所以然者。以胃中冷。水穀不別故也。

陽明病。初欲食。小便反不利。大便自調。其人骨節疼。翕翕如有熱狀。奄然發狂。濺然汗出而解者。此水不勝穀氣。與汗共并。脉緊則愈。

陽明病。欲解時。從申至戌上。

陽明病。不能食。攻其熱必噦。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。攻其熱必噦。

陽明病。脉遲。食難用飽。飽則微煩頭眩。必小便難。此欲作穀瘵。雖下之腹滿如故。所以然者。脉遲故也。

陽明病。法多汗。反無汗。其身如蟲行皮中狀者。此以久虛故也。

陽明病。反無汗。而小便利。二三日嘔而欬。手足厥者。必苦頭痛。若不欬不嘔。手足不厥者。頭不痛。云一。

冬陽明。

陽明病。但頭眩不惡寒。故能食而欬。其人咽必痛。

若不欬者。咽不痛。陽明云冬。

陽明病。無汗。小便不利。心中懊懣者。身必發黃。
陽明病。被火。額上微汗出。而小便不利者。必發黃。
陽明病。脈浮而緊者。必潮熱。發作有時。但浮者。必
盜汗出。

陽明病。口燥。但欲漱水。不欲嚥者。此必衄。

陽明病。本自汗出。醫更重發汗。病已差。尚微煩。不
了了者。此必大便鞅。故也。以亡津液。胃中乾燥。故
令大便鞅。當問其小便日幾行。若本小便日三四
行。今日再行。故知大便不久出。今為小便數少。以
津液當還入胃中。故知不久必大便也。