

傷寒廣要

傷寒廣要卷第七

東都丹波元堅亦柔撰

德陽蘇榮權矩亭

同叅校

浦江白昭煌潤生藏書重印

華陽周鳳楷魯東

兼變諸證

上

誤治虛乏

力 脉沉而數按之無

脈沉而數按之無力口渴身熱不退即退亦不淨神氣恍惚與湯水則飲不與則不飲時思食食亦不能下舌上微燥得湯即潤或淡紅色或有微苔或無苔此裏虛熱而少津液也

直解案此不

謂誤治證然以下諸方所主多有如此者仍出于茲

人參奪命散無問陰陽二證傷寒日子深淺差誤服藥而成壞

證垂死者服之再生。

人參

二兩緊實者

右爲麤末分再服生薑三片水一盞半煎至七分通口服一時辰間連進三服覺鼻上汗出無不即活。

家寶

破證奪命散

○一作丹

治傷寒陰陽二證不明或投藥錯誤致患人

困重垂死七日以後皆可服傳者云千不失一

好人參一兩去蘆細切水一大升銀石器內煎至一盞新水沉之取冷一服而盡汗不自它出只在鼻槩尖上涓涓如水是其應也。蘇韜光云侍郎方丈嘗以救數十人余宰清流日申屠倅行父之子婦產後病時疫二十餘日已成壞證偶見

人參湯須用長

問因勸其一味只服人參遂安是時未知有此方偶暗合耳

是齋

治傷寒壞證時或發熱消渴煩燥用新羅人參不拘多

少煎湯浸令冰冷候盛渴之時與之頓服熱則隨去

簡易

世

謂傷寒汗吐下三法差謬名曰壞證昔張致和用獨參湯救

治一人垂死手足俱冷氣息將絕口張不能言致和以人參

一兩去蘆加附子一錢於石朮內煎至一碗以新汲水浸之

若冰冷一服而盡少頃病人汗從鼻梁尖上涓涓如水此其

驗也蓋鼻梁上應脾若鼻端有汗者可救以土在身中周遍

故也近陸同婦產後患疫證二十餘日氣虛脈弱即同壞證

亦以此湯治之遂愈孫真人云人參湯須用長流水煎服若

流水煎井水則
不驗

用井水則不驗蓋長流水取其性之通達耳

續醫說

是治壞

病中之誤汗吐下真氣脫而致虛者服之如神

辨注

凡發汗

太過一時將至亡陽或身寒而慄或氣脫昏沉等候速宜煎

獨參湯一兩許飲之或甚者以四味回陽飲速爲挽回庶可

保全否則恐致不救

景岳

人參膏 用頂參六兩水五碗煎取二碗復渣用水二碗煎取

一碗去渣將三碗參汁合爲一處緩火煎熬以箸常常攪之

候汁稠厚即成膏矣凡救虛危將脫之症得此爲善

心悟

生脈散

○主治
互見前

人參 麥門冬 五味子

各等分

右細切水煎 人參之甘補氣麥門冬苦寒瀉熱補水之源

五味子之酸清肅燥金名曰生脈散 內外傷辨○原无分

大白誤汗太過津液外亡用生脈益氣湯 即本方合補

人參三白散發汗後脈虛人弱者

人參 錢三 白朮 白芍藥 白茯苓 各二錢 生薑 三片

大棗 二枚

右用水二鍾煎一鍾溫服之 桂枝要○原加 寶鑑補遺不用

大棗云手足冷或身微熱脈皆沉細微弱而煩躁者或用人

參三白湯加竹茹 ○案此方未審其出典先君子曰要訣云

方錯舉和劑治勝脱蘊熱此方攷婦人良方治血虛肌熱乞力

力武湯其方與乞
伽散相同

癸未仲秋比鄰林楚曉之母勞力感寒頭眩發熱前醫誤以為
太陽表症而投辛發之劑連五劑不痊及延余治六脈洪緩無
力兩手微見瞶動此乃過飲表劑因致元氣大虛血不榮筋法
當溫補遂用補中益氣湯加肉桂芍藥兩服熱退身涼脈亦斂
再劑瞶動亦止

正軒岐救

加味人參養營湯治發汗過多氣血俱虛而筋惕肉瞶者

人參

半二錢

白朮

當歸身

生地黃

自熱用熱此無

麥門冬

錢各半一

茯苓

甘草

川芎

肉桂

半有熱者減

五味子

粒十五

黃芪

汗二錢半有自

生薑

片三

棗子

箇二

水二鍾煎至一鍾去渣溫服如陰虛相火動者加知母黃柏
各一錢酒炒用若陽虛下寒脈微者加熟附子一錢肉桂倍
之不得眠加遠志酸棗仁各一錢

繙要○案人參苓朮湯本
出和劑癘冷門今於彼方

去芍藥陳皮遠志
加川芎麥門冬

明條汗下過多津液衰少或病方瘥血

氣尙虛是以心火不降腎水不升而口燥咽乾者必當滋陰
補血之劑用滋陰養營湯於本方去朮芩桂芪薑棗加知
母黃柏 溫疫論人參養營湯於滋陰養營湯方中去黃柏
加陳皮

溫經益元湯治因汗下大虛頭眩振振欲擗地并肉瞤筋惕及
因發汗太多衛虛亡陽汗不止

客熱上焦

熟地黃 人參 白朮 黃耆 當歸 白芍藥

生地黃 白茯苓 陳皮 肉桂 甘草 大附子

水二鍾薑一片棗一枚槌法加糯米一撮煎之溫服

六書附原脫

赤子今據補

撮要孫氏集效方並去熟地茯苓陳皮加乾薑

案

此方原爲代真武湯然稍屬緩慢仍錄于此

韓氏曰產脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若只用救逆效必遲矣與羊肉湯爲效神速病人面色雖見陽是客熱上焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦有陽則上焦陽氣下降丹田知所歸宿矣夫氣有高下病有遠近證有中外治有輕重各適其宜所爲故病八九日汗下太過二脈沉細無力多

蹇足臥惡聽人聲皮有粟時戰如瘧宜羊肉湯主之

羊肉湯方

當歸

白芍藥

兩各一

黑附子

去四錢炮裂

龍骨

半兩燒通赤

生薑

兩二

牡蠣

燒一兩赤

桂枝

半兩

右爲麤末每服二兩羊肉四兩葱白四寸去黃心同剉爛以水五升之一大升今蓋熬至一半以來濾絞去滓分三服服之海

云陽證大汗大下後亡陽於外亡血於內上而津脫下而液

脫津液兩亡宜以此湯補之矧陰證者豈可不溫補哉此與

傷寒太陽證振搖與眞武湯一例外之陽證至此尙溫况此

陰候豈得不補耶

合略例○案此方卽當歸而生薑化之者湯

發瘧

瘧爲發汗太過血不榮筋之候故亡血新產瘡家虛家易犯此證無論陰陽剛柔脈類總之正衰邪盛卒難救療

緒論

瘧者發熱腹痛口噤頭搖瘈瘲不語項強背直腰身反張或目疼或目赤或閉目或反目或足冷或足溫或妄行其脈沉弦而遲亦或帶緊此爲惡候不救者多若脈如雨濺散出於指外者旦暮殂也傷風頭痛發熱常出微汗又自嘔逆汗之必發瘧新產血虛汗出傷風亦致發瘧大發溼家汗亦作瘧熱而死瘧初發來多有腹痛之證內經曰戴眼反折瘈瘲汗出如珠著身不流太陽絕也其謂是乎

總括○初發多有腹痛似不必

若發熱畏寒無汗開目仰臥口燥渴脈浮緊而數此屬陽名剛
瘥若自汗不惡寒閉目合面四肢不收口中和脈沉細而濇此
屬陰名柔瘥夫二瘥皆有搐搦反張口噤咬齒等證但剛瘥手
足抽掣極能駭人柔瘥四肢不收時或發作耳
明條證以
剛瘥爲之發汗柔瘥爲之解肌並以小續命湯加減剛瘥去附
子用麻黃柔瘥去麻黃用生附子大便利而厥逆者則以熟附
佐之
嬰兒指要○案小續命湯剛瘥柔通用本出總病論見于下
凡二瘥並可與小續命加減服之又有大豆紫湯與竹瀝並可
與服然得斯疾十愈二三耳
管見良方
小續命湯

附子

生剉去皮

防風

半一兩

芍藥

白朮

人參

川芎

麻黃

去節湯乾

防己

黃芩

桂枝

甘草

各一兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓取八

分清汁入生薑汁再煎一二沸溫服日三夜二若柔瘥自汗

者去麻黃加葛根

活人○加葛根三字據本草瘥論補案此方本出千金治中風冒昧不知痛處拘急

不得轉側

總病加葛根名葛根麻黃湯治剛瘥柔瘥去麻黃加

葛根成一兩半

○本方一兩

蘊要云剛柔二瘥通用小續命湯

主之此言未可憑也如柔瘥有汗須去麻黃無熱有寒須去黃芩防己乃可用之若剛瘥熱多須去附子恐不為續命湯

也用者詳之

大豆紫湯治中風痲痺或背強口噤

○錄節

大豆

升五

清酒

斗一

右二味以鐵鎚猛火熬豆令極熟焦煙出以酒沃之去滓服一升日夜數服服盡更合小汗則愈一以去風二則消血結

千金

破傷

風入

本出

四體

角人

中

療

產後

中

風

角

弓

反

張

又

出

傷

損

中

五

劑

肘後療中風無問男子婦人中風脊急身痠如弓紫湯

方雞屎

升二

大豆

升一

防風

切三

兩

右二味以水三升先煮防風取

三合汁豆雞屎二味鎚中熬之令黃赤色用酒二升淋之去滓然後用防風汁和分爲再服相去如人行六七里衣覆取

汗忌風

外臺○案千金外臺更有類方數首當致○以上臺總治

王朝奉桂枝加葛根括蕒湯

治證同括蕒桂枝湯

桂枝

芍藥

錢各一

甘草

葛根

括蕒根

錢各二

右咬咀每服五錢水二盞薑五片棗二枚煎至一盞去滓服

戎元

若汗多亡陽下多亡陰致筋脈失養不柔和而成瘓無外邪可

解者惟宜補養氣血

人闡要編○緒論云十全大補參養營大建中湯選用

凡陰證脈沉細者附子湯芍藥甘草附子湯桂枝加附子湯選用服藥後汗出身和者吉若脈來沉遲或緊細而大便自利者皆死證也

緒論○案三方之一目原作附子散附子白朮湯其方本出聖惠活人等一係辛燥瘥病液乾實非所宜今

所不取致三醫通鑒金匱諸條必配仲景溫補方亦屬
牽強然此三方特爲合轍仍從改易○以上柔痙屬

痙病通宜三承氣合解毒下之

本標

傷寒瘡瘍破傷風與傷寒治法一同但以涼隔白虎承氣臨時

斟酌用之

要心

治傷寒剛痙壯熱頭痛筋脈不能舒展犀角大黃湯方

犀角

鎰

大黃

劉炒各一兩

芎藭

半兩

石膏

二兩

牛黃

研半分

右五味搗羅四味爲散入牛黃同研令勻每服一錢匕不拘

時煎淡竹葉湯調下

聖濟○以上剛痙

風溼

大抵濕之爲病易至沉深漸漬之餘淪肌浹髓於斯時也須以

修身集卷之八

昌福公司代印

朮附薑桂作大劑與之藥力相接病當漸解不可以旦暮而責效焉要之治濕莫若生附蒼朮爲快

指直

治濕莫如朮然白朮性緩不如蒼朮之烈芎藭亦能逐水其說見於左傳若更挾熱而小便不利則須用茯苓防己之類以通之然亦視其輕重淺深若所感重而濕已達於藏府必不入食爲嘔爲泄爲喘滿爲四支重痛爲鄭聲爲眼直視睛不能轉爲脚腫若臍下堅硬爲虛汗非若風寒之易攻直須以雄附薑桂橘朮之類作大劑與服使藥氣相接浸漬攻之積日持久乃當漸去要以生附蒼朮爲主也不可以數服不見效用別藥

易簡

爲陰邪其性緩

爲陰邪爲痛爲

腫