

新刻陳養晦先生傷寒五法卷之三

東海石楷臨初父撰述

門人殷銘子文全閱

五法治例

咳嗽

咳嗽出於肺蓋皮毛者肺之合也因寒侵皮毛致肺咳嗽故言在表若惡寒脊強此太陽經咳嗽宜發表若脇痛往來寒熱此少陽經咳嗽宜小柴胡湯此二者皆表證也傳經裏證則無咳嗽惟直中陰經間有

咳嗽乃寒束於肺必下利清穀四肢厥逆外無表證
方是直中咳嗽急用四逆湯溫之若水停心下亦令
咳嗽必見水水氣證候法當分表裏表有水咳而發熱
用小青龍湯裏有水咳而身涼用十棗湯

咳逆

夫逆氣爲咳逆乃氣逆而不伸俗名呃逆者是也然
有數證如脉來沉細者內有寒也必見有直中寒證
用理中湯溫之若脉洪有力或便閉口渴此爲當下
若失下則濁氣不下降反逆而冲上故似咳逆非真

惡風要寒辨
營衛之症不
若以有汗無
汗辨之更為
的確

咳逆也宜下之若往來寒熱而有咳逆是邪將入裏裏不納邪故咳逆屬少陽經用小柴胡湯和之至於久病見咳逆者是真氣已散死證不治內經曰弦數者其聲嘶木敗者其葉落胃絕者其聲咳逆故曰死證

惡風

風寒常相因而少相離惡風未有不惡寒者蓋有寒時不皆惡風有風時不皆惡寒也

夫風邪侵於衛則惡風是太陽經傷風證宜桂枝湯蓋八方之風邪皆傷衛而不傷榮氣被邪侵則腠理開而自汗汗去則脉浮緩故用桂枝實表解肌自各

有例

惡寒

夫寒邪侵於榮則惡寒故惡寒卽是太陽經寒證宜
麻黃湯若傳經卽屬熱則無惡寒直中陰經而惡寒
急用四逆湯溫之故傳經陰證決無惡寒之理又有
經汗吐下而惡寒者正氣虛也脉必微弱宜補氣血
用真武湯亦有惡寒正表證脉當浮緊反尺寸俱微
弱者是原本氣血虛弱先用黃芪建中扶助正氣然
後發表名曰先補後攻

身體痛

夫有寒邪在表則血凝而不得周流故身痛假有熱在內則血氣通暢豈有身痛之理故身痛卽是表證必脉帶浮緊宜大發表凡身痛固是表證若脉反微弱者此氣血本虛不可驟表先用黃芪建中湯補之然後發表若傳裏證則無身痛惟直中陰經亦有身痛但無頭痛發熱以別之輕則理中湯重則四逆湯又陰毒身痛痛之極也則寒又甚於直中者數倍宜急溫之以回陽氣用正陽甘草湯又有中濕身痛則

聲重鼻塞、一身盡痛、有風濕身痛、則身腫喜衣、不能轉側、此二證名曰類傷寒、故身痛不可槩治、須詳證以別之。

咽痛

夫咽者胃之路也、今咽痛知熱邪在裏、故爲裏證、然亦有數證、有陽毒咽痛、則口瘡赤爛、發狂吐血、宜陽毒升麻湯、有少陰傳經咽痛、必口燥煩渴、欲思水自救、及便閉諸證、內熱之極、必待外無一毫表證、方可

用承氣湯、加甘桔下之、又有尺寸脉緊、當無汗、今反

用承氣
加甘桔
似難

汗出不止而咽痛者名曰亡陽咽痛此津液虛極而反生熱宜用朮附湯又有非時暴寒伏於少陰而有咽痛者此寒邪內急反于於上故令咽痛必見下利清穀四肢厥冷方用四逆湯若外無大寒證卽用桂甘湯又不可用四逆矣

筋惕肉瞤

夫人身筋肉賴血以養之若發汗太過則液枯而血少致筋肉空虛如魚失水故惕然動跳也急用真武湯以生榮氣或素有動氣則不可汗若誤汗之重虛

其虛亦成筋肉震惕或白朮牡蠣真武湯止之然筋跳肉瞤固屬虛若惡寒湯中去芍藥增附子一倍及惡熱者湯中去附子增芍藥一倍恐其太燥故耳

無汗

夫無汗正是表證寒邪侵於表則無汗蓋寒邪凝滯則腠理閉塞而無汗宜用麻黃湯發表以開泄之使邪去血和腠理自開通矣然無汗固屬太陽傷寒證又有他證亦令無汗宜詳別之

自汗

夫自汗有數種大抵風傷衛則令自汗風性溫屬陽主動能開泄腠理故自汗必頭疼發熱方爲表證自汗宜用桂枝湯實表解肌若裏證自汗外無一毫表證乃熱邪傳裏薰蒸臟腑以致腠理開泄亦自汗宜用承氣湯下之又有風溫自汗者身多灼熱喘甚息粗者是也宜用萎蕤湯若中暑自汗則灑然毛聳六脉虛弱宜用白虎湯益元散或謾發汗而汗出不止名曰亡陽或虛汗自出而不止亦名曰亡陽通用柴胡龍骨牡蠣湯及朮附湯量證用之有柔痙自汗

則頸項強角弓反張者是也小續命湯去麻黃加桂枝又有陽明腑病內熱灼甚口渴便閉而自汗者用調胃承氣湯若直中陰經四肢厥冷汗自出者急投四逆湯以上數證宜細加詳別

口燥咽乾

夫口燥咽乾乃邪熱傳裏燒耗津液以致口燥咽乾宜以三承氣湯選用下之又有陽明腑病口咽乾燥者此陽熱內陷必背惡寒用白虎湯若少陽口燥咽乾乃邪傳半表半裏未深入腑將化爲熱今口咽微

微乾燥必見往來寒熱及少陽諸證宜用小柴胡加
天花粉若表證盡除而口燥咽乾甚者必大便閉結
內熱之極是邪傳少陰宜急下之以救腎經將絕之
水豈可不分表裏而混治哉

發狂

夫熱傳裏則爲陽盛陽主動動則使人發狂寒主陰
靜豈有發狂之理然發狂有三證熱邪傳裏名曰正
狂其證小便不利大便閉結口燥大渴宜大承氣湯
下之若狂而下利赤黃口渴者黃連解毒加大黃葶

藤以治之。經曰：暴注下迫，皆屬於火。又有內熱迫極，畜熱下焦，名曰如狂，非如正狂之甚。其證小便自利，大便黑色，唇口焦，水不嚥，小腹硬滿，宜用桃仁承氣之類。又有表證服藥不能汗，醫用火逼，周身取汗過急，致津液內竭而驚狂者，名曰火邪驚狂。此證屬虛，不可下。其證必汗出不止，小便必澁，或身瞶動而心煩躁，宜用柴胡龍骨牡蠣以收之。總之發狂實者煩躁不已，虛者真陽脫亡，則汗出不止，當量其虛實以解之。此治狂之大法也。

寒熱往來

太陽少陽

足少陽膽經乃陰陽交界之所寒邪傳至此處邪與陽爭則發寒邪與陰爭則發熱陰陽交爭故為寒熱往來正是半表半裏之證只有小柴胡一湯和解又有陽明腑病熱結在內不得通越亦有寒熱往來必大便結實用大柴胡承氣湯下之又有一種渴而不嘔兼頭汗出而寒熱往來胸滿咳嗽此用柴胡桂薑湯加天花粉若傷寒病後如瘧狀一日二三發不嘔

圖二便自調脉浮緩者乃邪退正復不藥而愈若一

陽明內實則
為實熱往
來之症今
人頗多程
山陰以為必
與亦屬偏

日二三發又嘔二便反常脉浮者桂枝各半湯微表之

喘

夫喘出於肺肺主皮毛邪侵皮毛令人發喘故曰在表必有頭痛發熱惡寒之證卽用麻黃湯然有裏證喘者何也表證盡去不惡寒反惡熱便閉潮熱此熱結在胃不得伸達裏氣上冲故喘宜用大承氣湯下之有太陽表證汗後渴飲水多水停心下發咳微喘者此水氣喘也必見有表裏水氣之證若表有水小

青龍湯裏有水十棗湯太陽與陽明合病胸滿而喘者卽投麻黃湯倍加杏子可見喘之屬表又何疑焉

渴

有陽毒口渴中暑口渴俱用白虎湯夫渴者內熱也邪熱燒耗津液故思水以解飲多能消者熱深也飲少不能消者熱未深也故多在裏然表雖無渴或間有之若太陽而渴邪居人身久尺寸脉浮表證俱在者此太陽渴也宜用小青龍去半夏倍加天花粉若小便不利而渴者此太陽腑病用五苓散若自汗而

渴甚者此陽明腑病熱灼之甚胃無液潤急用白虎湯外無表證下利腸垢而渴甚者此少陰傳經裏證宜下之乃火性急速故也若少陰自利清穀而渴小便色白乃寒極而反似熱也雖渴與之水又不能下用乾薑甘草湯若汗吐下後津液內竭而渴者用小柴胡湯宜隨證以別之

霍亂

夫霍亂者吐利兼作言其揮霍撩亂也屬於熱者十常八九屬於寒者十無一二若有一毫口渴轉筋卽