

新萬國藥方

新萬國藥方

第一編 呼吸器系諸病

第一節 鼻腔病

急性鼻加答兒 Rhinitis acuta Coryza

處置 溫保、發汗、喫烟禁止、塵埃豫防、體質療法(結核、梅毒)
 鼻邪、鼻寒冒、鼻粘膜加多兒、舊譯作頭風鼻塞、右有傷風感冒等名、

一 耶僕蘭日葉 二、〇〇

● 浸煎劑
 沸湯適宜浸出臨臥頓服

二 耶僕蘭日葉 五、〇〇

白葡萄酒適宜浸出入日間

濾液 二五〇、〇〇

白糖 三〇〇、〇〇

右混和每服二三食匙和溫湯服用

三 接骨木花浸(一五、〇二五〇、〇〇)

醋酸安母紐謨液 二五〇、〇〇

單舍利別 二五〇、〇〇

右每二時服一食匙

四 接骨木花浸(一〇、〇二〇〇、〇〇)

● 炭酸安母紐謨 一〇〇、〇〇

單舍利別 一〇〇、〇〇

右混和一日三回分服

五 接骨木花醋(一〇、〇二〇〇、〇〇)

右十日間浸出濾過每服一小

兒匙溫糖水調和服用

六 加密列花 五、〇〇

薄荷葉 五、〇〇

右浸出濾液 一五〇、〇〇

● 重炭酸那篤留謨 三〇〇、〇〇

右一日數回分服

● 水劑

七 撒里矢爾酸那篤留謨 二、〇〇

苦味丁幾 八滴

水 三〇〇、〇〇

右頓服

● 散劑
 陀勿兒氏散 〇、五〇

右臨臥頓服

八 撒里矢爾酸那篤留謨 三、〇〇

右包於「オブラート」服用

九 安知歇貌林 〇、二〇

乳糖 〇、五〇

右臨臥頓服

一〇 安知歇貌林 〇、二〇

一 安知歇貌林 一、〇〇

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 一六 | 一五 | 一四 | 一三 | 一二 | 一一 | 一〇 | 〇九 | 〇八 | 〇七 | 〇六 | 〇五 | 〇四 | 〇三 | 〇二 | 〇一 |
| 乳糖 甘汞 右混和吹入 | 單寧酸 吹入劑 白糖 右混和吹入 | 結晶アコニチン 貌羅護化規尼涅 甘草越幾斯適宜 右為十九於二十四時間內分服 | 樟腦 阿片 硝酸加僧謨 白糖 右為散臨臥溫茶調和服用 | 安息香酸 樟腦 實麥答利斯末 右一日六回分服 | 薄荷末 咖啡末 白糖 右吹入 | 亞拉比亞護謨 右混和吹入 | 次硝酸蒼鉛 單寧酸 鹽酸莫兒比涅 右混和吹入 | 撒魯兒 撒里矢爾酸 單寧酸 硼酸 右半日間吹入 | 鹽酸古加乙涅 咖啡末 白糖 右吹入 | 鹽酸古加乙涅 鹽酸古加乙涅 メントール | 咖啡末、白糖 右研和吹入 | 鹽酸莫兒比涅 右二十四時間吹入 | 鹽酸莫兒比涅 右混和每回吹入少量 | 鹽酸莫兒比涅 白糖 右一日五回乃至十回吹入 | 咖啡末 硼酸 鹽酸古加乙涅 メントール |
| 一五、〇 | 二、〇 五、〇 | 〇、〇 〇、〇 〇、〇 〇、五 | 〇、〇 〇、〇 〇、〇 〇、三 八、〇 | 〇、五 〇、一 〇、三 〇、三 〇、三 | 〇、一 五、〇 五、〇 五、〇 | 一、五 二、〇 | 〇、〇 三、〇 三、〇 三、〇 | 一、〇 〇、二 〇、一 四、〇 | 〇、二 五、〇 五、〇 | 〇、二 〇、一 〇、二 | 〇、一 〇、一 〇、一 | 〇、一 四、〇 | 〇、五 一、五 | 五、〇 二、〇 〇、五 〇、五 | 各五、〇 〇、一五 〇、二五 二、〇 五、〇 |
| 二二 | 二一 | 二〇 | 一九 | 一八 | 一七 | 一六 | 一五 | 一四 | 一三 | 一二 | 一一 | 一〇 | 〇九 | 〇八 | 〇七 |
| 鹽酸古加乙涅 メントール | 鹽酸古加乙涅 咖啡末 白糖 右吹入 | 撒魯兒 撒里矢爾酸 單寧酸 硼酸 右半日間吹入 | 次硝酸蒼鉛 單寧酸 鹽酸莫兒比涅 右混和吹入 | 亞拉比亞護謨 右混和吹入 | 薄荷末 咖啡末 白糖 右吹入 | 鹽酸古加乙涅 鹽酸古加乙涅 メントール | 鹽酸莫兒比涅 右二十四時間吹入 | 鹽酸莫兒比涅 白糖 右一日五回乃至十回吹入 | 咖啡末 硼酸 鹽酸古加乙涅 メントール | 咖啡末、白糖 右研和吹入 | 鹽酸古加乙涅 メントール | 鹽酸莫兒比涅 右二十四時間吹入 | 鹽酸莫兒比涅 右混和每回吹入少量 | 鹽酸莫兒比涅 白糖 右一日五回乃至十回吹入 | 咖啡末 硼酸 鹽酸古加乙涅 メントール |
| 〇、二 | 〇、一 〇、一 | 〇、二 〇、一 〇、一 四、〇 | 三、〇 三、〇 三、〇 | 二、〇 一、五 | 〇、一 五、〇 五、〇 | 〇、二 〇、一 〇、二 | 〇、一 四、〇 | 〇、五 一、五 | 二、〇 〇、五 〇、五 | 五、〇 二、〇 〇、一五 〇、二五 | 〇、二五 〇、二五 | 〇、一 四、〇 | 〇、五 一、五 | 五、〇 二、〇 〇、一五 〇、二五 | 各五、〇 〇、一五 〇、二五 二、〇 五、〇 |
| 二七 | 二六 | 二五 | 二四 | 二三 | 二二 | 二一 | 二〇 | 一九 | 一八 | 一七 | 一六 | 一五 | 一四 | 一三 | 一二 |
| 鹽酸古加乙涅 蒸餾水 右吸入 | 鹽酸古加乙涅 薄荷油 水 右吸入 | 格魯兒酸加僧謨 杏仁水 水 右吸入 | 次硝酸蒼鉛 右二十四時間吹入 | 鹽酸莫兒比涅 白糖 右一日五回乃至十回吹入 | 咖啡末 硼酸 鹽酸古加乙涅 メントール | 咖啡末、白糖 右研和吹入 | 鹽酸古加乙涅 メントール | 鹽酸莫兒比涅 右二十四時間吹入 | 鹽酸莫兒比涅 白糖 右一日五回乃至十回吹入 | 咖啡末 硼酸 鹽酸古加乙涅 メントール | 咖啡末、白糖 右研和吹入 | 鹽酸古加乙涅 メントール | 鹽酸莫兒比涅 右二十四時間吹入 | 鹽酸莫兒比涅 右混和每回吹入少量 | 鹽酸莫兒比涅 白糖 右一日五回乃至十回吹入 |
| 二〇、〇 二〇、〇 | 二〇、〇 三滴 | 五、〇 五、〇 | 〇、〇 四、〇 | 〇、〇 一、五 | 五、〇 二、〇 〇、一五 〇、二五 | 各五、〇 〇、一五 〇、二五 二、〇 五、〇 | 〇、二五 〇、二五 | 〇、一 四、〇 | 〇、五 一、五 | 五、〇 二、〇 〇、一五 〇、二五 | 各五、〇 〇、一五 〇、二五 二、〇 五、〇 | 〇、二五 〇、二五 | 〇、一 四、〇 | 〇、五 一、五 | 五、〇 二、〇 〇、一五 〇、二五 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-------|----|---------------|------------|----|----------|------------|
| 二八 | 石炭酸 | 一〇、〇 | 三二 | 樟腦 | 一〇、〇 | 三九 | 硼酸軟膏 | 二〇、〇—二〇、〇% |
| | 安母尼亞水 | 一二、〇 | | 右一茶匙、入酒盞、注沸騰、 | | | 右塗布 | |
| | 再留酒精 | 二〇、〇 | | 蓋漏斗、嗅蒸氣、 | | 三九 | 硼砂 | 五、〇 |
| | 的列並油 | 五、〇 | | ● 注入劑 | | | 蓄微蜜* | 二五、〇 |
| | 右每回三滴潤於濾紙嗅入 | | | ● 塗布劑 | | | 蓄微水** | 二五、〇 |
| 二九 | 石炭酸 | 五、〇 | 三三 | 格魯兒那篤留謨 | 一、〇—二、〇 | 四〇 | 硝酸銀水 | (〇、三)三〇、〇 |
| | 酒精 | 一五、〇 | | 右注入 | 一〇〇、〇 | 四〇 | 右塗布 | |
| | 安母尼亞水 | 五、〇 | 三四 | 鞣酸水 | (二、〇)一〇〇、〇 | 四一 | 鹽酸古加乙涅水 | (〇二、五)五〇 |
| | 水 | 一五、〇 | | 右注入 | | 四一 | 右塗布 | |
| | 右每二時以數滴蘸紙片嗅入 | | 三五 | 硫酸亞鉛水 | (〇、四)六〇、〇 | 四二 | 鹽酸古加乙涅 | 〇、五 |
| | (初期、「ブランド」氏方) | | | 右注入 | | 四二 | 蒸餾水、伽里設林 | 各五、〇 |
| 三〇 | 石炭酸 | 五、〇 | 三六 | 鹽酸莫兒比涅水 | (〇、二)五〇、〇 | 四三 | 樟腦 | 〇、五 |
| | 亞爾個保兒 | 一五、〇 | | 右注入 | | 四三 | 酒精 | 五、〇 |
| | 蒸餾水 | 一〇〇、〇 | 三七 | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇五—〇、二五 | | 蒸餾水 | 五、〇 |
| | 右十滴浸於布帛嗅入 | | | 右每回一茶匙注入劇甚噴嚏 | | | 右鼻腔內塗布 | |
| 三一 | 貌魯謨 | 〇、二 | | ● 塗布劑 | | | | |
| | 貌魯謨加留謨 | 〇、二 | | | | | | |
| | 水 | 一〇〇、〇 | | | | | | |

慢性鼻加答兒 Ozaena

● 丸劑 處置 慢性鼻腔加答兒、惡臭鼻漏、惡臭鼻瘍、惡臭性鼻潰瘍、腦漏、舊譯作久頭風、又名鼻臃
 內部鏡檢、藥液之吸引及洗滌、溫亞爾答煎注入、食鹽溶液注入、茄皮除去、燒灼法、潰瘍面藥液點注
 一四四 硫酸亞篤魯魯比涅 〇、〇〇〇—五
 鹽酸亞剎莫兒比涅 〇、〇—

右爲十九每三時服一九

●散劑

四五 加糖沃度鐵

白糖

五、〇 五、〇

右分十包朝夕一包、瘰癧兼

梅毒性

●水劑

四六 沃度鐵舍利別

單舍利別

六、〇 〇、五

醋酸依的兒

右混和一日三回每回半茶匙

乃至一茶匙瘰癧性

●嗅入劑

四七 炭酸安母紐謨

薄荷油

加耶布的油

一五、〇 十二滴

右嗅入

四八 石炭酸

酒精

安母尼亞水

五、〇 一五、〇

水

右嗅入

四九 石炭酸

一〇、〇

有加里油

酒精

安母尼亞水

右嗅入

五、〇 二〇、〇

石炭酸

的列並油

酒精

安母尼亞水

右嗅入

一〇、〇 二〇、〇

純イヒチヲール

依的兒、酒精

右每十分乃至十五分嗅入

●綿球劑

偏里設林

水

右蘸於綿球栓塞一時間

ベタナフイール

クイルラヤ丁幾

水

右液蘸於綿球插入十五分時

間

ナフタリン

スイルラヤ丁幾

五、〇 五、〇

水

右含於綿球插入十五分時

●ブージー劑

硫酸銅

二〇〇、〇 〇、一—〇三

膠

右混和調製桿子十個爲鼻一

ブージー

結晶硝酸銀

〇、一—〇、五

膠、白陶土

右混和調製桿子十個爲鼻一

ブージー

●煙草劑

赤硫化水銀

〇、一—〇、三

右和煙草吃煙

●吹入劑

明礬

五、〇

亞拉比亞護謨

右混和一日二回吹入

明礬

二〇、〇

白糖

二〇、〇

右一日二回吹入

格魯兒酸加留謨

白糖

二〇、〇

右研和細末一日二回吹入
 但本藥研和之際違調劑法則
 有爆裂之大危險

六一 樟腦末 一〇、〇
 白糖 一〇、〇

六二 次硝酸蒼鉛 一〇、〇
 炭酸麻僂涅失亞 一〇、〇
 右研和吹入

六三 硝酸銀 〇、一、一、〇
 炭酸麻僂涅失亞 五、〇
 右研和吹入

六四 硝酸銀 〇、一、〇、五
 白陶土 一〇、〇
 右研和一日一回吹入

六五 甘汞 五、〇
 澱粉 二〇、〇
 右吹入

六六 甘汞 二、〇
 赤降汞 一、〇
 白糖 一五、〇
 右混和吹入

六七 白降汞 〇、二、五

白糖 一五、〇
 右研和吹入

六八 沃度 〇、五
 メントール 〇、五
 硼酸 二五、〇
 右吹入

六九 沃度 〇、五
 單寧酸 五、〇
 硼酸 五、〇
 右一日三回乃至六回吹入

七〇 沃度仿謨 〇、二
 亞拉比亞護謨末 一〇、〇
 右研和一日三回至五回吹入

七一 沃度仿謨 一〇、〇
 亞拉比亞護謨末 一〇、〇
 右吹入

七十二 沃度仿謨 五、〇
 安息香酸那篤留謨 五、〇
 精製的列並油 五滴
 右吹入

七三 沃度兒 一〇、〇
 右吹入

七四 撒魯兒 一、〇

撒里矢爾酸 〇、二
 單寧酸 〇、一
 硼酸 四、〇
 右吹入

七五 クレチリン 〇、一、〇、五
 硼酸 一〇、〇
 薄荷油 二十滴
 右吹入

七六 アリストール 五、〇
 右吹入

七七 タンナール 一〇、〇
 右吹入

七八 ●吸入劑 四、〇、一、〇、〇
 クレチリン 二〇〇、〇
 水 二〇〇、〇
 右吸入

七九 昇汞水 (〇、一) 一〇〇、〇
 硼酸 五、〇
 杏仁水 五、〇
 水 二五〇、〇
 右吸入

八〇 ●洗滌劑 五、〇
 格魯兒酸加留謨

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|----|-------------------------------------|---------------------------|----|---------------------------------|--------------------|
| 八一 | 右洗滌 格魯兒酸加留謨 偏里設林 | 五〇〇、〇 四、〇 二〇、〇 | 八七 | 右注入 沃度 沃度加留謨 | 〇、一 二、〇 五〇〇、〇 | 九四 | 右注入 格魯兒安母紐謨 炭酸那篤留謨 石炭酸 | 一〇、〇 一五、〇 六滴 |
| 八二 | 右混和洗滌 硼酸 格魯兒那篤留謨 | 二〇〇、〇 二、五 一〇、〇 | 八八 | 右注入(ルゴール氏溶液) 沃度 沃度加留謨 偏里設林 | 〇、一 〇、一五 〇、五 五、〇 | 九五 | 抱水格魯刺兒 | 一、〇 |
| 八三 | 右洗滌 重碳酸那篤留謨水 | 五〇〇、〇 | 八九 | 右注入 昇汞水 | 二〇〇、〇 | 九六 | 右注入 撒里矢爾酸 重碳酸那篤留謨 偏里設林 | 二、〇 三、〇 七〇、〇 |
| 八四 | 右微溫洗滌 重碳酸那篤留謨 格魯兒那篤留謨 | (一、〇)二〇〇、〇 五、〇 一〇、〇 | 九〇 | 右注入 昇汞 偏里設林 | 〇、〇一 一〇〇、〇 | 九七 | 右注入 撒里矢爾酸 硼酸那篤留謨 偏里設林 | 四、〇 六、〇 七五、〇 |
| 八五 | 右洗滌 格魯兒酸加留謨水 | 五〇〇、〇 | 九一 | 右注入 蒸餾水 過滿俺酸加留謨 | 二、〇 一〇〇、〇 | 九八 | 右混和每回一茶匙和一杯之 水注入 知母爾 | 二〇〇、〇 〇、二五 |
| 八六 | 右注入 格魯兒石灰(晒粉) | 五〇〇、〇 | 九二 | 右注入 醋酸礬土液(二%) | 五〇〇、〇 | 九三 | 右注入 | 五〇〇、〇 |

九九 クレチリン 一、〇〇〇
 酒精 一、二〇〇
 右以一茶匙溶於水五〇〇、〇〇

●塗布劑 注
 格魯兒酸加留謨 一、〇〇〇
 右以毛筆塗布 三〇、〇〇

二〇 格魯兒化亞鉛 一、〇〇〇
 蒸餾水 一五、〇〇
 偏里設林 一五、〇〇
 右塗布 五〇、〇〇

二〇 昇汞 〇、五〇〇
 右塗布 五〇、〇〇

二〇 硝酸銀 二、〇〇〇
 蒸餾水 二、〇〇〇
 右塗布 二〇、〇〇

二〇 硝酸銀水 (〇、六) 一〇、〇〇

二六 甘汞 一、〇〇〇
 白糖 二、〇〇一〇、〇〇〇

梅毒性鼻炎 Rhinitis syphilitica

二五 硼酸那篤留謨 五、〇〇〇
 偏里設林 二五、〇〇〇
 右塗布

二六 石炭酸 三、〇〇〇
 沃度丁幾 三、〇〇〇
 右塗布

二七 石炭酸 二〇、〇〇〇
 レゾルチン 三、〇〇〇
 偏里設林 五〇、〇〇〇
 水 三〇〇、〇〇〇
 右塗布

二八 ゴゾヨドル化亞鉛 一、〇〇〇
 蒸餾水 一〇、〇〇〇
 偏里設林 一〇、〇〇〇
 右塗布

二九 沃度仿謨 三〇、〇〇〇
 華攝林 三〇、〇〇〇
 右爲軟膏塗布

三〇 沃度仿謨 二〇〇
 百露拔爾撒謨 〇、五〇〇
 刺乃林 一〇、〇〇〇
 右塗布

三一 三十倍硝酸銀軟膏 二五、〇〇〇
 右塗布

三二 炭酸安母紐謨 五、〇〇〇
 樟腦 一、〇〇〇
 刺乃林 三〇、〇〇〇
 右爲軟膏塗布

三三 結麗阿篤曹 一、〇〇〇
 偏里設林軟膏* 二五、〇〇〇
 右塗布

三四 鹽酸古加乙涅水 (〇、三) 一〇、〇〇〇
 右塗布

三五 鹽酸古加乙涅 一〇、〇〇〇
 刺乃林 一〇、〇〇〇
 右爲軟膏每時塗布

二七 イヒチチール 五、〇〇〇
 右吹入

蓖麻子油 一〇〇、〇〇〇
 酒精 五〇、〇〇〇

二八 吸入其蒸濕

〇、〇五

沃度加留謨

〇、一

蒸餾水

一〇〇、〇

右注入

二九 沃度加留謨

沃度丁幾

蒸餾水

右洗滌

沃度加留謨

二、五

一〇、〇

一〇〇〇、〇

二、〇

蒸餾水

豚脂

刺乃林

右塗擦鼻粘膜

一、〇

二、〇

一五、〇

衄血 Epistaxis

鼻出血、古名鼻衄、又名鼻孔流血、又名鼻紅

處置 頭部安靜、鼻翼壓定、止血劑內服、冷水注射、收斂藥液注入、醋水注入、後鼻孔栓塞

三三

●浸劑

麥角浸 (三、〇) 一、一〇、〇

單舍利別

一五、〇

右每二時服一食匙

三五

硫酸亞鉛

一、〇

明礬

二、〇

水

五〇、〇

三九

稀醋酸*

右注入

三〇、〇

右注入

三一

過酸化水素水**

一五、〇

水

一〇〇、〇

三二

●丸劑

麥角越幾斯

〇、五

甘草羔、甘草末

各適宜

右爲十九一日五回每回二粒

三六

硫酸亞鉛

明礬

四、〇 一、〇

水

一〇〇、〇

三三

●散劑

鉛糖

〇、五

白糖

五、〇

右分十包每三時服一包

三七

明礬

水

二〇、〇

右注入

五〇、〇

右注入

三三

●吹入劑

阿仙藥

五、〇

三四

●注入劑

五、〇

二六

沒食子丁幾**

五、〇

右混和吹入

五、〇

一三

明礬

一〇、〇

右混和吹入

蒸餾水

一〇〇、〇

●コロホニウム
●塗布劑

一〇、〇
一〇、〇

一三
フエリピリン一八、〇—二〇、〇

右浸於綿球鼻粘膜塗布

第二節 喉頭病

急性喉頭加答兒

Laryngitis catarrhalis acuta

氣喉炎、喉頭粘膜炎、加答兒性喉頭炎、一作急性喉頭炎、舊譯作聲脂新炎

處置

安臥、室溫調制、輕發汗、催吐、鎮咳、蒸氣吸入、頸部卷法、水蛭貼用、賊風冷飲喫烟及發聲禁止、冰片
嚙下、溫飲料攝取

一三

●丸劑

二、〇

一三

右爲一包臨臥頓服

一四

安知歇貌林

一、〇

吐根末

一、二

重炭酸那篤留謨

一、〇

乳糖

〇、五

鹽酸莫兒比涅

〇、六

一元

右分六包一日三回每回一包

一四

精製硫黃

〇、五

兒三粒

二、五

重炭酸那篤留謨

一、〇

樟腦

〇、五

●硫酸ヒニジン

二、五

白糖

一、〇

白糖

七、五

鹽酸莫兒比涅

〇、一

右分十包一日三回每回一包

一四

精製硫黃

七、五

睡菜葉越幾斯

三、〇

重炭酸那篤留謨

〇、六

白糖

〇、一

佩里設林

五滴

重炭酸那篤留謨

〇、六

白糖

〇、一

亞爾答根末

適宜

白糖

〇、六

白糖

二、〇

右爲五十九朝夕各二九

重炭酸那篤留謨

〇、六

白糖

二、〇

●散劑

〇、五

右分三包一日三回每回一包

一四

重炭酸那篤留謨

二、〇

●散劑

〇、五

撒里矢爾酸那篤留謨

三、〇

重炭酸那篤留謨

〇、二

一七

●散劑

〇、五

撒里矢爾酸那篤留謨

三、〇

重炭酸那篤留謨

〇、二

急性喉頭加答兒

| | | | | | |
|----|--|----|---|----|---|
| 一四 | 右分十包一日三回每回一包 鹽酸亞刺莫兒比滯 〇、〇一五 鹽酸莫兒比滯 〇、〇〇三 | 一五 | 吐根末 一、〇一、二、〇 吐酒石 〇、〇三、一〇、〇五 海葱醋蜜 * 一五、〇 | 一五 | 單舍利別 各一五、〇 蒸餾水 右一日六回分服 六〇、〇 |
| 一四 | 右分三包每二時服一包 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇 右早晨微溫湯溶解頓服 | 一五 | 右震盪每十分服一小兒匙 吐根浸 (〇、四)九〇、〇 每十分時服半食匙 (小兒假 性格魯布催吐藥) | 一六 | 格魯兒安母紐謨 五、〇 甘草羔 五、〇 鹽酸莫兒比滯 〇、〇三 |
| 一四 | ●吐劑 硫酸銅 〇、五 蒸餾水 六〇、〇 單舍利別 一五、〇 | 一五 | ●水劑 撒里矢爾酸那篤留謨 八、〇 薄荷水 六〇、〇 水 一四〇、〇 | 一六 | 格魯兒安母紐謨 五、〇 吐酒石 〇、〇三、一〇、〇五 甘草羔 八、〇 茴香水 * 一五〇、〇 |
| 一五 | 右每十分時服半食匙、催吐 硫酸銅 〇、五 蒸餾水 五〇、〇 單舍利別 二〇、〇 | 一五 | 右一日三回二日分服 撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇 苦味丁幾 三、〇 水 一〇〇、〇 | 一六 | 安息香酸丁幾 五、〇一、八、〇 吐根舍利別 一〇〇、〇 水 右每時服一茶匙(小兒) |
| 一五 | 右每十分時服一茶匙、催吐 連用 吐根酒 一五、〇 海葱醋蜜 * 一五、〇 | 一五 | 右每二時服一食匙 撒里矢爾酸那篤留謨 八、〇 苦味丁幾 五、〇 ホル卜酒 三〇、〇 水 二〇〇、〇 | 一六 | 右每二時服一食匙 亞拉比亞護謨漿 * 二〇、〇 杏仁水 五、〇 單舍利別 三〇、〇 |
| 一五 | 右每十分時服一茶匙、催吐 連用(乳兒) | 一五 | 右一日三回二日分服 亞拉比亞護謨漿 * | 一六 | 右每二時服一茶匙 菲沃斯越幾斯 〇、二 |

| | |
|--------------|------|
| 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇五 |
| 亞拉比亞護謨漿 * | 七〇、〇 |
| 扁桃舍利別 * | 一一、〇 |
| 右每二時服一茶匙、咳嗽 | |
| 鹽酸亞刺莫兒比涅 | 〇、〇五 |
| 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇三 |
| 水 | 一二、〇 |
| 稀鹽酸 | 〇、〇五 |
| 亞爾答舍利別 | 三〇、〇 |
| 右每二時服一食匙 | |
| 貌魯謨加留謨 | 二、〇 |
| 鹽酸規尼涅 | 〇、〇三 |
| 單舍利別 | 一〇、〇 |
| 水 | 一〇、〇 |
| 右一日三回分服 | |
| 重碳酸那篤留謨 | 二、〇 |
| 沃度加留謨 | 一、〇 |
| 苦味丁幾 | 二、〇 |
| 水 | 一〇、〇 |
| 右一日三回分服 | |
| 硼酸那篤留謨 | 一五、〇 |
| 單舍利別 | 三〇、〇 |
| 右每時服一食匙水適宜調和 | |

| | |
|-----------------|-------|
| 服用 | |
| ● 浸煎劑 | |
| 耶僕蘭日葉浸(三、〇)五〇、〇 | 二七 |
| 右頓服 | |
| 接骨木花浸 | 二六 |
| (二〇、〇)一五〇、〇 | |
| 醋酸安母紐謨液 | 二五、〇 |
| 橙皮舍利別 | 二五、〇 |
| 右每二時服一食匙 | |
| 亞兒答煎 * | 一五〇、〇 |
| 格魯兒安母紐謨 | 五、〇 |
| 阿片丁幾 | 〇、〇五 |
| 橙皮舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每二時服一食匙、咳嗽 | |
| 亞爾答根煎 * | 一〇〇、〇 |
| 格魯兒安母紐謨 | 一、〇 |
| 單舍利別 | 一〇、〇 |
| 右每時服一茶匙 | |
| 亞爾答根煎 | 二七 |
| (一〇、〇)二〇〇、〇 | |
| 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇三 |
| 單舍利別 | 一五、〇 |
| 右每二時服一食匙 | |

| | | |
|-------------|-------------|----|
| 攝涅瓦浸 | (八、〇)二〇〇、〇 | 二七 |
| 杏仁水 | 八、〇 | |
| 單舍利別 | 一五、〇 | |
| 右一日六回二日分服 | | |
| 吐根浸 | (〇、三)一八〇、〇 | 二七 |
| 阿片丁幾 | 五、〇 | |
| 單舍利別 | 一〇、〇 | |
| 右每二時服一食匙 | | |
| 吐根浸 | (〇、五)一五〇、〇 | 二七 |
| 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇三 | |
| 茴香舍利別 * | 三〇、〇 | |
| 右每二時服一食匙、咳嗽 | | |
| 吐根浸 | (〇、一五)一〇〇、〇 | 二七 |
| 炭酸加留謨 | 〇、五一一、〇 | |
| 單舍利別 | 一五、〇 | |
| 右每二時服一茶匙 | | |
| 吐根浸 | (一、〇)二〇〇、〇 | 二七 |
| 覆盆子舍利別 * | 二、〇 | |
| 右每二時服一食匙 | | |
| 吐根浸 | (〇、六)一八〇、〇 | 二七 |
| 單舍利別 | 一五、〇 | |
| 安母尼亞茴香精 | 四、〇 | |

一六 右每二時服一食匙、祛痰
吐根浸 (〇、六)一八〇、〇
重碳酸那篤留謨 四、〇
單舍利別 一五、〇

一七 右每二時服一食匙、祛痰
吐根浸 (〇、三)一〇〇、〇
菲沃斯越幾斯 〇、一
覆盆子舍利別 一〇、〇

一八 右每時服一小兒匙(小兒)
吐根浸 (〇、三)一〇〇、〇
菲沃斯越幾斯 〇、二
單舍利別 一〇、〇

一九 右混和一日三回分服
吐根浸 (〇、三)一〇〇、〇
菲沃斯越幾斯 〇、一
亞爾答舍利別 一〇、〇

二〇 右每時服一小兒匙(小兒)
吐根浸 (〇、三)一〇〇、〇
印度大麻越幾斯 〇、一
亞爾答舍利別 一〇、〇

二一 右每時服一小兒匙(小兒)
吐根浸 (〇、三)一〇〇、〇
亞爾答舍利別 一〇、〇
吐根浸 (〇、二)一〇〇、〇

二二 右每時服一小兒匙(小兒)
吐根浸 (〇、二)一〇〇、〇
亞爾答舍利別 一〇、〇

二三 右每時服一小兒匙(小兒)
吐根浸 (〇、二)一〇〇、〇
亞爾答舍利別 一〇、〇

安母尼亞苗香精 二、〇
鹽酸亞刺莫兒比涅 〇、〇三
鹽酸 〇、〇二
亞爾答舍利別 二〇、〇

●乳劑
右每二時服一茶匙(小兒)
扁桃乳劑 * 一二〇、〇
杏仁水 四、〇

菲沃斯越幾斯 〇、二
扁桃舍利別 * 三〇、〇
扁桃乳劑 * 一〇〇、〇

杏仁水 二十滴
吐根舍利別 一〇、〇
扁桃乳劑 * 九〇、〇

扁桃乳劑 * 九〇、〇
吐酒石 〇、〇四
單舍利別 一〇、〇

右服一茶匙至吐休止
甘扁桃油 一〇、〇
亞拉比亞謨謨 五、〇
單舍利別 一五、〇

水 二〇〇、〇

右為乳劑每一時服一食匙
自釀粟子乳劑 * 二〇〇、〇
鹽酸莫爾比涅 〇、〇三
扁桃舍利別 * 二〇、〇

●滴劑
右每二時服一食匙
鹽酸莫兒比涅 〇、〇五
杏仁水 一〇、〇

右每二時服十滴
鹽酸莫兒比涅 〇、〇一
杏仁水 一〇、〇

一日三回每服十滴
鹽酸莫兒比涅 〇、〇一
杏仁水、蒸餾水 各二五、〇

右每服十五滴乃至二十滴
鹽酸莫兒比涅 〇、〇一
杏仁水、蒸餾水 各一〇、〇

右一日三回每回十滴
別拉敦那越幾斯 〇、二五
杏仁水 一五、〇

右一日三回每回二十滴
十滴

十滴

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------------|----------|------------|----|--------------|----------------|
| 一四 | 菲沃斯越幾斯 | 一、〇 | 薄荷油 | 三滴 | 二〇 | 硝酸銀 | 〇、〇二一、〇 |
| | 佩里設林 | 五、〇 | 水 | 二五、〇 | 二〇 | 蒸餾水 | 一〇〇、〇 |
| | 安母尼亞茴香精 | 一〇、〇 | 右吸入 | | 二〇 | 右吸入 | |
| | 右一日四回每回十五滴 | | 醋酸安母紐謨 | 〇、六一六、〇 | 二〇 | 昇汞水 | (〇、二一〇、二)一〇〇、〇 |
| | ●吸入劑 | | 水 | 二〇〇、〇 | 二〇 | 右吸入 | |
| 一五 | 重碳酸那篤留謨水 | (〇、五)一〇〇、〇 | 右吸入 | | 二〇 | 單寧酸 | 五、〇一、〇〇、〇 |
| | 右吸入 | | 格魯兒安母紐謨 | 〇、三一三、〇 | 二〇 | 佩里設林 | 五〇〇、〇 |
| 一六 | 重碳酸那篤留謨二、〇一六、〇 | 二〇〇、〇 | 水 | 一〇〇、〇 | 二〇 | 右一回吸入十滴乃至二十滴 | |
| | 蒸餾水 | 二〇〇、〇 | 右吸入 | | 二〇 | 亞爾答根煎 | (二〇、〇)一五〇、〇 |
| 一七 | 食鹽、重碳酸那篤留謨各二、〇 | 三〇〇、〇 | 醋酸礬土水 | (一、〇)三〇〇、〇 | 二〇 | 右吸入 | |
| | 蒸餾水 | 三〇〇、〇 | 右吸入 | | 二〇 | 的列並油 | 〇、五一二、〇 |
| 一八 | 食鹽水 | (一、〇一六、〇)(二〇〇、〇) | 水 | 〇、五 | 二〇 | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 右吸入 | | 撒里矢爾酸 | 〇、五 | 二〇 | 右振盪吸入 | |
| | 右吸入 | | 硼酸那篤留謨 | 五、〇 | 二〇 | メントール | 二〇、〇一五〇、〇 |
| 一九 | 格魯兒酸加留謨水 | (二、〇)二〇〇、〇 | 水 | 一〇〇、〇 | 二〇 | 佩里設林 | 一〇〇、〇 |
| | 右吸入 | | 右吸入 | | 二〇 | 右シユライベル氏裝置吸入 | |
| 二〇 | 格魯兒酸加留謨 | 五、〇 | 過格魯兒鐵液 | 〇、三一〇、三 | 二〇 | 鹽酸古加乙涅 | 〇、二一〇、四 |
| | 杏仁水 | 五、〇 | 水 | 一〇〇、〇 | 二〇 | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 鹽酸古加乙涅 | 〇、二五 | 過格魯兒鐵液 | 一、〇一五、〇 | 二〇 | 右吸入 | |
| | | | 水 | 一〇〇、〇 | 二〇 | 鹽酸古加乙涅 | 〇、二五一〇、五 |
| | | | 右吸入、血性咯痰 | 一〇〇、〇 | 二〇 | 蒸餾水 | 二五〇、〇 |

急性喉頭加答兒

| | | | |
|----|---------|--------------|---------|
| 二六 | 杏仁水 | 右吸入 | 三、〇 |
| | 水 | 右吸入 | 一〇〇、〇 |
| 二七 | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、一—〇、五 | 一五、〇 |
| | 偪里設林 | 右一回吸入十滴乃至二十滴 | 〇、五—一、〇 |
| 二八 | 阿片丁幾 | 右吸入 | 一〇〇、〇 |
| | 阿片越幾斯 | 〇、〇—一、〇 | 一〇〇、〇 |
| 二九 | 菲沃斯越幾斯 | 〇、〇—一、〇 | 一〇〇、〇 |
| | 別拉敦那越幾斯 | 〇、〇—一、〇 | 一〇〇、〇 |
| 三〇 | 水 | 右吸入 | 一〇〇、〇 |
| 三一 | 葛陀羅華越幾斯 | 〇、〇—一、〇 | 一〇〇、〇 |

| | | | |
|----|---------|---------------|---------|
| 三三 | 貌魯謨加留謨 | 右吸入 | 一、〇—一、五 |
| | 水 | 右吸入 | 一〇〇、〇 |
| 三四 | 貌魯謨 | 〇、〇—〇、二 | 〇、〇—〇、二 |
| | 貌魯謨加留謨 | 右吸入 | 一〇〇、〇 |
| 三五 | 貌魯謨那篤留謨 | 〇、五—一、五 | 〇、〇—一、〇 |
| | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇—一、〇 | 二〇〇、〇 |
| | 水 | 右吸入、歇私的里性聲帶麻痺 | 二〇〇、〇 |
| 三六 | 石炭酸水 | (〇、五)—一〇〇、〇 | 〇、〇—一、〇 |
| | 石炭酸 | 右吸入 | 一、〇—二、五 |
| 三七 | 貌魯謨加留謨 | 〇、〇—〇、二 | 五〇〇、〇 |
| | 水 | 右吸入 | 〇、〇—〇、二 |
| 三八 | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇—〇、二 | 一五、〇 |
| | 明礬 | 〇、〇—〇、二 | 〇、〇—〇、二 |
| | 白糖 | 〇、〇—〇、二 | 〇、〇—〇、二 |

| | | | |
|----|---------|-----------|---------|
| 三九 | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇—〇、二 | 〇、〇—〇、二 |
| | 鹽酸古加乙涅 | 〇、〇—〇、二 | 一〇、〇 |
| | 白糖 | 〇、〇—〇、二 | 〇、〇—〇、二 |
| 四〇 | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇—〇、二 | 〇、〇—〇、二 |
| | 鹽酸古加乙涅 | 〇、〇—〇、二 | 〇、〇—〇、二 |
| | 次硝酸蒼鉛 | 〇、〇—〇、二 | 〇、〇—〇、二 |
| | 白糖 | 〇、〇—〇、二 | 〇、〇—〇、二 |
| | 右吹入 | 〇、〇—〇、二 | 〇、〇—〇、二 |
| 四一 | 塗布劑 | 〇、〇—〇、二 | 〇、〇—〇、二 |
| | 硝酸銀水 | (一、〇)—二、〇 | 二、〇—二、〇 |
| 四二 | 右喉頭塗布 | 二、〇—二、〇 | 二、〇—二、〇 |
| 四三 | 偪里設林 | 八、〇—八、〇 | 八、〇—八、〇 |
| 四四 | 巴豆油 | 一、〇—一、〇 | 一、〇—一、〇 |
| | 蓖麻子油 | 五、〇—一、〇 | 五、〇—一、〇 |
| 四五 | 右頸部塗布 | 四、〇—四、〇 | 四、〇—四、〇 |
| | 阿列布油 | 二、〇—二、〇 | 二、〇—二、〇 |
| | 右三滴點入喉頭 | 二、〇—二、〇 | 二、〇—二、〇 |

二三五 貌魯談加留謨 〇、〇一五
 鹽酸莫兒比涅 〇、〇一五
 達拉侃篤護謨末、白糖 各適宜
 右爲錠劑十個每時一個
 二三六 菲沃斯越幾斯 〇、〇二

杏仁水 五、〇
 亞拉比亞護謨 二〇、〇
 單舍利別 三〇、〇
 右爲舐劑每二時一茶匙(小兒)

二三七 鹽酸亞剎莫兒比涅 〇、〇一
 水 一〇、〇
 右皮下注射

慢性喉頭加答兒

Laryngitis catarrhalis chronica

一作慢性喉頭炎、舊譯作聲膈久炎、

處置 禁止高聲長談冷飲喫烟酒類香料等其他室內清潔、頸部按摩、麻醉鎮咳、吹入、吸入或塗布

二三六 鹽酸莫兒比涅 〇、〇一
 吐根末 〇、〇二
 白糖 二、〇
 右分十包朝夕各服一包

乳糖 〇、〇三
 右分二包臨時服一包、鎮咳

單舍利別 七、五
 右一日六回分服

二三三 白糖 二、〇
 右分十包朝夕各服一包

●水煎劑 一五、〇
 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇
 右水適宜溶解早起頓服、瀉下

二三七 芍藥根煎(一〇、〇) 一〇、〇
 格魯兒安母紐謨 二、五
 甘草羔 二、五
 右一日六回分服

二三二 白糖 二、〇
 右分十包朝夕各服一包

二三四 硫酸麻個涅叟謨 一五、〇
 稀鹽酸 二、〇
 水 二〇〇、〇
 右一日三回二日分服、瀉下

二三六 杏仁水 一〇、〇
 鹽酸莫兒比涅 〇、〇一
 右五滴乃至十五滴一回服用

二三〇 別拉敦那越幾斯 〇、〇一
 白糖 二、〇
 右分十包朝夕各服一包

二三五 貌羅謨加留謨 一、〇一
 水 一〇〇、〇
 右每二時一食匙、咽喉銳感

二三九 抱水格魯拉爾 二、〇
 水 六〇、〇
 單舍利別 三〇、〇
 右三回分服、催眠

二三一 白糖 〇、〇五
 右臨臥頓服

二三八 芍藥根煎(一〇、〇) 一〇、〇
 稀鹽酸 一、五

二三八 ナルセイ 〇、五
 稀醋酸 二十滴

二三二 鹽酸ヘロイン 〇、〇一

二三六 芍藥根煎(一〇、〇) 一〇、〇
 稀鹽酸 一、五

二三九 抱水格魯拉爾 二、〇
 水 六〇、〇
 單舍利別 三〇、〇
 右三回分服、催眠

慢性喉頭加答兒

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <p>二五 白醋 酸鉛 右吹入</p> | <p>二五 明礬 別拉敦那越幾斯 白糖</p> | <p>二五 明礬 乳糖 右吹入</p> | <p>二五 明礬 硫酸亞鉛 右吹入</p> | <p>二五 單寧酸 鹽酸莫爾比涅 白糖</p> | <p>二五 單寧酸 乳糖 右吹入</p> | <p>蒸餾水 亞爾答舍利別 右一日三回每服一茶匙</p> |
| <p>二五 明礬 クレチリン 右研和吹入</p> | <p>二五 單寧酸 白糖 薄荷油 右研和吹入</p> | <p>二五 白糖 右吹入</p> | <p>二五 硼酸 白糖 右研和吹入</p> | <p>二五 貌魯謨加留謨 澱粉 右吹入</p> | <p>二五 亞拉比亞護謨 甘汞 右吹入、梅毒性喉頭加答兒</p> | <p>二五 硝酸銀 滑石 右吹入 右研和吹入</p> |
| <p>二七 阿片丁機 明礬 右吸入</p> | <p>二七 明礬水 明礬水 右吸入 右吸入</p> | <p>二六 食鹽水 食鹽水 右吸入 右吸入</p> | <p>二六 ●吸入劑 食鹽水 右吸入</p> | <p>二五 乳糖 ツゾヨドル亞鉛 右吹入</p> | <p>二五 薄荷油 硼酸 右研和吹入</p> | <p>白糖 薄荷油 右研和吹入</p> |
| <p>〇、五一 十滴—三十滴</p> | <p>(一〇、〇)五〇〇、〇 (二、〇)二〇〇、〇</p> | <p>(一、〇)二〇〇、〇 (一、〇)二〇〇、〇</p> | <p>一五、〇</p> | <p>一、〇 一、〇</p> | <p>〇、二—〇、五 一〇、〇 二十滴</p> | <p>五、〇 十滴</p> |