

7
書奇科眼

驗屢試屢書此
忽輕勿幸者閱

8
書奇科眼

眼科奇書

此書得之于古渝洲。李氏藏。仙傳秘本。
。屢試屢驗。較他眼科書最為簡要。但其
表分兩類。宜臨症斟酌。或分輕重。加減用者。
慎之。蜀東長壽奉銘氏謹述。時在光緒丙戌
春于渝城天符廟之書齋。

此書係仙人傳授。治眼病百用百靈。有以
書少而忽之。書雖少。一百另八症之眼病。
胥在其中。症雖多。皆不外內障外障。二大
綱。何謂外障。外障是寒。何謂內障。內
障是火。按此主方。百不失一。

凡紅腫不開。疼痛難忍。滿眼紅腫。羞明怕日。
多眼淚。生眼屎。蟹睛。以及風火目等症。為外障。

凡眼內赤紅不腫。不疼不痛。無紅筋努肉。
。眼珠清亮。只有模糊不明。日久斷光。

即为内障。

又有数症。无气，无寒。药方到后尾。

外障眼病

凡治男女大小。一切外障眼病。红肿不开。疼痛难忍。羞明怕日。不喜灯火。泪眼红筋，努肉，多泪。或生翳子。庸医以为虚火犯上。即用凉药。又用补药。若是真火眼即愈。若是虚火眼。服此凉补之药。红筋肿痛虽去。眼内必生青膜。白去遮睛，不见人物。遂谓此人交代残疾。不知用药不明。误受其害。如遇头风洪目。以及蟹睛。服此凉药。必穿无治。服补药者定死。

凡一切男女大小。外障眼病。用四味大散。或八味大散。看症加減。初起服一剂或二剂。将陈寒散净。即可全愈。永不复发。或服凉药补药。眼珠上必起青膜。白去遮睛。此时宜服大散四五剂。即

服料中益氣湯一二劑。以固正氣。又服大
發散四五劑。仍服料中益氣湯一二劑。如
此交互調服。外用眼藥點之。陳墨即散。
白玄青膜自消。何患眼之不復明乎。

凡頭風眩目。頭頂如棒槌搗。目珠如針刺。
疼痛難忍。內宜服四味大發散。重加北辛
二兩或三兩。又加明天麻二兩。姜汁炒。
外即用皂頭風藥。內服外包。要同一時。
內外各一劑即愈。

凡生蟹睛。仍用四味大發散。加全虫一兩
。或二兩。酒洗去毒。蟬蛻一兩。或五兩
。姜汁炒服一二劑。即愈。如不愈外用搗
魚血點蟹上。如有大蟹是黑色。宜用延美
容餅方。此二方專于服水藥時用之。方能
見效。

四味大發散

麻黃一兩或二兩。薄荷一兩。桑葉一兩。

北半五钱，或用一两。叶要洗净。老姜一斤，或用八两。连皮捣碎为引。八味大发散。照四味大发散方，加面花活一两。北玄风一两。白芷稍二两。川芎一两。仍用老生姜八两，或一斤为引。看症加减。法列如后。

如有白文遮睛，加大蛇退一二条酒洗。蝉退一两，去翅足，白叩壳一两姜汁炒。此三味皆散文退翳之药。外务用眼药点之。如热泪多，要加蔓京一二两。或痰冷，加北味二两。打碎。然冷痰乃是内障眼病。须审明以此五味为主。如白珠上红筋不去。加桑柏皮一把用刀刮去粗皮，如红筋去净。此味不用。以共大芎肺气也。

如眼珠似商胀痛不安。加肥元参一两。汉防己一两。或又加炒香附一两。桔草一两。如生努肉。加白芷稍一二两。如两太阳

眼疾
澤

按眼痛。如大明麻一兩、薑汁炒。淨蕪本一兩或二兩。如眼癢加金虫一兩，酒洗。蠶虫一兩，薑汁炒。蟹睛亦加此二味。如大眼角紅，乃是火眼之火。加熟軍五錢或一兩，用碗泡水服。熟軍用酒炒。如小眼角紅，乃小腸之火。加淮水通一兩。車前仁一兩。如舌上白胎是邪寒。黃胎是陳寒，生加麻黃二兩或三四兩。雄化一兩或三四兩。杏仁霜一兩。

包 頭 風 方

火
酒

用生附子一兩。胡椒一兩。火葱一把。老薑四兩。共搗爛入鍋內。用酒同炒。大熱炒起。入布帕內，包頭患處。包時如火燒一樣。慎勿因熱極難受。遂將包菜撤去。包至不大熱時，方取下。仍將此菜曲佳。二次照前法炒包。如菜干又加酒炒包。如此二三次，即愈。內服外包，要同一時。

点 鳝 鱼 血 方

点蟹睛，鳝鱼血，用干布裹鱼尾二三寸在外。使病人仰臥。将鱼尾剪去二三寸，令血滴蟹上。不必使手。每日滴四五次即愈。内服外点。同时神效。

延 芙 蓉 餅

延芙蓉餅。专治火蟹。一有火色是黑。此方并治眼丹眼痛。延巴虫四五条。芙蓉叶五钱，焙干，同捣如泥，作餅。将眼紧闭。切莫入眼内。此餅贴在痛眼皮上。一二次即愈。不可多贴。内服外贴，同时必效。

凡 治 男 女

凡治男女大小。一切外障青膜白云遮睛，不拘年数多寡。先用火发散将陈寒散尽。然后可用二白散。

二 白 散

酒白马二两。生白芷二两，共为末。每用

三五錢，蒸猪肝吃。鸡肝羊肝更妙。此料吃光，即愈。又做一单加白叩壳一两，姜汁炒。服至去毒退散，始住。愈后更服补中益气汤一二剂。瘀血已去，再服一二剂，收功。

凡点眼方。如红肿疼痛难安。用黄连泡水洗之，即愈。点暴眼方。白礬研细，用火酒调搽数次。一夜即愈。又一方暂效，麝香子救救，入眼内一刻钟，取去，即效。点老眼一切外障方。煅甘石一两，花椒二两。甘石入沙罐内，花椒将甘石盖好。外用白炭烧罐底，以花椒烟过，无烟为度。花椒烟止。去花椒。将甘石研极细，点之。如加雷硝砂三分。煅粉一钱。白丁香一钱。更神妙。

制煅粉之法。务去净著外皮。推成浆。盛布袋内去渣。将此浆放一日。去清水

。取底下粉晒干。

白丁香。即瓦菴尿。用雄不用雌。两头尖者方是。研细，合入甘石炭菴粉硝砂应用。

凡点暴发火眼翳子方。用洋皮一分。炭菴粉一钱。研细点之，如眼疼痛难忍。加乳香二分。没药二分。二味均要去油。

凡搽一切烂弦风火眼。痘风眼。血风眼。方用炉甘石研极细，合麻油调至碗内，再用一碗装陈艾揉绒。每甘石一两。陈艾一钱。卜荷三钱。明雄三钱。和艾绒用火点烘。薰上碗内。甘石薰至黄色时。又搅又薰。如此数次。收存。用时以手指揉绒。自搽烂眼皮上下。

又方用丑焙子煨成性，为末，黄丹少研。鹅脂蜡烛搽。蕨油更妙。

又洗眼方。能治一切外障，烂弦。风火眼

。豆风。红风等。用西庄黄大两。生甘草
四两。金银花二两。乌梅二两、去核。生
黄柏二两。干菊花二两。铜绿二两。胆礞
二两。槐花二两。当归二两。红花二两。
白礞火煨。余皆生用。共为末。每剂三四
钱。用布一块。碗一个。将药放在帕上。
加半碗开水。在药碗内。置饭甑上蒸好。
煮热蒸眼外。用布帕团团遮蔽。不使热气
外溢。煮后即将此药水洗眼。渐冷即止。
一日二次。

凡治烂弦风火眼。年久有虫。此乃取虫方
。用乌桕叶。手搓挤汁。和人乳点大眼角
上。即时痒。用簪脚。将虫拨出。立效。
又一方。用蟹螯子叶。以肉咀嚼。洗汁于
杯中。用新蒙眼。笔划双眸子纱上。然后
滴前药汁。即时虫出纱外。虫大如丝。色
赤而长。又滴数次。虫去净。用清风清眼

活血之藥，二三劑即止。然必斗久始有虫。
初起无虫。實金子，能治目暗尔新器物，
冷痰浸淫。以及青盲等症。用實金子叶
晒干，研极细，落棉裹之。以人乳浸之。
如人行七八里时，用此药点之。即仰面卧。
如此数月，视物如真。忌酒麴麵，油薯
物。

补中益气汤

党参二两。黄芪二两。白术二两。甘草一
两。当归一两。陈皮一两。柴胡一两。升
麻一两。始治眼病加龙眼二两或四两。红
枣二两，如治心痛，用生姜四两为引。

熟地黄去汤

元熟二两，或四两。杭巴去一两或二两，
去心。益智仁一两或二两。去壳，盐水炒

六味地黄汤

元熟二兩。羌活桑皮各一兩。大茶粉丹各一兩。澤明五錢，芫引。

製生附子法

生附子一屯。溫熱水泡。洗去鹽味。去外黑皮切化。又用極熱水泡數次。以去其大鹽味。取出陰干，去水氣。加廣均姜一屯。用柴火炒成黃色。開口切化。先熬姜汁十餘沸。撈起令。服一大錢。即時嘔吐黃胆水。如吐不止。病人作難。飲水即解。如飲水後不吐。又將開水煎熬二次。仍服一大錢。必大吐。如又不吐。再加生附子一斤。均姜一斤。照前法熬好服之。必大吐。如開光見亮。急用熟地二斤。砂仁四兩。姜汁炒為末。和入地黃。外用只亮熬水送下。熟地黃吃后。服補中益氣湯又二劑。此方用至後治勞因擊睛內。

凡治男女大小。一切。爛眼風火血風痘風

眼目。无说远年近日，宜用大发散。看症
加减。症轻即风寒轻。只服一二剂。症重
即风寒重。连服四五剂。内服此药。外用
眼药点之自愈。

如年久有虫。依前取虫之法。眼会被物擦
伤。红黑青腫。流血浸睛。用芙蓉根去皮
。或花叶亦可。打烂贴之。不肿不痛。三
次即愈。定要忌风。

又方用生半夏磨冷水搽之。或为末、冷水
调搽亦可。

又方用广三七磨水。以鸡毛刷上。内服散
血除风水药。

凡治男女大小眼丹。红肿如桃。疼痛难忍
。用生白礞三钱。眼珠五分为末。兑生蜜
搽。

又一方用白果一个。磨醋搽之。症轻不必
服药。如症重服白芷稍一两。北辛三钱。

雄虫五钱。炒银花二两。天丁五钱。金虫五钱。穿山甲五钱，炒。蒲公英二两。生甘草五钱。不用引。服一二剂即愈。

凡外障上下眼皮。红肿破穿，成眼漏。以及烂弦风火眼。用茜草银花赤芍玄风桔梗独活白芷川芎玄参生地连翘黄芩炒荆芥枳壳大力子各三钱。虫退十个。车前草灯心引。服一剂。同后方。

既服前方。用黄莲甘草各一钱。连翘羌活荆芥大力子各三钱。灯心引。连服五三剂。凡搽眼丹。以及诸瘡红肿疼痛。未成即散。已成即穿。文火。吊鱼竿，用桐子叶包。或用布包，水浸湿。柴灰火烧热。去布。加盐少许。合打烂敷上。即消散。生用亦可。

凡治男女大小外障。努肉遮睛。从小眼角起。遮过瞳人。先用大吹散一二剂。再用

生功參二兩。玄參一兩。焦朮二兩。升皮一兩。粉單五錢。使蟲子二兩。炒去殼。仍用生豆漿半茶碗。連服三四劑。以上兩方。兌換兼服。努肉退淨為佳。兩方便要忌茶。

又治努肉攀睛。大蛇退一條。用白色美酒。浸洗剪碎。又用麻油炒黃。不可炒糊。為末。生綠豆一合。炒青。為末。上白粉四兩。水調和。放在飯殼上蒸熟。服至退散為佳。此症如初起只服大發散一二劑。即愈。

治小兒外障。痘毒入目。用柴胡茯苓當歸
霜公黃芩蒙花白芍粉丹皮白朮白芷用連翹
銀花矢柳各三錢。炒杏仁錢半 檀明砂三
錢。虫退甘草各一錢。卜荷錢。綠豆壳
黑豆壳。各半茶杯。連服二三付。如眼
火生。加金鉤斜漢竹葉。如肝經熱。加平

肝菜洞肝火。又用己手菜。

包手菜方。能治五^年痘^毒。以及痘子入^目不^散等^症。方用^纸盘^根牛^旁子^根野^棉花^根。三味俱要新鲜。合打烂和^醪糟半茶杯。捣^绒调^匀。置^锅内^微炒^热包。如^左目^包右^手脉^纹。如^右目^包左^手脉^纹。包^半日^或半^夜。如^发烧^要看^脉纹^上有^泡。将^菜取^下。此^泡不^可弄^破。破^则痘^毒难^散。过^数日^自然^滴好。又用^后方^点之。

点痘^毒方。能^消三^五年^之痘^毒。用^小白^海蛤^八。又^白齿^一个。将^此物^扑在^碗内。用^冷水^研至^极浓。对^人乳。用^挖耳^脚点^入痘^毒上。每^日点^十余^次。如^勿此。用^青菜^磨水^代之。有^服蝉^花无^比散。倘^未透^净。又^用二^方。第^二方^用想^地五^钱。漳^河光^东虫^退蛇^退葵^苓丹^皮枣^皮女^贞子。白^僵叩^逆壳。各^三钱。用^绿豆^壳半^杯。水^煎服^三四

付 即退淨。点痘藥方。用生蜂蜜。布帕
滤去渣。点痘藥上。新蜜更好。每日数次
，半月后可散尽。每日用虫退五錢。谷精
草一两。煎水当茶饮。或虫退金银花煎水
当茶饮。三味同飲更佳。

又痘子落眼珠内。用白牛虱子剪去足。使
血点虫痘上，即愈。一月外难治。一月内
此方能消。

又治小兒一二岁外障眼病。红肿疼痛。用
黄连为末。冷水调敷足心。男左女右。即
涌泉。火眼自愈。如肿痛难开。加羌活皂
角卜硝合黄连为末。同敷上即愈。

又方用甘草浸水、蜜明礬。敷上眼皮自愈
。

治小兒外障，干火眼。羞明。用野棉子为
末，每次三四錢。煮野兔肝服之。鸡肝亦
可。連服三四付，即愈。