

太陽經中篇

凡寒傷營之法五十八條

證列於此篇

西昌喻

昌嘉言甫著

黎川陳守誠伯常重梓

按上篇風傷衛之證用桂枝湯解肌者乃是不欲發汗以擾動其營也不擾其營但治其衛嘗有不及之弊不及則邪不盡去勢必傳入於裏故篇中兩解表裏之法居多此篇寒傷營之證用麻黃湯發汗者乃亟驅其邪盡從表出不使停留之法嘗有太過之弊太過則未免因邪傷正而虛候易生設有餘邪不盡者多未敢再汗但可和其營衛或

俟其律回自然得汗故兩解表裏之法差少其誤
下之證亦不比上篇之陽邪多變但發汗之後其
人津液已虛更加誤下則津液重虛所以或邪少
虛多而傷其陽或邪盛熱熾而傷其陰源同流異
各造其偏以故治法亦錯出不一必先會大意然
後一展卷而了然於心目也。

辨寒傷營有定脉定證總稱傷寒一法

①太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體重嘔逆脉
陰陽俱緊者名曰傷寒。

原文

發熱惡寒體重嘔逆脉陰陽俱緊凡是傷寒病必

具此五者。故以爲總稱。或未發熱者。寒邪初入。尙未鬱而爲熱。頃之卽熱矣。多有服表藥後反增發熱者。病必易解。蓋熱鬱未久。藥卽領邪外出。無裏證故也。仲景恐見惡寒體重嘔逆。又未發熱。認爲直中陰經之證。操刃殺人。蚤於辨證之先。揭此一語。慮何周耶。

、辨傷寒證用麻黃湯大綱一法

②太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。

原文

上條已言傷寒之脈證矣。此復以頭痛發熱身疼

腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘互發其義蓋惡寒未有不惡風者頭身腰節疼痛卽體重之應無汗而喘亦卽嘔逆脉陰陽俱緊之應也汗乃血之液血爲營營強則腠理閉密雖熱汗不出也麻黃發汗散邪其力最猛故以桂枝監之甘草和之而用杏仁潤下以止喘逆然亦但取微似汗不須歔熱希粥正如馭六馬執轡惟謹恒虞其泛軼耳辨傷寒傳經不傳經一法

③傷寒一日太陽受之脉若靜者爲不傳頗欲吐若燥煩脉數急者爲傳也傷寒二三日陽明少陽證不

見者爲不傳也

原文

脉靜者邪在本經。且不能遍。故不傳經。頗欲吐。外邪內搏。身煩脉數。寒邪變熱。必傳經也。二三日陽明少陽證不見。卽誤治。亦止留連於太陽耳。

辨傷寒欲傳不傳心悸而煩。宜用建中一法。

④傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。嘔家不可用建中湯。以甜故也。

原文

欲傳未傳之證。其人內實差可無慮。若陽氣內虛而心悸。陰氣內虛而心煩。將來邪與虛搏。必至危困。建立其中氣。則邪不易入。卽入亦足以禦之也。

辨寒傷營之證。當汗不汗。反行鍼灸。致變二法。

⑤太陽傷寒者。加溫鍼。必驚也。原文

溫鍼欲以攻寒。孰知鍼用火。溫營血得之。反增其熱。營氣通於心。引熱邪以內。逼神明。必致驚惶而神亂也。

⑥脉浮宜以汗解。用火灸之。邪無從出。因火而盛。病從腰以下必重而痺。名火逆也。原文

外邪挾火勢上炎。必不下通陰分。故重而痺也。

辨脉浮及浮數。宜用麻黃湯發汗一法。

⑦脉浮者。病在表。可發汗。宜麻黃湯。脉浮而數者可

發汗宜麻黃湯。原文

傷寒之脉陰陽俱緊其脉但浮及浮數而不兼緊似可不用麻黃湯然寒既入營舍麻黃湯定法別非他藥可代故重申其意見脉緊固當用麻黃湯而脉浮不緊者乘其邪方在表當用麻黃湯托出其邪不使得入卽脉浮數而不緊者乘其勢正欲傳當用麻黃湯擊其半渡而驅之使出參看中風證脉浮宜用桂枝湯可見天然一定之法不因邪勢之淺深輒可變易也

服麻黃湯得汗後察脈辨證有次第不同三法

一法汗解後復感復煩脉浮數者宜更藥解散

一法脉浮數而煩加渴者宜兩解表裏

一法具兩解證不渴者用藥宜裏少表多

⑧傷寒發汗解半日許復煩脉浮數者可更發汗宜

桂枝湯

原文

發汗後病解半日許復煩脉復浮數明係汗後表疎邪風襲入所致即不可再用麻黃湯宜更變發汗之法改用桂枝可耳用桂枝者一以邪重犯衛一以營虛不能復任麻黃也

⑨發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之

原文

脉浮數而煩與上同也。加之。以渴則津液爲熱所耗而內燥。裏證具矣。津液內耗。卽非細故。宜用四苓以滋其內。而加桂以解其外。比上更用桂枝之法。又大不同者。以無復感故也。然旣云兩解表裏之邪熱。則五苓散中。尤用蒼桂用枝。從可推矣。按五苓兩解表裏之法。風傷衛寒傷營俱用之。

⑩傷寒汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。

原文

傷寒以無汗故煩。汗出則不煩。可知矣。但汗出而渴。則上條五苓兩解表裏之法。在所必用。若汗出

而并不渴。則裏證本輕。故曰桂枝湯中之三五苓湯中之一少。示三表一裏之意。名曰茯苓甘草湯。以消息病情。而分解微邪。如璋判圭。合允爲寶符。辨脉浮緊。浮數。尺脉反遲。反微。不可發汗。二法。一法脉浮緊。身疼痛。宜以汗解。但尺遲則不可汗。一法脉浮數。卽誤下。仍當發汗。但尺微則不可汗。①脉浮緊者。法當身疼痛。宜以汗解之。假令尺中遲者。不可發汗。何以知之。然以榮氣不足。血少故也。文原脉浮而緊。徧身疼痛。廼傷寒正病。亟當發汗以驅逐外邪者也。設其人元氣素薄。尺中脉遲。則城郭

不完兵甲不堅米粟不多根本先欲動搖尙可背城借一乎此所以必先建中而後發汗也

①脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈

原文

脉浮數者法當從乎汗解故有更藥發汗及兩解表裏之法設經誤下而身重心悸縱脉仍浮數亦不可復發其汗但宜靜調俟其汗自出乃解耳所以然者以尺脉微裏陰素虛故也必須津液自和卽爲表裏俱實便自汗出而愈此亦先建中而後

發汗之變法要知仲景云尺脉微者不可發汗又云尺微者不可下無非相人津液之奧旨所以誤下之脉雖浮數不改亟宜發汗者亦必審諦其尺脉不當率意徑情有如此矣

凡用發汗藥宜審病人有無宿疾不可徑汗六法

③咽喉乾燥者不可發汗

原文

咽中乾燥其人平日津液素虧可知故不可發汗以重奪其津液也叔和重集不可發汗篇有咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲得踰卧不能自溫一條與此似同而實大異此戒

發汗以奪陽明之津液。彼戒發汗以奪少陰之血也。又咽中閉塞不可下一條亦指少陰立說成註。俱以咽門爲胃之系混釋則謬矣。

④淋家不可發汗。發汗則便血。原文

小便淋者。膀胱爲熱所閉。氣化不行也。更發其汗。則膀胱愈擾。而血從小便出矣。

⑤瘡家雖身疼痛不可發汗。汗出則瘡。原文

身疼痛爲寒傷營之證。本當發汗。然瘡瘍之人。肌表素虛。營血暗耗。更發其汗。則外風襲虛。內血不榮。必至頸項強。身手張而成瘡。瘡亦膀胱之病也。

言卷一
夫衄家不可發汗。汗出必額上陷，脈緊急，目直視，不能眴，不得眠。原文

目得血而能視，汗爲血液。衄血之人，清陽之氣素傷，更發其汗，則額上必陷，乃上焦枯竭之應也。諸脈者皆屬於目，筋脈緊急，則目上瞪而不能合，目不合則不得眠也。傷寒發煩，目瞑者，必衄，宜用麻黃湯發汗。此言素慣衄血之人，戒發汗以虛其虛，宜兩諦之也。

亡血家不可發汗。發汗則寒慄而振。原文

亡血卽亡陰也。亡陰發汗，本當生熱，乃反寒慄而振。

振者何耶。蓋陰亡則陽氣孤而無偶。纔一發汗其陽必從汗盡越。所以寒慄有加。陰陽兩竭也。

⑥汗家重發汗。必恍惚心亂。小便已陰疼。與禹餘糧丸闕。原文

心主血。汗者心之液。平素多汗。更發其汗。則心藏之血傷。而心神恍惚。小腸之腑血亦傷。而便已陰疼。禹餘糧丸原方闕。然生心血。通水道。可意會也。服麻黃湯汗後。病不解。有惡寒惡熱。不同治一法。

⑦發汗病不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之。發汗後惡寒者。虛故也。不惡寒但惡熱者。實也。

當和胃氣與調胃承氣湯。原文

惡寒者汗出營衛新虛故用法以收陰固陽而和其營衛不惡寒者汗出表氣未虛反加惡熱則津乾胃實可知故用法以泄實而和中然曰與似大有酌量其不當徑行攻下以重虛津液從可識矣服麻黃湯汗後身痛脈遲者宜行補散一法

③發汗後身疼痛脈沉遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩。新加湯主之。原文

傷寒發汗後身反疼痛者乃陽氣暴虛寒邪不能盡出所致若脈見沉遲更無疑矣脈沉遲者六部