

本

州

綱

目

本草綱目拾遺果部下目錄

諸荔

殼

龍眼核

殼

蜜望

蒲桃樹

苧薺粉

野苧薺

櫻桃核

山櫻桃

棗殼

刺菱

沙角

烏欖仁

刺梨

枇杷核

羊桃

倒捻子

甘蔗滓

皮

猴闔子

瓜子殼

蒲桃殼

橙餅

津符子

必思答

黃皮果

甘劍子

揚搖子

海梧子

木竹子

櫓罟子

槎子

羅晃子

夫編子

白緣子

繫彌子

人面子

四味果

千歲子

侯騷子

仙掌子

酒杯藤子

藥果

藟子

楸子

隈支

呂宋果

本草綱目拾遺卷八

錢唐趙學敏恕軒氏輯

合肥張紹棠又堂氏刊

果部下

諸荔

殼

陳定九荔枝譜有奇荔能治病經兵燹後亦僅有
存者今錄之於左以備用

粵語南方離火之所出荔枝得離火多故一名離
枝亦曰麗枝麗離也文從兩日天地之數水一而

火二故麗從兩日日爲五行之華月爲六氣之精
日麗乎支猶之乎日出於扶桑也麗枝乃震木之
大者震木以扶桑爲宗子而麗支其支子故曰麗
支日出於離離盡午中故麗支以夏至熟離爲坤
之中其色黃故曰黃離麗支之核外赤內黃則黃
離之美也坤之中其味甘故曰甘節麗支之肉少
酸多甘則甘節之吉也荔支以臘而萼以春而華
夏至而翕然子赤生於木而成於火也皮紅肉白
而核復純丹火包其外復孕其中也肉白爲金金

爲內外火所煉故味醇和而甘其液乃金水之精
甘又屬土備五行之粹美而以火爲主者也粵以
火德王凡花多朱色皆火花實多朱實皆火實太
陽烈氣之所結火實之屬凡百種而荔支爲長火
爲母荔支則火之長子也荔支多食未嘗傷人飲
蜜一杯卽解或以青鹽調白火酒飲或飲荔支酒
過醉則以荔支殼浸水飲之又荔支多露有過食
者味爽就樹閒先吸其露次嚙其香使氤氲若醉
五內清涼則可以消肺氣滋眞陰卻老還童○荔

支歲初而蕾二月而花發發時多電則花落實小
多雨則花腐少雨則花液相膠而不實估計者視
其花以知其實多少而判之藏荔支法就樹摘完
好者留蒂寸許蠟封之乃剪去蒂以蠟封翦口以
蜜水滿浸經數月味色不變

保和枝 產泉郡北陳巖山蓮花峯實大色黃可
消胸膈煩悶調逆氣導營衛其核燒灰酒下可已
痢止腹痛

回春果 產漳郡康仙祠葉大如掌色翠與眾荔

殊其實味苦澀酸棘不可口采以浸酒能已風去
癘治癰如神葉亦然

以上閩產

紫玉環 產四川瀘洲曝乾啖一枚可除瘴癘卽
早行大霧中嵐氣不得侵也

以上川產

玉露霜 產廣東新會崖門山白殼丹肉不摘經
冬不落其味甘酸啖之止嗽降肺火療怯症

妃子笑 產佛山色如琥珀大如鶯卵核小如豆
漿滑如乳啖之能除口氣使齒牙經宿猶香

牟尼光 產潮州大浦山中味如乳飲之功同參

本草綱目拾遺 卷八
芑 以上廣東產

墨荔 產廣西平樂萬山中皮肉俱黑如墨味臭而苦粹不可啖或曰出賀縣山中或曰荔浦脩仁二邑山中多有之味臭有大毒誤食之必心腐腸爛而死

按荔支名品最多有綠皮者綠核者有黃皮者白皮者三月四月七月熟者然其性大約相同惟此數品治療各異故類及之

殼 痘出無漿心不爽快以荔支殼煎湯飲

不藥
良方

○王聖俞云荔枝殼能理血透發分標凡一切疹瘡不能透達痘出模糊一片者非此不能解表成漿血崩同壽錄用荔枝殼燒灰存性研末好酒空心調服每服二錢輕者一服卽止至重者三服愈

龍眼核

殼附

綱目龍眼核主治多言其肉至其核之功用最廣止載其能治胡臭他皆未之及又不及其殼今悉採他本補之

腦漏 黃氏醫抄用廣東圓眼核入銅爐內燒烟起將筒熏入患鼻孔內數次卽愈

一切瘡疥 高只元傳世方用龍眼核煨存性麻
油調敷卽愈

治癬 祝氏效方圓眼核二個去外黑皮搥碎雄
黃硫黃陀僧枯礬川椒末各三分共爲細末以生
薑蘸擦患處卽愈○集聽方患癬用龍眼核去外
黑殼用內核米醋磨搽

滅斑生髮 張觀齋云桂圓核仁凡人家有小子
女者不可不備遇面上或磕傷及金刃傷以此敷
之定疼止血生肌愈後無癍若傷鬢髮際愈後更

能生髮不比他藥愈後不長髮也

小腸疝氣 不藥良方荔支核龍眼核各七枚俱
燒灰大茴二粒炒共爲末好酒調下外用生薑搗
爛敷腎卽消○經驗廣集治疝氣偏墜小腸氣痛
神效荔支核炒龍眼核炒小茴香炒各等分爲細
末空心服一錢以升麻一錢水酒煮送下

念珠丸 張氏必效方治陰疝偏腫囊中疼痛難
忍乳香去油淨二錢圓眼核三錢黃蠟二兩和藥
末成丸彈子太分爲一百零八丸蛤粉爲衣用線

穿起露一宿收貯遇症每服三丸乳香湯下

小便不通 用龍眼核去外黑殼打碎水煎服如

通後欲脫者以圓肉湯飲之

足指癢爛 藥鏡用桂圓核燒灰摻之立效

無名腫毒 黃氏醫抄桂圓核以水調塗俱效能

止折傷出血療金瘡滅斑

烟筒傷喉 萬近蓬云凡烟管誤戳傷喉出血不

止者用桂圓核去外黑皮惟取內核仁焙搗爲極

細末看喉中傷處用筆管安末吹之卽定疼止血

而愈屢試果驗

治刀傷出血 殷仁趾傳方以龍眼核炒擣磨細敷之

刀斧傷 黃貶翁醫抄桂圓核不拘多少用火燒枯存性研末摻患處卽愈

按陳杰回生集大興李振祖西平云龍眼核末敷金刃傷昔在西秦及巴里坤軍營救愈多人查本草綱目及別集本草俱未紀載可知世間有用之材自古迄今湮沒者不可勝計矣

本草綱目拾遺 卷八
龍眼殼○乃龍眼外裹肉之殼本黧黃色閩人恐其易蛀輒用薑黃末拌之令黃且易悅目也廣中桂圓多不用薑黃拌故今廣圓猶存本色入藥用殼須洗去外色黃者

敷湯泡傷 行篋檢祕用圓眼殼煨存性爲末桐油調塗患處卽止痛愈後又無斑痕眞良方也

泉州府志龍眼最小者呼鬼眼龍眼是其中者今不復識別

蜜望

粵志其子五月色黃味甜酸颺洋者兼金購之有
夭桃與相類六七月熟大如木瓜味甜酢以羹魚
尤善凡渡海者食之不嘔浪

肇慶志蜜望子一名莽果樹高數丈花開極繁蜜
蜂望之而喜故名交廣錄蜜望二月開花五月子
熟色黃一名望果其類有夭桃正月開花六七月
子熟年歲荒則結實愈多粵謠云米價高食夭桃
故廣人貴望果而賤夭桃貴之故望之蜂望其花
人望其果也

止船暈

按船暈北人謂之苦船苦音庫此症多嘔吐不食
登岸則已胃弱人多有之蜜望果甘酸能益胃氣
故能止嘔暈

蒲桃樹

羅浮志蒲桃樹高二三丈其葉如桂四時有花叢
鬚無瓣如剪出絲毬長寸許色兼黃綠結實如蘋
果殼厚半指絕香甜核與殼不相連屬搖之作響
羅浮澗中多有之猿鳥含啄之餘隨流而出山人