

389245

临床医学  
多选题试题选编

内科·儿科

武汉医学院



# 前 言

《临床多选题选编》是在我院近两年内两次出版的《多选题试题汇编》的基础上，较广泛地参考了兄弟院校的有关试题，经过内、外、妇、儿、传染病、神经病、精神病等有关学科、专业的教师删修精选、审定而编印的。

本书按照卫生部规定的多选题题型和对高等医学院校医学专业毕业生业务统考的要求，共精选了5700余题。其中：内科（含传染病、神经精神病）2764题，外科1518题，妇产科628题，儿科804题。各学科中二类题约占20%，各种图片共95幅。可供医学专业毕业生参加业务统考复习和其他各类年级医学生、教师以及医务工作者在教学、医疗和晋升考试中学习参考。

为便于学习，《选编》的编纂，根据卫生部颁发的教学大纲的要求，基本遵循了全国高等医学院校试用教材各学科各专业的系统性。各试题的答案，附于各系统之后，以便于与教科书对照学习。

本《选编》分上、下两册。上册为内、儿科，下册为外、妇产科，各专科所附之图片，均在各册之后，用胶板纸印刷。每册前面，都附有多选试题简介，供读者了解题型和进行正确答题之参考。

本书在编写过程中，得到我院各级领导、各有关教研室及科室的大力支持；有关临床学科有教学经验的高年教师参加了本书的编审工作。在编印中，对各种试题曾进行多次审校，力求使试题达到言简意赅，答案准确，但肯定还会有一些缺点和错误，我们诚恳地希望读者给予批评、指正。

武汉医学院《临床多选题选编》编审委员会

一九八五年四月

# 目 录

## 内 科 儿 科

|                |     |
|----------------|-----|
| 内 科.....       | 1   |
| 一、消化、急性中毒..... | 1   |
| 二、循环系统.....    | 60  |
| 三、呼吸系统.....    | 97  |
| 四、泌尿系统.....    | 130 |
| 五、内分泌系统.....   | 149 |
| 六、传染病学.....    | 171 |
| 七、血液系统.....    | 217 |
| 八、神经系统.....    | 237 |
| 九、精神病学.....    | 245 |
| 儿 科.....       | 255 |
| 一、小儿生长发育.....  | 255 |
| 二、婴儿喂养.....    | 260 |
| 三、新生儿疾病.....   | 265 |
| 四、佝偻病.....     | 272 |
| 五、营养不良.....    | 276 |
| 六、婴儿腹泻.....    | 279 |
| 七、肺炎.....      | 285 |
| 八、先天性心脏病.....  | 294 |
| 九、泌尿系统疾病.....  | 302 |
| 十、血液系统疾病.....  | 308 |
| 十一、化脓性脑膜炎..... | 314 |
| 十二、麻疹.....     | 318 |
| 十三、小儿结核病.....  | 322 |
| 与试题有关的附图.....  | 329 |

# 内 科

(共2764题)

## 一、消化、急性中毒 (1—707)

### A 型 题

1. 急性胃炎的诊断依据是:
  - A. 急性上腹痛, 食欲减退、恶心、呕吐
  - B. 常伴有腹泻
  - C. 有服用刺激性食物或药物史
  - D. 除上述外, 必须慎重排除其他急腹症
  - E. 使用一般抗酸解痉药及抗生素有效者
2. 病人误服腐蚀剂, 下述处理哪项不合适?
  - A. 进稀软饮食
  - B. 静脉输液
  - C. 给予粘膜保护剂
  - D. 剧痛时给杜冷丁
  - E. 抗菌素预防感染
3. 急性单纯性胃炎的常见临床表现:
  - A. 上腹剧痛、呕吐与腹泻
  - B. 恶心呕吐与上消化道出血
  - C. 上腹不适、呕吐、发热与失水
  - D. 食欲减退、上腹痛与白细胞增加
  - E. 上腹不适、疼痛、恶心呕吐与腹泻
4. 关于急性单纯性胃炎, 下列哪项是错误的?
  - A. 有饮食不当及摄入刺激性药物史
  - B. 常伴有腹泻
  - C. 有时上腹剧痛
  - D. 诊断比较容易
  - E. 一般不用抗菌药物治疗
5. 有关急性腐蚀性胃炎的诊治原则中, 哪一项是错误的?
  - A. 立即洗胃
  - B. 镇痛
  - C. 补液及纠正酸碱平衡紊乱
  - D. 禁食
  - E. 使用青、链霉素
6. 胃粘膜屏障主要是指:
  - A. 是胃粘膜的上皮细胞
  - B. 是指胃粘膜的上皮细胞更新良好
  - C. 胃粘膜上皮细胞胞膜的脂蛋白层
  - D. 为复盖于胃壁表面的胃粘液
  - E. 胃粘膜有良好的血液供应
7. X线钡餐胃肠检查适用于:
  - A. 疑有胃、十二指肠溃疡或胃癌的病人
  - B. 为了解整个胃肠的功能与器质病变
  - C. 食管狭窄的病人
  - D. 疑有食管、胃、十二指肠疾患和胰腺癌肿或囊肿的病例
  - E. 发现早期胃癌
8. 对慢性胃炎的病因目前哪种说法是对的?
  - A. 免疫因素
  - B. 慢性酒精中毒
  - C. 病因未完全明确
  - D. 胆汁反流
  - E. 刺激性食物和药物
9. 对60岁的萎缩性胃炎患者, 最宜采取的措施是:

- A. 消除病因
  - B. 用药物治愈
  - C. 外科手术切除
  - D. 对症治疗及定期随访观察
  - E. 防治其他并发症
10. 慢性萎缩性胃炎是否可以癌变?
- A. 尚有争论, 未获一致意见
  - B. 主要是胃体胃炎可以癌变
  - C. 是老化或加龄现象, 不必多虑
  - D. 尚待纤维胃镜更多病例的追踪观察
  - E. 较普遍认为可以癌变
11. 慢性萎缩性胃炎的特征病理改变是:
- A. 胃粘膜上皮脱落
  - B. 粘膜皱壁平坦或消失
  - C. 腺体部分或全部消失
  - D. 粘膜及粘膜下层淋巴浆细胞浸润
  - E. 上皮或腺体的“肠型上皮化生”
12. 诊断慢性胃炎最可靠的依据是:
- A. 慢性上腹痛常在餐后加重
  - B. X线钡餐检查
  - C. 胃液分析
  - D. 胃脱落细胞检查
  - E. 纤维胃镜及粘膜活检
13. 慢性萎缩性胃炎与下列哪项无关?
- A. 幽门功能失调
  - B. 心力衰竭
  - C. 门静脉高压
  - D. 过度吸烟
  - E. 恶性贫血
14. 慢性萎缩性胃炎与下列哪项无关?
- A. 牙龈溢脓
  - B. 胃次全切除
  - C. 活检见腺窝增生
  - D. 上消化道出血
  - E. 胃泌素水平增高
15. 慢性胃炎的常见症状与体征:
- A. 多为消化不良的症状与上腹轻压痛
  - B. 有长期上腹疼痛一进食一缓解的特征
  - C. 上腹不适、反酸、腹泻
  - D. 上腹痛、流涎、呕吐、舌炎
  - E. 贫血、消瘦、黑便
16. 诊断慢性胃炎最可靠的方法是:
- A. 胃液分析检查
  - B. X线钡餐检查
  - C. 胃脱落细胞检查
  - D. 纤维胃镜检查与活检
  - E. 血清壁细胞抗体检查
17. Strickland 提出的萎缩性胃炎分型的主要根据是:
- A. 粘膜活检
  - B. 血清胃泌素的高低
  - C. 泌酸功能
  - D. 血清内因子抗体(+)或(-)
  - E. 血清壁细胞抗体(PCA)的有无
18. 血清壁细胞抗体阳性, 血清胃泌素升高应考虑:
- A. 胃窦部萎缩性胃炎
  - B. 胃体萎缩性胃炎
  - C. 肥厚性胃炎
  - D. 浅表性胃炎
  - E. 胃窦溃疡
19. 浅表性胃炎胃镜所见, 错误的是:
- A. 胃窦部明显
  - B. 胃粘膜红白相间, 以红为主
  - C. 常有灰白色或黄色浓性分泌物附着粘膜上
  - D. 局部粘膜可见充血、水肿
  - E. 粘膜皱壁细或平坦
20. 胃镜观察慢性萎缩性胃炎不同于慢性浅表性胃炎的主要特征是:
- A. 病变范围
  - B. 粘膜色泽
  - C. 花斑状特征
  - D. 充血、渗出
  - E. 透见粘膜下血管
21. 胃窦炎临床表现, 哪项是错误的?
- A. 易出现胃肠道症状

- B. 酷似消化性溃疡  
C. 易发生胃溃疡  
D. 易发生胃癌  
E. 不易引起上消化道出血
22. 下列哪项不符合萎缩性胃体胃炎?  
A. 胃酶低或无  
B. 血清胃泌素减少  
C. 易发生缺铁性贫血  
D. 壁细胞抗体阳性  
E. 消化道症状少
23. 关于慢性萎缩性胃炎, 哪项是错误的?  
A. 在我国较常见  
B. 较多出现胃肠道症状  
C. 胃泌素分泌降低  
D. 可反复出现上消化道出血  
E. 病变仅限于胃窦部, 胃体不受累
24. 各种腐蚀性药物接触粘膜, 粘膜结痂颜色, 下列哪项是错误的?  
A. 硫酸——黑色痂  
B. 盐酸——灰棕色痂  
C. 硝酸——深黄色痂  
D. 强碱——粘膜透明水肿  
E. 醋酸——黄色痂
25. 下列哪项不符合萎缩性胃炎?  
A. 胃酸分泌正常  
B. 多有消化道症状  
C. 血液胃泌素降低  
D. 易发生恶性贫血  
E. 壁细胞抗体阴性
26. 关于萎缩性胃炎, 下列哪点不正确?  
A. 胃镜检查发现粘膜较苍白, 胃底穹窿部观察到血管可肯定诊断  
B. 目前一般认为部分患者可发展为胃癌  
C. 缺酸和低酸者可短期选用不易吸收的抗菌素  
D. 并非所有患者均可用稀盐酸或胃蛋白酶合剂  
E. 疑有自身免疫所致者可用强的松
27. 慢性萎缩性胃炎的特征病理改变是:  
A. 胃粘膜上皮脱落  
B. 粘膜皱襞增粗  
C. 腺体部分或全部消失  
D. 粘膜及粘膜下层淋巴浆细胞浸润  
E. 上皮或腺体的“肠型上皮化生”
28. 下列各项中, 哪一项不符合慢性萎缩性胃炎的特点?  
A. 胃窦局部性萎缩为主  
B. 胃酸分泌受抑不明显  
C. 癌变较萎缩性胃体胃炎多见  
D. 发生贫血者较多见  
E. 壁细胞抗体阴性
29. 血清壁细胞抗体阳性多见于:  
A. 急性单纯性胃炎  
B. 胃窦胃炎  
C. 胃体胃炎  
D. 胃溃疡  
E. 胃泌素瘤
30. 慢性萎缩性胃炎可短期口服抗生素治疗, 在下列抗生素中, 采用何者为好?  
A. 四环素  
B. 红霉素  
C. 庆大霉素  
D. 氯霉素  
E. 先锋霉素 IV
31. 诊断胃窦胃炎的辅助检查是:  
A. 胃酸分泌障碍轻, 血清壁细胞抗体 (PCA) (一)  
B. 胃酸分泌障碍重, PCA (一)  
C. 胃酸分泌障碍轻, PCA (+)  
D. 胃酸分泌障碍重, PCA (+)  
E. 胃酸分泌无障碍, PCA (+)
32. 慢性胃窦胃炎的 X 线表现可表现为:  
A. 整个胃壁变形  
B. 胃蠕动亢进  
C. 胃粘膜呈锯齿状, 窦部痉挛变形  
D. 胃壁僵硬、运动减弱

- E. 胃内有潴留液
33. 萎缩性胃炎的主要诊断依据是:
- 胃液分析
  - X线钡餐检查
  - 纤维胃镜及活组织检查
  - 粪便隐血试验
  - 胃脱落细胞检查
34. 慢性萎缩性胃体胃炎的特点是:
- 病变广泛, 疼痛显著
  - 易合并胃溃疡
  - 胃酸多数较低
  - 易发生上消化道大出血
  - 较易癌变
35. 预防慢性胃炎的主要方法是:
- 定期服用甲氧咪唑, 减少胃酸分泌
  - 服用制酸剂减低胃酸
  - 服用抗生素, 抑制胃内细菌增殖
  - 避免刺激性食物, 去除口腔、咽喉病灶
  - 服用胆酸钠, 减少胆汁反流
36. 临床疑有胃炎引起的反复上消化道出血, 为了确诊, 首选的检查方法是:
- 吞线试验
  - 急诊胃肠钡餐检查
  - 急诊内窥镜检查
  - 急诊剖腹手术
  - 出血停止一周后再作有关检查
37. 患者上腹隐痛一年, 饭后上腹胀满, 食欲减退, 一般情况尚佳, 胃液分析: 空腹游离盐酸“O”、注射五肽胃泌素后MAO10mEq/小时。诊断首先考虑为:
- 肥厚性胃炎
  - 胃溃疡
  - 胃粘膜脱垂
  - 萎缩性胃炎
  - 胃癌
38. 男性, 50岁患者, 间歇上腹不适4年多, 餐后加重, 嗝气。胃液分析: 基础酸分泌量(BAO)为零, 最大酸分泌量(MAO)为5毫克当量/小时, 壁细胞总数(PCAO)等于3.0亿个。下列疾病哪种最可能?
- 慢性浅表性胃炎
  - 球部溃疡
  - 球后溃疡
  - 慢性萎缩性胃炎
  - 慢性肥厚性胃炎
39. 十二指肠溃疡患者壁细胞总数平均约为正常人的:
- 2倍
  - 3倍
  - 5倍
  - 8倍
  - 10倍
40. 溃疡病在病理学上组织损害深达哪一层?
- 粘膜层
  - 粘膜下层或肌层
  - 粘膜肌层
  - 肌层
  - 粘膜层及肌层
41. 在产生消化性溃疡的原理上, 下述因素哪种最为重要?
- 胆汁反流
  - 无酸便无溃疡
  - 炎症
  - 饮食失调
  - 血型
42. 胃溃疡最常发生的部位是:
- 胃贲门部
  - 胃底部
  - 胃体大弯侧
  - 胃小弯
  - 幽门管
43. 胃溃疡的好发部位是:
- 胃窦部大弯侧
  - 胃体部小弯侧
  - 胃角部小弯侧
  - 食管贲门联合部
  - 胃底部大弯侧

44. 消化性溃疡发生在何位置, 最易引起大出血?
- 胃小弯溃疡
  - 幽门管溃疡
  - 十二指肠球部溃疡
  - 球后溃疡
  - 复合溃疡
45. 关于胃酸分析, 以下概念正确的是:
- BAO正常值为12—18mEq/小时
  - MAO正常值为40—60mEq/小时
  - MAO即指胃总酸度
  - BAO即指胃游离酸
  - 十二指肠溃疡病人BAO与MAO均增高
46. 壁细胞总数增加(PCM)与下何种疾病发生有密切关系?
- 胃溃疡
  - 十二指肠溃疡
  - 胃癌
  - 慢性萎缩性胃炎
  - 浅表性胃炎
47. 哪种因素对胃泌素有抑制作用?
- 肉汤
  - 10%酒精
  - 胃酸明显增高
  - 胃的伸张
  - 刺激迷走神经
48. 消化性溃疡愈合一般需要:
- 2—3周
  - 4—8周
  - 10—12周
  - 12—14周
  - 14周以上
49. 关于消化性溃疡疼痛的特点, 正确的是:
- 十二指肠穿透性溃疡: 左背疼
  - 胃穿透性溃疡: 右上腹疼
  - 球后溃疡: 空腹与夜间疼重
  - 幽门管溃疡: 疼痛节律性明显
  - 胃大弯溃疡: 进食后可减轻
50. 消化性溃疡最重要的表现是:
- 返酸
  - 嗝气
  - 呕吐
  - 上腹疼痛
  - 腹胀
51. 消化性溃疡的主要诊断依据是:
- 慢性、周期性、节律性上腹痛
  - 上腹部压痛
  - 钡餐检查有激惹及变形
  - 钡餐检查有龛影
  - 胃液分析结果异常
52. 引起胃溃疡的机理主要是:
- 长期服碱性药引起的胃酸反馈增多
  - 过酸食物
  - 粘液分泌减少
  - 氢离子回渗
  - “O”型血
53. 在十二指肠溃疡的发病原理中, 哪项是起决定性作用的?
- 持续和过度的精神紧张, 情绪激动
  - 植物神经系统功能失调
  - 胃酸—胃蛋白酶对粘膜的损害作用
  - 内分泌系统功能紊乱
  - 胆汁反流
54. 关于溃疡愈合, 哪项是错误的?
- 溃疡愈合一般需4~8周
  - 愈合后多不留有瘢痕
  - 穿透性溃疡愈合后最容易引起畸形
  - 缓解期反映溃疡为非活动性或在愈合中, 甚至已愈合
  - 近幽门处溃疡愈合时可引起器质性幽门狭窄
55. 关于消化性溃疡, 以下哪项最多见?
- 彻底治愈者
  - 慢性和周期性不突出者
  - 有典型的慢性、周期性、节律性特点者
  - 节律性缺如者

- E. 有并发症者
56. 引起胃溃疡的决定因素是:
- 药物或刺激性食物
  - 胃粘膜屏障的破坏
  - 胃泌素分泌增加
  - 壁细胞总数增加
  - 有胃炎的存在
57. 关于幽门管部溃疡的特点,不正确的是:
- 易发生幽门梗阻
  - 易发展为穿透性溃疡
  - 疼痛节律性明显
  - 呕吐较严重
  - 制酸药疗效不显著
58. 胃溃疡与溃疡型胃癌在X线上的主要区别是:
- 胃壁硬度
  - 粘膜皱襞中断
  - 溃疡周围有无浸润隆起
  - 溃疡大小
  - 溃疡是否突出胃腔之内
59. 胃酸引起消化性溃疡,下列哪种酸性环境最有助于溃疡形成?
- pH2.5以下
  - pH3.5
  - pH4.5
  - pH5.5
  - pH5.5以上
60. 十二指肠球部溃疡时,壁细胞总数是:
- 增加
  - 减少
  - 正常
  - 缺如
  - 不定
61. 类固醇性溃疡,下列哪项是不正确的?
- 发生率无性别差异
  - 胃溃疡多于十二指肠球部溃疡
  - 溃疡面积大,边缘锐利
  - 并发症发生率高
  - 易发生梗阻
62. 关于十二指肠球部溃疡,哪项是正确的?
- MAO 8 毫克当量/小时
  - 复发率是低的
  - 多与胃溃疡并存
  - 与胃溃疡比,发病年龄较轻
  - 进食后疼痛加重
63. 胰岛非 $\beta$ 细胞瘤与十二指肠溃疡的鉴别诊断,主要依靠下列哪项指标?
- 易并发上消化道出血
  - 溃疡为多发性
  - 溃疡顽固而不易愈合
  - 伴有腹泻
  - 血胃泌素浓度和壁细胞总数测定
64. 下列有关十二指肠溃疡的临床,哪一项不正确?
- 有空腹疼痛、进食后疼痛减轻的规律
  - 90% 溃疡好发于球部
  - 前壁溃疡穿孔者多见
  - 血中胃泌素水平显著升高
  - 发生癌变机会很少
65. 消化性溃疡的典型临床症状是:
- 上消化道出血
  - 反酸、嗝气
  - 长期周期发作性节律性上腹痛
  - 食欲降低,上腹不适
  - 食欲亢进,便秘
66. 消化性溃疡作胃液分析时,下述判断哪项是错误的?
- 胃溃疡的胃酸分泌多正常或稍低于正常
  - 十二指肠溃疡胃酸分泌多增加
  - 用各种方法证实胃酸缺乏时,应疑为溃疡癌变
  - 复合性溃疡的胃酸分泌多数降低
  - 基础胃酸 $>15$ 毫当量/时,最大胃酸分泌 $>60$ 毫当量/时,提示为胃泌素瘤
67. 除消化性溃疡症状外,尚有突出的夜间

- 痛，向背部放射，常伴有大量出血，药物治疗效果差，应考虑为：
- 十二指肠球部多发性溃疡
  - 幽门管溃疡
  - 复合溃疡
  - 溃疡癌变
  - 球后溃疡
68. 关于消化性溃疡的病理，正确的是：
- 胃溃疡多发生于泌酸最强的区域内
  - 溃疡的直径多数大于2.5厘米
  - 对吻性溃疡仅发生于十二指肠
  - 一个以上的溃疡称为复合性溃疡
  - 溃疡的愈合多在2—4周
69. 关于消化性溃疡的临床症状，不正确的是：
- 胃溃疡多为餐后痛
  - 十二指肠溃疡多为空腹和夜间痛
  - 消化道溃疡病人均有上腹痛
  - 十二指肠溃疡易发展为穿透性溃疡
  - 球后溃疡易发生大出血
70. 甲氧咪胍治疗消化性溃疡的药理作用是：
- 拮抗胆碱能神经
  - 拮抗胃泌素
  - 抑制主细胞分泌胃蛋白酶原
  - 增加胃粘膜细胞屏障作用
  - 拮抗组织胺 $H_2$ 受体作用
71. 生胃酮治疗胃溃疡的机理与下列哪项无关？
- 抑制胃蛋白酶
  - 促进受损粘膜的愈合
  - 防止氢离子回渗
  - 抑制胃酸分泌
  - 促进胃粘液分泌
72. 生胃酮的副作用与下列哪项无关？
- 高血压
  - 水肿
  - 低钾性碱中毒
  - 低钾性肌病
  - 可逆性粒细胞减少
73. 十二指肠溃疡止痛效果最迅速的是：
- 阿托品
  - 硫酸支链淀粉
  - 甲氧咪胍
  - 前列腺素 $E_2$
  - 三钾二枸橼酸络合铋
74. 23岁，男性，十二指肠球部溃疡患者，新近出现呕吐隔夜食，吐后症状减轻，下列治疗措施哪项是错误的？
- 灭吐灵（胃复安）
  - 三矽酸镁
  - 安定
  - 普鲁本辛
  - 甲氧咪胍
75. 下列给药方法哪种正确？
- 制酸剂在餐前 $\frac{1}{2}$ ~1小时及睡前服
  - 抗胆碱能药在餐后1小时及睡前服
  - 生胃酮在餐后1小时及睡前服
  - 甲氧咪胍在餐后及睡前服
  - 三钾二枸橼酸络合铋在餐后30分及睡前服
76. 止痛效能最快的制酸药是：
- 氢氧化铝
  - 氧化镁
  - 碳酸氢钠
  - 三矽酸镁
  - 碳酸钙
77. 关于消化性溃疡的治疗，下列哪项错误？
- 制酸剂一般服用6~8周
  - 制酸剂服至疼痛消失后两周
  - 生胃酮的疗程为4~6周
  - 溃疡愈合一般需要4~8周
  - 经12周的认真内科治疗仍未有好转者称难治溃疡
78. 生胃酮的用法哪项正确？
- 100毫克，三餐后各一次，睡前加

服200毫克

- B. 生胃酮+双氢克尿塞  
C. 疗程10~12周  
D. 生胃酮+双氢克尿塞+氯化钾  
E. 生胃酮+安体舒通
79. 当前治疗消化性溃疡疗效比较肯定的药物:  
A. 仍然是碱性药物和抗胆碱能药物  
B. 生胃酮与组织胺 $H_2$ 受体拮抗剂  
C. 硫糖铝  
D. 前列腺素  
E. 缺乏严格的双盲对照, 许多新药疗效尚不能肯定
80. 消化性溃疡伴有高血压病, 下列哪种药物不能应用?  
A. 乐得胃  
B. 生胃酮  
C. 甲氧咪胍  
D. 胃复安  
E. 654—2
81. 下列各种药物中最适宜于治疗胃溃疡的是:  
A. 碳酸氢钠  
B. 胃复安  
C. 胃舒平  
D. 生胃酮  
E. 甲氧咪胍(胺)
82. 治疗消化性溃疡, 下列药物中哪一项是错误的?  
A. 次碳酸铋  
B. 硫糖铝  
C. 三钾二枸橼酸络合铋  
D. 胃蛋白酶  
E. 胃复安
83. 当前治疗消化性溃疡的药物哪项正确?  
A. 仍是碱剂与抗胆碱能药物, 无重大进展  
B. 缺少严格的双盲对照研究, 许多新药疗效尚未肯定  
C. 生胃酮是治疗胃溃疡有效药物  
D. 硫糖铝是抗胃蛋白酶制剂, 为重要进展  
E. 组胺 $H_2$ 受体拮抗剂疗效尚未肯定
84. 消化性溃疡时用制酸药最好是:  
A. 大剂量联合用药, 可加速溃疡的愈合  
B. 餐前用药效果最好  
C. 片剂比粉剂好  
D. 餐后一小时及睡前服下效果最好, 一般不必长期服用  
E. 长期服用可防止溃疡病的复发
85. 患者因患慢性肾功能不全而腹泻, 同时并发胃溃疡, 选用下列哪种药物最适宜?  
A. 阿托品  
B. 生胃酮  
C. 碳酸氢钠  
D. 氢氧化铝凝胶  
E. 甲氧咪胍
86. 甲氧咪胍最适合治疗的疾病是:  
A. 胃溃疡  
B. 十二指肠溃疡  
C. 慢性胃炎  
D. 胃息肉  
E. 幽门管溃疡
87. 消化性溃疡疼痛发作, 但无并发症, 其饮食应:  
A. 暂给流质饮食, 少吃多餐  
B. 一般不必严格控制食谱, 但应控制刺激性食物  
C. 只需劝戒烟酒  
D. 应禁食, 以加速控制症状  
E. 在抗酸解痉药治疗下, 饮食不需控制
88. 幽门梗阻、返流性食管炎等时, 禁用下述哪类药物?  
A. 制酸药  
B.  $H_2$ 受体拮抗剂  
C. 生胃酮

- D. 抗胆碱能药  
E. 硫糖铝
89. 下列制酸药的剂量, 哪项是错误的:  
A. 氢氧化铝凝胶25ml, 日4次  
B. 三矽酸镁0.6, 日4次  
C. 氧化镁0.6, 日4次  
D. 碳酸钙0.6, 日4次  
E. 碳酸氢钠0.6, 日4次
90. 抗胆碱能药可用下列哪种情况?  
A. 幽门梗阻  
B. 反流性食管炎  
C. 近期有溃疡大出血  
D. 十二指肠球部溃疡  
E. 胃溃疡
91. 慢性肾炎高血压型患者(发现前列腺肥大三年)新发有十二指肠溃疡活动期, 为治疗消化性溃疡, 选用哪组药物最好?  
A. 阿托品+甲氧咪胍+生胃酮  
B. 甲氧咪胍+前列腺素<sub>E<sub>2</sub></sub>+硫糖铝  
C. 普鲁本辛+氧化镁+氢氧化铝  
D. 三矽酸镁+碳酸钙+生胃酮  
E. 硫糖铝+三钾二枸橼酸络合铋+生胃酮
92. 关于胃及十二指肠溃疡并发大量出血, 哪项不正确?  
A. 是上消化道出血的最常见原因  
B. 是消化性溃疡最常见的并发症  
C. 可以是消化性溃疡的死亡原因  
D. 均有溃疡病史  
E. 溃疡症状在出血前加重, 出血后减轻
93. 关于消化性溃疡急性穿孔, 哪项不正确?  
A. 前壁溃疡易发生  
B. 一定有胃或十二指肠内容物溢入腹腔  
C. 饱食、粗糙食物和引起腹压增加的动作可诱发  
D. 都有气腹症  
E. 都有急性腹膜炎
94. 能说明溃疡较深或穿透性溃疡者是:  
A. 疼痛剧烈  
B. 服制酸药者不缓解  
C. 疼痛范围如手掌大小  
D. 痛点局限或疼痛涉及背部  
E. 疼痛伴有恶心呕吐
95. 消化性溃疡中最多的致死原因是:  
A. 癌变  
B. 大出血休克  
C. 急性穿孔, 化脓性腹膜炎  
D. 幽门梗阻, 电解质紊乱  
E. 慢性消耗
96. 有关上消化道出血, 以下哪项是不正确的?  
A. 呕血一般指出血部位在 Treitz 韧带以上  
B. 出血时可作急诊内窥镜检查  
C. 出血量超过50ml时就可形成柏油便  
D. 出血后血清BUN可升高  
E. 呕血量较大, 是食管静脉破裂出血
97. 难治性或顽固性消化性溃疡是指:  
A. 多次发生出血者  
B. 胃泌素瘤  
C. 球后溃疡  
D. 经6~8周认真内科治疗, 症状无好转, 溃疡犹存或恶化者  
E. 多发性溃疡
98. 消化性溃疡原常见的并发症是:  
A. 穿孔  
B. 幽门梗阻  
C. 恶性变  
D. 呕血或黑便  
E. 水、电解质紊乱
99. 幽门梗阻伴持续性呕吐可造成:  
A. 低氯高钾碱中毒  
B. 缺钾性酸中毒  
C. 低氯缺钾酸中毒  
D. 低氯高钠碱中毒  
E. 低氯缺钾碱中毒

100. 十二指肠球部溃疡并发症, 下列哪项是错误的?
- 大量出血
  - 急性穿孔
  - 幽门梗阻
  - 癌变
  - 粘膜糜烂
101. 上消化道小量活动性出血, 定位诊断最有价值的检查是:
- 消化道插管抽液检查
  - 吞线试验
  - X线钡餐检查
  - 纤维内窥镜检查
  - 肠系膜动脉选择造影
102. 上消化道大出血, 早期可靠的观察指标是:
- 上腹疼痛、恶心、上腹压痛
  - 脉搏细速, 血压下降
  - 红细胞计数与血红蛋白下降
  - 红细胞压积变化
  - 末梢血片中, 红细胞呈小细胞低色素性
103. 粪便隐血试验阳性, 胃出血至少为:
- 2 毫升
  - 5 毫升
  - 10 毫升
  - 15 毫升
  - 20 毫升
104. 当怀疑癌性溃疡时, 确诊的主要根据是:
- 粪隐血试验
  - 纤维胃镜检查
  - 脱落细胞检查
  - X线钡餐检查
  - 胃粘膜活组织检查
105. 下列哪种疾病须考虑剖腹探查?
- 胃溃疡可疑
  - 胃底静脉曲张可疑
  - 胃憩室可疑
  - 胃癌可疑
  - 复合性溃疡可疑
106. 消化性溃疡并发上消化道出血, 宜静脉给予:
- 血浆
  - 葡萄糖盐水
  - 红细胞悬液
  - 晶体溶液及全血
  - 白蛋白
107. 消化性溃疡患者出现哪种情况需要紧急手术治疗?
- 有反复上消化道出血史, 现又出血
  - 年龄较大, 病程长, 疼痛反复发作
  - 合并幽门梗阻
  - 伴胃酸减少
  - 大出血停止后, 一天内又有大量出血
108. 下列哪项表现, 对幽门梗阻的诊断最重要?
- 胃型或蠕动波
  - 呕吐物中有隔夜或隔日食物
  - 呕吐后腹胀可减轻
  - 震水音
  - 水、电解质与酸碱平衡失调
109. 诊断幽门梗阻最主要临床表现是:
- 餐后上腹痛, 可见扩大的胃型轮廓
  - 有胃蠕动波、蠕动音
  - 有拍水声 (亦称震水声)
  - 疼痛伴有呕吐, 呕吐后症状减轻
  - 呕吐宿食 (或称隔夜食)
110. 上消化道出血最常见的病因是:
- 门脉性肝硬化食管静脉曲张破裂
  - 消化性溃疡
  - 胆道疾病
  - 急性糜烂出血性胃炎
  - 全身性疾病
111. 穿透性溃疡是:
- 指慢性的胃或十二指肠内容物穿入腹膜腔的过程
  - 常伴局限性腹膜炎

- C. 多见于胃前壁溃疡  
D. 十二指肠球部后壁多见  
E. 大剂量抗酸剂不能取得满意疗效者
112. 十二指肠溃疡患者近三天来每天解成形黑便一次，量不多，应给：  
A. 禁食+输液+止血敏  
B. 即输血+胃内持续滴注去甲肾上腺素+止血敏  
C. 流汁饮食+输液+止血敏+甲氰咪胺  
D. 输液+大量冰盐水洗胃+制酸剂  
E. 手术治疗
113. 下列哪项最能提示消化性溃疡发生了并发症：  
A. 常发生夜间痛  
B. 恶心、腹胀明显  
C. 疼痛的节律性发生改变  
D. 上腹部压痛  
E. 嗝气返酸加重
114. 消化性溃疡合并症中最多的是：  
A. 急性穿孔  
B. 慢性穿透  
C. 出血  
D. 幽门梗阻  
E. 癌变
115. 消化性溃疡合并大出血的特点，不正确的是：  
A. 出血后疼痛加重  
B. 呕血常混有食物  
C. 呕血呈酸性  
D. 呕血常为咖啡色  
E. 出血后可有发热及氮质血症
116. 提示溃疡穿孔最有意义的根据是：  
A. 突发腹痛  
B. 急性腹膜炎体征  
C. 休克征象  
D. 腹腔试验穿刺  
E. 气腹征象
117. 最能提示胃泌素瘤的检查是：  
A. BAO测定  
B. MAO测定  
C. BAO/MAO比值  
D. 胃泌素测定  
E. 胰升血糖素测定
118. 患者男，36岁，上腹痛二十余年，上消化道出血三次。胃液检查：空腹胃液量220ml，BAO64mEq/时，MAO 92mEq/时，据此，最可能的诊断是：  
A. 胃溃疡  
B. 十二指肠溃疡  
C. 胃粘膜脱垂  
D. 幽门梗阻  
E. 胃泌素瘤
119. 30岁，十二指肠球部溃疡患者，10小时前呕吐血少量，大量黑便3次，血压70/50mmHg，脉搏120次，血红蛋白6克%，何种处理为首选？  
A. 大量输液  
B. 右旋糖酐  
C. 外科手术  
D. 急诊内窥镜直视下电凝止血  
E. 输血、输液
120. 男性，45岁，上腹痛2年余，周期发作，最近一月持续，左上腹有局限性压痛，钡餐提示胃角部龛影，直径1厘米，胃酸分析正常偏低，经内科保守治疗8周后痛略轻，龛影犹存，进一步处理首选哪项？  
A. 继续保守治疗，加用生胃酮  
B. 继续保守治疗，反复大便潜血试验  
C. 气钡双重对比餐钡复查  
D. 纤维胃镜检查、活检  
E. 手术
121. 60岁，男性，确诊为十二指肠溃疡出血，经内科积极治疗24小时，血压90~60/60~40mmHg，脉120次/分，此时最好的措施为：  
A. 继续输液、输血  
B. 胃内去甲肾上腺素灌注

- C. 宜用垂体加压素静注  
D. 应急诊手术  
E. 用甲氧咪胍静滴
122. 男性, 30岁, 反复发作有规律性上腹部疼痛史十多年, 近一周加重, 呕血、便血两天。考虑下列哪种诊断可能性大?  
A. 出血性胃炎  
B. 消化性溃疡出血  
C. 胃癌出血  
D. 肝硬化食管静脉曲张破裂  
E. 胆道出血
123. 40岁, 男性, 三年来常发作右上腹痛, 午夜尤甚, 疼痛放射至背部, 先后发作3次上消化道大出血, 曾作3次胃肠钡餐透视, 结果是十二指肠球部均未见异常, 体检: 肝脾不大, 右上腹有压痛, 哪种病可能性最大?  
A. 胃癌  
B. 慢性胃炎  
C. 胃溃疡  
D. 十二指肠球后溃疡  
E. 食管静脉曲张
124. 26岁, 男性, 五年来经常餐后3~4小时上腹疼痛, 有时半夜痛醒, 五肽胃泌素胃液分析: BAO 5 mEq/小时, MAO 40 mEq/小时, 考虑符合下述哪种疾病?  
A. 胃溃疡  
B. 慢性萎缩性胃炎  
C. 十二指肠球部溃疡  
D. 胃癌  
E. 胃泌素瘤(卓——艾二氏综合征)
125. 男性, 42岁, 一小时前突感上腹剧痛, 伴恶心, 无排便、排气, 半小时后腹痛转向右下腹, 并向右肩部放射。体检: 全腹压痛, 有肌卫及反跳痛, 无腹块触及, 白细胞总数  $18,000/\text{mm}^3$ , 最可能的诊断是:  
A. 急性阑尾炎  
B. 急性胰腺炎  
C. 消化性溃疡穿孔  
D. 绞窄性肠梗阻  
E. 胆囊炎穿孔
126. 男性, 58岁, 十多年来有胃病史, 四个月来消瘦, 一月来反复黑便。Hb 8 g、ESR 15 mm/小时, 大便潜血(++) , 五肽胃泌素胃液分析: BAO 0.5 mEq/小时, 钡餐造影特点: 胃小弯可见充盈缺损及  $2.5 \times 3 \text{ cm}$  溃疡位于腔内, 溃疡周围粘膜中断。诊断:  
A. 胃溃疡  
B. 胃癌  
C. 胃肉瘤  
D. 慢性胃炎  
E. 胃溃疡癌变
127. 某患者胃镜检查发现胃及十二指肠均有多个溃疡, 胃液分析: 基础酸分泌量(BAO) 16毫当量/小时, 最大酸分泌量(MAO) 64毫当量/小时, 壁细胞总数(PCM) 50.5 亿个。下列疾病哪种应考虑?  
A. 慢性肥厚性胃炎  
B. 胃溃疡  
C. 十二指肠球部溃疡  
D. 胃泌素瘤  
E. 十二指肠球后溃疡
128. 男性, 34岁, 早餐后先觉有便意, 后解出黄色成形便, 排便后起身时突然晕倒在地, 面色苍白、大汗, 即送来。过去无特殊疾病, 亦无同样发作史。体查: 体温  $37^\circ\text{C}$ , 血压 90/80 毫米汞柱, 脉搏 124次/分, 神清, 面色苍白, 四肢冷, 心界不大, 心音规律, 无杂音, 肺无罗音, 肝脾未扪及, 肠鸣音明显增多, 血红蛋白 12克%, 白细胞计数及分类正常。最可能是:  
A. 低血糖反应  
B. 感染性休克  
C. 心源性休克

- D. 一时性晕厥  
E. 上消化道出血伴休克
129. 男性, 35岁, 上腹隐痛半年, 无节律性。一月前钡餐检查见胃角部有 0.5cm 突出于腔外的龛影, 近三天来每天解成形黑便一次, 量不多, 血压正常, 血红蛋白 10.5 克%, 应考虑为:  
A. 十二指肠溃疡并上消化道出血  
B. 胃溃疡并上消化道出血  
C. 复合性溃疡并上消化道出血  
D. 胃癌并上消化道出血  
E. 慢性胃炎并上消化道出血
130. 上题所述, 立即的处理措施应为:  
A. 禁食+输液+止血敏  
B. 输血+6-氨基己酸+胃内滴注去甲肾上腺素  
C. 流汁+输液+止血剂+制酸剂  
D. 输液+冰盐水洗胃+制酸剂  
E. 手术治疗
131. 25岁男性患者, 解柏油样便二天入院, 血压 70/50 毫米汞柱, 脉搏 130 次/分, 血红蛋白 6 克%, 过去间有上腹痛, 曾做钡餐检查球部变形。其病因诊断, 哪项最可能?  
A. 慢性胃炎  
B. 胃溃疡  
C. 胃癌  
D. 十二指肠球部溃疡  
E. 复合溃疡
132. 上题所述, 紧急处理哪项首选?  
A. 静注抗血纤溶芳酸  
B. 静滴脑垂体后叶素  
C. 胃内滴入去甲肾上腺素  
D. 快速输血  
E. 内窥镜下止血
133. 患者上腹痛 3 年余, 近 2 月来厌食, 钡餐发现胃小弯溃疡, 增大组织胺胃液分析: 胃液  $\text{pH} = 7$ , 血清胃泌素增高, 考虑最可能的诊断是:  
A. 胃溃疡并胃窦胃炎  
B. 胃溃疡癌变  
C. 胃溃疡合并十二指肠溃疡  
D. 胃泌素瘤  
E. 以上均不是
134. 十二指肠溃疡合并幽门梗阻患者剧烈呕吐, 血清钾 2.3 毫当量/升, 血清钠 116 毫当量/升, 血清氯化物 86 毫当量/升, 二氧化碳结合力 70 容积%。下列处理措施哪项正确?  
A. 生理盐水+氯化钾静滴及阿托品  
B. 10% 葡萄糖+氯化钾静滴及普鲁苯辛  
C. 50% 葡萄糖+氯化钾静脉注射  
D. 生理盐水+氯化钾静滴及抽胃液减压  
E. 乳酸钠静滴
135. 胃肠道消化酶中最主要的是:  
A. 胃消化酶  
B. 小肠液的消化酶  
C. 胰液消化酶  
D. 胆汁中的消化酶  
E. 结肠液的消化酶
136. 关于肠道的消化吸收功能, 正确的是:  
A. 十二指肠近端即有吸收作用  
B. 小肠液的消化酶起主要消化作用  
C. 胰液的消化酶起辅助作用  
D. 生理情况下小肠的吸收量大于分泌量  
E. 维生素  $\text{B}_{12}$  只在空肠吸收
137. 溃疡型肠结核时 X 线钡餐检查的 Stierlin 征是指:  
A. 肠粘膜皱襞粗乱, 肠壁边缘不规则  
B. 肠腔狭窄、肠段收缩变形、回盲肠正常角度消失  
C. 回肠末端和盲肠有增生性狭窄、收缩和畸形  
D. 病变肠段有激惹征、排空快、充盈不佳, 而病变上、下端肠曲充盈良好

- E. 病变肠段僵硬, 粘膜皱襞紊乱
138. 溃疡型肠结核的临床表现是:
- 多有结核毒血症
  - 常有腹泻, 多为脓血便
  - 易并发急性肠穿孔
  - 常引起大量肠出血
  - 多不伴有肠外结核
139. 肠结核主要好发的部位是:
- 空肠
  - 横结肠
  - 回盲部
  - 升结肠
  - 乙状结肠
140. 诊断溃疡型肠结核, 以下哪项具有重要意义?
- 右下腹痛、腹泻、便秘交替
  - 右下腹肿块
  - 痰、粪便同时浓缩检查结核菌均阳性
  - 结核菌素试验呈强阳性
  - X线钡剂检查回盲部有钡影跳跃征
141. 溃疡型肠结核病理变化, 下列哪项是错误的?
- 溃疡常沿肠管纵径扩展
  - 溃疡边缘不规则
  - 溃疡深浅不一
  - 常累及周围腹膜
  - 邻近肠系膜淋巴结也受累
142. 肠结核诊断最有意义的是:
- 青壮年人有肠外结核证据
  - 腹痛、腹泻、发热、盗汗
  - 右下腹压痛, 肿块或肠梗阻
  - 钡餐透视有激惹征象或充盈缺损或肠腔狭窄
  - 粪便结核菌阴性
143. 关于增生型肠结核的临床特点, 正确的是:
- 常有腹泻或腹泻、便秘交替
  - 因慢性肠穿孔而形成腹部包块或腹腔脓肿
  - 结核中毒及肠外结核表现明显
  - 可发生肠梗阻
  - 粪便中易查到结核杆菌
144. 关于溃疡型肠结核的病理特点, 正确的是:
- 孤立与集合淋巴结干酪样坏死
  - 病变深达肌层, 易发生急性穿孔
  - 病变损害血管, 易发生出血
  - 溃疡沿肠纵径发展
  - 修复过程充分, 不易发生肠瘘或腹腔脓肿
145. 有关溃疡型肠结核, 下列哪项是错误的?
- 病变常围绕肠周径扩展
  - 溃疡边缘不规则, 深浅不一
  - 并不累及周围腹膜或邻近肠系膜淋巴结
  - 溃疡边缘与基底部出血的机会少
  - 溃疡一般不导致急性穿孔
146. 增生性肠结核临床主要症状是:
- 腹泻
  - 便秘
  - 腹泻与便秘交替出现
  - 盗汗
  - 消瘦
147. 溃疡型肠结核的临床表现, 哪项是错误的?
- 右下腹痛, 进食后加重
  - 腹泻为主
  - 多无全身结核中毒症状
  - 下腹可触及较固定包块
  - 钡剂灌肠可见Stierlin征象
148. 下列哪项不符合肠结核?
- 年青人有发热、盗汗、下腹痛、右下腹肿块
  - 青年人有不明原因肠梗阻者
  - 腹泻多为脓血便, 伴有里急后重
  - 胃肠钡餐发现充盈缺损或狭窄
  - 有肺结核病史