

傷寒補亡論

卷之四

仲景傷寒補亡論卷第六

河南郭雍撰次

陽明經證治八十七條 少陽經證治十一條

陽明經證治八十七條

仲景曰尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥龐氏曰此證惡寒可發汗若惡寒罷反自汗惡熱者爲胃家實屬正陽陽明宜調胃承氣湯

仲景問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明

何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃
家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實
大便難是也龐氏曰本太陽病若發汗若下若利小
便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明名曰太陽陽明
也本傳到少陽因發汗利小便胃中燥大便難者名
曰少陽陽明也病人本風盛氣實津液消爍或始惡
寒汗出後惡寒既罷而反發熱或始得病便發熱狂
言者名曰正陽陽明也凡陽明證俱宜下唯中寒惡
寒爲病在經與太陽合病屬表可發其汗

又曰陽明之爲病胃家實是也千金作胃中寒者非
又問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若
利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內
實大便難者此名陽明也

又問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒
反惡熱也

又問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰
雖得之一日惡寒將自罷卽自汗出而惡熱也

又問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所

歸無所復傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也

又曰本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也

又曰傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濺濺然者是轉屬陽明也

又曰傷寒三日陽明脈大

又曰傷寒脈浮而緩手足自溫者是爲繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者爲陽明病也

又曰傷寒轉繫陽明者其人澀然微汗出也

又曰陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也常氏云可桂枝麻黃各半湯小柴胡湯

又曰陽明病若能食名中風不能食名中寒

又曰陽明病若中寒者不能食小便不利手足澀然汗出此欲作固瘕必大便初鞭後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也常氏云可理中湯豬苓湯
又曰陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨

節疼翕翕如有熱狀奄然發狂澌然汗出而解者此
水不勝穀氣與汗共并脈緊則愈常氏云疑闕麻黃
湯一法又一本云脈去則愈雍曰千金翼作堅者則
愈無脈字證既有誤未可使用麻黃湯也若脈浮而
緊無汗者則可用三書之誤是誤以緊爲堅者爲去
或漏脈字或漏者字當云脈緊者則愈

又曰陽明病欲解時從申至戌上

又曰陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛
冷故也以其人本虛故攻其熱必噦常云可溫中湯

金匱方小半夏湯亦可

出而小便利者必愈

又曰陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便
難此欲作穀瘕雖下之腹滿如故所以然者脈遲故
也常氏云茯苓湯五苓散雍曰已發黃者茵陳蒿湯
又曰陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者
此以久虛故也常氏云可桂枝加黃芪湯雍曰以無
汗故如蟲行皮中狀須小汗乃解宜桂枝麻黃各半
湯此湯解身痒能小汗故也
又曰陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足

厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛常氏云類要用小建中湯誤也可小柴胡湯雍曰手足厥者宜小建中湯

又曰陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛常氏云可服茯苓甘草白朮生

薑湯

未見方

咽痛者宜桔梗湯

又曰陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃常氏云可茵陳蒿湯調五苓散

又曰陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發

黃常氏云可與茵陳蒿湯調五苓散

又曰陽明病脈浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出常氏云可與柴胡桂枝湯

又曰陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄常氏

云可黃芩芍藥地黃湯

當作黃芩芍藥甘草湯此句後增非郭氏語

又曰陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尙微煩不了了者此大便秘故也以亡津液胃中乾燥故令大便秘當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便秘不久出今爲小便數少以津液

當還入胃中故知不久必大便也

又曰傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之常云可小柴胡湯

又曰陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈常氏云未攻者可與生薑瀉心湯利不止者四逆湯

又曰陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也常氏云可五苓散雍曰旣不可攻則調胃承氣不可用但煎茵陳蒿湯調五苓散服之

又曰陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

又曰陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣
腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然
汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多微發
熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹
大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大瀉下
又曰陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭
者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法
少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃

可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

又曰夫實則譊語虛則鄭聲鄭聲者重語也直視譊語喘滿者死下利者亦死

又曰發汗多若重發汗者亡其陽譊語脈短者死脈自和者不死

又曰傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十

又曰陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

又曰陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣
腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然
汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多微發
熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹
大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大瀉下
又曰陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭
者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法
少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃

可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必溏不可攻
之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後
發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉
失氣者慎不可攻也

又曰夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語也直視譫
語喘滿者死下利者亦死

又曰發汗多若重發汗者亡其陽譫語脈短者死脈
自和者不死
又曰傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十

餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視脈弦者生濇者死微者但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利止後服

又曰陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則譫語小承氣湯主之若一服譫語止者更莫復服

又曰陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不