

本字年一書四

本草原始合雷公炮製卷之四

雍邱正字李中立纂輯並書畫

草部

竹葉處處有之。竹之類甚多而入藥者惟三種。人多不能盡別。謹按竹譜。箬竹堅而節促。體圓而質勁。皮白如霜。卽水白竹也。淡竹似篁而茂。卽甘竹也。苦竹有白有紫。說文云。冬生草也。象形。下垂者。箬箬也。蓋

竹從倒草竹草也而冬不死故從倒草一

曰竹倒種故從倒草竹性喜東南引生故

西北種之故曰倒種久之滋引自滿東南

重竹葉味苦平大寒無毒主欬逆主氣逆

筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風瘧疾痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒實通神

明輕身益氣汗主風症小兒身中惡瘡煮

取竹汁日澡洗良

竹物之有

筋節者也

按管與刺

字為節者

竹節



竹葉青竹葉與鹽少許寒溫
 藥廣合之。疥癬竹葉為末雞膏和塗愈
 氣。按藥性論云味甘無毒。歷大寒。瘧暴
 中風。風痺胸中。大熱止煩悶。皮筋。微寒。王
 嘔。碗溫氣寒熱吐血崩中溢筋。久渴心
 煩。服竹瀝良。治產後身或強直。口噤面
 青。手足強反張。飲竹瀝一二升。醒。姪媛
 若煩。此子煩故也。竹瀝不限冬少。細細服
 之。小兒癩。青竹茹三兩。醋三升。煎一升
 去滓服。一合兼治小兒口噤。體熱病。

淡竹
 味甘淡木
 性曰味辛
 非也



本草原治
 卷四
 草部

苦竹葉及歷療目瘡目痛明目利九竅
 竹筴味甘無毒主消渴利水道益氣可久
 食。卒失聲濃者煮苦竹葉服之良。頭瘡
 大筴竹葉燒為灰量瘡大小用灰調生油
 薄少入膩粉佳。有一種草
 莖如欵線葉如淡竹亦名之

苦竹味苦



淡竹葉俗多收稱利小水治喉痺等症并
 煎飲。又有一種短莖穴葉亦堪入藥

藥性論

竹味甘

百春生

秋局

藥同竹



根冬不死

附子生犍為山谷及廣漢皮黑體圓底平

山芋狀相彷彿以八月上旬採八角者長

一個重一兩者氣全堪用係烏頭傍出故

附子僉名味辛甘温大熱有毒主風寒咳


逆邪氣温中金瘡破瘻堅寒濕

腰痠拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊

風寒心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白堅肌

骨強陰孕婦忌煎墮胎甚速。若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲木者是也宜服霹靂散附子一枚燒灰存性為末蜜水調服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈。附子缺市以山芋造戒沈責但味甘而不辛為異

頂上



八角附子 子本黑 底平



俗呼大附子 子又呼黑附子

雷公云凡使先須認勿誤用有烏頭喙身烏黑少有傍尖身喙皮土蒼有大烏許者孕八九個周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮令皺折即劈破用天雄身全矮無尖周圍四而者附孕十一個

皮蒼色卽是天雄宜炮皺折後去皮尖
底用不然陰制用並得側子只乃附子
房有小顆附子如棗核者是宜生用治
風疹神妙木鱉子只是諸家附雄烏中
毗穗者號曰本鱉子不入藥中用若服
令人喪目若附子底平有九角如鐵色
一個個重一兩卽是氣全堪用夫修事
一兩于文武火中炮令皺折者去之用
刀刮土孕子并去底尖微細劈破子屋
下平地上掘一坑深一尺安附于中一
宿至明取出焙乾用夫欲炮者灰火勿
用雜木火只用柳木最妙若陰制使卽
生去尖皮底薄切用東流水并黑豆浸
五日日夜然後漉出于日中晒令乾用
便須陰制去尖了每十兩用
生烏頭五兩東流水六升

烏頭與附子同根春時採因有腦似烏烏

之頭故謂之烏頭味辛甘溫大熱有大毒

除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胸上

痰食不下心腹冷疾臍間痛肩脾痛不可

飽仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之

名射罔味苦有大毒療尸疰癢堅及頭中

風痺痛敷箭射禽獸即亡中人亦死倘誤

中人甘草藍青小豆葉浮萍皆可解也

烏頭係歪頂之附子也市者以川烏當之

非也治螫螫烏頭末少許研醋調傅之

○蛇虺

螫人射

馬參

鹿茸

頂




五字



五字

烏喙喙乃鳥之口。此藥兩歧相合如鳥之口故名烏喙。味辛微溫有大毒。主風濕木腰痛不能行步。瘰癧腫膿結。又腫胎。烏喙係兩歧之鳥頭也。

頭兩歧



体黑

二月採



去地土

皮噴

烏喙江東人呼為莖。晉羅姬諸申生寘莖于肉者是也。唐武后置莖于食。賀氏食之暴死。蘇秦曰人之飢所以不食烏喙者以其雖偷充腹而與死同。患也可見。烏喙至毒之物也。用者可不慎歟。

本草部

天雄此與烏頭附子本並出建平故謂之

三建謝靈運山居賦曰三建異形而同出

別說云始種烏頭而不生諸附子側子之

類經年獨生長六者是也淮南子云大雉

云取天雄三枚內雄雞腸十搗生食之令

人勇。味辛甘大温有大毒主大風寒濕

痺歷節痛拘攣慢急破積聚邪氣金瘡強

筋骨輕身健行療頭風去來疼痛心腹結

積閉節重不能行步除骨節痛長陰氣強


志令人武勇力作不倦又墮胎廣雅云一

歲為側子二歲為烏喙三歲為附子四歲

為烏頭五歲為天雄今一年種之便有此

通物豈今人種時之法用力倍至故爾繁
 盛也耶然元種者母為鳥頭傍出者為附
 子其長二三寸者為天雄兩歧相合者為
 鳥喙附子之小者為側子實五物而一種
 也惟此物形體獨長大故稱天雄。天雄
 係長柄之附子也宜炮皺折後去皮尖底
 用之。生少室山八月採本經云二月採
 恐非時也

天雄形長二三寸



体黑

鳥頭鳥喙生朗陵山谷天雄生少室山谷
 附子側子生犍為山谷及廣漢今並生蜀
 生本只種附子至成熟後有鳥頭鳥喙天
 雄側子收時乃一處造釀方成藥之法先

本草綱目卷之六 草部 六

於六月內，置造大小麩麩，至收採前半月，預先入麥煮成粥，後將土件麩造，請候熟，麻去博其醋，不用大酸，酸則水解之，便將所收附子等，去根鬚于新潔瓮內，淹浸七日，每日撓一遍，日足撈出，以粥疎篩之，令牛白衣後，向慢風日中晒之，百廿日，以麩乾為度，是色俱碧耳。

側子狀如棗核，又從附子旁生，故曰側子。

味辛大熱，有大毒，主癰腫、風痺、歷節、腰脚疼、冷寒、熱鼠瘦、又墮胎。家附雄烏側同，而本經分生三處，各有所宜，故也。

附子



附子

本草經云只是諸家所推烏頭與附子者實
小色黑如桑椹號曰大烏頭不入藥用者
服之令人喪日

雷公云側子只是附子旁有小顆側子
如藥核者是宜主用治風疹神

妙也

葶麻子胡地者良。葉似葶草而厚大。莖赤
有節如甘蔗。高丈餘。秋生細花。隨便結實。
殼上有刺。實類巴豆。色斑。形如牛蛭。又名

葶麻子。味甘辛平。有小毒。主水瀉。水研二
十枚服之。吐惡沫。加至三十枚。三

本草綱目卷四
日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡痒
浮腫尸注惡氣瘴取油塗之葉主風腫不
仁搗蒸敷

油可調印色

正



背



形大斑
紅者佳

治難產及胎衣不下取草麻子七枚去殼
取仁研如膏塗腳心底子及衣下便速洗
去不爾腸出即用此膏塗頂腸當自入。
治一切毒腫疼痛不可忍者搗草麻子敷
之即

雷公云

此使勿用黑天赤利子緣在他
屢上生是類兩頭尖有毒藥守

不用草麻子形似巴豆節節目黃黑斑
點凡使先須和皮用鹽湯煮半日去皮

取子研
過用

蒴藿田野墟村中甚多花白子初青如菜

豆顆每朵如蓋面大又中有一二百子十

月方熟紅春夏採葉秋冬採莖根一名董

草一名菱味酸温有毒主風瘙癢疹温痺

味及出產處不同治療又

別自是二物斷無疑焉
雷公云凡使春用隔年花莖夏用根秋

冬並總作煎只取根用銅刀細切于柳木臼中搗取自然汁出緩于鍋子中煎如稀湯任用也

天南星生平澤處處有之苗起數莖每莖
 端六七葉高一尺餘結實作包稍如鼠尾
 根比芋而圓肌細膩且白炮之易裂本經
 云葉似蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭
 黃色六月結子作穗似石榴子紅色根似
 芋而圓是虎掌非南星也然南星多生南
 方形圓如星故以名之味苦辛有毒生中
 風除痰麻痺下氣
 破堅積消滯腫利胸膈散血墮胎凡用
 生薑湯泡七次根菜蠅螬止夜痛