

沂水县概况



沂水县地方史志编纂委员会办公室

沂 水 县 概 况

沂水县地方史志编纂委员会办公室

一九八四年十二月


前 言

—————

最后，谨向热情提供资料的单位和帮助指导我们工作的同志表示感谢！

沂水县地方史志编纂委员会办公室

一九八四年十二月



目 录

前言

沂水县简图

建置沿革.....	(1)
自然条件.....	(6)
经济状况.....	(13)
文化事业.....	(22)
重大事件.....	(29)
著名人物.....	(32)
名胜古迹.....	(36)

建置沿革

位置 沂水县位于东经 $118^{\circ}13'$ — $119^{\circ}03'$ ，北纬 $35^{\circ}36'$ — $36^{\circ}13'$ 。地处沂蒙山区。东与莒县为邻，西与沂源、蒙阴交界，南与沂南毗连，北与安丘、临朐接壤。居沂、沭河上游，跨益（都）新（沂）、泰（安）石（臼）公路中段。东西最大横距78公里，南北最大纵距67.5公里，总面积2,070平方公里。

沿革 沂水县历史悠久，据发现的旧、新石器多处遗址（诸葛区范家旺南洼洞、姚店子区吉子山）及龙山文化遗存证明，约在二十万年前后已有人类聚居，

四千年前原始氏族社会，我们的祖先即在此繁息。周为东夷之根牟、阳等小国。春秋名郛，战国称盖，先属鲁，后入齐，秦



龙山文化遗存，打播台遗址

为琅琊郡地。汉，东为琅琊郡之东莞县（今县

东北部)；西为泰山郡之盖邑(今沂源县东里一带)；南为城阳国之阳都(今沂南县东北部)，三地均属琅琊国。魏以东莞、阳都二地置东莞郡(郡治在东郛)。晋因之。东晋分东莞县置东安郡。南北朝时期，东莞县名取消，改称团城，又改名东徐州、南青州，属东安郡(郡治在团城)。596年(隋开皇十六年)，改为沂水县，属琅琊郡，县名沿用至今。唐属沂州；宋、辽、金属莒州；元、明属青州府；清属沂州府。民国初，先属岱南道，后改属济宁道。1925年冬，张宗昌分全省为十道，又改属琅琊道。1928年裁道，直隶于省府。1934年山东省第三区行政督察专员公署在沂水建立，1936年5月迁于临沂，沂水为该区辖县。

早在1925年，沂水就有共产党人的活动。1939年6月9日(农历4月22日)，日军侵占沂水城，国民党县政府陷于瘫痪。中共沂水县委联合各界组成抗日民主政府，属沂蒙专署辖。中华人民共和国成立后，沂水县属沂水专员公署。1953年8月，沂水专署撤销，沂水县隶属临沂专员公署迄今。

区划 1734年(清雍正十二年)，全县划为一百四十三里。1827年(道光七年)，改为六柜

一百二十六社。民国初年废社，行政区划多变，初为十八区，旋改为二十区，1930年裁为十区一百二十二社。1931年改为十区二百五十个小乡，1935年将小乡并为四十个大乡。1939年6月至1944年8月15日，日伪县政府在其控制范围内下设五个区。在抗日民主根据地，根据抗战形势需要，行政区划时有变更：1939年6月以前，先后建立了十个区民主政府。从1940年3月沂水县抗日民主政府成立至1944年，原沂水县十个区先后划为沂南、沂东、沂临边联、沂北、莒沂边、沂中、沂源、莒沂等八县。日本投降后至1958年，沂水县界与安丘、莒县、沂源、蒙阴、沂南多次调整，划出划入变化较大，1961年4月，县界方稳定下来，县辖18个公社154个管理区。1984年4月撤销公社，设区建乡（镇），全县改为18个区、80个乡、4个镇，共有1,208个大队，1,257个自然村，6,886个生产队。

沂水县区乡（镇）行政区划名称一览表

区名称	乡（镇）名 称							
沂 城	沂水镇	石官庄	七里堡子	石良店子	武家洼			
许家湖		许家湖	前邕山	后坡	东斜午			
四十里堡		张家官庄	老官庄	大李马庄	四十里堡	三十里堡		
道 托		道托	前涝坡	韩家曲				
高 桥		袁家仁	沐水	核桃园	徐家牛旺	北高桥		
马 站	马站镇	珠江店子	朱刘店	书堂旺	古峰台			
圈 里		胡家岔河	高家庄	后朱营	圈里			
杨 庄		东杨庄	水牛	龙泉官庄	四官庄	善瞳		
官 庄		富官庄	徕庄	东得水	朱双			
沙 沟		东于沟	上流庄	张马庄	泮池	龙河官庄	沙沟	崖庄
诸 葛		西店子	葛庄	梭峪	上新庄	下古村	诸葛	
王 庄		王家庄子	陈家林	回峰涧	王庄			
夏 蔚		朱位	中峪	甄家瞳	夏蔚			
泉 庄		尹家峪	金里庄	石汪峪	张耿			
崔家峪	崔家峪镇	上常庄	柴山	大松林				
黄山铺		蛮庄	胡家庄	盆山	刘诸坞	葛子铺	杨家庄子	黄山铺
姚店子	姚店子镇	扈山店	前南社	吉子山	后城子			
院东头		上岩峪	刘家店	院东头				

县治 史传为古之东莞城，据《沂水县志》道光本记载，建置年代可追溯到汉武帝元朔二年，居县境东南部，为历代全县政治、经济、文化中心。

人口、民族

1983年底全县人口962,761人，1949年有503,000人。1953年第一次人口普查有562,829人。1964年第二次人口普查有693,215人。



沂水城中心大街

1982年第三次人口普查有941,855人，其中男占51.05%，女占48.95%；农业人口904,447人，占96.03%；兵源人口45,993人；劳动年龄585,636人；育龄妇女240,558人，人口出生率19.57‰，死亡率5.91‰，自然增长率为13.66‰。人口密度，1964年每平方公里为355人，1982年每平方公里为455人。1964年至1982年人口平均递增率为17‰。

全县共有八个民族。汉族有937,837人，占总人口的99.57%。其他少数民族共4,018人，占

总人口的0.43%。其中藏族3人，壮族1人，朝鲜族2人，满族29人，白族1人，高山族1人，回族3,981人。回族主要分布在沂城、马站和沙沟区。

自然条件

地形 全境为低山丘陵区，属剥蚀地形。境内山岭连绵，沟壑纵横，地势自西北向东南倾斜。西北部为山地，平均高度海拔500米左右；中部和东部为低缓丘陵，平均高度海拔300米左右；南部为冲积平原，平均高度海拔150米左右。最高点在沂山南麓太坡（泰薄）顶，海拔916米，最低点在官庄区朱双村东南处，海拔101.3米。

地质 地质形成的年代主要有前震旦系、震旦系、寒武系、白垩系和第四系。境内有沂水——汤头、郯郛——葛沟两条北北东向的大断裂通过。受其影响，在中间和两侧又形成了三组六条断裂及不少褶皱。地层构成的主要岩石有变质岩、沉积岩、岩浆岩。其岩性主要有：石灰岩、页岩、片麻岩、花岗岩、砂砾岩和玄武岩。

山脉 境内山脉多为沂山和蒙山余脉，共有大小山头1,941个。山东著名的沂沭断裂带，将县内山脉分为东北～西南向、西北～东南向及近

南北向三大类。东北～西南向山脉位于县境东北部，主要有汞丹山、峨山等。汞丹山南北长2.5公里，东西宽1.6公里，海拔398米，山体由片麻岩组成，山峰呈浑圆状。西北～东南走向山脉，位于县境西部五个区及北部沂山南延部分。西部诸山由片麻岩、花岗岩组成，多陡崖峭壁；以北山脉则由石灰岩、页岩、石英砂岩及片麻岩组成，多平顶山，沿其走向相间排列；沂山南延部分山体构成，主要是花岗岩和片麻岩，巉岩峭壁相隐其间。近南北向山脉，位于县境北部一狭长地带，由于受断裂带控制，多呈块断状。山体主要由砂砾岩、玄武岩夹少量石灰岩、页岩构成，以太平山为最高，海拔515.5米，余山皆在海拔400米以下。

河流 境内共有大小河流15,003条，属淮河流域沂河水系，多系季节河，汛期易洪，冬春易枯。位于崔家峪区西部的摩天岭为沂水的分水岭，岭西河流流向西及西南，岭东河流流向东或东南。大的河流有沂河、沭河和浞河三条，10～20公里的中型河流有27条。沂河源于沂源县鲁山，自西北入我县境。境内流程50.5公里，落差66米，河宽330～800米。根据记载，沂河的最大流量出现在1730年（清雍正八年），推算在

10,580~13,500立方米/秒之间,1957年亦出现了6,940立方米/秒的流量。沭河为我县第二大河,发源于我县沙沟区沂山南麓,经莒县、莒南、临沂、临沭流入江苏后入海,县境内流程36公里。

土壤 全县土壤可分为棕壤、褐土、潮土三个土类,十一个亚类,十五个土属,六十六个土种。棕壤,面积157.4万亩,占土地总面积的50.7%。主要分布在东部和中部的变质岩地区。这类土壤土层薄,质地粗,多无灌溉条件,水土流失严重。适宜种植地瓜、花生。褐土,面积120.4万亩,占土地总面积的38.8%。主要分布在西部和北部石灰岩地区。这类土壤土体较厚,理化性较好,土壤养分含量高于棕壤。但水土流失也比较严重。可种植粮食、棉花及部分烟草和花生。潮土,主要分布在沂、沭河两岸的冲积平原。面积32.6万亩,占土地总面积的10.5%,土层深厚,肥力较高,是沂水的粮食高产区。

全县的土壤肥力较差。土壤有机质、水解氮、速效钾、速效磷都处于低水平。特别是速效磷普遍缺乏。1977年土壤速测化验,低于5 PPM的占取样样品的96.9%。

植被 全县作物种植面积144万亩,占总面积的46.4%;林地面积(包括经济林地)52万亩;占总

面积的14%；疏林地和天然草场37.3万亩，占总面积的10.21%；其余为荒山荒滩、村镇、道路、水面。

气候 属暖温带季风气候区，具有显著的大陆性气候特征：四季变化明显，光照充足。冬季干冷，雨雪稀少，风向多偏北；春季干燥，易发生春旱，风向多偏南；夏季高温高湿，雨量集中；秋季天高气爽，常有秋旱。年平均气温 12.3°C ，极端最高气温 39.2°C （1978年5月25日），极端最低气温 -20.2°C （1969年2月5日）。由于地形影响，气温从西南向东北递减，年平均气温相差 1°C 。根据二十五年的气象资料分析，全县年平均降水量792.1毫米。但年际间变化较大，1960年降水1297.9毫米，1983年仅降水456.7毫米。年平均降水日数84.3天。全年降水高峰在七月份，年平均为261.2毫米，占全年总降水量的33%；降水最少的是一月份，年平均为7.7毫米，占全年总降水量的0.97%。年平均相对湿度为66%。全县平均无霜期206天，最长240天，最短166天。但由于全县地形差异，无霜期长短也有较大差异。一般境内西南部无霜期较长，北部较短。全县年平均日照2420.5小时，年平均总辐射量118.5千卡/平方厘米。光照年际间一般变化不大。

附： 1 9 8 3 年气象要素统计表

项 目	月 份												全年合 计平均
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
气温 °C	-1.8	-0.8	5.1	13.9	20.1	23.9	25.7	25.9	22.0	13.9	7.0	-0.3	12.9
降 水 量 (mm)	4	2	5	8	7	8	16	6	10	14	1	2	83
	2.0	6.2	34.4	29.5	30.2	28.9	101.7	79.6	74.4	67.1	0.6	2.1	456.7
日 照 (太阳时)	182.2	190.7	199.0	204.1	242.6	234.7	201.0	260.7	195.6	155.1	225.7	190.4	248.18
相对温度 (mB)	60	56	61	57	65	59	76	73	75	75	57	54	64
平均风速 (米/秒)	1.1	2.0	2.2	2.8	2.2	2.1	1.9	1.8	1.5	1.3	1.4	1.2	1.8

1983年各风向频率

(北)	北	东北	东	东北	东	东南	东南	南	南	南	西南	西南	西	西北	西北	北	北	静
N	NN	NE	ENE	E	ESE	ES	SSE	S	SSW	WS	WSW	W	WNW	WN	NNW	NNW	C	
8	7	7	2	2	1	5	7	14	5	4	1	8	1	4	4	4	23	

累年各月平均气温、降水 (1959~1983)

月 项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
气 温 ($^{\circ}\text{C}$)	-3.0	-0.6	5.6	12.8	19.1	23.3	25.5	25.1	20.0	14.0	6.4	-0.6	12.3
降 水 mm	7.7	10.3	19.8	47.3	45.1	99.6	261.2	148.9	81.9	37.2	23.3	9.8	792.1