

本

州

綱

目

本草綱目草部目錄第十七卷

草之六 毒草類四十七種

大黃

本經

商陸

本經

狼毒

本經

防葵

本經

狼牙

本經

藺茹

本經

大戟

本經

澤漆

本經

甘遂

本經

續隨子

開寶

葇蓉

本經
即天仙子

雲實

本經

薤麻

唐本
博落迴附

常山

蜀漆

本經
土紅山附
杜莖山

藜蘆

本經
○山慈石
根馬腸根附

參果

木藜蘆

拾遺

附子

本經

下天雄

本經

側子

別錄

漏籃子

綱目

烏頭

本經
喙射罔附

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

由跋

本經

蒟蒻

開寶
菩薩草附

半夏

本經

蚤休

本經

鬼臼

本經

射干

本經

鳶尾

本經

玉簪

綱目

鳳仙

綱目

坐拏草

圖經
押不蘆附

曼陀羅花

綱目

羊躑躅

本經

山躑躅
羊不喫草附

芫花

本經

蕘花

本經

醉魚草

綱目

莽草

本經

茵蘘

本經

石龍芮

本經
卽胡椒菜

毛茛

拾遺
海薑附

牛扁

本經
蝨建草附

葶麻

圖經

格注草

唐本

海芋

綱目

透山根附

鉤吻

本經

右附方舊一百三十四新四百九十五

本草綱目草部第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃

本經下品

釋名黃良

本經將軍

火參

吳普如

吳普宏景曰大黃其色也將軍

之號當取其駿快也杲曰推陳致新如戡定禍亂以致太平所以有將軍之號

集解

別錄曰大黃生河西山谷及隴西二月八月采根火乾普曰生蜀郡北郡或隴西二月八月

生黃赤其葉四四相當莖高三尺許三月花黃五月實黑八月采根根有黃汁切片陰乾宏景曰今采益州北部汶山及西山者雖非河西隴西好者猶作紫地錦色味甚苦濇色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如西耐蛙堪久此藥至勁利粗者便不中服恭曰葉子莖並似

羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖葉粗長而厚根細者亦似宿羊蹄大者乃如盃長二尺其涇潤而易蛙壤火乾乃佳作時燒石使熱橫寸截著石上搏之一日微燥以繩穿眼乾今出宕州瀘州西羌蜀地者皆佳幽并以北者漸細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及隴西誤矣藏器曰凡用當分別之若取和厚深沈能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者若取瀉洩駿快推陳去熱者當取河西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土番大黃正月內生青葉似薺麻大者如扇根如芋大者如盃長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二八月采根去黑皮切作橫片火乾蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土大黃二月開花結細實時珍曰宋祁益州方物圖言蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若盃藥市以大者爲枕紫地錦文也今人以莊浪出者

爲最莊浪卽古涇原隴西地與別錄相合

正誤

生苗葉累年長一種羊蹄大黃治疥癩甚效初

內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟卽黃色呼爲金蕎麥三月采苗五月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼爲土大黃時珍曰蘇說卽老羊蹄根也因其似大黃故謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃也狀似羊蹄而生山上所謂土大黃或指此非羊蹄也俱見本條

根脩治

雷曰凡使細切以文如水旋斑緊重者剉片蒸之從已至未曬乾又洒臘水蒸之從

未至亥如此凡七次曬乾卻洒淡蜜水再蒸一伏時其大黃必如烏膏樣乃曬乾用藏器曰凡用有蒸有生有熟不得一槩用之承曰大黃采時皆以火石燂乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙

蒸煮

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒普曰神農雷公苦有毒扁鵲苦無毒李當之大寒元素

曰味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也用之須酒浸煨熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒杲曰大黃苦峻下走用之于下必生用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至高之分驅熱而下如物在高巔必射以取之也若用生者則遺至高之邪熱是以愈後或目赤或喉痹或頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元氣耗陰血故也之才曰黃芩爲之使無所畏權曰忌冷水惡乾漆

主治下瘀血血

閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致

新通利水穀調中化食安和五臟

本**平胃下氣除**

痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛

諸老血留結

別錄

通女子經候利水腫利大小腸貼

熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿

甄權

通宣一切氣

調血脈利關節泄壅滯水氣溫瘴熱瘡

大明

瀉諸實

熱不通除下焦溼熱消宿食瀉心下痞滿

元素

下痢

赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譫語黃

疸諸火瘡

時珍

發明

之才曰

得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚

閉宗奭曰張仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯
用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心

湯更用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐
衄也此乃邪熱因不足而客之故令吐衄以苦泄
其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用
之無不效惟在量其虛實而已震亨曰大黃苦寒
善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經
之陽亢甚甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉
去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之
陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故
黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血
之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣寇氏不
明說而云邪熱客之何以明仲景之意而開悟後
人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽明手足厥陰
五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在
氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足
吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡
足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖
曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下
痞滿按之實瀉者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉

脾胃之溼熱非瀉心也病發于陰而反下之則作痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘在于心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所至爲痞滿又云濁氣在上則生臌脹是矣病發於陽而反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成無己註釋傷寒論亦不知分別此義成無己曰熱淫所勝以苦泄之大黃之苦以蕩滌瘀熱下燥結而泄胃強頌曰本草稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元帝常有小腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻眾病其偶

中便謂此方神奇其差誤不言用藥之美可不戒哉

附方

舊十四新

吐血衄血

治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之
大黃二

兩黃連黃芩各一兩水三升煮一

吐血刺痛黃一

升熱服取利

兩為散每服一錢以生地黃汁一合水

傷寒痞滿

半盞煎三五沸無時服簡要濟眾方
病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為

痞也大黃黃連瀉心湯主之
以麻沸湯二升漬之須臾絞汁

熱病譫狂五兩對

分作二次溫服仲景傷寒論
炒微赤為散用臘雪水五升煎如

傷寒發黃上方同

膏每服半匙冷水下聖惠方
氣壯者大黃一兩水二升漬一宿旦煎汁一腰

腳風氣令焦搗篩每用二錢空心以水三大合入

薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷一切壅滯

方治風熱積壅化痰涎治痞悶消食化氣導血用

大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜丸如梧

子大每服十丸白湯下並不損人如要微利加一

二十丸○衛生寶鑑用阜筴熬膏和丸名墜痰丸

又名全真丸金宣宗服痰為百病滾痰丸治痰為

之有驗賜名保安丸百病惟水瀉胎

前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切曬八兩生黃

芩八兩沉香半兩青礞石二兩以焰消二兩同入

砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和丸梧

子大常服一二十丸小病五六十丸緩病七八十

丸急病一百二十丸溫水吞下即臥勿動候藥逐

上焦痰滯次日先下糟粕次下痰涎未下再服王

隱君歲合四十餘斤愈男女諸病無極丸治婦人

疾數萬也養生主論痛下崩漏不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹

痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其效甚速

宜大癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分
用童尿一盃食鹽二錢浸一日切曬一分用醋酒
一盃浸一日切曬再以巴豆仁三十五粒同炒豆
黃去豆不用一切曬再紅花四兩泡水一盃浸一日
切曬一分用當歸四兩入淡醋一盃同浸一日去
歸切曬一分用末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心溫
酒下取下惡物為驗未下再服此心腹諸疾備急
武當高士孫碧雲方也醫林集要
丸治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一
兩搗篩蜜和搗一千杵丸小豆大每服三丸凡
客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒
者以暖水或酒服之或灌之未知更服三丸腹中
鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即
瘥此乃仲景方司空裴秀改為散用不及丸也
圖經大黃十兩為散醋三升蜜兩匙和
本草腹中痞塊煎丸梧子大每服三十丸生薑湯
下吐利為度腹脇積塊風化石灰末半斤瓦器炒
外臺祕要極熱稍冷人大黃末一兩

妙熬入桂心末半兩略炒下米醋攪成膏攤布貼之。○又方大黃二兩朴消一兩爲末以大蒜同搗膏和貼之。或加阿魏一久患積聚二便不利上搶兩尤妙。丹溪心法。大黃白芍各二兩爲末水丸梧子大每脾癖疳積湯下四十丸。日三以知爲度。千金方。脾癖疳積不拘大人小兒錦紋大黃三兩爲末醋一盞沙鍋內文武火熬成膏傾瓦上日曬夜露三日再研用舶上硫黃一兩形如琥珀者宮粉一兩同研勻十歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生冷魚肉只食白粥半月如一服不愈半月之小兒後再服若忌口不如勿服。聖濟總錄。小兒無辜。閃癖癰癤或頭乾黃聾或乍痢乍瘥諸狀多者大黃煎主之。大黃九兩錦紋新實者若微朽卽不中用削去皮搗篩爲散以好米醋三升和置瓦盆中於大鎗內浮湯上炭火慢煮候至成膏可丸乃貯器中三歲兒一服七丸梧子大日再服以下出青赤膿爲度若不下或下少稍稍加丸若

下多又須減之病重者七八劑方盡根大人亦可
用之此藥惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳
母亦禁之一加木香小兒諸熱大黃煨熟黃芩各
一兩半崔知悌方一兩為末煉蜜丸
麻子大每服五丸至十丸蜜湯下骨蒸積熱漸漸
加黃連名三黃丸錢氏小兒方
大黃四分以童子小便五六合煎取四合去滓
空腹分為二服如人行五里再服廣利方赤
白濁淋好大黃為末每服六分以雞子一個破頂
入藥攪勻蒸熟空心食之不過三服愈
簡便相火祕結大黃末一兩牽牛頭末半兩每服
方二錢有厥冷者酒服無厥冷五心
煩蜜湯服劉諸痢初起大黃煨熟當歸各二三
河間保命集錢壯人各一兩水煎服
取利或加檳熱痢裏急煎服取利集簡方忽喘
榔集簡方熱痢裏急煎服取利集簡方忽喘
悶絕不能語言涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絕
而復蘇名傷寒併熱霍亂大黃人參各半兩