

傷寒雜病論會通

傷寒雜病論會通卷十一

漢長沙太守南陽張機仲景述

長安黃維翰竹齋學

辨少陰病脈證并治

少陰之為病脈微細但欲寐也。

張今詔曰經云少陰之上君火之主又云少陰之中陰腎也。是少陰本熱而標寒上大火而下水神之處也。

精與神合而脈生焉病則精氣衰神氣少故脈微細也。精陰主樞轉出入於外內病則入而不出因而不外氣也。

行於陰故有欲寐也。沈先論曰少陰薄也。屬陽虛細小也。其見於脈證有如是也。沈先論曰少陰薄也。屬陽虛細小也。

陰病之提但細欲寐者傷氣行於陰而欲寐之證據也。此是少陰病之微或借細前一太陰後厥陰俱不見。但欲寐之證據也。此是少陰病之微。

厚衣近火善睡凡六七日以前多與諸劇證便伏於此。程如微或借細前一太陰後厥陰俱不見。但欲寐之證據也。此是少陰病之微。

厚衣近火善睡凡六七日以前多與諸劇證便伏於此。程如微或借細前一太陰後厥陰俱不見。但欲寐之證據也。此是少陰病之微。

去處矣。最要而提。方丹者。外元已解也。太陽篇云。太陽病十日陰以

新陽也。少陰者。血脈經絡榮衛循環系統之符語。在上焦

清曰。心液曰。肺器。在中焦。曰。肝動。脾。肝為發。肺為吐。故網及新

焦曰。膽液曰。器。脾為發。生。白。液。球。及。分。必。之。器。胞。為。器。在。下

化。精。生。殖。之。器。內。經。云。女。體。陰。之。上。熱。氣。治。之。液。又。云。少。陰

與。太。陽。為。表。裏。蓋。人。身。之。體。溫。之。發。生。於。血。液。之。循。環。之。養

熱。氣。不。足。之。為。保。護。及。調。節。之。賴。於。皮。膚。之。微。榮。若。榮。衛。衰。弱

脈。窄。而。細。少。陰。陽。兩。虛。則。精。神。志。意。昏。憤。急。倦。不。振。而。但

欲。寐。也。蓋。少。陰。與。厥。陰。如。輔。車。之。相。依。以。腦。體。神。經。之。但

作用。全。藉。血。液。之。滋。養。是。以。血。旺。則。精。神。爽。血。衰。則。志

裏。下。血。等。治。法。則。詳。見。於。太。陽。篇。也。

少陰病欲吐不吐。心煩但欲寐。五六日自利而渴者。屬少陰也。虛故飲水自救。若小便色白者。少陰病形悉具。小便

白者以下焦虛寒不能制水故令色白也。

陳修園曰少陰病其脈從肺出絡心注胸中胸中不與欲吐

而不能吐心中熱煩不能寐而但欲寐此水火不濟陰

陽不交機樞不轉之象也五日正少陰主氣之期至六

日其數已足火不交而自利水不上交而作渴者此

屬少陰之水火虛也水虛無以利沃焚火虛無以作渴者此

故引水自救此少陰病寒熱俱有之燔也若少陰病則

小便必赤者救小使色白者寒之燔也陰寒之病者

悉具此確切不移之診法也原其小便不能制水故令

下焦虛而有寒全失上焦之君火之熱化不能制水故令

而復吐利

病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛

腎中真陽為之熏騰乃是以上潮故口渴與三陽經之邪熱

真陽受困津液不流上潮故口渴與三陽經之邪熱

乾津液者大相反也每用真武湯治白濁頗著奇效

小便白疑是白濁也每用真武湯治白濁頗著奇效

汗尤在表曰陰陽俱緊太陽傷寒之脈也法當無汗而反

汗出者表虛亡陽其病不屬太陽而屬少陰矣司寒邪

直入經脈便受故當咽痛而吐利也此為二陰傷太陽邪

虛不任因遂轉入少陰則陰之發蓋太陽者少陰之表猶昏

乃飛渡者多陰主方中寒行曰陰而傷血同古字通用無陽者汗

矣故謂無陽以為之衛護而汗所以反得自成病也陽亡於

而外則利故此節為總冒其義直貫至篇終裏則水下趨

責少陰汗也

少陰病欬而不利譏語者被火氣劫故也小便必難以強

柯韻曰心上欬下利津液喪亡而譏語非轉屬陽明腎

汗可也少陰發熱不得已用麻黃發汗即肺出絡心裏

下焦聲心主別汁大滲入臍肺今故少陰而受邪復受火侮二便機

張隱庵曰平脈為曰寸口諸微亡則陽已虛尺脈弱瀋者
 可發汗者以亡陽故也夫陽亡則寸之案寸為陽尺瀋而復
 乃下焦精血已虛以故復不可在下寸口觀尺脈弱瀋而復
 已虛言寸脈已虛以脈微之在寸口觀尺脈弱瀋而復
 湯發汗者又有承氣湯下之者如其脈微瀋而復
 弱瀋汗者又有承氣湯下之者如其脈微瀋而復
 不可瀋汗者又有承氣湯下之者如其脈微瀋而復
 醫量元戎少陰瀋者復不可發汗亡陽故也宜附子湯若
 陽已虛尺脈弱瀋者復不可發汗亡陽故也宜附子湯若
 少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反
 去者為欲解也雖煩下利必自愈

錢天來曰脈緊見於太陽則發熱惡寒而為寒邪在裏至七八日則陰
 見於少陰則無熱惡寒而為寒邪在裏至七八日則陰
 陽相持以久而始下利則變而為陽氣細弱以自守矣雖至
 下利而脈上微不可發汗之亡陽若以寒邪極盛之緊脈
 恐又為上文微不可發汗之亡陽若以寒邪極盛之緊脈
 陰病其脈上微不可發汗之亡陽若以寒邪極盛之緊脈
 忽見暴微則緊可知脈緊下利之緩時手足已寒邪解之兆也
 曰手足反溫則緊可知脈緊下利之緩時手足已寒邪解之兆也

解則手足不當溫。脹緊得去，是以謂之反也。反溫反去，寒微故手足得溫。脹緊得去，是以謂之反也。反溫反去，寒氣已回，故陰寒之利必自愈也。尤在煩曰：雖煩下利，必自止。意設邪氣盡，則煩與利亦必自止耳。

少陰病下利，若利自止，惡寒而踈卧，手足溫者可治。踈卧，手足不當溫，脹緊得去，是以謂之反也。反溫反去，寒氣已回，故陰寒之利必自愈也。尤在煩曰：雖煩下利，必自止。意設邪氣盡，則煩與利亦必自止耳。

張隱庵曰：此病在少陰，而得火土之生，氣者可治也。下利者，病少陰，若利自止，下焦之氣自生矣。下利者，病少陰，若利自止，下焦之氣自生矣。下利者，病少陰，若利自止，下焦之氣自生矣。

寒而踈卧者，病少陰，若利自止，下焦之氣自生矣。下利者，病少陰，若利自止，下焦之氣自生矣。下利者，病少陰，若利自止，下焦之氣自生矣。

手足逆冷者，即為真陽敗而手足成不治矣。若手足溫則手足逆冷者，即為真陽敗而手足成不治矣。若手足溫則手足逆冷者，即為真陽敗而手足成不治矣。

素問通評虛寬論：從則生，逆則死。所謂從者，手足溫也。王肯堂曰：少陰病下利，惡寒而踈，四逆湯、真武湯。

少陰病惡寒而踈，時自煩，欲去衣被者可治。

張合韶曰：此論少陰得君火之氣者，為可治也。少陰病惡寒而踈，陰盛於外也。時自煩，欲去衣被者，君火在上。

易經佳而命會... 卷一... 少陰... 四

也。陰寒之氣見於中而消。故為可治。錢而天來。諸但惡寒而
不發熱。為寒邪所中。也。踰臥者。踰曲而臥。諸寒收引。惡而
寒之甚也。黃坤輿曰。自頃而去衣被。陽氣之復也。是以
可治。

少陰中風。脈陽微。陰浮者。為欲愈。

錢天來曰。少陰中風者。風受於陰。則寸經也。脈法。浮則為

陽。脈已微。則知風邪欲解。邪入少陰。惟恐為尺部。脈沉。沉

則邪氣入裏。今陰脈反浮。則邪不入裏。故為欲愈也。章

少陰病欲解時。從子至寅上。

虛谷曰。微細。今尺浮者。微也。陰浮者。尺浮之象。故為欲愈也。故其

脈本微細。今尺浮者。微也。陰浮者。尺浮之象。故為欲愈也。故其

少陰病吐利。手足不逆冷。反發熱者。不死。脈不至者。灸少

陰七壯。

陰王之時。而所謂陰得陽則解也。少陰所重。在真陽。可知也。

陰成無已。此曰陽生於子。為一陽。丑為二陽。寅為三陽。少

程郊備曰夫陰病吐而且利裏陰勝矣以胃陽外脫手足不

逆冷之多發熱為衛陽外持前不發熱今反發熱自非死

矣不知陰脈七壯不治從急也弱是而用藥自當從事於溫

足內伯曰從陰動脈在太谿取以流不息之義也其穴在

灸之原能還脈絕則死張壽甫曰灸時宜兩脚一寸時動脈陷中

下利手足健內經曰下利發熱者不死此論其常也仲景曰

者或陽則人生無逆冷反發熱者不死此論其常也蓋暴病

常是美行徵此解之藥鮮有不殺人和其陰若慮其發熱反如

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必使血也

喻嘉言曰少陰病難於不得死然熱病至八九日陰邪內解

腎時反逆一身手足盡熱者以熱在膀胱必無此候當是藏邪傳

五

必起之道故爾盡熱也勝胱之血為女韻伯曰與太陽熱其結出

六勝胱血自下者證同而來因則異也九日傳陽證者有盡

血熱者是指小傳便太陽下利便者指大便言熱在膀胱而便

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道而出

或從口鼻或從耳出者名下厥上竭為難治

張隱庵曰此言強發少陰之汗而動則血中之血也故少陰

病但四厥厥者未從經云衝脈任脈皆起於臍中未

知從何道出者未知從何道出也衝脈任脈皆起於臍中未

會於咽喉別而絡唇口出於頰頰任脈乃口鼻之交通行之

竅或從口鼻者從衝脈而出也任脈從臍上通行之

繫兩目也此生中氣於下血出也承泣或從目出者從任脈

逆內傷為難治喻嘉言曰強發少陰汗而動其血勢必
皆耳目較前證太陽當汗之證尺中一遲矣輕不可汗曰五榮

隨奔氣之促也。况強發少陰汗乎。周身之氣皆逆。血
 溫不可而論。一歸人得傷寒數日。咽乾煩渴。脈弦細。醫
 者汗之。其始血。蓋少陰中血。不當發汗。仲景云。少陰強
 為發汗。必動其血。未可知。從道而。出。或從口鼻。或從耳。目。是
 後得微汗愈。陶節庵曰。當歸四逆湯。仍灸太谿。三陰交。湧泉。

少陰病惡寒身踈而利手足厥冷者不治

柯韻伯曰。傷寒以陽為主。不特陰證見陽。則作瘕。陰盛則陰
 病。見陽證者。可治。背為陽。腹為陰。陽盛則作瘕。陰盛則
 踈。臥若利。而手足無陽。所謂六府氣絕。於外者。利。手足
 足逆冷。是純陰。無陽。所謂六府氣絕。於外者。利。手足
 難主。氣絕於內者。下利。不禁矣。所奉。故。手足受氣。於四肢
 於少陰。急投。最重。針。馳。遠。曰。此證。尚。未。至。汗。出。息。高。猶。為
 可治。

少陰病吐利躁煩四逆者死

易... 卷... 六

程郊借曰吐利而躁煩陰陽離脫而擾亂土可知也
此乎此與吳茱萸湯證存陰從燥耳陳修園曰此一陰中
尚現陽神一則陽盡唯存陰燥耳陳修園曰此一陰中
藉死也土之氣交上下而連回旁若胃氣絕則陰陽離故
少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

喻嘉言曰下利既止其人自可得生者乃頭眩時時自冒
者復言為死候蓋人身陰陽相為依附者也頭眩時時自冒
諸於陽而上聚死於頭可見然而利止則生陰盡利止則死

脫於陽而上聚死於頭可見然而利止則生陰盡利止則死
如矣殘燈餘焰上下騰則頭眩時時自冒而死也陽既下竭
如矣殘燈餘焰上下騰則頭眩時時自冒而死也陽既下竭

時眩之狀虛陽上脫也鏡天來曰頭眩者頭目眩暈也
時眩之狀虛陽上脫也鏡天來曰頭眩者頭目眩暈也

時自冒者胃氣通於上也法惜乎用之不知也無及矣
也時自冒者胃氣通於上也法惜乎用之不知也無及矣

時自冒者胃氣通於上也法惜乎用之不知也無及矣
時自冒者胃氣通於上也法惜乎用之不知也無及矣

少陰病四逆惡寒而身踈脈不至心煩而躁者死

黃坤已如四逆心煩而身躁陰盛極矣脈又不至則陽
氣已絕如是則心煩而躁者死蓋陽升則煩陽脫則躁
素問陰精者神之宅也神藏則精寒陽根欲脫神魂失藏
藏於陰精者神之宅也神藏則精寒陽根欲脫神魂失藏
是以反陰病而陽氣不行於四肢故逆陽氣不布於周
身故惡寒而身躁陽氣不通於四肢故逆陽氣不布於周
身躁擾者純陰無陽之中忽呈陰證似陽為大將絕而
暴張之狀主死○宗本湘古本作不煩而躁者死今依
本論改正

少陰病六七日息高者死

何韻白三焦息者乃腎間動氣也但出心與脈不能入肝
與腎生其氣已絕於內也六經中獨少陰歷言死證他經
無死證其氣息高則真氣上逆於胸中本實先機而不能
復歸於氣海故主死也
傷寒論識後世所謂鼻扇亦息高之類也但氣出而不還
少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自

利復煩躁不得卧寐者死。

喻嘉言曰：脈微沉細，但欲卧，其陰矣。乃於之本證也。欲吐，不一證。

則陽證，言曰：脈微沉細，但欲卧，其陰矣。乃於之本證也。欲吐，不一證。

欲吐，明係加陰，煩躁，正當急溫之時。邪至此，不轉增，正於六。

也。程賢曰：真陽擾亂，頃刻算陰，感陰不己，而無汗，出是為死。

鬼氣，陽欲成，濟也。一病經表裏之分也。陽現，故不見煩躁等證者。

少陰病，始得之，反發熱，脈沉者，麻黃附子細辛湯主之。

尤在涇曰：此寒中，少陰之經，而復外連太陽之證，以少陰與太陽為表裏，其氣相通，故也。少陰始得，本無熱，而

外連太陽，則反發熱，細辛專溫少陰之經，仍繫少陰，則脈不浮而沉，故與附子細辛專溫少陰之經，仍繫少陰，則脈不

法黃正也。子合用，俾外邪出而真陽不出，纔是少陰表。

此乃條... 溫條... 陰者當無... 此乃條... 溫條... 陰者當無... 此乃條... 溫條... 陰者當無...

麻黃附子細辛湯方

麻黃二兩 附子一枚 破八片 細辛二兩

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

此乃條... 溫條... 陰者當無... 此乃條... 溫條... 陰者當無... 此乃條... 溫條... 陰者當無...

為表精重麻黃用子本細辛湯以汗之。房慾後傷寒多患此

證治精重麻黃用子本細辛湯以汗之。房慾後傷寒多患此

別則不痛甚則效速又治寒邪犯齒致腦齒痛宜急用之

爾室秘通其汗經頭痛三陰三陽經不流主而足寒氣

不能發或通暴逆聲不出咽痛異常卒然而起或欲發而

之大其不可輕用寒涼之劑辛湯溫之并以蜜製附子為

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日

無裏證故微發汗也。

無他證者曰此承上證而言若得之二三日只發熱以微

陰不汗得也金雞不煩此二證皆未曰無汗非仲景暑之也

麻黃附子甘草湯方