

庐山常見外傷止血藥



中国科学院
庐山植物园

革命委员会編

一九六九年九月

最 高 指 示

领导我們事业的核心力量是中国共产党。

指导我們思想的理論基础是馬克思列宁主义。

(中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次會議開幕詞)

备战、备荒、为人民。

(引自周恩来总理在北京市革命委员会成立和庆祝大会上的讲话。)

要斗、私、批、修；要拥军爱民，要抓革命促生产，促工作，促战备，把各方面的工作做得更好。

(引自《人民日报》一九六七年十一月十日《形势比以往任何时候都好》)

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

(引自一九六八年第三期《红旗》杂志)

中国医学是一个巨大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

对卫生部《关于组织西医离职学习中医班总结报告》的指示。

前 言

偉大領袖毛主席指出：“蘇修、美帝狼狽為奸，做了这么多的坏事、丑事，全世界革命人民是不会饶过他們的。世界各國人民正在起来，一个反对美帝、蘇修的历史新时期已经开始。”我們在毛主席的英明领导下，在史无前例的无产阶级文化大革命中，在社会主义革命和社会主义建設中取得了偉大的胜利。但是，我們决不可因为胜利，放松自己的革命警惕性，决不可忽视美帝、蘇修发动大规模侵略战争的危險性，我們要作好充分准备，准备他們大打，准备他們早打，准备他們打常規战争，也准备他們打核大战。总而言之，我們要有准备。

在偉大領袖毛主席“备战、备荒、为人民”最高指示的指引下，在党的“九大”浩蕩东风的鼓舞下，我們遵照毛主席“中国医药学是一个偉大的宝庫，应当努力发掘，加以提高”的偉大教导，在庐山織革委员会的大力支持下，收集了四十余种中草药，整理編写了“庐山常見外伤止血药”这本小冊子，作为落实“九大”精神，提高警惕保卫祖國的实际行动，并以此向建国二十周年大庆献礼，向偉大領袖毛主席敬献忠心。这些草药，大部分經民間应用有良好的止血消炎效能，有的是我們綜合了國內有关資料編輯而成，由于我們的水平有限，錯誤之处，敬請同志們批評指正，以便充實提高。

中国科学院
庐山植物园 革命委员会

一九六九年九月十八日

目 录

楊梅	(1)
野苧蕨	(3)
庐山长叶小蘗	(5)
闊叶十大功劳	(7)
油菜籽	(8)
佛甲草	(9)
榿木	(10)
仙鹤草	(12)
翻白草	(14)
地榆	(16)
合萌	(18)
盐肤木	(19)
白芨	(21)
木芙蓉	(23)
木槿	(25)
砾砂根	(27)
杜葶山	(29)
华山矾	(30)
醉鱼草	(31)
双蝴蝶	(33)
白薇	(34)
紫草	(36)
散血丹	(38)
夏枯草	(40)
地瓜儿苗	(42)

車前	(44)
梔子	(46)
金銀花	(47)
續斷	(49)
艾	(51)
旱蓮草	(52)
土三七	(53)
蒲黃	(55)
白茅	(56)
天南星	(58)
半夏	(60)
白及	(62)
石松	(64)
卷柏	(65)
紫萁	(66)
海金砂	(67)
小叶雞尾草	(69)
拉丁學名引索	(71)
附錄：《名詞解釋》	(73)

楊 梅

(異名：火梅樹、水楊梅、樹梅)

學名：Myrica rubra S. et Z.

楊梅科

形态：常綠喬木，高可達10餘米。樹皮幼時平滑，褐色，老樹變為縱淺裂，芽、幼枝及葉柄無。單葉互生，厚革質，有短柄，倒卵狀長圓形或楔狀披針形，先端鈍或微尖，基部漸狹，全緣或中部以上有少數粗鋸齒，表面深綠有光澤，兩面均無毛。花單性，雌雄異株，雌花序卵狀長圓形，雄花序圓柱形，通常不分枝，紅黃色。核果球形，外果皮暗紅色，肉質多液。花期3—4月，果期6—7月。

生態環境：多生于陽光充足的疏林或灌叢中。土壤肥沃，排水良好的地方生長旺盛。

效用及制作：樹根皮供藥用，根烘乾存性，取根皮一兩，加冰片（中藥）三分，共研成粉末，用粉末撒布傷處，包紮即可止血消炎。

另外，樹皮、根皮、葉均含鞣質，可制烤膠，樹皮為治療痢疾的有效良藥。寧波取樹皮煎水漱口，能治牙痛，果核燒灰敷之可治牙疳。



图 1 楊 梅

野 苧 麻

(異名：野麻、苧麻)

学名：Boehmeria nivea Gaud.

蕁麻科

形态：多年生草本或亚灌木，高1—2米，莖直立，有分枝，密生灰褐色粗糙毛。单叶互生，闊卵形至卵形，先端长漸尖，基部闊楔形或截形，边缘有粗鋸齿，表面綠色粗糙，背面密生白色茸毛，脈上有长柔毛。花单性，雌雄同株，成腋生柔荑花序。花为淡綠色，雄花序通常位于雌花序之下，雌花具有管状花被。瘦果橢圓形具毛。花期4—5月，果期7—8月。

生态环境：喜生溫暖雨量充足的山坡、阴湿地、山沟、路边等。以肥沃的砂质壤土，腐植质壤土最为合适。贫瘠之地也可栽培。

效用及制作：根叶供药用，叶为止血药，治创伤出血、瘀血，效果良好。在生长期过程中（4—10月）均可采集鲜叶捣烂外敷创伤伤口。还可将鲜叶采制晒干或烘干存性，研成細粉，外敷伤口均有止血的效能。另外其根为利尿解热剂，有安胎作用。莖干外皮为良好的纖維原料。



图 2 野 苧 麻

庐山长叶小檗

学名: *Berberis virgetorum* Schneid.

小檗科

形态: 落叶灌木, 高达2米, 枝条粗壮, 有稜角, 多分枝, 全体无毛, 皮淡褐色, 内皮及木质黄色, 叶刺粗壮, 多不分叉, 希有2叉或3叉, 棕褐色。叶片纸质, 光滑无毛, 5片簇生于刺腋, 卵形或长卵状披针形, 全缘, 春生叶叶缘有红色斑纹, 先端钝尖, 基部楔形, 柄短为紫色, 表面深绿色, 背淡绿色, 总状花序, 下垂生于叶腋, 花冠黄色。浆果长圆形, 熟时灰褐色有白粉, 有种子2粒, 长卵形。花期5—6月, 果期7—8月。

生态环境: 分布于全省各山区、多见山坡林下, 土壤肥沃的水沟旁。庐山500公尺以上的山沟阴湿处, 以及向阳山坡的水沟旁分布较多。

效用及制作: 根中含有小檗碱, 供药用。

挖取鲜根, 切细煎水, 可为外伤消炎用, 另外还可用作苦味健胃剂, 煎汁洗眼可治赤目炎症, 内服可清热退火, 有止痢疾和止牙痛的功效。




图 3 庐山长叶小檗

闊叶十大功劳

(異名：大叶黃連、貓儿头)

学名：Mahonia bealei Carr.

小蘗科

形态：常綠灌木，高达4米，莖粗壯，直立，少分枝，全体无毛。外部有粗栓皮，木部黃色。叶革質互生，或簇生莖頂，奇数羽狀复叶，小叶9—15枚、对生，卵圆形至矩卵圆形，先端漸尖，有銳刺，基部不相称，截或心形，邊緣反卷，每側有2—5个粗大硬刺齒，上面暗綠色，下面帶白色，总狀花序，丛生枝端，花多数，黃色，两性，花梗5毫米，基部有卵圆形苞片一枚，漿果卵圆形，藍黑色，有白粉，花期3月，果期4—5月。

生态环境：本省分布于800—1500公尺的山区，常見于山坡林下較阴处、腐植質深厚、排水良好的林下水边旁，生长較多，亦常見栽培庭园中。

效用及制作：根供药用，內含有小蘗鹼。多用于外伤消炎药，取鮮根打去泥土（勿洗）切成細片，开水煮沸濾去殘渣，待水冷却后用其冲洗伤口，为良好的消炎止痛药。另外用其提取小蘗鹼可治肺癆、止咳、化痰、退热等症。

油 菜 籽

学名: *Brassica campestris* Linn.

十字花科

形态: 一年生或二年生草本, 直立, 高100—150厘米, 无毛, 在开花时带白霜, 根坚实粗壮, 根叶多数、坚实, 亮綠色倒卵形, 基部窄, 基緣或有不明显的锯齿, 茎叶无柄抱茎, 总状花序成圆锥状复花序, 花淡黄, 长角、細瘦种籽球形褐色。花期3—4月, 果期4—5月。

生态环境: 此种在我国长江中下游地区广泛栽培, 种子榨油供食用。

制作及使用方法: 取成熟种籽半盞, 去其杂质, 研成粉末, 用鸡蛋三个均匀調成膏状敷伤口, 即止血止痛, 外用胶布或綢帶包紮固定。

另外种籽有行血、催生、消肿的功能。治疗难产, 产后瘀阻心腹痛, 外敷治痈肿丹毒。

佛 甲 草

(異名：万年草、午时花、小叶刀嫩草)

学名：Sedum lineare Thunb.

景天科

形态：多年生草本，莖长30厘米，多数丛生，肉质多汁，颇柔软，倾臥地面，着地的部分节生根。花莖直立，高10—20厘米，圆柱形綠色。叶綫形，三片輪生，基部扁平，上方漸次成圆柱形，多肉質，全体无毛。花莖于頂端分枝，每枝梗分叉状疏生黃色小花，无花梗，苞片綫形，萼片五枚，綫形或披針形，花瓣五片长椭圆形，先端細尖，黃色，質薄。蓇突果，种子細小。花期6月，果期7—8月。

生态环境：生于山野，多石質干燥山坡或灌木丛間，山沟土壤肥沃的阴湿处亦有分布。

效用及制作：全草为葯用，莖叶全草可治火燙伤，咽喉腫痛，刀伤出血，紅肿疼痛。用法：5—6月采收，全草搗烂外敷伤口即可止血。另将全草晒干研碎成粉末备用。



图 4 佛 甲 草

榧 木

(異名：榧柴、榧子条儿)

学名：Loropetalum chinensis Oliv. 金縷梅科

形态：常綠灌木或小乔木，高4—6米，树皮深灰色，小枝細，密生灰褐色星状毛，嫩叶、花序、花萼背面及果均有淡棕黃色星状短柔毛。叶互生，卵圆形至卵状椭圆形，先端尖，基部圆形或偏心脏形，革质、全緣，边缘有纤毛，叶正面为綠色，背面帶白霜，花两性，簇生于小枝端，白色或乳白色，蒴果木質，花期5月，果熟期10月。

生态环境：喜生在阳光充足的山坡，路边，灌木丛中。在海拔600米以下，常与其他灌木混生，因經常砍伐，很少长成小乔木。

效用及制作：采用新鮮的花，叶搗烂，外敷可治刀伤、刺伤，有止血作用。花焙干研末外敷刀伤，效果优良。并可将其叶晒干研粉备用。



图 5 榧 木

仙 鶴 草

(異名：龙牙草、石打穿)

学名：Agrimonia pilosa Ledeb.

蔷薇科

形态：多年生直立草本，高50—60厘米。全体被长柔毛，基部木质，上部多分枝。叶为奇数羽状复叶，互生有柄，小叶片3—7枚，大小不等，长卵形或椭圆状卵形，先端锐尖，基部楔形，有时稍斜，边缘锐锯齿。密生柔毛，顶生及中部的叶较大，各小叶之间夹杂数对小形小叶。总状花序，顶生或腋生，窄细长10—20厘米，花有短梗，花冠五片，黄色，倒卵形，先端微凹，瘦果包于具钩刺的宿存花萼内。花期7—8月，果期9—10月。

生态环境：常见于荒地、山坡、路边、草地或其他杂草混生，有时成片生长。在庐山200—1200公尺范围内的山坡、路边，排水良好的地方均有分布。

效用及制作：全草供药用，为有名的收敛剂，治外伤出血、吐血、咯血、肠出血、子宫出血等症。外伤止血常用新鲜全草捣烂外敷伤口或采挖全草晒干或烘干研成粉末敷用。